


E $\frac{15}{30}$



$$\frac{9}{6} \frac{15}{30}$$

ДОМАШНІЙ
ГОМЕОПАТИЧЕСКІЙ ЛѢЧЕБНИКЪ,

ИЛИ

ПОЛНОЕ НАСТАВЛЕНІЕ

КАКЪ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВОЛѢЗНИ ПО ГОМЕОПАТИЧЕСКОМУ СПОСОБУ.

Съ приложеніемъ характеристики наиболѣе употребительныхъ
и новѣйшихъ гомеопатическихъ лѣкарствъ.

СОЧИНЕНІЕ

ДОКТОРА БЕРНГАРДА ГИРШЕЛЯ.


Изданіе второе, исправленное и дополненное по одиннадцатому
нѣмецкому.

ИЗДАТЬ А. ФОРВРИХЕРЪ.

МОСКВА.

Типографія Федора Ивановича Нейбюргеръ, Кузнецкій мостъ, д. нн. Голицына.

1879.



101

Книга имеет:

Печатных листов	Выпуск	В переплетн. един. соедин. №№ вып.	Таблиц	К а р т	Иллюстр.	Служебн. №	Наклад и всписка
38		шт. 2				121	14

167



ДОМАШНІЙ
ГОМЕОПАТИЧЕСКІЙ
ЛѢЧЕБНИКЪ.

38405-0



2011142081

801-92
7063-3
15
30

ДОМАШНІЙ
ГОМЕОПАТИЧЕСКІЙ ЛѢЧЕБНИКЪ,

ИЛИ

ПОЛНОЕ НАСТАВЛЕНІЕ

КАКЪ ПОЛЬЗОВАТЬ БОЛѢЗНИ ПО ГОМЕОПАТИЧЕСКОМУ СПОСОБУ.

Съ приложеніемъ характеристики наиболѣе употребительныхъ
и новѣйшихъ гомеопатическихъ лѣкарствъ.

СОЧИНЕНІЕ

ДОКТОРА БЕРНГАРДА ГИРШЕЛЯ.

Изданіе второе, исправленное и дополненное по одинадцатому
нѣмецкому.

ИЗДАЛЪ А. ФОРВРИХЕРЪ.



МОСКВА.

Типографія Федора Ивановича Нейбюргеръ, Кузнецкій мость, д. нн. Голицына.

1879.

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Предлагаемая книга Дрезденскаго врача доктора Бернгарда Гиршеля всегда представляла одинъ изъ наиболѣе основательныхъ и популярныхъ гомеопатическихъ лѣчебниковъ. Нынѣшнее изданіе выгодно отличается отъ предъидущаго еще большею полнотою и особенно удобствомъ справокъ. Почти на каждой страницѣ читатель встрѣтитъ что-нибудь новое. Особенно слѣдуетъ указать на *новыя лекарства*, которыя упоминаются почти при каждой болѣзни, и на цѣлый новый отдѣлъ: *обозрѣніе сферы дѣйствія лекарствъ*, имѣющее цѣлью облегчить выборъ средства, подходящаго къ извѣстному случаю заболѣванія. *Характеристика лекарствъ* значительно дополнена.

Надѣмся, что второе изданіе этого лѣчебника будетъ встрѣчено публикой такъ же сочувственно и также принесетъ свою долю пользы.

Издатель.

Объ употребленіи книги.

1. Названіе болѣзни, для которой хотять выбрать лѣкарство, слѣдуетъ отыскать въ оглавленіи или въ алфавитномъ указателѣ. Если названіе тамъ не окажется, то это значитъ, что авторъ съ намѣреніемъ опустилъ его, потому что лѣченіе болѣзни той невозможно для не-врача.

2. Затѣмъ слѣдуетъ прочесть всю статью объ этой болѣзни, съ начала до конца, потому что выборъ лѣкарствъ основывается на внимательномъ сравненіи ихъ характеристикъ. Слѣдуетъ также сравнить статьи о другихъ болѣзняхъ, на которыя указано въ данной статьѣ. Чѣмъ болѣе изучать лѣкарства въ дѣйствіи ихъ и противъ другихъ болѣзней, тѣмъ болѣе будешь основываться съ ихъ характеромъ, и тѣмъ легче будетъ выбрать лѣкарство и для данной болѣзни. Если при какой-нибудь болѣзни рекомендуется нѣсколько лѣкарствъ безъ точныхъ указаній, то слѣдуетъ отыскать поочередно эти медикаменты въ обзорѣ и характеристикѣ лѣкарствъ и, сравнивъ указанные тамъ симптомы, выбрать то средство, которое наиболѣе подходит къ данному случаю.

3. Болѣе важныя лѣкарства, на которыя преимущественно слѣдуетъ обращать вниманіе, напечатаны **жирнымъ** шрифтомъ. Напечатанныя *курсивомъ* занимаютъ второе мѣсто. Обращаться къ лѣкарствамъ, приведеннымъ въ примѣчаніяхъ, слѣдуетъ только тогда, когда приведенныя въ самомъ текстѣ окажутся неподходящими.

4. Не всегда бываетъ, чтобы всѣ характеристическіе симптомы, показанныя при известномъ лѣкарствѣ, подходили подъ данный случай заболѣванія. Поэтому при выборѣ известнаго лѣкарства слѣдуетъ основываться на томъ, чтобы оно имѣло за со-

бой наибольшее, сравнительно съ другими лѣкарствами, число подходящихъ симптомовъ.

5. Что касается до важнаго вопроса о силѣ и повтореніи приѣма, то онъ въ большинствѣ случаевъ рѣшается въ главахъ объ отдѣльныхъ болѣзняхъ. Гдѣ же этого нѣтъ тамъ слѣдуетъ придерживаться общаго правила: въ **острыхъ болѣзняхъ** давать **низкія дѣленія и повторять приѣмы чаще** (черезъ 4, 3, 2 и даже 1 часъ), а въ **хроническихъ** давать **болѣе высокія дѣленія и повторять приѣмы рѣже** (1, 2, 3 раза въ день, черезъ день, или съ промежутками въ нѣсколько дней).

6. Цифры, находящіяся при названіяхъ лѣкарствъ, означаютъ наиболѣе употребительную степень разжиженія (дѣленія). Впрочемъ, можно давать лѣкарства нѣсколькими степенями ниже (по понятіямъ гомеопатовъ-теотериковъ это будетъ болѣе слабый приѣмъ). Если же при цифрѣ стоитъ знакъ (—), то это означаетъ, что показанное дѣленіе есть самое крѣпкое, ниже котораго давать не слѣдуетъ. Такъ напр. *Aconit.* — 2 значить, что давать слѣдуетъ не ниже 2 дѣленія, но что не дурно подняться нѣсколько выше, т. е. дать 3 или 4 дѣленіе. Болѣе сильными дѣленіями мы будемъ считать писшія.

7. Обыкновенно приѣмъ состоитъ изъ 1 — 3 капель разжиженія, или 1 — 2 щепотокъ (сколько помѣщается на кончикѣ перочиннаго ножа) порошка (растиранія), или, наконецъ, изъ 2 — 4 крупинокъ. Сравнить сказанное о приѣмахъ лѣкарства и ихъ повтореніи ниже, на стр. 20 — 24.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

ВВЕДЕНІЕ.

	Стр.
I. Основаніе гомеопатіи	1.
Жизнь и дѣятельность Гапеманна.	2.
Будущность гомеопатіи	12.
Основныя черты гомеопатическаго способа лѣченія	15.
II. Устройство и употребленіе домашней гомеопатической аптечки	19.
Правила относительно принятія лѣкарствъ и приготовленія разжиженій	20.
Правила относительно повторенія пріемовъ.	23.
Составъ домашней гомеопатической аптечки	24.
Списокъ новыхъ американскихъ и другихъ рѣже употребляемыхъ въ этомъ сочиненіи лѣкарствъ	30.
III. Діететическія наставленія.	31.

О БОЛѢЗНЯХЪ ВЪ ЧАСТНОСТИ И ИХЪ ЛѢЧЕНІИ

ПЕРВОЕ ОТДѢЛЕНІЕ.

Болезни кровеносной системы.

A. Лихорадка.

1. Перемежающаяся, собственно такъ называемая лихорадка, <i>febris intermittens</i>	38.
2. Тифъ, нервная горячка, <i>febris nervosa, typhus</i>	45.
3. Родильная лихорадка, <i>febris puerperalis</i>	53.
4. Молочная лихорадка, <i>febris lactica</i>	55.

Б. Болѣзненное состояніе крови относительно количества.

	Стр.
5. Приливъ крови, волненіе, чувство жара, <i>congestiones</i>	56.
6. Полнокровіе, <i>plethora venosa, venositas</i>	57.
7. Геморрой, <i>haemorrhoides</i>	59.
8. Кровотеченія: подкожное кровотеченіе, кровотеченіе въ подкожной кѣтчаткѣ, (подкожное кровоизліяніе); кровотеченіе носомъ, <i>epistaxis</i> ; кровотеченіе изъ легкихъ, кровохарканіе; <i>haemoptoe</i> или <i>haemoptysis</i> ; рвота кровью, <i>vomitus cruentus, haematemesis</i> ; кровавыя испражненія, <i>haemorrhagia intestinorum</i> ; кровотеченіе изъ почекъ, пузыря, мочевого канала, кровавая моча, <i>haematuria</i> ; кровотеченіе изъ матки, <i>metrorrhagia</i> , и выкидышъ, <i>abortus</i>	64.
9. Малокровіе, <i>anaemia</i> , и дѣвичья немочь, <i>chlorosis</i>	72.

В. Болѣзненное состояніе крови относительно качества.

10. Золотуха, <i>scrophulosis</i> , и Англійская болѣзнь, <i>rhachitis</i>	76.
11. Ломота, <i>arthritis</i>	80.
12. Ревматизмъ. Сюда относятся: ревматическая лихорадка; сѣдалищная боль, <i>ischias</i> ; боль въ поясницѣ.	84.
13. Водянки, <i>hydropes</i> . Всеобщая водянка; подкожная водянка, водянка кѣтчатой ткани, называемая также отекомъ, <i>anasarca</i> и <i>oedem</i> ; мозговая водянка, <i>hydrocephalus</i> ; грудная водянка; водяная околосердечной сумки, <i>hydropericardium</i> ; водянка легкихъ, водянка груди, <i>hydrothorax</i> ; водяная живота, <i>hydrops ascites</i> ; мошонки, <i>hydrocele</i> ; матки, <i>hydrometra</i> ; яичниковъ, <i>hydrops ovarii</i> ; желчнаго пузыря, <i>hydrops cystidis felleae</i> ; фаллопиевыхъ трубъ, <i>hydrops tubarum</i> ; почечной чашечки, <i>hydronephrose</i> ; суставовъ, особенно колѣнъ, <i>hydrops articularis, hydrarthros</i> ; почекъ, или отдѣленіе мочи, содержащей много бѣлковины, <i>albuminuria, morbus Brightii</i>	91.
14. Сахарное мочеизнуреніе, <i>diabetes mellitus</i>	97.
15. Ожирѣніе, <i>obesitas</i>	98.
(16 — 20). Чахотки, изнурительныя болѣзни, <i>phthises, tabes</i> , изнурительныя лихорадки	99.

	Стр.
16. Горловая (гортанная) чахотка, <i>phthisis laryngea, trachealis etc</i>	100.
17. Легочная чахотка, <i>tuberculosis</i> или <i>phthisis pulmonalis</i> и <i>pneumonia chronica caseosa</i> , просачивающаяся бугорчатка, и слизистая чахотка, <i>phthisis pituitosa</i>	101.
18. Брюшная чахотка, <i>phthisis abdominalis</i> , сухотка дѣтей, <i>tabes meseraica</i>	102.
19. Нервные чахотки: страданія головного мозга, изнурительная нервная горячка, <i>febris nervosa lenta</i>	102.
20. Чахотки, происходящія отъ разрушенія мускуловъ, костей и суставовъ	103.

Г. Болѣзни кровеносной системы.

21. Болѣзни сердца, <i>affectio cordis</i> , сердцебиеніе, <i>palpitatio cordis</i>	104.
а. Неорганическія болѣзни сердца	105.
б. Органическія болѣзни сердца	107.
22. Воспаленіе сердца и околосердечной сумки, <i>myo</i> — и <i>endocarditis</i> и <i>pericarditis</i>	110.
23. Болѣзни большихъ кровеносныхъ сосудовъ (страданія аорты, расширеніе венъ, воспаленіе венъ, бѣлая опухоль лядвей, <i>phlegmasia alba dolens</i>).	112.
Базедова болѣзнь	113.

ВТОРОЕ ОТДѢЛЕНИЕ.

Болѣзни нервной системы.

А. Болѣзни мозга и его оболочекъ.

24. Воспаленіе мозга, острая водянка мозга, мозговое выпотѣніе, <i>encephalitis, meningitis, hydrocephalus acutus</i> . Эпидемическое воспаленіе спинно-головного мозга, <i>meningitis cerebrospinalis epidemica</i>	114.
25. Ударъ, <i>apoplexia</i>	119.
26. Головокруженіе, <i>vertigo</i>	122.

	Стр.
27. Головная боль, <i>cephalalgia</i>	125.
28. Кровяная опухоль головы у новорожденныхъ, <i>cephalae- matoma</i> , и болѣзни черепа	133.
29. Ненормальный сонъ: бессонница, <i>agrypnia</i> ; спячка, <i>sopor</i> ; бессонница дѣтей и т. д.	133.
30. Душевные (психическіе) недуги, <i>psychopathiae</i>	136.

Б. Болѣзни органовъ чувствъ, ихъ аппаратовъ и прилежа- щихъ частей.

31. Глазныя болѣзни: воспаленіе глазныхъ вѣкъ, <i>inflamma- tio palpebrarum</i> ; воспаление глазъ, <i>inflammatio bulbi</i> ; слабость глазъ, <i>amblyopia</i> и <i>asthenopia</i> ; ячмени, <i>hor- deolum</i> и т. д.	138.
32. Болѣзни уха: глухота, <i>barycoxia</i> ; шумъ въ ушахъ, <i>tin- nitus aurium</i>	142.
33. Воспаленіе уха, <i>otitis</i>	143.
34. Боль, ломъ (стрѣльба) въ ушахъ (ревматизмъ уха).	144.
35. Истеченіе изъ уха, <i>otorrhoea</i>	145.
36. Воспаленіе околоушныхъ слюнныхъ желѣзъ, свинка, <i>parotitis</i>	146.
37. Разстройства обонянія	147.
38. Разстройство вкуса	147.
39. Разстройство чувствъ	147.

В. Болѣзни спинного мозга и его оболочекъ.

40. Воспаленіе спинного мозга, <i>inflammatio medullae spina- lis, myelitis acuta et chronica</i>	148
41. Боль въ спинѣ, раздраженіе спинного мозга, <i>irritatio spinalis</i>	150.
42. Истерика и ипохондрія, <i>hysteria, hypochondriasis</i>	152.

Г. Болѣзни нервовъ движенія и чувствъ.

43. Слабость нервовъ, <i>debilitas nervosa</i>	156.
44. Судороги, <i>spasmi</i> ; конвульсии, <i>convulsiones</i> или <i>spasmi clonici</i> ; столбнякъ, <i>spasmus tonicus</i> ; сведеніе челюстей.	

Стр.

<i>trismus</i> ; судороги отъ ранъ, <i>tetanus</i> ; нервное оцѣненіе, <i>catalepsia</i> ; самостоятельный дѣтскій параличъ; пляска св. Витта, малая — <i>chorea St. Viti</i> , и большая — <i>chorea Germanorum</i> ; падучая болѣзнь, <i>epilepsia</i> ; судороги беременныхъ и родильницъ, <i>eclampsia gravidarum et parturientium</i>	157.
45. Параличъ органовъ движенія, <i>paralysis</i>	165.
46. Нервные боли (невралгіи), <i>neuralgiae</i>	169.
47. Личная боль, <i>tic douloureux, prosopalgia</i>	169.
48. Нечувствительность, параличъ органовъ чувствъ, <i>analgesia, anaesthesia</i>	174.
49. Обморокъ, <i>syncope</i>	174.

ТРЕТЬЕ ОТДѢЛЕНІЕ.

Болѣзни слизистыхъ оболочекъ.

А. Болѣзни дыхательнаго аппарата.

а. Болѣзни носа.

50. Катарръ носа, насморкъ, <i>catarrhus nasalis, coryza</i>	176.
51. Нарывы въ носу, <i>ulcus nasale</i> ; вонючее истеченіе изъ носу, <i>ozæna</i> , и опухоль носа	179.
52. Полипы въ носу, <i>polypus nasi</i>	180.

б. Болѣзни гортани, дыхательнаго горла и его развѣтвленій (бронхіи), легкихъ и подреберной плевы.

(53 — 59.) Кашель	181.
53. Простой катарральный кашель; катарральная лихорадка; <i>catarrhus acutus</i> и <i>chronicus</i> ; <i>febris catarrhalis</i>	182.
54. Гриппъ, <i>influenza, febris catarrhalis epidemica</i>	188.
55. Органическій кашель.	188.
56. Судорожный кашель, <i>catarrhus spasmodicus</i>	192.
57. Коклюшъ, <i>tussis convulsiva</i>	195.
58. Воспаленіе гортани, <i>laryngitis</i> , дыхательнаго горла, <i>tracheitis</i> , и его развѣтвленій (бронхіи), <i>bronchitis</i>	198.

	Стр.
59. Крупшъ, <i>angina membranacea</i>	199.
60. Охрипость, <i>raucedo</i>	204.
61. Воспаленіе легкихъ, <i>pneumonia</i>	206.
62. Воспаленіе подреберной плевы (плевры), <i>pléuritis</i>	210.
63. Воспаленіе грудныхъ желѣзъ, <i>mastitis</i>	212.
64. Стѣсненіе дыханія, одышка (стѣсненіе въ груди), судорожная одышка, <i>asthma</i> ; грудная жаба, <i>angina pectoris</i> , <i>stenocardia</i> ; Миллярова одышка, или судороги гортанной щели, <i>laryngismus stridulus (spasmus glottidis)</i>	213.

Б. Болѣзни пищеваго аппарата.

а. Болѣзни органовъ жеванія и глотанія.

65. Гнилость рта, <i>stomatace</i> ; водяной ракъ, <i>notha</i>	219.
66. Молочница, <i>aphthae</i>	221.
67. Дурной запахъ изо рта, <i>halitus foetidus</i>	222.
68. Воспаленіе языка, <i>glossitis</i>	222.
69. Опухоль языка, <i>tumor linguae</i>	223.
70. Нарывы на языкѣ, <i>ulcera linguae</i>	223.
71. Параличъ или неповоротливость языка, <i>paralysis linguae</i>	224.
72. Слюнотеченіе, <i>salivatio</i> или <i>ptyalismus</i>	224.
73. Зубная боль, <i>odontalgia</i>	224.
74. Зубная болѣзнь дѣтей, трудное прорѣзываніе зубовъ, <i>dentitio difficilis</i>	232.

б. Болѣзни зѣва.

75. Воспаленіе горла, <i>angina faucium, uvularis, tonsillaris, pharyngea</i>	235.
76. Дифтеритъ, гангренозная жаба, <i>diphtheritis</i>	239.
77. Воспаленіе пищевода, <i>oesophagitis</i>	242.

в. Болѣзни желудка и кишечнаго канала.

(78 — 81.) Желудочные (гастрическіе) недуги	242.
78. Катартъ желудка, также: испорченный желудокъ, гастрическое состояніе, <i>status gastricus, catarrhus gastricus</i> ; гастрическая лихорадка, <i>febris gastrica</i> ; ослизненіе желудка, <i>status pituitosus</i> ; слабость желудка, <i>dyspepsia</i>	243.

	Стр.
79. Развитие кислотъ въ желудкѣ, <i>acor</i> ; изжога, <i>pyrosis</i> .	250.
80. Рвота, <i>vomitus</i> .	251.
81. Вѣтры, <i>flatulentia</i> .	253.
82. Желудочныя боли, <i>gastrodynia</i> , или судороги желудка, <i>gastralgia</i> или <i>cardialgia</i> .	255.
83. Воспаленіе желудка, <i>gastritis</i> .	261.
84. Размягченіе желудка, <i>gastromalacia</i> .	263.
85. Воспаленіе нижней части живота, т. е. брюшины, <i>peritonitis</i> , или кишекъ, <i>enteritis</i> .	264.
86. Боли въ животѣ, колики, <i>colica</i> .	268.
87. Поносъ простой, <i>diarrhoea</i> и 88. Кровавый поносъ, <i>dysenteria</i> .	272.
89. Холерина; европейская или спорадическая холера, <i>cholera</i> . Холера дѣтей, <i>cholera infantum</i> .	281.
90. Азіятская, или эпидемическая холера, <i>cholera epidemica</i> .	283.
91. Запоръ, <i>obstructio</i> .	286.
92. Животные паразиты. А. Глисты, глистные болѣзни <i>helminthiasis</i> ; Б. Трихины, трихинная болѣзнь, <i>trichiniasis</i> .	290.
93. Выпаденіе прямой кишки, <i>prolapsus ani</i> .	296.
Г. Болѣзни селезенки и печени.	
94. Воспаленіе селезенки, <i>splenitis</i> , кслотье въ селезенкѣ и другія болѣзни селезенки.	297.
95. Болѣзни желчныхъ путей: желчное состояніе, <i>status biliosus</i> ; желчная лихорадка, <i>febris biliosa</i> ; желтуха, <i>icterus</i> ; желчные камни, <i>cholelithiasis</i> ; желчная колика, <i>colica biliosa</i> .	298.
96. Воспаленіе печени, <i>hepatitis</i> .	305.

В. Болѣзни мочевой и половой системъ.

а. (97 — 107.) Болѣзни мочевыхъ путей.

А. (97 — 99.) Воспалительныя болѣзни мочевыхъ органовъ.

97. Воспаленіе почекъ, <i>nephritis</i> ; 98. Воспаленіе мочевого пузыря, <i>cystitis</i> ; 99. Воспаленіе мочевого канала, <i>urethritis</i> .	309.
---	------

- Б. (100 — 101.) Катарральныя болѣзни мочевыхъ органовъ.
100. Катарръ мочевого пузыря, *catarrhus vesicae*. 101. Катарръ мочевого канала, *catarrhus urethrae* 311.
- В. (102 — 106.) Судорожныя (нервныя) болѣзни мочевыхъ органовъ.
102. Боль при испусканіи мочи, затрудненное испусканіе ея, *dysuria*; мочерѣзь, *stranguria*. 314.
103. Боли и колика въ почкахъ, *nephralgia* и *colica renalis*. 315.
104. Судороги мочевого пузыря, *spasmus vesicae* 315.
105. Задержаніе мочи, *ischuria* 316.
106. Недержаніе мочи, *incontinentia urinae* или *enuresis*; невольное испусканіе мочи ночью; параличъ мочевого пузыря, *paralysis vesicae* 317.
- Г. Органическія болѣзни:
107. Органическія болѣзни мочевыхъ органовъ 319.
- б. (108 — 120.) Половыя болѣзни.
- А. (108 — 114.) Половыя болѣзни не заразительныя.
108. Истощеніе спиннаго мозга вслѣдствіе половыхъ излишествъ, *tabes dorsualis* 322.
109. Непроизвольное изліяніе сѣмени (поллюціи), *pollutiones* 323.
110. Мужское безсиліе, *impotentia* 324.
111. Болѣзни яичекъ (мошонки): воспаленіе, *orchitis*; органическія и нервныя болѣзни яичекъ 325.
112. Воспаленіе матки, *metritis* 327.
113. Менструальныя болѣзни, *menstruationis anomaliae* . . 329.
114. Бѣли, *leucorrhoea* 336.
- Б. (115 — 119.) Половыя болѣзни вслѣдствіе зараженія.
- О сифилитическомъ зараженіи вообще и о предохраненіи себя отъ него 341.
115. Гоноррея (перелой, трипперъ), *gonorrhoea*, *blennorrhoea urethrae virilis* 343.
116. Шанкерь, *ulcera syphilitica* 345.
117. Бубоны, *bubones syphilitici* 347.

	Стр.
118. Фигообразныя шишки (кондиломы), <i>condilomata syphilitica</i>	347.
119. Вторичныя формы сифилиса (сифилитическое поражение кожи и костей), <i>syphilis secundaria</i>	348.
В. Аномалія женской воспроизводительной сферы.	
120. Женское безплодіе, <i>sterilitas</i>	350.

ЧЕТВЕРТОЕ ОТДѢЛЕНІЕ.

Болезни мускульной системы.

121. Болезни грудобрюшной преграды: воспаление, <i>diaphragmitis</i> ; икота, <i>singultus</i> ; параличъ, <i>paralysis diaphragmatis</i>	351.
122. Воспаление поясничной мышцы, <i>psotitis</i>	352.
123. Прогрессивная атрофія мускуловъ, <i>atrophia muscularis progressiva</i>	353.

ПЯТОЕ ОТДѢЛЕНІЕ.

Болезни кожи.

Накожные сыпи.

А. Воспалительныя, лихорадочныя сыпи.

а. (124 — 127.) Плоскія или пятнистыя сыпи.

124. Роза, <i>erysipelas</i>	355.
125. Скарлатина; скарлатинная лихорадка, <i>scarlatina</i>	356.
126. Корь, <i>morbilli</i>	361.
127. Краснуха, <i>rubeolae</i>	362.

б. (128 — 130.) Пузырчатыя и просовидныя сыпи.

128. Поясная роза, <i>zona</i> или <i>zoster</i>	363.
129. Собственно такъ называемая просовидная сыпь (красная, бѣлая), <i>miliaria</i>	363.
130. Крапивная сыпь, <i>urticaria</i>	364.

в. (131 — 133.) Оспенныя сыпи.

131. Настоящая оспа, *variola* 365.
 132. Вариолоиды (легкая форма настоящей оспы) *varioloïdes* 367.
 133. Вѣтреная оспа, *varicellae* 367.

Б. Хроническія, нелихорадочныя сыпи.

а. (134 — 138.) Пятнистыя сыпи, *maculae*.

134. Веснушки, *ephelis* 368.
 135. Печеночныя пятна, *chloasma* или *pityriasis versicolor* . 369.
 136. Отрубевидный лишай, *herpes furfuraceus* 369.
 137. Кровяныя пятна (Верлгофова болѣзнь), *purpura haemorrhagica* (также *peliosis rheumatica*) 369.
 138. Опрѣлость, ссадина, *intertrigo* 370.

б. (139.) Чешуйчатая сыпь.

139. Чешуйчатая сыпь, *psoriasis* 370.

в. (140 — 145.) Узловатая сыпь, *papulae*.

а. Сухіе узелки.

140. Сыпь у дѣтей, сопровождающая прорѣзываніе зубовъ, *strophulus* 371.
 141. Лишай, узловатый лишай, *lichen* 371.
 142. Зудящая сыпь, *prurigo* 372.

β. Гноящіяся узелки.

143. Угри, *acne* 372.
 144. Красноватая (мѣдная) сыпь, преимущ. на носу, *acne* или *gutta rosacea* 373.
 145. Кровяныя чирья, *furunculi*. 373.

г. (146 — 151.) Пузырчатая сыпь, *vesiculae*.

146. Являющіяся группами изолированныя пузырьки, *phlyctenae*. 374.
 147. Лишайные пузырьки, *eczema* 374.
 148. Кольцевидный лишай, *herpes circinnatus* или *iris* . . 375.
 149. Чесотка, *scabies* 375.

	Стр.
150. Пузырчатая воспалительная сыпь, <i>pemphigus</i>	376.
151. Кровяные пузырьки, <i>bullae</i>	376.
д. (152.) Пустулезныя сыпи, <i>pustulae</i> .	
152. Гнойная корка, <i>impetigo</i>	376.
153. Молочная корка, <i>crusta lactea</i>	377.
154. Парша, <i>tinca capitis</i>	378.

(155 — 165.) Наросты и новообразования.

155. Зобъ, <i>struma</i>	379.
156. Мѣшеччатая опухоль, <i>lupia, tumor folliculosus</i>	380.
157. Сальная (стеариновая) опухоль, <i>steatoma</i>	380.
158. Бѣлая опухоль колѣна, <i>tumor albus</i>	380.
159. Полипы, <i>polypus</i>	380.
160. Костные наросты на головѣ, <i>exostoses</i>	381.
161. Наросты на сухожильяхъ (поверхъ кости), <i>ganglion</i>	381.
162. Бородавки, <i>verrucae</i>	381.
163. Ознобленіе, отмороженіе, <i>perniones</i>	382.
164. Мозоли, <i>clavi</i>	382.
165. Родимыя пятна, <i>naevi</i>	382.

ШЕСТОЕ ОТДѢЛЕНИЕ.

Лѣченіе нѣкоторыхъ наружныхъ и хирургическихъ болѣзней.

Раны, механическія поврежденія.

166. Раны, <i>vulnera</i>	383.
167. Подкожное кровоизліяніе, <i>sugillationes</i>	385.
168. Нагноеніе, <i>suppurationes</i> ; абсцессы, <i>abscessus</i> ; (погто- ѣда, <i>paranaritium</i>)	385.
169. Нарывы (язвы), <i>ulcera</i>	386.
170. Фистулы, <i>fistulae</i>	387.
171. Затвердѣлости, <i>indurationes</i>	388.
172. Антоновъ огонь, <i>gangraena</i> или <i>sphacelus</i>	388.
173. Вывихъ (разрывъ сочлененій), <i>luxatio</i>	388.

	Стр.
174. Надрывъ отъ подъема тяжестей, чрезмѣрное растяже- ніе мускуловъ, <i>nimiae intentiones musculorum</i>	388.
175. Повихъ (растяженіе сочлененій), <i>subluxatio</i>	389.
176. Грыжи, <i>herniae</i>	389

Для большей наглядности мы приводимъ еще въ от-
дѣльныхъ спискахъ болѣзни женскія и дѣтскія.

А. Женскія болѣзни.

3. Родильная лихорадка	53.
4. Молочная лихорадка	55.
7. Распиреніе жаль у женщинъ	63.
8. Кровотеченіе изъ матки и выкидышъ	64.
9. Малокровіе и дѣвичья немочь.	72.
13. Водянка матки.	91.
13. Водянка яичниковъ	91.
21. Сердцебіеніе	104.
23. Бѣлая опухоль ядвен	113.
26. Головокруженіе у беременныхъ	125.
27. Головная боль, мигрень.	125.
41. Боль въ спиный, раздраженіе спиннаго мозга	150.
42. Истерика	152.
43. Слабость нервовъ.	156.
47. Личная боль у беременныхъ	169.
49. Обморокъ	174.
63. Воспаленіе грудныхъ желѣзъ	212.
73. Зубная боль у беременныхъ и кормящихъ грудью	224.
78. Катарръ желудка у женщинъ	243.
80. Рвота у беременныхъ	251.
80. Прихоти беременныхъ	253.
82. Судороги желудка	255.
86. Колики (менструальныя)	268.
87. Поносъ у беременныхъ	272.
91. Запоръ у беременныхъ	286.
107. Болѣзни мочевыхъ органовъ у беременныхъ	319.

	Стр.
112. Воспаленіе матки	327.
113. Менструальныя болѣзни.	329.
114. Бѣли	336
120. Женское безплодіе	350.

Б. Дѣтскія болѣзни.

10. Золотуха и англійская болѣзнь (искривленіе позвоночнаго столба).	76.
13. Мозговая водянка.	91.
18. Сухотка дѣтей.	102.
24. Воспаленіе мозга, мозговое выпотѣніе, воспаленіе спинно-головнаго мозга	114.
28. Кровяная опухоль головы у новорожденныхъ	133.
29. Безсонница	134.
31. Воспаленіе глазъ у новорожденныхъ, золотушное	138.
35. Истеченіе изъ уха	145.
44. Судороги (конвульсіи, столбнякъ, пляска св. Вита, сокращеніе членовъ).	157.
45. Самостоятельный дѣтскій параличъ	166.
51. Нарывы въ носу	179.
53. Катаральный кашель, катаральная лихорадка	182.
57. Коклюшъ	195.
58. Воспаленіе гортани, дыхательнаго горла и его развѣтвленій	198.
59. Крупшъ	199.
64. Миллярная одышка, судороги гортанной щели	213.
66. Молочница	221.
74. Зубныя болѣзни дѣтей, трудное прорѣзываніе зубовъ (зубная боль, судорожное возбужденіе нервной системы, приливъ крови, лихорадка, болѣзненное состояніе кишечнаго канала, поносъ, кашель).	232.
75. Воспаленіе горла у дѣтей	235.
79. Развитіе кислотъ въ желудкѣ	250.
80. Рвота новорожденныхъ	251.
81. Вѣтры	253.
84. Размягченіе желудка	263.

	Стр.
86. Глистная колюка	268.
87. Поносъ	272.
89. Холера дѣтей	281.
91. Запоръ	286.
92. Глистные болѣзни	290.
93. Выпаденіе прямой кишки	296.
95. Желтуха у новорожденныхъ	299.
105. Страданія мочевого пузыря у дѣтей.	316.
106. Недержаніе мочи во время сна	317.
124. Роза у новорожденныхъ	355.
125. Скарлатина, скарлатинная лихорадка	356.
126. Корь	361.
127. Краснуха	362.
131. Оспа	365.
132. Вариолонды	367.
133. Вѣтреная оспа	367.
138. Опрѣлость у новорожденныхъ	370.
140. Сыпь у дѣтей, сопровождающая прорѣзываніе зубовъ	371.
153. Молочная корка	377.
154. Парша	378.
—	
Характеристика гомеопатическихъ лѣкарствъ	390.
Обозрѣніе сферы дѣйствія отдѣльныхъ лѣкарствъ по болѣзнямъ	534.
Алфавитный указатель	570.

ВВЕДЕНІЕ.

I.

Основаніе Гомеопатіи. Жизнь и дѣятельность Ганеманна. Будущность Гомеопатіи. Основныя черты гомеопатическаго способа лѣченія.

Гомеопатія существуетъ на дѣлѣ. Благодаря сочувствію милліоновъ людей, это существованіе прочно. Ея успѣхи, число ея приверженцевъ между врачами и не-врачами безпрестанно растутъ, и кругъ ея дѣятельности дѣлается все болѣе и болѣе обширнымъ. Безпрестанно возникаютъ новыя гомеопатическія больницы, новыя клиники, профессорскія кафедры, общества, аптеки, журналы. Хотя масса врачей старой школы противится, по своему невѣжеству, гомеопатіи и съ любовью дѣлаетъ старыя предрасудки, хотя еще только небольшое число государствъ дало ей оффиціальное мѣсто возлѣ давно признанной закономъ аллопатической медицинской школы, однако все это вознаграждается сочувствіемъ и энтузіазмомъ публики, которые позволяютъ надѣяться, что недалеко уже то время, когда гомеопатическая школа перестанетъ быть ecclesia pressa. И теперь уже она въ правѣ считать своею обширную часть земнаго шара. Въ соединенныхъ штатахъ Сѣверной Америки число врачей-гомеопатовъ почти равняется числу аллопатическихъ врачей.

Ученіе безсмертнаго Ганеманна выдержало уже испытаніе времени. Ни одна врачебная метода еще не доживала, какъ гомеопатія, до 85 лѣтъ и тѣмъ менѣе переживала такой промежутокъ

времени. Это показываетъ, что она не есть порожденіе моды или причинъ временныхъ; и смѣлая надежда тѣхъ, которые предоставили времени разрушеніе новой школы, давно уже покинута ими.

Гомеопатія въ видѣ зародыша существовала уже въ продолженіе столѣтій въ медицинской наукѣ. Когда она впервые стала на степенъ самостоятельной школы, рѣзко отличающейся отъ школы старой, она, понятно, нашла множество противниковъ и враговъ, людей, не желавшихъ выйти изъ старой колен. Не смотря однако на всѣ старанія, всѣ опроверженія сильныхъ противниковъ, новая медицинская школа, убѣждающая силою фактовъ, нашла громадное число приверженцевъ на обоихъ полушаріяхъ. И внутренняя борьба не сокрушила гомеопатію; не смотря на крайнія выходки эксцентричныхъ поклонниковъ съ одной стороны, не смотря на колеблющихся приверженцевъ съ другой, она твердо держится своего принципа: подобное лѣчится подобнымъ; она не отстаетъ вмѣстѣ съ тѣмъ отъ общаго развитія науки. Такого рода явленіе нельзя считать произведеніемъ фантазіи, а слѣдуетъ считать, напротивъ, историческою необходимостью.

Ганеманнъ, основатель гомеопатіи, понималъ значеніе своего дѣла. «Нужно же наконецъ высказать во всеуслышаніе,» сказалъ онъ въ 1808 году, — «наша медицина нуждается въ преобразованіи отъ головы до пятъ. Чего не должно бы быть, то совершается, самое же существенное остается незамѣченнымъ. Зло увеличилось до того, что нашему дѣлу можно только помочь, дѣйствуя самымъ рѣшительнымъ образомъ.»

Судьба не поскупилась надѣлать и Ганеманна терніями, которыя достаются въ большей или меньшей мѣрѣ на долю каждаго человѣка, возвышающагося надъ уровнемъ обыденныхъ понятій. Взглядъ на жизнь Ганеманна откроетъ намъ значеніе его дѣятельности и поможетъ проникнуть въ сущность гомеопатіи.

Основаніе Гомеопатіи. Жизнь и дѣятельность Ганеманна.

Самуилъ Ганеманнъ родился 10 Апрѣля 1755 г. въ Мейсенѣ, въ домѣ отца своего Готфрида Ганеманна, талантливаго живописца на фарфорѣ. Родители съ самаго начала имѣли благо-

дѣтельное вліяніе на любознательнаго мальчика. Отець училъ его убѣждать, прежде чѣмъ вѣрить, заставлялъ его самостоятельно мыслить, для чего пользовался даже способомъ одиночнаго заключенія. Мать, урожденная Шписъ, была первой учительницей маленькаго Самуила. Благопріятныя условія домашней обстановки, честность, простота, практическія знанія, дали направленіе даровитому мальчику, понятливость, прилежаніе и отличныя дарованія котораго были замѣтны уже въ школѣ, въ которую онъ поступилъ 12-ти лѣтъ отъ роду въ 1767 году. Особенное вліяніе имѣли на мальчика Ф. А. Бюргеръ, ректоръ упомянутой выше школы, и И. Ф. Миллеръ, ректоръ другой школы, въ которую Ганеманнъ перешелъ 15-ти лѣтъ. Послѣдній изъ упомянутыхъ достойныхъ мужей, у котораго жилъ Ганеманнъ, когда замѣтилъ страсть его къ занятіямъ классическими древностями и, кромѣ того, естественными науками, всѣми срѣдствами помогалъ мальчику, освободилъ его отъ платы за ученіе, уговорилъ отца разрѣшить сыну университетскія занятія. Въ этой школѣ Ганеманнъ получилъ основательное классическое образованіе, которое отражается на всѣхъ его работахъ, вмѣстѣ съ тѣмъ онъ изучилъ англійскій и французскій языки, положилъ основаніе своимъ значительнымъ философскимъ и положительнымъ знаніямъ. Свидѣтельствомъ послѣднихъ можетъ служить разсужденіе о чудесномъ строеніи человѣческой руки, которое онъ написалъ при переходѣ изъ школы въ Лейпцигскій университетъ въ 1775 г. Тема эта въ то время для подобныхъ случаевъ была необыкновенною.

Въ Лейпцигѣ Ганеманнъ съ трудомъ зарабатывалъ себѣ кусокъ хлѣба уроками и переводами. И здѣсь его освободили отъ платы за слушаніе лекцій. Накопивъ небольшую сумму денегъ, онъ уже черезъ два года покинулъ Лейпцигъ, не представлявшій тогда много шансовъ для медицинской практики, и отправился въ Вѣну. Здѣсь уже черезъ девять мѣсяцевъ нужда заставила его отказаться отъ занятій подъ руководствомъ знаменитаго Кварина и взять на себя должность домашняго врача при намѣстникѣ Семиградскомъ, баронѣ фонѣ Брукенталь. Два года медицинской практики въ Германштадтѣ доставили ему наконецъ средства для занятій докторскою диссертацией; онъ защитилъ въ Эрлангенѣ 20-го Августа 1779 г. диссертацию о судорожныхъ страданіяхъ.

Съ этихъ поръ Ганеманнъ постоянно переселялся изъ одного города въ другой. Мы встрѣчаемъ его сначала въ Геттштедтѣ, затѣмъ въ Дессау, въ 1781 г. въ качествѣ физика въ Гоммеригѣ близъ Магдебурга, гдѣ онъ женился на дочери аптекаря Кюхлера изъ Дессау; черезъ три года мы находимъ его въ качествѣ врача при больницѣ въ Дрезденѣ, гдѣ онъ состоялъ въ литературной связи съ Дассдорфомъ и Аделунгомъ; въ 1789 г., онъ уже опять въ Лейпцигѣ. Отвращеніе къ занятіямъ медициной, примѣнять которую при тогдашнемъ ея состояніи не позволяла ему совѣсть, овладѣла имъ до такой степени, что онъ кое-какъ перебивался съ помощью занятій фармаціей и химіей, открытія въ области которой скоро обезсмертили его имя, и переводами. При одномъ изъ переводовъ, по поводу замѣчаній Куллена о хинѣ, Ганеманнъ, пораженный противорѣчіями относительно дѣйствія этого средства, рѣшился на себѣ самомъ испробовать дѣйствіе хины. Онъ заболѣлъ возвратной горячкой, которая, какъ извѣстно, въ опредѣленныхъ случаяхъ излѣчивается этимъ средствомъ. Такъ какъ продолжительное изученіе дѣйствія лѣкарствъ и указанія медицинской литературы доказывали существованіе закона, что лѣкарства излѣчиваютъ тѣ болѣзни, которыя сами производятъ, то положеніе „*Similia Similibus*“ было найдено. Такимъ образомъ въ 1790 г. совершился самый важный фактъ въ жизни Ганеманна и въ области современной ему медицины.

Ганеманнъ не объявилъ тотчасъ своего открытія, какъ это обыкновенно дѣлается въ наше время; впродолженіе шести лѣтъ онъ изслѣдовалъ и обдумывалъ новое положеніе, чтобъ представить его міру уже вполне провѣреннымъ и созрѣвшимъ. Лишь въ 1796 г. онъ въ первый разъ объявилъ свое мнѣніе въ журналѣ Гуфеланда; выступилъ онъ скромно, желая сближенія съ старой школой, но все-таки твердо и съ полнымъ убѣжденіемъ. Немногіе лишь признали его принципъ, но и тѣ не примѣняли его на практикѣ. Эта неудача не остановила Ганеманна; онъ неустанно стремился къ своей цѣли. Онъ опять занялся практикой, чтобъ найти подтвержденіе своему ученію. Въ 1792 г. онъ сталъ во главѣ вновь открытаго лѣчебнаго заведенія въ Георгенталѣ, въ Тюрингіи, гдѣ онъ возбудилъ всеобщее вниманіе исцѣленіемъ помѣшаннаго Клокешбринга; въ 1794 г. онъ былъ въ Брауншвейгѣ, въ

1795 г. въ Кенигслуттерѣ, гдѣ онъ въ первый разъ испробовалъ гомеопатическое дѣйствіе Белладонны, какъ цѣлебнаго и предохранительнаго отъ скарлатины средства. вмѣсто признанія заслугъ теперь начались преслѣдованія, которыхъ не избѣгаетъ никто изъ жертвующихъ себя человѣчеству. Кое-гдѣ даже стали пользоваться Белладонной, не обращая при этомъ однако, какъ это бываетъ иногда и теперь, никакого вниманія на руководящій принципъ. Врачи и аптекаря какъ бы составили заговоръ противъ Ганеманна. Послѣдніе были особенно ожесточены тѣмъ, что при новой методѣ лѣченія рецепты были чрезвычайно просты, и что лѣкарства могъ готовить иногда и не-фармацевтъ. Вслѣдствіе этого, вѣроятно, Ганеманнъ нигдѣ не могъ найти покоя. Сначала въ 1799 г. онъ былъ въ Алтопфѣ, потомъ въ Эйленбургѣ, въ Махернѣ близъ Лейпцига, въ Виттенбергѣ, впродолженіе двухъ лѣтъ въ Дессау, гдѣ онъ написалъ сочиненіе о кофе. Въ 1805 г. въ первый разъ появились въ печати на латинскомъ языкѣ результаты его опытовъ, вскорѣ послѣ того основательное сочиненіе: «врачебная наука, основанная на опытѣ», въ которомъ въ первый разъ встрѣчается слово «гомеопатія». Небольшіе толчки влекутъ за собой иногда громадные перевороты въ области человѣческой мысли и исторіи человѣчества. Слово это спасло новый принципъ; оно сдѣлалось знаменемъ приверженцевъ. Враги увидѣли въ немъ систематическую оппозицію, и чѣмъ болѣе они противились, тѣмъ болѣе способствовали реформѣ Ганеманна. Изъ Торгау въ 1806 г. этотъ послѣдній, когда отвернулись отъ него врачи, обратился къ публикѣ посредствомъ примѣрныхъ популярныхъ сочиненій. Доказательства въ пользу новаго ученія не замедлили явиться, и энтузіазмъ неврачей спасъ его, побуждая холодныхъ специалистовъ къ изученію и чрезъ это къ принятію новаго ученія.

Въ полномъ смыслѣ слова реформа была завершена лишь въ 1810 году изданіемъ Органона врачебнаго искусства, въ которомъ гомеопатія впервые явилась какъ полная, самостоятельная система лѣченія. Въ немъ Ганеманнъ съ величайшимъ воодушевленіемъ проповѣдуетъ открытый имъ законъ, уничтожаетъ обаяніе авторитета, порываетъ связи съ прошедшимъ. Правда, въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ энтузіазмъ завлекъ его слишкомъ далеко; поэтому мы видимъ съ тѣхъ поръ съ одной стороны возрастающій

успѣхъ гомеопатіи, съ другой — все болѣе сильныя преслѣдованія, направленныя однако противъ вопросовъ второстепенныхъ, такъ какъ самый принципъ былъ нерушимъ. Особенно нападали на малые приемы и на теорію потенцій (т. е. ученіе о возрастающей по мѣрѣ разжиженія силъ лѣкарствъ). Но нужно замѣтить, что самыя увлеченія Ганеманна были слѣдствіемъ слѣпой оппозиціи, которая возбудила ненависть реформатора и искусственно изолировала его.

Но не только печатнымъ словомъ, — и дѣломъ Ганеманнъ стремился къ осуществленію выводовъ изъ открытой имъ истины. Онъ переселился въ Лейпцигъ, чтобъ основать тамъ клинику. Когда это ему не удалось, онъ началъ два раза въ недѣлю читать лекціи о гомеопатіи, причемъ написалъ разсужденіе объ употребленіи чемерицы у древнихъ, которое возбудило удивленіе всѣхъ глубокими классическими познаніями, въ немъ высказывающимися. Изъ небольшого кружка своихъ слушателей Ганеманнъ образовалъ общество для изслѣдованія лѣкарствъ, труды котораго въ пользу реформы этого важнаго отдѣла врачебной науки послужили основаніемъ для втораго обширнаго сочиненія Ганеманна, шеститомной «фармакологіи». Оно содержитъ описаніе 62-хъ вновь изслѣдованныхъ средствъ и вышло въ свѣтъ въ промежуткѣ отъ 1811—1819 годовъ.

Теперь Ганеманнъ уже съ охотой занимался медицинской практикой вмѣстѣ съ сыномъ своимъ Фридрихомъ, которому онъ предоставилъ также отражать нападки на его ученіе. Блестящіе результаты, которыхъ Ганеманнъ достигъ во время одной тифозной эпидеміи и позже во время холерныхъ эпидемій, много содѣйствовали славѣ гомеопатіи и ея основателя. Такъ въ 1820 г. вызвалъ его къ себѣ фельдмаршалъ Шварценбергъ, побѣдитель при Лейпцигѣ. Когда послѣдній сталъ поправляться, возбуждено было всеобщее удивленіе, но смерть больнаго, которая, какъ доказало вскрытіе трупа, была неизбѣжна вслѣдствіе органическихъ разрушеній, подала опять поводъ нападать на Ганеманна. Противники его указали на то, что онъ противъ закона самъ отнускаетъ лѣкарства, лишили его такимъ образомъ средствъ къ практикѣ и посредствомъ разныхъ другихъ враждебныхъ дѣйствій выжили изъ Лейпцига. Онъ послѣдовалъ приглашенію герцога Фридриха Фердинанда и отправился

въ 1821 году, въ качествѣ надворнаго совѣтника и лейбъ-медика, въ Кетень. Тутъ онъ мирно занимался своей работой, посѣщаемый больными изъ всѣхъ странъ свѣта, такъ какъ гомеопатія уже въ то время распространилась въ Германіи, Венгріи, Италиі, Франціи, Англии, Россіи и даже въ Америкѣ. Дѣйствуя преимущественно въ области хроническихъ болѣзней, такъ какъ ему рѣдко приходилось видѣть больныхъ на дому, Ганеманнъ занимался ими преимущественно, и результатомъ этихъ занятій было третье большое сочиненіе его подъ заглавіемъ: «хроническія болѣзни,» вышедшее въ 1828—1830 годахъ. Сочиненіе это обогатило ученіе о лѣкарствахъ, что и было признано всѣми, но положеніе о трехъ основныхъ причинахъ хроническихъ болѣзней послужило яблокомъ раздора для его послѣдователей, которые, такимъ образомъ, также причинили ему огорченіе, хотя по справедливости учитель и не, долженъ бы былъ противиться свободному развитію учениковъ. Именно самостоятельность этихъ послѣднихъ спасла гомеопатію освободивъ ее отъ нѣкоторыхъ эксцентричностей Ганеманна. Съ какимъ уваженіемъ однако ученики относились къ своему учителю, это обнаружилось вскорѣ послѣ того на блистательномъ празднованіи его докторскаго юбилея 10-го Августа 1829 года, когда основано было центральное гомеопатическое общество, и когда между прочими подарками Ганеманну поднесли фондъ для основанія гомеопатической клиники въ Лейпцигѣ, которая и по преобразованіи ея въ поликлинику еще теперь съ пользою продолжаетъ свою дѣятельность.

Сочиненія его, появлявшіяся все въ новыхъ и новыхъ изданіяхъ, усиливающійся приливъ больныхъ, быстрое распространеніе гомеопатіи, утѣшали бодрого старца среди злополучія его семейной жизни, которая отравлялась смертью многихъ дѣтей, оставленіемъ родительскаго дома единственнымъ сыномъ, который пропалъ безъ вѣсти, потерей въ мартѣ 1830 года подруги жизни. На ея мѣсто осмидесятилѣтній старецъ избралъ 28-го января 1835 года Меланію д'Эрвильи-Гойэ, которая пріѣхала къ нему, привлеченная его славою какъ врача, изъ Парижа, куда затѣмъ и увезла его. Простой образъ жизни былъ промѣненъ на болѣе блестящій и подвижной. Шестидесятилѣтній докторской юбилей доказалъ, что и здѣсь Ганеманнъ сумѣлъ заслужить уваженіе въ обширныхъ

и знатныхъ кругахъ. Весною 1843 года онъ заболѣлъ бронхіальнымъ катаромъ и скончался 2-го іюля утромъ въ 5 часовъ отъ легочнаго паралича на 89 году жизни, которая, по выраженію Руммеля, «была безпрестанной борьбой, сначала съ бѣдностью, затѣмъ съ предразсудками, злонамѣренностію, недоброжелательствомъ, наконецъ съ опасностію, которая, казалось, въ большей или меньшей мѣрѣ грозила его творенію отъ его же учениковъ.»

Бросая еще разъ взглядъ на жизнь Ганеманна, мы оставляемъ здѣсь въ сторонѣ то, что онъ совершилъ важнаго въ другихъ областяхъ науки — такъ въ химіи чрезъ открытіе новаго ртутнаго препарата, новаго способа изслѣдованія вина, чрезъ сочиненіе объ отравленіи арсеникомъ — и касаемся только его заслугъ предъ медициной. Здѣсь прежде всего видимъ реформу ученія о болѣзняхъ (патологіи). Старая медицина колебалась между матеріалистическимъ и динамическимъ воззрѣніемъ на жизнь, она была склонна къ одностороннимъ химическимъ или механическимъ взглядамъ; Ганеманнъ возстановилъ значеніе духовнаго начала жизни, указывая на важную роль нервовъ и единство человѣческаго организма. Медицинѣ до Ганеманна правилось доискиваться непостижимой сущности болѣзней, складывать себѣ изъ этого догматическія понятія и на основаніи своихъ теорій и умозрѣній, которыя въ большинствѣ случаевъ представляли только гипотезы (укажемъ напр. на ученіе о воспаленіяхъ), составлять планы такъ называемаго рациональнаго лѣченія. Ганеманнъ всѣми силами боролся противъ этой опасной игры ума и указывалъ на наблюденіе, какъ на единственное твердое основаніе естественныхъ наукъ, а слѣдовательно и вершины ихъ — медицины. Совокупность симптомовъ онъ призналъ единственною цѣлью и единственнымъ средствомъ при опредѣленіи болѣзни и ея лѣченія. Только то, что проявляется въ признакахъ, можетъ служить мѣриломъ при выборѣ средства. При этомъ однако онъ отличалъ, чего не замѣтили враги его въ своихъ нападкахъ, существенное отъ случайнаго и нисколько не исключалъ размышленія; онъ рисовалъ общую картину болѣзни, основываясь только на данныхъ симптомахъ. Особенное вниманіе при этомъ онъ, какъ предвозвѣстникъ новой фізіологической школы, обращалъ на мѣсто находенія и исходную точку болѣзни. Индивидуализація — важнѣйшее условіе всякаго разумнаго дѣйствія — въ медицинѣ только

чрезъ него получила право гражданства. До него это положеніе было только мертвой буквой, потому что его не умѣли примѣнить на практикѣ. Ганеманнъ научилъ разсматривать каждую болѣзнь какъ индивидуальное явленіе, лѣченіе же болѣзней по родамъ и по видамъ, подъ которые ихъ подводили, онъ называлъ бесполезной и опасной спаровкой ложной науки и безусловно отвергъ его. Такимъ образомъ онъ рѣшительно наналъ на враговъ человечества и медицины, на авось и какъ-нибудь. Этого, несомнѣнно, было достаточно для того, чтобы ненавидѣть и преслѣдовать смѣлаго нововводителя.

Но Ганеманнъ сдѣлалъ еще болѣе, онъ преобразовалъ ученіе о врачеваніи (терацію) или, лучше сказать, онъ создалъ его вновь. Въ чемъ состояла (къ сожалѣнію — состоитъ) врачебная наука старой школы? На воображаемыхъ и теоретическихъ свойствахъ болѣзней основывали воображаемыя и теоретическія дѣйствія лѣкарствъ. Искусственная связь, необходимая во всѣхъ системахъ подобнаго рода, которая тогда были въ модѣ, должна была восполнить пробѣлъ между опредѣленіемъ болѣзни и ея врачеваніемъ. Въ дѣйствительности же настоящая врачебная наука (терація) лишена была всякой основы; она унаслѣдовала существующія съ незапамятныхъ временъ неопредѣленные методы лѣченія и старинныя формулы, вродѣ: очищаетъ кровь, разбиваетъ и. т. д., и вращалась внутри границъ отвлеченія или гипотетическихъ противоположностей (отъ жара — средства прохлаждающія, отъ кислоты въ желудкѣ — щелочи). Только немногія средства, такъ называемыя специфическія, дѣйствіе которыхъ въ извѣстныхъ болѣзняхъ было испытано (напр. хина отъ перемежающейся лихорадки), употреблялись съ нѣкоторою увѣренностью; но все-таки не знали, почему эти средства дѣйствуютъ такъ, и не были въ состояніи увеличить число такихъ средствъ. Безсмертный умъ Ганеманна достигъ этого. Человѣкъ не открываетъ ничего такого, чего не существуетъ въ природѣ. Великая книга природы открыта для всѣхъ, и многіе съ большимъ талантомъ разбираютъ ея таинственные письмена, но одинъ только гений вникаетъ въ самую глубь сокровенныхъ въ ней истинъ, которыя и облекаетъ творчески въ извѣстныя формы. Таково было открытіе Ганеманна, что подобное лѣчится подобнымъ. Уже до него нѣкоторые, какъ Парацельсъ, Василій Валентинъ и далѣе до

самого Гипократа, упоминали объ этомъ законѣ, но они не сумѣли сдѣлать изъ него выводовъ, не сумѣли приложить его на практикѣ. Тысячи людей, знавъ дѣйствіе разныхъ лѣкарствъ, не открыли того начала, которое проявлялось въ этихъ дѣйствіяхъ. Тысячи людей въ припадкѣ перемежающейся лихорадки, который случился съ Ганеманномъ, не были бы озарены свѣтлою мыслью, которая помогла бы выйти изъ лабиринта; необходимъ былъ его проницательный взглядъ, чтобъ сдѣлать это великое, бессмертное открытіе. Противопоставляя извѣстнымъ явленіямъ болѣзней извѣстныя явленія, вызываемыя дѣйствіемъ лѣкарствъ, и замѣчая внутреннее согласованіе между ними по мѣсту и характеру, Ганеманнъ построилъ на этомъ свою методу лѣченія, онъ соединилъ надлежащимъ образомъ разъединенныя столь долгое время ученіе о болѣзняхъ и ученіе о лѣченіи ихъ. Запутанное въ медицинѣ сдѣлано было простымъ, искусственное — естественнымъ. Случай замѣненъ былъ опытомъ, догадки — знаніемъ, произволь — закономъ. Ганеманнъ рѣшилъ загадку: чему слѣдуетъ приписать безсознательно совершенныя замѣчательныя исцѣленія въ прошедшія времена, и показать, какъ въ будущемъ совершать такія же исцѣленія, но сознательно.

Но какую пользу могъ принести принципъ, если не было возможности примѣнить его на практикѣ? Неутомимая дѣятельность Ганеманна помогла и въ этомъ случаѣ: преобразовано было ученіе о лѣкарствахъ (фармакологія). Нѣкоторые даровитыя головы уже до него настаивали на томъ, чтобы опыты производились надъ здоровыми. Къ этому побуждало ихъ печальное состояніе ученія о лѣкарствахъ (основаннаго большею частью на наблюденіяхъ случайныхъ, какъ напр. при отравленіяхъ, и на смутныхъ наблюденіяхъ у постели больного). Но отдѣльные опыты надъ здоровыми не привели ни къ какому результату, потому что ими не сумѣли воспользоваться. Ганеманнъ вполне покончилъ съ прошедшимъ; съ помощію общества для изслѣдованія лѣкарствъ онъ создалъ новое ученіе о лѣкарствахъ, почерпнутое изъ наблюденій надъ здоровыми. Личное участіе Ганеманна въ изслѣдованіяхъ и изданіи сочиненія было также значительно. Тонкость и точность его наблюденій, особенно въ сферѣ психической, — удивительны; его характеристики лѣкарствъ суть блестящія доказательства его

значительныхъ дарованій, какъ врача. То, до чего въ этой области дошли гораздо позже — я подразумѣваю физиологическое изслѣдованіе — Ганеманнъ уже тогда примѣнилъ къ дѣлу. И въ этомъ случаѣ Ганеманнъ выказалъ свое отвращеніе ко всякимъ субъективнымъ и догматическимъ воззрѣніямъ; онъ облекъ результаты изслѣдованій въ оригинальную форму, дѣйствительно, затрудняющую нѣсколько изученіе сочиненія, но, съ другой стороны, самымъ нагляднымъ образомъ представляющую существенное содержаніе его.

Наконецъ Ганеманнъ сдѣлалъ послѣдній и крайній выводъ изъ своихъ положеній — онъ преобразовалъ правила содержанія больныхъ, и простота его предписаній не осталась безъ вліянія и на противниковъ его. Реформа эта распространилась не только на діететику, на которую почти не обращали вниманія, и на значеніе которой указалъ также Ганеманнъ, но и на приемы лѣкарствъ. Приписывая каждому средству извѣстное дѣйствіе, послѣдній каждое средство употреблять отдѣльно, отвергая злополучныя смѣси старой школы. Средства эти, при помощи своихъ знаній по химіи и ботаникѣ, онъ давалъ въ формѣ наиболѣе удобной для дѣйствія лѣкарствъ, и этотъ способъ не оставленъ безъ вниманія, относительно тинктуръ, и аллопатами. Законъ специфическаго дѣйствія, по которому лѣкарство дѣйствуетъ на болѣзнь непосредственно, смотря по роду ея и по мѣсту находенія, привелъ къ наблюденію, что приемы, даже несравненно меньшіе обыкновенно употребляемыхъ, обнаруживаютъ надлежащее дѣйствіе. Это навело Ганеманна на мысль о разжиженіяхъ и растираніяхъ, которыя ошибочно считаются главнымъ дѣломъ въ гомеопатіи, между тѣмъ какъ они явились только слѣдствіемъ примѣненія на практикѣ новаго ученія. Черезъ растираніе и разжиженіе дѣйствіе лѣкарствъ измѣняется, распредѣляется, какъ бы утончается и раскрывается. Вслѣдствіе этого Ганеманнъ склонился къ предположенію, что лѣкарство дѣйствуетъ тѣмъ сильнѣе, чѣмъ выше дѣленіе его. За эту такъ называемую теорію потенцій дорого заплатился Ганеманнъ, и еще дороже заплатилась гомеопатія. Надъ многими положеніями Ганеманна уже произнесло свой приговоръ время. Многія изъ нихъ были отвергнуты, какъ одностороннія и крайнія, но большинство ихъ осталось, осталась сущность, признанная и взлелѣянная судьбою. Ганеманнъ былъ одинокъ въ свое время, потому что стоялъ

выше его, какъ это бываетъ съ каждымъ реформаторомъ. Большая часть его современниковъ уважала его, задача потомства — вполне понять его. Позднѣйшее развитіе медицины, которая послѣ длиннаго ряда опытовъ дошла до многого, уже высказаннаго имъ, доказываетъ насколько онъ опередилъ свое время. Такимъ образомъ, Ганеманнъ былъ не только реформаторомъ, онъ былъ и пророкомъ. То, что школа Шенлейна сдѣлала для индивидуализаціи болѣзней, что новое время сдѣлало для возвышенія опыта и низверженія старой вѣры въ авторитетъ, что, наконецъ, новѣйшая, такъ называемая фізіологическая школа, сдѣлала для объективности діагнозы, для познанія частныхъ явленій и мѣста нахождения болѣзней, для установленія фізіологической точки зрѣнія на жизнь человѣка въ здоровомъ и больномъ состояніи, для упрощенія рецептовъ, для утвержденія господства діететики, — все это мы уже находимъ у Ганеманна, и весьма многіе изъ этихъ вопросовъ впервые были имъ лишь возбуждены. Но важнѣе всего то, что Ганеманнъ каменистую почву врачебной науки обратилъ въ плодородное поле, чѣмъ принесъ пользу всему человѣчеству. Презрѣнную медицину онъ вновь заставилъ уважать.

Честь и слава за это великому генію! мы его безъ опасенія ставимъ на ряду съ другими великими реформаторами.

Будущность Гомеопатіи.

Мы видѣли прошедшее гомеопатіи; дальнѣйшее ея существованіе обезпечено тѣмъ, что въ основаніи гомеопатіи лежитъ истина, что эта метода лѣченія призвана выполнить особую историческую задачу и что она способна развиваться сама изъ себя.

Въ основаніи гомеопатіи лежитъ истина. Внимательное изслѣдованіе гомеопатическихъ лѣкарствъ показываетъ ясно какъ день, что каждое гомеопатическое лѣкарство излѣчиваетъ у больного тѣ же симптомы, которые оно вызываетъ у здороваго, или — выражаясь другими словами — что симптомы лѣкарствъ, излѣчивающихъ болѣзни, подобны симптомамъ самихъ этихъ болѣзней, и что, такимъ образомъ, главнѣйшее положеніе гомеопатіи: подобное

лѣчится подобнымъ (*similia similibus curantur*), которое и тайно и явно не разъ уже признано аллопатами, основано на фактѣ. Далѣе статистика исцѣленій въ больницахъ, указанія медицинской литературы и безпристрастное наблюденіе ежедневной практики до того убѣждаютъ въ великой пользѣ гомеопатической методы лѣченія, что мы считаемъ излишнимъ объ этомъ распространяться.

Гомеопатія призвана выполнить особую историческую задачу. Это значить, что она призвана выработать непреложныя основанія врачебной науки. Она вовсе не пренебрегаетъ, какъ нѣкоторые ложно думаютъ, ученіемъ о болѣзняхъ и ихъ распознаніи (патологіей и особенно діагностикой), она изучаетъ и примѣняетъ къ дѣлу вспомогательныя естественныя науки, подготовительныя науки (анатомія, физиологія), также патологическую анатомію и физическое распознаваніе (посредствомъ постукиванія, выслушиванія и т. д.); но преимущественно она обрабатываетъ поле врачеванія, столь пренебрегаемое приверженцами всѣхъ другихъ школъ. Это пренебреженіе главною задачею медицины со стороны другихъ школъ находится въ связи съ тѣмъ обстоятельствомъ, что аллопатамъ неизвѣстно дѣйствіе на организмъ cadaго лѣкарственнаго вещества въ отдѣльности, потому что дѣйствіе это можно узнать только посредствомъ опытовъ надъ здоровымъ организмомъ по правиламъ Ганеманна, слѣдовать которымъ аллопаты не желаютъ; а если какое-нибудь подобное наблюденіе и бываетъ сдѣлано, аллопатія не имѣетъ съ своей точки зрѣнія основанія приложить его къ медицинской практикѣ. Въ этомъ состоитъ существенное отличіе гомеопатіи отъ старой школы съ ея лѣкарственными смѣсями, которыя не только доказываютъ незнаніе дѣйствія отдѣльныхъ средствъ, но и дѣлаютъ невозможнымъ познаніе этого дѣйствія. Тѣмъ же гомеопатія отличается отъ новой эмпирической школы Радемахера, которая поставила правиломъ, что при каждой болѣзни сначала нужно еще отыскать подходящее лѣкарство посредствомъ опыта, и, наконецъ, отъ новой аллопатической, такъ называемой «физиологической» школы, которая при лѣченіи или бросается въ объятія старой аллопатіи съ большей или меньшей вѣрою въ дѣйствіе ея лѣкарствъ, или совершенно ни во что не вѣритъ и предоставляетъ больныхъ судьбѣ, ибо питаетъ твердое убѣжденіе, что исцѣлять можетъ одна только природа, и что всѣ

лѣкарства въ мѣрѣ = 0, за исключеніемъ развѣ только хинина или опиума. Если же больной хочетъ что-нибудь принимать, то ему даютъ отваръ алтейнаго корня или оба упомянутыя выше средства, а также баварское пиво или теплую воду. Такого рода совѣты давалъ напр. недавно умершій профессоръ Бокъ въ Лейпцигѣ.

Гомеопатія способна развиваться сама изъ себя. Если бы старыя и упрямые противники гомеопатіи потрудились убѣдиться въ успѣхахъ, какіе сдѣлали теорія и практика этого ученія со времени Ганеманна, они не стали бы вѣчно повторять одни и тѣ же упреки, которые возникли еще въ первые дни новаго ученія, но и тогда уже были справедливы въ весьма малой мѣрѣ. Последнее время многое измѣнило и въ гомеопатіи. Многія крайности, какъ напр. слишкомъ высокія дѣленія, распространенное прежде ученіе о чесоточномъ худосочіи, строгій динамизмъ (ученіе о силахъ), рѣдкіе приемы лѣкарствъ и т. д., введены въ надлежащія границы или устранены, и многія ошибки исправлены посредствомъ болѣе глубокаго научнаго изслѣдованія. Если бы противники гомеопатіи, отбросивъ предразсудки, принялись за изученіе ея въ настоящемъ ея видѣ,*) то они убѣдились бы, что Ганеманнова метода лѣченія не есть метода чисто эмпирическая, а рациональная въ полномъ смыслѣ этого слова, что она основана на научныхъ данныхъ и, главное, что она не позволяетъ лѣчить машинально, сообразуясь только съ одними симптомами болѣзней, но считаетъ необходимыми полное врачебное изслѣдованіе и обсужденіе для отысканія вѣрнаго лѣкарства. Изложеніе основныхъ чертъ гомеопатіи въ томъ видѣ, какъ онѣ встрѣчаются у просвѣщенныхъ современныхъ гомеопатовъ (кто осмѣлится отрицать, что и между нами есть невѣжды?), поставитъ эти положенія въ надлежащій свѣтъ и вмѣстѣ съ тѣмъ покажетъ, что ни одна система не отличалась такой простотой, какъ наша. Если же простота есть признакъ истины и согласія съ природой, то гомеопатія несомнѣнно обладаетъ этими качествами, и она, по старой поговоркѣ, справедливо можетъ быть названа *simplex veri sigillum* (простой отпечатокъ истины).

*) Подробное научное изслѣдованіе основъ гомеопатіи можно найти въ *Compendium der Homöopathie nach ihrem neuesten Standpunkte und Anleitung zum Studium und zur Praxis derselben*, von Dr. B. Hirschel. 3. Auflage. 1864. Wien, bei Braumüller.

Основныя черты гомеопатическаго способа лѣченія можно выразить въ слѣдующихъ положеніяхъ.

1) Подъ гомеопатіею разумѣется тотъ способъ лѣченія, который относительно основныхъ правилъ врачеванія (общая терапія), относительно спеціальнаго изученія дѣйствія лѣкарственныхъ веществъ (*materia medica*, фармакодинамика, ученіе о лѣкарствахъ) и ихъ примѣненіи къ лѣченію (частная терапія), въ теоріи и на практикѣ примѣняетъ законъ подобія.

2) Законъ этотъ составляетъ главное основаніе гомеопатическаго способа лѣченія. По закону этому выборъ лѣкарства долженъ производиться такъ, чтобы дѣйствіе этого лѣкарства, изученное главнымъ образомъ на здоровомъ человѣкѣ, по возможности точнѣе согласовалось съ симптомами данной болѣзни (*similia similibus curantur*, подобное лѣчится подобнымъ).

3) Однако это сходство между лѣкарствомъ и болѣзнью не должно быть внѣшнимъ, т. е. оно не должно состоять только въ сходствѣ симптомовъ, которые относительно лѣкарствъ узнаются чрезъ опыты надъ здоровымъ организмомъ, относительно болѣзней посредствомъ клиническихъ наблюденій; между обоими факторами должно существовать извѣстное внутреннее согласованіе, специфическое родство. Это родство проявляется въ томъ, что при сравненіи предполагаемаго къ выбору лѣкарства съ данной болѣзнью, пораженное болѣзнью мѣсто, процессъ болѣзни, внутреннія и внѣшнія условія и причины, словомъ внутренній и внѣшній характеръ обоихъ, близко согласуются между собою.

4) Для этой цѣли недостаточно опытовъ относительно дѣйствія лѣкарствъ на здоровый организмъ; чтобы вполнѣ понять характеръ медикамента, надо знать, какъ онъ дѣйствуетъ и на больныхъ.

5) Каждый медикаментъ имѣетъ свое особенное, ему только свойственное дѣйствіе, подобно тому, какъ и всякая болѣзнь — свои особенныя, ей только принадлежащія явленія. А потому надо давать каждый медикаментъ отдѣльно, такъ какъ чрезъ смѣшеніе отличительный характеръ его затемняется.

6) При выборѣ этого простаго лѣкарства надо обратить вниманіе: а) на явленія наружныя и внутреннія, объективныя и субъективныя, особенно же на существенныя и характеристичскіе симптомы болѣзни; б) на пораженныя органы, ткани, (легкія, печень, слизистая оболочка и т. д.); в) на процессъ болѣзни (воспаленіе, катарръ, ракъ), ходъ, продолжительность ея (начало, кризисъ, ослабѣваніе); г) на ближайшія и отдаленныя причины ея (душевные потрясенія, простуда и т. д.); е) на особенности даннаго случая (возрастъ, полъ, тѣлосложеніе, темпераментъ, обстоятельства жизни, діета и т. д.); е) на внѣшнія вліянія (температура, погода, время года и дня, эпидемія, вліяніе движенія и покоя, ѣды, положенія тѣла, умственнаго напряженія и т. д.), на особенности болѣзни и отдѣльные симптомы. Такимъ образомъ необходимо такое точное изслѣдованіе болѣзни, какого не предписываетъ ни одна школа, потому что безъ такого изслѣдованія специфическое сходство не можетъ быть открыто.

7) Количество лѣкарства, которое дается больному (доза), опредѣляется силою дѣйствія этого лѣкарства, воспримчивостью больного къ лѣкарствамъ и родомъ болѣзни (см. слѣдующій отдѣлъ).

Гомеопатія предписываетъ обыкновенно малые по понятіямъ старой школы приемы, потому что ея лѣкарства прямо дѣйствуютъ на пораженную болѣзнью часть организма, которая становится чувствительнѣе, и потому малыхъ приемовъ бываетъ достаточно, чтобы произвѣсти дѣйствіе. Съ другой стороны лѣкарства эти, по незначительности приемовъ, не могутъ повредить здоровымъ частямъ организма.*) Иногда, впрочемъ, различная степень воспримчивости больныхъ, или свойства лѣкарства, или родъ болѣзни, дѣлаютъ необходимыми болѣе сильныя приемы. Главное дѣло состоитъ въ томъ, чтобы придерживаться положенія: «подобное лѣчится подобнымъ,» а вопросъ о величинѣ приема есть дѣло второстепенное, такъ что даже при большихъ приемахъ метода лѣченія

*) Въ доказательство того, что гомеопатическія лѣкарства суть ничто, аллопаты обыкновенно берутся выпить сткляночку безъ всякаго для себя вреда. Гомеопатическія лѣкарства, согласно съ вышесказаннымъ, не могутъ повредить здоровому, а все-таки излѣчиваютъ больное.

остаётся гомеопатическою. Полагать сущность гомеопатіи въ малости приѣмовъ — не болѣе какъ недоразумѣніе; но что и небольшіе приѣмы производятъ дѣйствіе, это не подлежитъ сомнѣнію и можетъ быть доказано множествомъ аналогичныхъ явленій, существующихъ въ природѣ. Я укажу только на дѣйствіе чрезвычайно разжиженныхъ красильныхъ и сильно пахучихъ веществъ, на реакцію раствореннаго въ 450,000 частей воды іода на крахмалъ, на психическія явленія, на вліяніе запаха бульона и другихъ яствъ на страдающихъ разстройствомъ желудка, на электричество и т. д. Кто беретъ въ этихъ случаяхъ свѣшать матерію, опредѣлить массу и величину ея?

8) Приѣмъ лѣкарства повторяется чрезъ большіе и меньшіе промежутки времени, смотря по силѣ дозы, смотря по природѣ и силѣ болѣзни и по дѣйствию лѣкарства.

9) Назначенныя средства мѣняютъ, т. е. даютъ новый медикаментъ вмѣсто прежняго, какъ скоро дѣйствіе его оказывается неудовлетворительнымъ, или когда самая болѣзнь потерпитъ измѣненіе вслѣдствіе ли дѣйствія лѣкарства или вслѣдствіе естественнаго своего хода.

10) Лѣкарства должно быть даваемо въ такой формѣ, чтобы оно сохранило свою сущность, силу и простоту, и чтобы раздѣленіе его на точно размѣренные приѣмы было удобно (см. слѣд. главу).

11) По началамъ гомеопатіи допускается и приноситъ пользу и наружное употребленіе лѣкарствъ, но въ этомъ случаѣ необходимо употреблять лѣкарства въ нисшихъ разжиженіяхъ или даже тинктуру.

12) Діета сообразуется не только съ даваемыми лѣкарствами, но также съ характеромъ болѣзни и особенностями больного (см. главу III).

Если представить наглядно весь образъ дѣйствій гомеопата, то получишь слѣдующее: гомеопатъ изучаетъ свойства лѣкарствъ на здоровомъ организмѣ, чтобы узнать такимъ образомъ *чистое* ихъ дѣйствіе; опыты эти производятся посредствомъ сильныхъ дозъ, потому что здоровый организмъ не легко поддается вліянію лѣкарственныхъ веществъ. Когда изучено дѣйствіе лѣкарствъ на органы и части тѣла, изучены болѣзненные симптомы, тогда уже употребляютъ въ болѣзняхъ тѣхъ же частей и того же рода изученныя

вышеупомянутымъ способомъ лѣкарства. Но такъ какъ лѣкарства эти дѣйствуютъ только на пораженные болѣзною органы, то, при большей воспримчивости этихъ послѣднихъ, нужны лишь небольшія дозы. Изъ этого ясно, почему слабыя гомеопатическія дозы производятъ дѣйствіе, а сильныя лишь ухудшили бы болѣзнь; ясно также, что если эти дозы не окажутъ дѣйствія, то не могутъ и повредить, потому что для болѣзненнаго раздраженія здоровыхъ частей необходимы сильныя приемы.

Вотъ основныя правила, которымъ нужно слѣдовать при гомеопатическомъ лѣченіи, чтобы не слѣпо назначать лѣкарства по симптомамъ, но лѣчить рационально. Чѣмъ точнѣе исполнять эти правила, тѣмъ счастливѣе будутъ результаты, хотя мы и не станемъ скрывать, что, не смотря на кажущуюся простоту этихъ правилъ, при практическомъ приложеніи ихъ возникаютъ большія трудности относительно выбора лѣкарства, потому что весьма часто многія лѣкарства за разъ представляются подходящими, вслѣдствіе мнимаго сходства. Кто надѣется легко постигнуть эти начала или почерпнуть всю мудрость изъ однихъ только лѣчебниковъ, тотъ очень ошибается. Необходимы долгая практика и опытность для того, чтобы сдѣлаться хорошимъ гомеопатомъ, и совершенное незнаніе глубокой сущности нашей индивидуализирующей медицинской практики выказываетъ тотъ, кто считаетъ ее болѣе легкою, нежели лѣченіе старой школы, болшею частью совершающееся по общему плану.

II.

Устройство и употребленіе домашней гомеопатической аптечки.**Внѣшнее устройство домашней гомеопатической аптечки.**

Гомеопатическая домашняя аптечка должна находиться въ ящикѣ, недоступномъ для внѣшнихъ вліяній. Всего лучше если ящикъ этотъ будетъ сдѣланъ изъ хорошаго, прочнаго дерева. Такъ какъ на лѣкарственные вещества имѣютъ также вредное вліяніе свѣтъ, теплота, испаренія, химическія тѣла и сильно пахучія вещества, то аптечка должна помѣщаться въ прохладномъ, закрытомъ и не содержащемъ сильно пахучихъ веществъ, какъ напр. мускуса, камфоры и проч., шкафѣ (или тому подобномъ мѣстѣ). Стклянки, назначенныя для лѣкарствъ, должны быть чисты, не имѣть трещинъ и быть закупорены не бывшими до того въ употребленіи плотными совершенно чистыми и безъ червоточинъ пробками. Для острыхъ веществъ всего лучше употреблять стклянки съ хрустальными пробками; препараты, разлагающіеся подъ вліяніемъ свѣта: іодистый калий, селитрокислое серебро, сохраняются въ темныхъ или обтянутыхъ черной бумагой стклянкахъ. Сткляночки отдѣляютъ одну отъ другой перегородками, пишутъ названія лѣкарствъ на пробкахъ, покрывающихъ ихъ бумажныхъ оболочкахъ, и, для предосторожности, наклеиваютъ этикетки съ названіями и на самыя стклянки, которыя, для легкости отысканія лѣкарствъ, размѣщаютъ въ алфавитномъ порядкѣ.

Домашнія гомеопатическія аптечки главнымъ образомъ содержатъ:

1) *Разжиженія* (капли), приготовляемыя изъ тинктуръ, которыя суть не что иное, какъ жидкости, получаемыя чрезъ продолжительное настаиваніе на винномъ спиртѣ большую частью расти-

тельныхъ (рѣдко минеральныхъ и животныхъ) веществъ, или эссенцій, т. е. соковъ, получаемыхъ чрезъ выжиманіе цѣлаго свѣжаго растенія или одной изъ его частей и прибавленіе спирта. Онѣ содержатъ дѣйствующее начало настоянныхъ веществъ. Введеніе ихъ составляетъ важную заслугу Ганеманна, потому что употребленіе ихъ легко, вѣрно и пріятно, и онѣ легко дѣлимы. Медикаменты эти должны быть всегда прозрачны и безъ осадка.

2) *Крутинки*, приготовляемыя изъ молочнаго сахара съ небольшою примѣсью крахмала. Онѣ смачиваются извѣстнымъ дѣленіемъ лѣкарства и въ такомъ видѣ ихъ принимаютъ. Особенно употребительны онѣ при лѣченіи женщинъ и дѣтей.

3) *Растиранія* (порошки). Вещества, которыя въ сыромъ видѣ имѣютъ весьма неопредѣленное дѣйствіе, какъ напр. ликонодіи (плауны), уголь, сѣра, или металлы, которые уже въ маломъ количествѣ дѣйствуютъ вредно, или лѣкарства, не растворимы ни въ водѣ, ни въ спиртѣ, ни въ эфирѣ, — растираются въ порошокъ съ молочнымъ сахаромъ. Эта форма лѣкарствъ употребляется только въ исключительныхъ случаяхъ.

Теперь мы хотимъ передать читателю все заслуживающее вниманіе относительно разжиженій и дѣленій. Въ большинствѣ случаевъ слѣдуетъ употреблять вмѣсто основныхъ лѣкарственныхъ веществъ, такъ называемыя дѣленія во 1-хъ потому, что онѣ всегда оказываютъ надлежащее дѣйствіе, и во 2-хъ потому, что употребленіе лѣкарственныхъ веществъ въ ихъ первоначальномъ видѣ и даже употребленіе нисшихъ дѣленій ихъ въ неопытныхъ рукахъ можетъ повлечь за собою ухудшеніе болѣзни.

Правила относительно принятія лѣкарствъ и приготовленія разжиженій.

Вообще говоря, нисшія разжиженія приличнѣе въ острыхъ (скоротечныхъ) болѣзняхъ, а высокія въ хроническихъ (медлительныхъ) болѣзняхъ. Само собою разумѣется, что все это зависитъ отъ условій, упомянутыхъ въ предыдущей главѣ, т. е. отъ свойства лѣкарствъ, отъ тѣлосложенія и отъ характера самой болѣзни; но все-таки можно указать для острыхъ болѣз-

ней на дѣлѣніе 2 — 6, для хроническихъ же на 3 — 12. Внутри этихъ границъ слѣдуетъ выбирать дѣленіе, смотря по обстоятельствамъ (срв. выше I, пунктъ 7). Замѣчу, что другіе идутъ далѣе меня, прописываютъ 30 и даже 200 дѣленіе. Ниже, при указаніи лѣкарствъ, я подробнѣе скажу о подходящихъ въ разныхъ случаяхъ, согласно съ моими опытами, дѣленіяхъ, а теперь я считаю нужнымъ замѣтить, что не всегда возрастъ, полъ, слабость тѣлосложенія, обуславливаютъ употребленіе высшихъ или нисшихъ дѣленій, но что особенная воспримчивость больного къ лѣкарствамъ, которую въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ слѣдуетъ имѣть въ виду, имѣетъ тутъ также большое значеніе.

Я говорилъ выше о дѣленіяхъ. Ихъ готовятъ такъ: тинктуру, полученную изъ настоянныхъ на крѣпкомъ спирту свѣжихъ или сухихъ растений, разжижаютъ крѣпкимъ виннымъ спиртомъ, тинктуры же, приготовленныя на слабомъ спирту, разжижаютъ слабымъ спиртомъ. Дѣлается это такъ, что 1 капля основной тинктуры приходится на 9 капель или, что то же, 10 капель тинктуры приходится на 90 капель спирта (Decimalscala, десятичная система); или же берется 1 капля тинктуры на 99 капель спирта (Centesimalscala, сотенная система). Смѣшанныя жидкости долго взбалтываютъ сильными размахами руки, пока соединеніе ихъ не совершится вполне. Такимъ образомъ получится такъ называемое первое дѣленіе, означаемое цифрою 1. Римская цифра X, находящаяся при арабской, означаетъ, что въ стклянкѣ содержится десятичное дѣленіе известнаго лѣкарства. Такъ напр. цифра 2 обозначаетъ второе сотенное дѣленіе, а X. 2 — второе десятичное. Изъ этого дѣленія уже готовятъ 2, 3, 4 и т. д. дѣленіе чрезъ разжиженіе его спиртомъ въ отношеніи 1: 9 (или 1: 99). Эти смѣси также слѣдуетъ сильно встряхивать. Если 5-ое дѣленіе покажется слишкомъ сильнымъ и захотятъ сдѣлать 6-ое, то по десятичной системѣ слѣдуетъ взять одну каплю этого 5-го дѣленія и разбавить ее 9-ю (если 10 капель, то 90) каплями, а по сотенной системѣ 99 каплями спирта, послѣ чего 6-е дѣленіе будетъ готово.

Подобнымъ же образомъ готовятъ изъ порошковъ растіанія по десятичной или сотенной системѣ. Берутъ 9 или 99 частей молочнаго сахару смѣшиваютъ ихъ, постепенно подсыпая, съ 1 частью лѣкарственнаго вещества и довольно долгое время

(не менѣе одного часа) растирають въ фарфоровой ступкѣ такимъ же пестикомъ. И здѣсь точно такъ же получается напр. изъ 1 дѣленія 2-е, когда одинъ гранъ перваго смѣшивается съ 9-ю гранами (или 10 грановъ съ 90 гр.) молочнаго сахару (1: 10), или же 1 гранъ съ 99 (1: 100). Этотъ способъ доводить только до 3 дѣленія, а четвертое дѣленіе готовится съ водою. Оставивъ утомительное растираніе, для дальнѣйшаго раздѣленія растворяють 10 грановъ 3-го растиранія въ 90 капляхъ воды (или 1: 99) и хорошенько взбалтываютъ этотъ растворъ. Такимъ образомъ получается 4-ое дѣленіе. Но это послѣднее можно готовить только для немедленнаго приема, потому что оно легко портится. Если же хотять приготовить препараты, сохраняющіеся долѣе, то слѣдуетъ продолжать дѣленіе. Берутъ 10-ть капель 4-го разжиженія, смѣшиваютъ ихъ съ 90 каплями разжиженнаго виннаго спирта (или 1: 99), получаютъ такимъ образомъ 5 разжиженіе и т. д. я предпочитаю всѣмъ другимъ систему десятичную, которая обыкновенно употребляется въ Дрезденѣ.

При названіи лѣкарства слѣдуетъ всегда выставлять и номеръ разжиженія. Ясно, что такимъ образомъ весь рядъ разжиженій всякій легко можетъ себѣ приготовить самъ. При нѣкоторыхъ лѣкарственныхъ средствахъ, каковы напр. соли, эфирныя масла, употребляютъ вмѣсто растиранія разжиженіе, чтобы избѣгать разложенія. Въ этомъ случаѣ, вслѣдствіе химическихъ причинъ, не всегда можно удержать отношеніе 1: 10; здѣсь чаще встрѣчается 5: 95. Разжиженіе же производится какъ и выше (10: 90), только 2-ое дѣленіе слѣдуетъ готовить съ помощію разжиженнаго, а 3-е и слѣдующія съ помощію уже крѣпкаго виннаго спирта.*)

Подходящее дѣленіе лѣкарства дается больному въ отдѣльныхъ приемахъ. Для этого въ большей части случаевъ бываетъ достаточно 1—2 капель жидкаго лѣкарства или щепотки (подъ щепоткою мы будемъ разумѣть такое количество порошка, какое можно захватить кончикомъ перочиннаго ножа) порошка, если лѣкарство приготовлено въ такомъ видѣ. Крупинокъ даютъ обы-

*) Первые три разжиженія эфирныхъ маселъ, напр. Petroleum, должны быть приготовляемы съ помощію самаго крѣпкаго спирта. Это относится также къ Balsamum Copaivae.

кновенно отъ 2 до 4 на одинъ пріемъ. Порошокъ разводятъ въ чайной ложкѣ воды, причемъ онъ долженъ хорошенько съ нею смѣшаться. Можно также раздѣлить одну каплю или грань, или нѣсколько капель и грановъ, на нѣсколько пріемовъ, напр. для цѣлаго дня. Если напр. хотятъ приготовить лѣкарства на шесть пріемовъ, то берутъ 6 капель или щепотокъ (или 12 крушин.) растворяютъ ихъ въ 6—12 или болѣе ложкахъ воды, смотря по обстоятельствамъ, потомъ, взболтнувъ растворъ, тщательно прикрываютъ его и, смотря по надобности, принимаютъ по ложкѣ черезъ 1—2 часа. Такимъ образомъ, можно или одну каплю раздѣлить на 6 частей (1 капля на 6 чайныхъ ложекъ воды, по ложкѣ черезъ 2 часа) или за разъ приготовить нѣсколько полныхъ пріемовъ (6 капель на 6 чайныхъ ложекъ воды, принимать по ложкѣ чрезъ 2 часа). Дѣтямъ можно давать каплю лѣкарства на сахарѣ. Нервѣдко принимаютъ жидкое лѣкарство на облаткахъ.

Крушинки (онѣ должны состоять изъ чистаго молочнаго сахара и крахмала; въ гранѣ должно ихъ быть около 50) употребляются такимъ образомъ: извѣстное количество ихъ (около 600) кладутъ въ стекляночку и смачиваютъ 2—3 каплями разжиженія, встряхиваютъ или мѣшаютъ лопаточкой; нѣсколько крушинокъ растираютъ съ молочнымъ сахаромъ, или растворяютъ въ водѣ, или принимаютъ ихъ безо всего. Всего чаще даютъ въ такой формѣ лѣкарства дѣтямъ и слабымъ женщинамъ. Впрочемъ, дѣти, въ большинствѣ случаевъ, охотно принимаютъ лѣкарства и въ другихъ видахъ.

Правила относительно повторенія пріемовъ.

Что касается до повторенія пріемовъ, то, по причинѣ разнообразія случаевъ, и тутъ нельзя дать опредѣленныхъ указаній. Вообще можно сказать, что пріемъ въ острыхъ болѣзняхъ, смотря по степени ихъ опасности, можетъ повторяться черезъ каждые 2—3 часа. Бываютъ также обстоятельства, какъ напр. при крупѣ, холерѣ, рвотѣ, судорогахъ, когда необходимо частое повтореніе, даже черезъ каждые полчаса. Въ случаяхъ же хроническихъ надо быть весьма осторожнымъ въ повтореніи лѣкарства. Опытъ показалъ, что нервѣдко повтореніе пріема черезъ каждые 4 часа дѣйствуетъ уже слишкомъ сильно. Большею частію бываетъ доста-

точно принимать лѣкарство 1 или 2 раза въ день, утромъ и вечеромъ; но при застарѣлыхъ недугахъ весьма полезно принимать лѣкарство черезъ день, даже съ промежутками въ 4—6 дней и болѣе послѣ одного или двухъ приемовъ. Это необходимо частію для того, чтобы дать лѣкарству время обнаружить полное свое дѣйствіе, частію также для того, чтобы не притупилась восприимчивость организма къ лѣкарству.

Къ сожалѣнію, въ послѣднее время вошло въ обычай давать попеременно 2, даже 3 и 4 лѣкарства; напр. при воспаленіи горла даютъ *Belladonna* и *Mercur.*, положимъ, въ два часа пополудни первое, въ 4 часа второе, затѣмъ въ 6 часовъ опять первое, и т. д. Такое лѣчение можно допустить въ нѣкоторыхъ случаяхъ, напр. при крупѣ, но не слѣдовало бы возводить его въ правило, потому что оно указываетъ на недостатокъ довѣрія къ дѣйствию каждаго отдѣльнаго средства и на нерѣшительность при выборѣ лѣкарствъ.

Составъ домашней гомеопатической аптечки.

Домашняя гомеопатическая аптечка можетъ состоять, смотря по желанію, изъ большаго или меньшаго числа лѣкарствъ.

А. Самая маленькая аптечка должна содержать такія лѣкарства, которыя чаще всѣхъ употребляются (полихресты), причемъ слѣдуетъ обратить вниманіе на то, что аптечки эти употребляются преимущественно въ семействахъ, для дѣтей. При именахъ лѣкарствъ я означу самыя употребительныя дѣленія (потенці), причемъ замѣчу, что я предпочитаю десятичную систему. **Жирнымъ шрифтомъ** напечатанныя цифры означаютъ дѣленія, особенно мною рекомендуемыя для домашней аптечки. Наиболѣе употребительными лѣкарствами я считаю слѣдующія:

1. *Aconitum Napellus*. Акониитумъ, борець. Дѣлен. 2. 3.
2. *Apis mellif.* Аписъ мелиф., пчелиный ядъ. Дѣл. 3. 6.
3. *Arnica montana*. Арника, баранья трава. 2. 3.
4. *Arsenicum album*. Арсеникъ, мышьякъ. 5. 6. — 12.
5. *Belladonna*. Белладонна, сонная одурь. 3. 6.
6. *Bryonia alba*. Бріонія, перестуцень. 3. — 6.

7. *Calcareo carbonica*. Калькарея карбоника, углекислая известь. **3.** растир. — **5. 6.** дѣлен.
8. *Carbo veget.* Карбо вегеталисъ, растительный уголь. **2. 3.** растир. **6.** дѣлен.
9. *Chamomilla vulgaris*. Хамомила, ромашка обыкновенная. **2. 3.**
10. *China*. Хина, хинная кора. **1. 2. 3.**
11. *Cina*. Цина, цитварное сѣмя. **2. 3.**
12. *Colocynthis*. Колоцинтисъ, колоквиить. **2. 3.** — **6.**
13. *Cuprum metallicum*. Купрумъ, мѣдь. **3.** растир. — **6.** дѣлен.
14. *Drosera rotundifolia*. Дрозера, росникъ. **2. 3.**
15. *Ferrum carbonicum*. Феррумъ карбоникумъ, углекислое желѣзо. **1. 2. 3.** растир.
16. *Hepar sulphuris calc.* Генаръ сульфурисъ, извѣстковая сѣрная печень. **2. 3.** растир. — **6.** дѣлен.
17. *Ignatia amara*. Игнація, горькій груданникъ. **2.** — **3.**
18. *Iodum purum*. Иодумъ, чистый іодъ. **2.** — **6.**
19. *Ipecacuanha*. Ипеакауана, рвотный корень. **2. 3.**
20. *Mercurius solubilis Hahnemannii*. Меркуріусъ солюбилисъ, Ганнеманнова растворимая ртуть. **2. 3.** растир. **6.** дѣлен. *)
21. *Nux vomica*. Нуксъ вомика, челибуха. **3.** — **6.**
22. *Phosphorus*. Фосфорусъ, фосфоръ. **3. 5.** — **6.**
23. *Pulsatilla nigricans*. Пульсатилла, вѣтреница. **2. 3.**
24. *Rhus toxicodendron*. Русъ, сумахъ **2. 3.** — **6.**
25. *Sepia*. Сепія, сокъ каракатицы. **2. 3.** — **6.** дѣлен. — **3.** растир.
26. *Silicea*. Силицея, кремнеземъ. **3.** растир. **6.** дѣлен.
27. *Spigelia anthelmintica*. Спигелия. **2. 3.** — **6.**
28. *Spongia tosta*. Спонгія, жженая губка. **2.** — **6.**
29. *Sulphur*. Сульфуръ, сѣра. **2. 3.** *Tct. sulph.* **3.**
30. *Veratrum album*. Вератрумъ, бѣлая чемерица **2. 3.** — **6.**

Кромѣ того можно еще рекомендовать для лѣченія дѣтей *Zincum*, какъ средство противъ судорогъ (смот. № 60).

*) Изъ всѣхъ ртутныхъ препаратовъ этотъ употребляется наиболѣе часто. За нимъ слѣдуетъ *Mercurius vivus*, живая ртуть.

Б Такъ какъ эта небольшая аптечка не всегда удовлетворяетъ даже главнымъ потребностямъ лѣченія, то необходимо бываетъ увеличить число лѣкарствъ до 60.

Вотъ списокъ дальнѣйшихъ тридцати лѣкарствъ.

31. *Antimonium crudum*. Антимоніумъ крудумъ, самородная сурьма 3. раст. — 6. дѣл.
32. *Argentum nitricum*. Аргентумъ нитрикумъ, азотокислое серебро. 5. — 6.
33. *Aurum muriaticum natronatum*. Аурумъ муріатикумъ натронатумъ, хлористо-натренное золото. 3. дѣлен.
34. *Baryta carbonica*. Барита карбоника, углекислый баритъ. 3. растир. — 6. дѣлен.
35. *Cannabis sativa*. Каннабисъ, конопля. 2. 3.—6.
36. *Cantharis*. Кантарисъ, испанская мушка. 3. — 6.
37. *Causticum*. Каустикумъ, Ганеманново ѣдкое вещество. 2. 3. — 6.
38. *Cocculus*. Коккулюсъ, кукульванъ. 3.
39. *Coffea arabica*. Коффеа арабика, кофе. 2.
40. *Crocus sativus*. Крокусъ, шафранъ. 3.
41. *Digitalis purpurea*. Дигиталисъ, панерсточникъ 1. 2. — 3.
42. *Dulcamara*. Дулькамара, сладкогорькій паслѣнь. 2. 3.
43. *Euphrasia officinalis*. Евфразія, очанка обыкновенная. 2.
44. *Graphites*. Графитесъ, графитъ. 2. 3. растир. — 6. дѣлен.
45. *Helleborus niger*. Геллеборусъ, черная чемерица. 2. 3. 6.
46. *Hyosciamus*. Гіосціамусъ, черная бѣлена. 2. 3. — 6.
47. *Kreosotum*. Креозотумъ, креозоть. 3. — 6.
48. *Lachesis*. Лахезисъ, ядъ змѣи того же имени. 6.
49. *Lycopodium*. Ликоподіумъ, плауень. 3. растир. — 6. дѣлен.
50. *Mercurius sublimatus corr.* Меркуріусъ сублиматусъ, ѣдкая сулема. 2. 3. — 6.
51. *Natrum muriaticum*. Натрумъ муріатикумъ, хлористый натрій. 2. 3. — 6. дѣлен.
52. *Nitri acidum*. Нитри ацидумъ, селитряная кислота. 2. 3.
53. *Opium*. Опіумъ, опій. 2. 3.
54. *Phosphori acidum*. Фосфори ацидумъ, фосфорная кислота. 2. 3.
55. *Platina*. Платина. 2. 3. растир. — 6. дѣл.

56. *Secale cornutum*. Секале, рожки, спорынья. 3. растир.—2. дѣлен.
57. *Staphysagria*. Стафисагрія, гнидникъ. 2. 3. — 6.
58. *Tartarus emeticus*. Тартарусъ эметикусъ, винный рвотный камень. 2. 3. — 6.
59. *Thuja occidentalis*. Туя, негнѣючка. 2. 3.
60. *Zincum metallicum*. Цинкумъ, цинкъ. 2. 3. растир. 6. дѣлен.
- В. Желаяющимъ имѣть еще болѣе полную аптечку, что особенно важно для живущихъ далеко отъ гомеопатическихъ аптекъ, совѣтуемъ прибавить слѣдующія 60 средствъ.
61. *Agaricus muscarius*. Агарикусъ, мухоморъ. 2. 3. дѣлен.
62. *Aethusa Cynapium*. Этуза, wokорышъ. 2.
63. *Alumen*. Алуменъ, квасцы. 3. растир.
64. *Ambra*. Амбра. 2. 3.
65. *Ammonium carbonicum*. Аммоніумъ карбоникумъ, углекислый аммоньякъ. 2. 3.
66. *Ammonium muriaticum*. Аммоніумъ муріатикумъ, нашатырь, водохлорокислый аммоньякъ. 1. 2.
67. *Anacardium orientale*. Анакардіумъ, слоновою вошь. 2. 3.
68. *Asa foetida*. Аса фетида, воночая камедь. 2. 3. — 6.
69. *Baryta acetica*. Барита ацетика, угусокислый баритъ. 3. дѣлен.
70. *Berberis vulgaris*. Берберисъ, барбарисъ. 2. 3.
71. *Bismuthum metallicum*. Бисмутумъ, висмутъ. 2. растир.
72. *Borax veneta*. Бораксъ, бура. 1. 2.
73. *Bromium*. Броміумъ, бромъ. 2. 3. — 6. *)
74. *Calcarea acetica*. Калькареа ацетика, угусокислая известь. 2. 5.
75. *Camphora*. Камфора. 2. 3. — 6. **)
76. *Capsicum annuum*. Капсикумъ, стручковый перецъ. 2. 3. — 6.
77. *Carbo animalis*. Карбо анималисъ, животный уголь. 2. 3. растир. 6. дѣлен.

*) Это средство скоро портится, почему его часто приходится возобновлять.

**) Средство это, по причинѣ сильнаго запаха, слѣдуетъ сберегать отдѣльно отъ другихъ лѣкарствъ. То же относится къ мускусу.

78. *Chininum sulphuricum*. Хининумъ сульфурикумъ, сѣрно-кислый хининъ. 1. 2. растир. или 2. 3. дѣл.
79. *Cicuta virosa*. Цикута вироза, омегъ. 2. 3. — 6.
80. *Clematis erecta*. Клематисъ, ломоносъ. 2. 3.
81. *Colchicum autumnale*. Кольхикумъ, безвременный цвѣтъ. 1. 2. 3.
82. *Conium maculatum*. Коніумъ, болиголовъ. 2. 3. — 6.
83. *Cyclamen europaeum*. Цикламень, дряква. 1. 2.
84. *Kali bichromicum*. Кали бихромикумъ, двухромокислое кали. 1. 2. 3.
85. *Kali carbonicum*. Кали карбоникумъ, углекислое кали. 3.
86. *Kali hydroiodicum*. Кали гидроіодикумъ, іодистое кали 1. 2.
87. *Lactuca virosa*. Лактука вироза, ядовитый латукъ. 2. 3.—6.
88. *Laurocerasus*. Лауроцерасусъ, лавровая вишня. 2. 3.
89. *Ledum palustre*. Ледумъ палустрэ, дикій розмаринъ. 1. 2. 3.
90. *Lobelia inflata*. Лобелія. 1. 2.
91. *Magnesia carbonica*. Магnezія карбоника, углекислая магnezія. 2. 3. растир. — 6. дѣлен.
92. *Manganum aceticum*. Манганумъ ацетикумъ, уксусокислый марганецъ. 2. 3. растир.
93. *Mezereum*. Мецереумъ, волчьи ягоды 2. 3. — 6.
94. *Millefolium*. Миллефоліумъ, тысячелистникъ. 1. 2.
95. *Muriaticum acidum*. Муріатикумъ ацидумъ, водохлорная кислота. 1. 2. 3.
96. *Natrum carbonicum*. Натрумъ карбоникумъ, углекислый натръ. 2. 3. — 6.
97. *Nux moschata*. Нуксъ моншата, муншкатный орѣхъ. 2. 3.—6.
98. *Oleander*. Олеандръ. 2. 3.
99. *Petroleum*. Петролеумъ, горное масло, нефть 3. 5. — 6.
100. *Petroselinum*, петрушка. 1. 2. 3.
101. *Plumbum metallicum*. Плюмбумъ, свинецъ. 3. растир. 6. дѣлен.
102. *Ranunculus bulbosus*. Ранункулусъ бульбосусъ, жабинецъ. 2. 3.
103. *Rheum*. Реумъ, ревень. 1. дѣлен.
104. *Rhododendron chrysanthemum*. Рододендронъ, боярышникъ. 2. 3.
105. *Ruta graveolens*. Рута. 2. 3.

106. *Sabadilla*. Сабадилла, китайская чемерица. 2. 3. — 6.
 107. *Sabina*. Сабина, казацкій можжевельникъ 2. 3. — 6.
 108. *Sambucus*. Самбукусъ, бузина. 2. 3.
 109. *Sassaparilla*. Сассапарилла, сальсапарель. 2. 3.
 110. *Senega*. Сенега, многомлечникъ 2. 3.
 111. *Sulphuricum acidum*. Сульфурйкумъ ацидумъ, сѣрная кислота. 1. 2. — 5.
 112. *Squilla maritima*. Сквилла, морской лукъ. 2. 3.
 113. *S. annum*. Станнумъ, олово. 2. 3. растир. 6. дѣл.
 114. *Stramonium*. Страмоніумъ, дурманъ. 3. 6.
 115. *Strontiana carbonica*. Стронціона карбоника, углекислый стронцій. 2. 3. растир.
 116. *Tabacum*. Табакумъ, табакъ. 2.
 117. *Therebinthinae oleum*. Теревинтинэ олеумъ, скипидаръ. 2. 3. — 6.
 118. *Valeriana*. Валеріана, маунъ. 1. 2. 3.
 119. *Verbascum*. Вербаскумъ, царскій скипетръ. 1. 2.
 120. *Viola tricolor*. Віола триколоръ, аютины глазки 1. 2.

Само собою разумѣется, что этотъ списокъ не исчерпываетъ всѣхъ средствъ, употребляемыхъ въ гомеопатіи; число всѣхъ извѣстныхъ въ гомеопатической литературѣ лѣкарствъ доходитъ почти до осьми сотъ. Въ послѣднее время особенно вошли въ употребленіе нѣкоторыя средства американскаго происхожденія. Приведенныхъ выше въ списокъ лѣкарствъ однако совершенно достаточно для домашней аптечки.

Для паружнаго употребленія слѣдуетъ прибавить:

Tinctura Arnicae. . . . тинктура изъ бараньей травы и
Tinctura Calendulae offic. — изъ ноготковъ.

Нѣкоторые совѣтуютъ для того же употребленія еще:

Tinctura Urticae urent. . тинктура изъ крапивы-жгучки,
Tinctura Symphyti offic. — изъ живокости,
Tinctura Helianthi annui. — изъ подсолнечника,

но послѣднія средства употребляются весьма рѣдко.

Списокъ новыхъ американскихъ и другихъ рѣже упоминаемыхъ въ этомъ сочиненіи лѣкарствъ.

- | | |
|---|-------------------------------------|
| <i>Actaea spicata.</i> | <i>Coca.</i> |
| <i>Aesculus glabra.</i> | <i>Coccus cacti.</i> |
| <i>Aesculus hippocastanum.</i> | <i>Coffein.</i> |
| <i>Agave americana.</i> | <i>Copaiva.</i> |
| <i>Agnus castus.</i> | <i>Cornus circinnata.</i> |
| <i>Aletris farinosa.</i> | <i>Cornus florida.</i> |
| <i>Allium sativum.</i> | <i>Cypripedium pubescens.</i> |
| <i>Aluminium metall.</i> | <i>Digitalinum.</i> |
| <i>Apocynum androsemifolium.</i> | <i>Dioscorea villosa.</i> |
| <i>Apocynum cannabinum.</i> | <i>Ergotinum.</i> |
| <i>Aralia racemosa.</i> | <i>Erigeron canadense.</i> |
| <i>Argentum foliatum.</i> | <i>Eryngium aquaticum.</i> |
| <i>Artemisia vulgaris.</i> | <i>Eupatorium aromaticum.</i> |
| <i>Arum triphyllum.</i> | <i>Eupatorium perforatum.</i> |
| <i>Asarum europaeum.</i> | <i>Eupatorium purpureum.</i> |
| <i>Asclepias syriaca.</i> | <i>Euphorbia corollata.</i> |
| <i>Asclepias tuberosa.</i> | <i>Euphorbium Cypariss.</i> |
| <i>Atropinum.</i> | <i>Filix mas.</i> |
| <i>Baptisia tinctoria.</i> | <i>Fluoricum acidum.</i> |
| <i>Baryta muriatica.</i> | <i>Fucus vesiculosus.</i> |
| <i>Boletus laricis.</i> | <i>Gelseminum sempervi-</i> |
| <i>Cactus grandiflorus.</i> | <i>rens (nitid.).</i> |
| <i>Calcarea jodata.</i> | <i>Glonoinum.</i> |
| <i>Calcarea phosphor.</i> | <i>Gossipium herbaceum.</i> |
| <i>Calendula officinalis.</i> | <i>Guajacum officinale.</i> |
| <i>Carduus marianus.</i> | <i>Gummi guttae.</i> |
| <i>Caulophyllum thalictroides.</i> | <i>Hamamelis virgin.</i> |
| <i>Chimaphila umbellata.</i> | <i>Helianthus annuus.</i> |
| <i>Cimicifuga racemosa.</i> | <i>Helonias dioica.</i> |
| <i>Cinnabaris.</i> | <i>Hydrastis canadensis.</i> |
| <i>Cinnamomum.</i> | <i>Hydrocyanicum acidum.</i> |
| <i>Cistus canadensis.</i> | <i>Ialappa.</i> |
| | <i>Iatropa curcas.</i> |

*Iris versicolor.****Kalium bromatum.****Kali chloricum.**Kalmia latifolia.**Kamala.**Kouso.**Leptandria virginica.**Lycopus virginicus.**Magnesia muriatica.****Mercurius bijodatus.***— ***cyanatus.***— ***dulcis*** (calomel).— ***jodatus.***— ***praec. ruber.****Millefolium Achillea.**Moschus.**Myrica cerifera.**Naja tripudians.**Nitri dulcis spiritus.**Nitrum.**Nuphar luteum.**Paris quadrifolia.**Phytolacca decandra.**Plantago major.**Podophyllum peltatum.**Polygonum hydropiper.*— ***punctatum.****Prunus spinosa.**Punica granatum.****Rana bufo.****Rumex crispus.****Sanguinaria canadensis.******Sarracenia purpurea.******Selenium.****Senecio aureus.*— ***gracilis.****Senna.**Silphium laciniatum.**Solanum nigrum.**Solanum tuberosum.**Sticta pulmonaria.**Strychninum nitricum.**Symphitum officinale.**Tellurium.*• *Teucrium marum verum.**Trillium pendulum.****Tussilago petasites.****Uranium muriaticum.**Urtica urens.****Uva ursi.******Veratrum viride.****Xanthoxylum fraxineum.**Zizia aurea.*

NB. Болѣ важныя изъ этихъ лѣкарствъ набраны жирнымъ шрифтомъ.

III.

Дієтетическія наставленія.

Мы можемъ предложить лишь нѣсколько общихъ замѣчаній относительно діеты, потому что дать наставленія для всякаго отдѣльнаго случая — невозможно. Но мы сдѣлаемъ и это, насколько

позволяютъ границы нашего сочиненія, при описаніи отдѣльныхъ болѣзней. Что діета есть важное вспомогательное средство при лѣченіи и часто сама по себѣ производитъ исцѣленіе—это слѣдуетъ уже изъ того, что несоблюденіе ея часто служитъ помѣхой исцѣленію и бываетъ нерѣдко причиной особенно хроническихъ недуговъ. Строгія дієтетическія предписанія Ганеманна, которыми онъ обратилъ вниманіе и на это поприще медицины, дѣйствительно основаны отчасти на этихъ наблюденіяхъ, но вызваны еще и тѣмъ обстоятельствомъ, что старая школа, разсчитывая на всемогущество своихъ микстуръ, большею частью мало заботилась о діетѣ, считая ее дѣломъ второстепеннымъ. Главнымъ образомъ строгость діеты въ гомеопатіи необходима потому, что, при небольшихъ приемахъ, дѣйствіе лѣкарствъ ослаблялось бы вліяніемъ постороннихъ веществъ. Установленію строгой діеты содѣйствовала еще идея объ антидотарическомъ, т. е. такомъ дѣйствіи нѣкоторыхъ веществъ, которое отнимаетъ у лѣкарства всю его силу. Таково дѣйствіе преимущественно винограднаго вина и кофе. Но въ послѣднее время, съ тѣхъ поръ какъ начали давать болѣе сильные приемы, лѣченіе же и въ дієтетическомъ отношеніи гораздо болѣе индивидуализовано, приравнивается ко всѣмъ особенностямъ извѣстнаго больнаго, стали заботиться уже не объ общихъ дієтетическихъ предписаніяхъ, а только о тѣхъ, которыя безусловно необходимы въ данномъ случаѣ и при извѣстныхъ лѣкарствахъ.

Что касается до болѣзней вообще, то лишь только зная отдѣльный, частный случай, можно рѣшить, что полезно больному, — покой или движеніе, комнатное тепло или свѣжій воздухъ, легкая или питательная пища и т. п. Такъ напр. при малокровіи вино и хорошее пиво полезны, а при приливахъ и полнокровіи — вредны. Надобно также обращать большое вниманіе на индивидуальныя особенности больнаго относительно возраста, пола, привычекъ. Такъ напр. большая разница существуетъ между больными, изъ которыхъ одинъ привыкъ къ кофе, а другой нѣтъ. Въ первомъ случаѣ можно скорѣе разрѣшить употребленіе этого напитка, если не противорѣчитъ прямо самая болѣзнь. Жирныя кушанья, пряности, трудноваримая мясная и растительная пища, кислое, острое, соленое и спиртное въ большей части случаевъ должны быть избѣгаемы. Изъ разныхъ сортовъ мяса особенно вредны: те-

лятина, гусятина, солонина, нѣкоторые роды колбасъ (кровяная и ливерная); изъ рыбъ: угри, копченая рыба, миноги; изъ овощей: рѣпа, капуста, разная зелень, горохъ, чечевица, ячная крупа. Далѣе, само собою разумѣется, что всякаго рода излишества большимъ вредны тѣмъ болѣе, что они рѣдко сходятъ съ рукъ и здоровымъ.

По отношенію къ лѣкарствамъ слѣдуетъ запретить преимущественно кофе, виноградное вино и другіе спиртные напитки (ромъ, водку и т. д.) при употребленіи растительныхъ средствъ, какъ напр. *Chamom.*, *Bellad.* и т. д. Ни въ какомъ случаѣ не выносить кофе *Nux vomica*, — средство, противоядіемъ которому служить именно этотъ напитокъ. Всѣ средства, которыя дѣйствуютъ возбуждительно на кровеносную систему, не терпятъ кофе и спиртныхъ напитковъ. При употребленіи землистыхъ и минеральныхъ средствъ, каковы *Baryt.*, *Graphit.*, *Mercur.*, *Silicea* и т. п., и въ престарѣлыхъ лѣтахъ скорѣе можно дозволить кофе. Однако, въ такомъ случаѣ слѣдуетъ употреблять его только за завтракомъ, и лѣкарство давать не менѣе двухъ часовъ спустя послѣ его употребленія. Далѣе гемеопатія запрещаетъ слѣдующія травы, сѣмена и корни, которыя сами производятъ лѣкарственное дѣйствіе, а потому противодѣйствуютъ нашимъ лѣкарствамъ: шавель, спаржу, горчицу, хрѣнь, петрушку, лукъ, чеснокъ, сельдерей, рѣдку, свеклу, тмишь, маіоранъ, шалфей, укропъ, кишинець (коріандръ), васильки, можжевельныя ягоды, грибы, шиповникъ, крессъ, цикорный и волчій корень, сушъ изъ травъ, зеленый, тминный и старый сыръ. Изъ пряностей слѣдуетъ по возможности избѣгать: корицы, шафрана, имбиря, перца, мускатнаго орѣха, ванили, лавроваго листа, цедры, лимона, горькаго миндаля, гвоздики. Slѣдуетъ также совершенно запретить столь любимое употребленіе разныхъ чаевъ и отваровъ, большая часть которыхъ (за исключеніемъ развѣ отваровъ алтееваго корня и льнянаго сѣмени) уничтожаетъ дѣйствіе лѣкарствъ; таковы преимущественно: бузина, ромашка, маунъ, вероника, тысячелѣстникъ (*Achillea Millefolium*), мелисса, перечная мята и т. д. При извѣстныхъ обстоятельствахъ необходимо также избѣгать крѣпкаго пива, прянаго шоколада, морожеваго (особенно съ ванилью), всякаго рода искусственныхъ соусовъ и салатовъ, особенно содержащихъ цедру и крѣпкій уксусъ, *Mixed pickles* (пикули) и т. д.

Навонецъ, слѣдуетъ отказаться отъ употребленія зубныхъ тинктуръ (порошки, не содержащіе пахучихъ веществъ, менѣе вредны), сильно пахучихъ парфюмерныхъ товаровъ, содержащихъ амбру, мускусъ, отъ разнаго рода мыль и косметическихъ водъ, отъ употребленія эфирныхъ маселъ и пахучихъ веществъ, нюхательнаго табаку, втираній и пластырей. Больной долженъ твердо положиться на дѣйствіе количественно ничтожныхъ, но качественно могущественныхъ гомеопатическихъ лѣкарствъ.

О БОЛѢЗНЯХЪ

ВЪ ЧАСТНОСТИ И ИХЪ ЛѢЧЕНІИ.



ПЕРВОЕ ОТДѢЛЕНІЕ.

БОЛѢЗНИ КРОВЕНОСНОЙ СИСТЕМЫ.

А. ЛИХОРАДКА.

Подъ именемъ лихорадки разумѣтся болѣзненное состояніе, которое опредѣляется ускореніемъ пульса, продолжительнымъ жаромъ или жаромъ и ознобомъ попеременно, при общемъ чувствѣ недомоганія. Лихорадка, такимъ образомъ, въ большей части случаевъ есть отраженіе другаго первичнаго мѣстнаго недуга, какъ напр. катарральнаго (простуднаго), желудочнаго (гастрическаго), ломотнаго, воспалительнаго состоянія. Поэтому лѣченіе лихорадки должно быть направлено на лежащую въ основаніи ея мѣстную болѣзнь, и когда эта послѣдняя будетъ побѣждена, лихорадка пройдетъ сама собою. Если мы здѣсь говоримъ отдѣльно о двухъ видахъ лихорадки, то это потому, что при нихъ общее пораженіе кровеносной и нервной системъ часто преобладаетъ надъ мѣстнымъ недугомъ, и лихорадка представляетъ какъ бы самостоятельную болѣзнь. Рѣчь идетъ о перемежающейся и нервной (тифъ, нервная горячка) лихорадкахъ. При лѣченіи прочихъ видовъ лихорадки слѣдуетъ имѣть въ виду обуславливающія ихъ мѣстныя явленія и обращаться къ соотвѣтственнымъ главамъ. Такимъ образомъ слѣдуетъ искать:

Воспалительную лихорадку въ статьѣ о воспаленіяхъ отдѣльныхъ органовъ,

Ревматическую лихорадку въ статьѣ о ревматизмѣ,

Катарральную лих. и гриппъ въ статьѣ о кашлѣ,

Желудочную лих. въ статьѣ о болѣзняхъ желудка,

Желчную лих. въ статьѣ о недугахъ желчи,

Слизистую лих. въ статьѣ о недугахъ желудка,
о тифѣ,

Глистную лих. въ статьѣ о глистахъ,

Лихорадку съ накожною сыпью въ статьѣ о
накожныхъ болѣзняхъ,

Зубную лих. въ статьѣ о страданіи зубовъ у
дѣтей,

Изнурительную (гектическую) лих. въ статьѣ о
изнурительныхъ болѣзняхъ.

1. Перемежающаяся Лихорадка.

(Собственно такъ называемая Лихорадка.)

Febris intermittens.

Перемежающеюся лихорадкою называется такое болѣзненное состояніе, которое развивается подъ вліяніемъ болотныхъ испареній и другихъ почвенныхъ и климатическихъ условий и обнаруживается или постоянно въ извѣстной мѣстности (эндемически), или временно (эпидемически), или, что случается рѣже, въ отдѣльныхъ случаяхъ (спорадически), какъ слѣдствіе различныхъ причинъ, напр. простуды, невоздержности въ пищѣ, душевнаго потрясенія. Болѣзнь представляется рядомъ припадковъ озноба, жара и пота (т. н. лихорадочныя стадіи), которые повторяются періодически, съ большею или меньшею правильностію, такъ напр. ежедневно, черезъ каждые 3 или 4 дня, и т. п. Иногда случается двойная лихорадка (*febris duplicata*), когда припадки являются два раза въ одинъ и тотъ же день.

Между отдѣльными припадками находится свободное отъ лихорадки время, въ которое однако являются съ большей или меньшей силой другіе недуги. Лихорадку сопровождаетъ множество разнообразныхъ припадковъ; бывають напр. нервныя страданія (судороги, головная боль, удушье), приливъ крови (головокруженіе, сердцебіеніе, волненіе), въ особенности дурное пищевареніе и признаки разложенія крови, куда относится также припуханіе отдѣльныхъ органовъ, преимущественно селезенки, которое почти всегда сопровождаетъ лихорадку. Смотря по присутствію или отсутствію та-

кихъ усложняющихъ явленій и по силѣ припадковъ, различаютъ злокачественную, обыкновенную и скрытую лихорадку.

Послѣ нѣсколькихъ припадковъ, спорадическіе, не злокачественные случаи лихорадки скоро прекращаются. Въ упорныхъ случаяхъ, особенно когда причиною ея бываютъ болотныя испаренія, или при неправильныхъ дѣйствіяхъ врача или пациента, болѣзнь продолжается дольше, и наконецъ образуется всеобщая лихорадочная порча крови, которая обнаруживается припуханіемъ печени, селезенки, водяною болѣзью, малокровіемъ и сильнымъ разстройствомъ пищеваренія. Такого рода состояніе должно считаться весьма опаснымъ. Въ особенности злоупотребленіе хиню и хининомъ, если ихъ принимали слишкомъ продолжительное время или въ слишкомъ сильныхъ приѣмахъ, влечетъ за собою припуханіе селезенки и порчу крови.

При лѣченіи надобно обращать вниманіе 1) на отдѣльныя вышеупомянутыя стадіи лихорадки (которыя проявляются весьма ясно, или отсутствуютъ, или переходятъ одна въ другую), 2) на общій ходъ болѣзни, которая часто во время припадковъ обнаруживаетъ совершенно другіе симптомы, нежели въ свободное отъ лихорадки время, 3) на лежація въ основаніи ея причины, и особенно 4) на сопровождающія ее явленія. Появленіе лихорадочнаго припадка послѣ *меньшаго* противъ прошедшаго раза промежутка времени считается всегда признакомъ худшимъ, нежели появленіе его послѣ *болѣе продолжительнаго* промежутка.

При выборѣ лѣкарствъ слѣдуетъ руководствоваться означенными при нихъ симптомами.

Наиболѣе употребительныя лѣкарства суть: *Arsenicum, Bryonia, China, Ipecacuanha, Natrum muriaticum, Nux vomica.*

Arsenicum — 3. *)

При возбужденіи и одновременномъ упадкѣ *нервной и кровеносной системъ*, при *злокачественныхъ эндемическихъ и клима-*

тическихъ вліяніяхъ, особенно *болотныхъ испареній*, при *сильномъ физическомъ разстройствѣ*, особенно печени и селезенки; *когда болѣзнь длится уже долгое*

*) Цифра означаетъ нисшее дѣленіе, до котораго (поэтому и знакъ —) при выборѣ можно спускаться. Не всег-

да необходимо выбирать именно это дѣленіе; смотря по обстоятельствамъ, можно съ пользою давать дѣленія и высшія.

время, особенно послѣ злоупотребленія хиною и при всеобщемъ упадкѣ силъ, преимущественно когда есть признаки водяной и при тилостныхъ явленіяхъ. Въ частности надо обращать также вниманіе на слѣдующее: типъ лихорадки — явленіе принадлежитъ черезъ одинъ или четыре дня; лихорадочные пароксизмы продолжительны, сильны, особенно періодъ жара; свободное отъ лихорадки время возмущается припадками, о которыхъ сейчасъ будетъ сказано. Внутренній ознобъ при наружномъ жарѣ; одновременно съ ознобомъ и послѣ него сердцебиеніе; тоска, безпокойство, волненіе крови, біеніе во всѣхъ жилахъ. Стѣсненіе въ груди. Упадокъ силъ; водяная, особенно ногъ и живота; значительное припуханіе печени и селезенки; исхудалость, изъязвленіе угловъ рта, горечь во рту, тошнота, зловонный поносъ, неутоляемая жажда, чрезвычайная слабость; подобный воску или грязный цвѣтъ лица; кровотеченіе, подкожное кровоизліяніе, просовидная сыпь, расположеніе къ пролежнямъ, антоновъ огонь.

Belladonna — 2.

Когда главнымъ образомъ поражена кровеносная система, особенно при приливѣ крови къ моз-

гу и преимущественно въ періодъ жара; отсюда — головокруженіе, краснота лица, жаръ въ головѣ, бредъ, сонливость, грёзы, страхъ, сердцебиеніе. Пульсация (біеніе) шейныхъ артерій. Кромѣ того: судороги, конвульсія, стягиваніе дыхательнаго горла, сухость рта, сильная жажда. — Характеристическій признакъ: жаръ и ознобъ быстро сменяютъ другъ друга, первый преобладаетъ надъ ознобомъ и потомъ.

Bryonia — 2.

При одновременномъ пораженіи грудныхъ органовъ и органовъ пищеваженія, причемъ желчныя припадки. Ознобъ и жаръ не продолжительны, но жаръ преобладаетъ; продолжительный потъ. Сильный, сухой, удушливый кашель до или во время озноба, съ давленіемъ и колющемъ въ груди. Давленіе въ бокахъ, особенно вслѣдствіе легкой опухоли селезенки. Горькій вкусъ во рту, отрыжка, запоръ, одинъ или попеременно съ поносомъ, притомъ давленіе на голову и головокруженіе съ краснотою щекъ. — При ознобѣ сильная жажда.

Capsicum — 2.

При накопленіи слизи во рту, горлѣ, желудкѣ, кишкахъ и, слѣдовательно, при поносѣ съ слизисты-

ми и жгучими испражнениями. Лихорадка съ преобладаніемъ озноба и долгое время послѣ того являющимся потомъ безъ жара, или же съ жаромъ, предшествующимъ ознобу. Во время озноба *сильная жажда*. Тоскливость, безпокойство, безсознательное состояніе, отвращеніе къ шуму, *головная боль*. Одновременно и позже — боль въ груди и спи- нѣ, ломъ во всѣхъ членахъ.

Carbo vegetabilis—2.

При лихорадкѣ съ ознобомъ (вечеромъ и ночью), затѣмъ жаръ и потъ, *жажда только во время озноба*; притомъ *жаръ въ животъ* (біеніе въ жилахъ, краснота лица, головокруженіе, головная боль), *венозное пораженіе нижней части живота, особенно геморроидальное, стѣсненіе въ груди и ревматическое пораженіе суставовъ и костей* (ломъ въ зубахъ, суставахъ). — Холодъ въ ногахъ, чрезвычайная слабость.

China — 1. *)

Лихорадка съ упадкомъ силъ, слабостью и малокровіемъ,

*) Старая школа ошибается, давая хину противъ лихорадки во всѣхъ ея видахъ. Въмѣсто хины, можно давать дѣйствующее болѣе сильно *Chininum sulphuricum* 2. — 1. растир.; порошки до 1 грана, два раза въ день, или растворъ *Chin. sulph.* 2.—1. дѣлен., по нѣскольку капель, два два, три въ день.

при значительномъ физическомъ разстройствѣ, съ начинающимся разложениемъ соковъ; при среднемъ вліяніи болотныхъ испареній; когда селезенка пухнетъ. Притомъ отравленія кровеносной системы сильно разстраиваются, и нервная система чрезвычайно раздражена (раздраженіе спиннаго мозга, болѣзненное давленіе на маговку, особенно во время озноба), чрезвычайная слабость и въ свободное отъ лихорадки время, быстрое развитіе водяной и малокровія, разложеніе крови. Характеристическимъ признакомъ для приѣма *China* служитъ опухоль селезенки, а также печени. Пароксизмы слабы, неправильны, типа перемежчиваго; нѣкоторыя стадіи не являються или не выражаются ясно; но потъ болшею частью преобладаетъ. Жажда между ознобомъ и жаромъ или *послѣ жара, во время пота*, даже и въ свободное отъ лихорадки время. Жаръ часто является лишь долгое время послѣ озноба. *Желчные* признаки, тошнота, чрезвычайный голодъ, *желтоватый цвѣтъ кожи*. Приливъ крови (головная боль, тоска, сердцебіеніе, бессонница даже послѣ пароксизмовъ; внутренний жаръ при наружномъ холодѣ). *Водянка* (брюшная, подкожная, особенно водянка ногъ). — Усиѣль

отъ *China* я видѣть особенно въ трехдневной лихорадкѣ, и когда свободное отъ лихорадки время не было возмущаемо припадками какого-либо другаго рода.

Ferrum — 1.

Лихорадка съ *малокровіемъ, слабостью и разстройствомъ пищева- ренія*. При *примивъ крови къ мруди и голову отъ слабости* и при *разложениі крови*, особенно *водянистомъ*, преимущественно послѣ *злоупотребленія хиною*, или когда перемежающаяся лихорадка длится уже долгое время. Пароксизмы не сильны, но продолжительны, особенно потъ; типъ *измѣняется*. *Печень и селезенка припухли*. Давленіе въ желудкѣ послѣ ѣды, слабость пищева- ренія, отрыжка, рвота, сли- зистый или водянистый поносъ. Кровотеченіе, сердцебіеніе, при- ливы крови къ легкимъ и стѣс- неніе дыханія; головная боль, го- ловокруженіе; жилы вздуты; опу- холь вокругъ глазъ; слабость му- скуловъ; исхудалость, блѣдность лица, отливъ крови отъ губъ и внутренности рта; чувство холо- да и опухоль ногъ. Слабость до изнеможенія. Всеобщая во- дяная.

Ignatia — 2.

При *чисто нервной* переме- жающейся лихорадкѣ и такой,

которая произошла отъ *страха, испуга* и т. п. причинъ. *Свобод- ное отъ лихорадки время совер- шенно свободно также отъ вся- кихъ друиыхъ припадковъ*. Парок- сизмы коротки, *измѣнчивы*, не- правильны; отдѣльныя стадіи пе- реходятъ одна въ другую; въ различныхъ частяхъ тѣла одно- временно ознобъ и жаръ, часто замѣтные только для больного, но недоступные для наблюдений. *Жажда во время озноба*; ознобъ уничтожается отъ наружной теп- лоты. Цвѣтъ лица *перемѣнчивъ*; *миренъ*. Тяжесть въ желудкѣ и другіе истерическіе припадки; чрезвычайная слабость, сонли- вость.

Trescasuanha — 2.

Въ *легкихъ спорадическихъ слу- чаяхъ, или при недавно возник- шей лихорадкѣ*. Когда *нѣтъ зна- чительнаго разстройства дыха- тельныхъ и особенно пищева- рительныхъ органовъ*; припадки *весь- ма чувствительны для самого больного и мало замѣтны для по- стороннихъ*. Пароксизмы не силь- ны, отдѣльныя стадіи *перемѣн- чивы*, нерѣдко касаются только отдѣльныхъ частей тѣла, пере- ходятъ одна въ другую. Ознобъ преобладаетъ; жажда во время жара. Отъ *вышней теплоты оз- нобъ усиливается*. До или во

время озноба языкъ нечистъ, тяжесть въ желудкѣ, тошнота, рвота, поносъ. — Одышка, давленіе и стѣсненіе въ груди, судорожный кашель. Головная боль, происходящая отъ разстройства желудка. Въ свободное отъ лихорадки время эти симптомы слабы, но не исчезаютъ вполне. Это средство полезно особенно лицамъ молодымъ, раздражительнымъ. — Въ лихорадкѣ, произошедшей отъ невоздержности въ пищѣ.

Natrum muriaticum — 2.

При продолжительной лихорадкѣ съ (не слишкомъ сильнымъ) разстройствомъ, особенно органовъ пищеваренія. Во время озноба: зѣвота, одышка, сонливость; во время жара: головная боль; въ тотъ и другой періодъ: жажда. Кромѣ того: горечь во рту, сухость языка, отсутствие аппетита, тяжесть въ желудкѣ, усиливающаяся отъ прикосновенія; характеристическій признакъ: боль подъ ложечкой и желтый, земляной цвѣтъ лица; изъязвленіе угловъ рта. Боли въ костяхъ, спинѣ. — Чрезвычайная слабость.

Nux vomica — 2.

Лихорадка, исходной точкой которой служатъ нервы спинного мозга или система нервныхъ узловъ, а потому главнымъ при-

знакомъ является боль въ спинѣ и верхней части живота (подъ ложечкой, въ желудкѣ, въ печени); болѣе сильное разстройство (нежели при *Irisac.*) органовъ пищеваренія, часто съ венознымъ отпѣнкомъ; поражены особенно: желудокъ, кишечный каналъ, печень, которые и въ свободное отъ лихорадки время являютъ признаки сильного разстройства. Притомъ отсутствіе аппетита, отвращеніе къ пищѣ, тошнота, горькій и кислый вкусъ, желчные припадки, желтоватый цвѣтъ лица, желтуха, запоръ, вѣтры, и въ связи съ этими симптомами — разстройство органовъ пищеваренія, истощеніе и упадокъ силъ. — Пученіе, опухоль, затвердѣлость органовъ нижней части живота. Въ связи съ недугами нижней части живота, полнокровіемъ, геморроидальнымъ состояніемъ или пораженіемъ позвоночнаго столба, *зетуца* головная боль, *головокруженіе* и проч. Съ другой стороны, являющееся особенно во время лихорадочнаго припадка, *пораженіе спинного мозга*: подергиваніе, столбнякъ, дрожаніе, боль въ поясницѣ, чувствительность спинныхъ позвонковъ при давленіи, чувство онѣмѣнія въ членахъ. Изъ припадковъ преобладаетъ ознобъ. Лѣкарство это особенно полезно лицамъ

зрѣлаго возраста, мужскаго пола и холерическаго темперамента.

Pulsatilla — 2.

Полезно отъ перемежающейся лихорадки съ *хлоротическимъ состояніемъ крови* *) и *соответствующимъ ему разстройствомъ питанія*; также при *слабости нервовъ, соединенной съ раздражительностью*, особенно при *разстройствѣ пищеваженія и остановкѣ менструацій*, а слѣд. полезно преимущественно *женщинамъ*. При лихорадкѣ, наступающей въ вечернее и ночное время. Когда ознобъ, замѣтный болѣе субъективно (для больного), нежели объективно (для постороннихъ), преобладаетъ, или когда жаръ является среди озноба; всѣ принадки умѣренны. Во время жара жажды иногда нѣтъ. Моча обильна и водяниста. Легкій ознобъ и въ свободное отъ лихорадки время. Кромѣ того — волненіе, сердцебиеніе, головокруженіе, головная боль, болѣе перваго, нежели конгестивнаго (зависящаго отъ прилива крови) характера. Стѣсненіе въ груди, обильный мокротою кашель. Всякаго рода разстройства желудка, преимущественно поносъ, нечистый языкъ, отсутствіе аппетита. — На это дѣкарство указываетъ

*) Хлорозъ — дѣвичья немочь.

также меланхолическое, слезливое настроеніе.

Rhus — 2.

При лихорадкѣ, явившейся отъ простуды, особенно вслѣдствіе *мокроты*, или сопровождаемой *сильнымъ упадкомъ нервной системы и истощеніемъ*, при *раздраженіи спиннаго мозга или разстройствѣ пищеваженія*; особенно въ послѣднемъ случаѣ поражены бываютъ *слизистыя оболочки*. Отсюда катарры и сухой насморкъ, ломъ въ головѣ, желудочные недуги, дурное питаніе, жажда; боль въ членахъ и спинѣ, судороги, бессонница, зудъ и чувство онемѣнія въ оконечностяхъ, слабость. Также въ тѣхъ случаяхъ, когда бываетъ крапивная сыпь.

Veratrum — 1.

Лихорадка съ *упадкомъ силъ, какъ при холерѣ* и т. п. признаками, слабый пульсъ, сердцебиеніе, обморокъ съ *предшествующимъ, субъективно и объективно замѣтнымъ ознобомъ, холоднымъ потомъ, водянистой рвотой и поносомъ*; чрезвычайно блѣдный и синій цвѣтъ лица, бредъ, судороги. Жажда во время озноба. — Большая часть этихъ принадлежковъ продолжается и въ свободное отъ

лихорадки время. Удобно, какъ видно изъ предъидущаго, только въ случаяхъ злокачественной перемежающейся лихорадки.

Примѣчаніе. Если отдѣльные симптомы болѣзни, какъ то—судороги, пораженіе груди, преобладаютъ надъ всѣми другими, то слѣдуетъ дѣйствовать специально противъ нихъ (сличить соответственныя статьи). Отлично дѣйствуетъ также **Tart. emet.** (3—2 разжиженіе или растираніе), но нѣсколько капель или 1 грану (щепоткѣ) 2 — 3 раза въ день, при симптомахъ, подобныхъ обозначеннымъ при *Iressac.*, но съ большимъ разстройствомъ желудка, сильною головою болью, а также сонливостью. Иногда отъ этого средства лихорадка проходитъ чрезвычайно быстро.

Если отъ злоупотребленія хиною (сильныя пріемы, продолжительное и неправильное употребленіе) или отъ другихъ причинъ перемежающаяся лихорадка затянулась, обнаруживается изнуреніе, то надежнымъ средствомъ противъ нея могутъ служить: **Arsenicum** (сравни. выше), если замѣтно извѣстное лихорадочное возбужденіе, и **Ferrum** (срав. выше симптомы), если преобладаетъ малокровіе, и соки становятся водянисты.

Изъ новыхъ средствъ, относящихся сюда, рекомендуютъ слѣдующія: **Cactus grandiflorus:** припадки передъ обѣдомъ или ночью, ознобъ, затѣмъ жаръ, головная боль, ошеломленность, кома (спячка), нечувствительность, жажда, одышка, невозможность лежачаго положенія, обильный потъ. Свободное отъ лихорадки время вполне чисто. **Eupatorium perfoliatum:** припадки на третій день, неопредѣленность промежуточнаго времени; ознобъ начинается въ спячѣ. Сильная дрожь при незначительномъ холодѣ. Жажда во время озноба и жара, сильная боль въ костяхъ.

Кромѣ того: *Cornus circinata*, *Cornus florida*, *Leptandria virginica*, *Podophyllum peltatum*, *Veratrum viride* — съ не вполне опредѣленными признаками.

2. Тифъ.

(Нервная горячка.)

Febris nervosa. Typhus.

Прежде подъ этимъ именемъ разумѣли многія болѣзни катаральнаго, желудочнаго, ревматическаго или воспалительнаго харак-

тера, которыя, усиливаясь, поражали нервную систему. Но новѣйшая медицинская школа показала, что всѣ прежнія такъ называемыя нервныя, нервно-гастрическія, нервно-катарральныя, нервно-ревматическія лихорадки, а также и слизистая, гнилая, лазаретная, изнурительная нервная лихорадка принадлежатъ къ одному и тому же типу, который называется тифомъ (собственно: «состояніе одурѣнія») или нервною горячкой, сущность которой, повидимому, состоитъ въ порчѣ крови, которая обнаруживается то въ мозгу (мозговой тифъ), то въ легкихъ (легочный тифъ), но чаще всего въ нижней части живота (брюшной тифъ), и отсюда уже распространяется на мозгъ и на легкія.

Причинами тифа бываютъ: простуда, несоблюденіе діеты, душевныя потрясенія, чрезмѣрное напряженіе умственныхъ и физическихъ силъ, истощеніе отъ голода, потери крови, кормленія грудью, слабительныхъ средствъ, злоупотребленіе лѣкарствами, тѣснота помѣщенія (когда помѣщается много людей въ одной комнатѣ), заразительный воздухъ въ отхожихъ мѣстахъ, извѣстныя эпидемическія и атмосферныя вліянія и т. д.

Уже заранѣе болѣзнь даетъ о себѣ знать чувствомъ озноба, утомленіемъ, отсутствіемъ аппетита, разстройствомъ желудка, поносомъ, дурнымъ расположеніемъ духа. Начало тифа является въ самыхъ различныхъ формахъ, такъ что сразу трудно бываетъ опредѣлить родъ болѣзни. Обыкновенно тифъ является въ формѣ катаральной, ревматической, гастрической (желудочной), желчной, воспалительной лихорадки. Продолжительная бессонница или сновидѣнія, разныя картины предъ глазами, притомъ чрезвычайная слабость и раздраженіе, все это уже можетъ служить доказательствомъ пораженія нервной системы. Такое состояніе продолжается дней восемь. Затѣмъ являются симптомы болѣе глубокаго пораженія кровеносной системы: лихорадка съ жаромъ, жаръ въ кожѣ; сыпь, преимущественно на груди и животѣ (напр. краснуха, желваки, просовидная сыпь), кровавыя пятна; кровотеченіе ртомъ, носомъ, заднимъ проходомъ, изъ легкихъ, кровохарканіе, пульсъ болѣе 100 ударовъ, часто ударяетъ быстро одинъ за другимъ два раза, задержаніе мочи или слабое выдѣленіе мочи, температура болѣе 37° по Цельсію. Слизистыя оболочки бываютъ поражены, являются катарры носа (насморкъ) и легкихъ (кашель), а также кишекъ (по-

ность), и въ кишкахъ накопляется тифозная масса въ видѣ нарывовъ, которые гноятся и съ своей стороны еще болѣе отравляютъ кровь. Поносъ въ такомъ случаѣ продолжается до тѣхъ поръ, пока ни заживутъ эти нарывы. Часто также бываетъ при этомъ продолжительный запоръ. У отверстій рта и носа образуются черные струнья; ротъ и зубы принимаютъ темнокрасавый цвѣтъ, или является въ полости рта молочница. Языкъ, сначала бѣлый, желтоватый или чистый болѣе обыкновеннаго, становится краснымъ, затѣмъ чернымъ, трескается, какъ бы покрывается корой. Часто также бываютъ поражены мочевые и половые органы и слуховой проходъ. Далѣе тифозная масса отлагается въ селезенкѣ, которая опухаетъ (весьма характеристическій признакъ тифа), въ легкихъ (воспаленіе), въ почкахъ и т. д. У больныхъ легко образуются пролежни и является антоновъ огонь на поясницѣ и бедреной кости. Само собою разумѣется, что нервная система должна потерпѣть отъ послѣдствій пораженія крови. Вслѣдствіе этого мозгъ находится въ состояніи опьяненія,—головная боль, бессонница, безпокойство, возбужденное состояніе, головокруженіе, тонкость слуха или крѣпость на ухо, обманъ чувствъ, видѣнія, бредъ или безпамятство, состояніе забытья, плохая память, дремота, тупое выраженіе лица, неподвижный взглядъ. Больные не чувствуютъ никакой боли, на вопросъ, какъ себя чувствуютъ, отвѣчаютъ, что здоровы; наконецъ они теряютъ сознаніе, мечутся по постели, мочатся и испражняются непроизвольно, бормочатъ, не могутъ высунуть языка, хватаютъ въ воздухѣ руками какіе-то хлопья, дрожатъ и даже впадаютъ въ судороги, бѣшенство и т. д. Дѣти жестикулируютъ, какъ автоматы или тупоумные, испускаютъ дикіе звуки и т. п.

Ходъ тифа медленъ. Исцѣленіе не совершается ранѣе 3-хъ недѣль. Болѣзнь обыкновенно усиливается до 3-ей недѣли, на 21-й день часто достигаетъ высшаго развитія и въ большинствѣ среднихъ и опасныхъ случаевъ снадаетъ лишь на четвертой недѣлѣ; всѣ признаки ослабѣваютъ такъ же медленно, какъ они усиливались. Обыкновенно выздоравливаніе тянется до 6-ой недѣли и долѣе, и многіе припадки продолжаются еще въ это время. Крѣпость на ухо и запоръ служатъ болѣе благопріятными признаками, нежели противоположныя явленія. Слѣдуетъ обращать особенное вниманіе на незамѣтно развивающееся воспаленіе легкихъ, о существо-

ваніи котораго часто можно узнать лишь посредствомъ стетоскопа (черезъ выслушиваніе). 17-й, 21-й и 28-й дни бываютъ часто рѣшительными. Кризисы часто вовсе незамѣтны, однако проявляющійся позднѣе потъ служить признакомъ выздоравливанія. — Нерѣдко по излѣченіи тифа являются другія страданія.

Гомеопатическое лѣченіе этой болѣзни особенно хорошо удается. Болѣзнь является въ болѣе мягкой формѣ и течетъ быстро, въ особенности же ускоряется выздоравливаніе, потому что лѣченіе это берегаетъ силы больного. Аллопатическое лѣченіе много вредило здѣсь чрезъ возбуждающія средства и ослабляющій методъ лѣченія. Въ последнее время несообразность этого образа дѣйствій, а также высокая температура (болѣе 33° по Реомюру [R] и 41° по Цельсію [C]), какъ оказывается при измѣреніи теплоты тѣла, привели опять къ лѣченію холодной водой (ванны), которое было въ употребленіи уже въ прошломъ столѣтіи. Метода эта оказалась цѣлесообразной и ее можно соединить съ гомеопатическимъ лѣченіемъ, хотя послѣдняго въ большинствѣ случаевъ одного бываетъ достаточно.

Пища должна быть въ высшей степени проста и освѣжающа. Опрятность и свѣжій воздухъ существенно необходимы. Всего болѣе слѣдуетъ опасаться преждевременнаго употребленія питательной и трудноваримой пищи, а также чрезмѣрнаго употребленія пищи вообще, потому что тонкія стѣнки кишекъ, которыя были покрыты нарывами, легко могутъ лопнуть и повлечь за собой внезапную смерть. Покраснѣвшія отъ лежанія мѣста, пока кожа еще не лопнула, слѣдуетъ мазать *коллодіумомъ*, смачивать *лимоннымъ сокомъ* и, еще лучше, *артикой*; если они мокнуть, то прикладывать *цинковую мазь*; при отдѣленіи гноя — *перувианскій бальзамъ* на корнѣи. Антоновъ огонь долженъ быть устраненъ внутренними средствами.

Изъ относящихся сюда средствъ слѣдуетъ прежде всего обратить вниманіе на тѣ, которыя соотвѣтствуютъ **общему характеру болѣзни** и которыя, слѣдовательно, приходится давать въ продолженіе извѣстнаго періода, съ небольшими лишь перерывами, до тѣхъ поръ, пока признаки болѣзни указываютъ на это средство. Вообще тутъ слѣдуетъ держаться того (главную роль играютъ-все таки особенности каждаго случая), что **Врюнія** или **Belladonna** слѣдуетъ давать на первыхъ дняхъ и въ болѣе легкихъ случаяхъ, и не слѣдуетъ слишкомъ скоро бросать эти средства. Нѣсколько поз-

же и въ болѣе опасныхъ случаяхъ слѣдуетъ обратиться къ **Rhus**, **Acidum muriaticum** или **Acid. phosphoricum**. **Arsenicum**, **Carbo** и **Phosphor** даются, когда болѣзнь достигла высшей степени развитія. Выбирать лѣкарства по слѣдующимъ признакамъ:

Arsenicum — 3.

Полезно въ *тяжкихъ случаяхъ*, и когда болѣзнь развилась довольно сильно, главное средство при *брюшномъ тифѣ* съ образованіемъ нарывовъ, исхудалостью, разложеніемъ крови, при продолжительномъ возбужденіи. *Чрезвычайная слабость, безпокойство, тоска*; сильный, *жгучій жаръ* въ кожѣ, красныя или желтыя, землянаго цвѣта щеки, *неутолимая жажда*; пульсъ быстрый, летучій; сильный бредъ, сначала живой, потомъ переходящій въ бормотанье, состояніе одурѣнія, прерываемое время отъ времени вскакиваніемъ. Хватаніе въ воздухѣ хлопьевъ, страхъ, подергиваніе, безмятество; больные не жалуются ни на какую боль; глухая боль въ правой сторонѣ нижней части живота, *поносъ* съ вонючими, водянистыми, *кровавыми*, разѣдающими испражненіями, сопровождаемый пученіемъ живота; непроизвольное истеченіе или задержаніе мочи; языкъ красный, бурый, сухой, растрескавшійся и, подобно губамъ, *черный какъ сажа*; большой бормочетъ, такъ что трудно понять

его; глаза вытаращены; метанье въ постели. Въ легкихъ слизистое хрипѣніе, свистъ. *Чрезвычайная исхудалость*. Признаки *разложенія крови*, какъ то: сыпи, подкожное кровоизліаніе, сильное истеченіе водянистой, темной крови изъ всѣхъ отверстій тѣла. Антоновъ огонь вслѣдствіе пролежней.

Bryonia — 2.

Соотвѣтствуетъ особенно началу болѣзни и болѣе легкимъ *гастрическимъ или желчнымъ формамъ* ея, съ возбужденіемъ, особенно *легочному* (грудному) и *брюшному* тифу, когда бываетъ ознобъ попеременно съ жаромъ, лицо красно, потъ или сухость кожи, кожа горяча, жажда; губы и языкъ желтоваты, потомъ красны, сухи, буры; тошнота, отвращеніе къ пищѣ, рвота слизью, желчью; давленіе въ желудкѣ, запоръ или поносъ съ желтоватыми испражненіями, пученіе живота; моча буро-красная, желтая; *тяжкое дыханіе, колотье при глубокомъ дыханіи* (легочный тифъ), *сильное безпокойство, бессонница*. Бредъ съ разными образами *передъ глазами*, хватаніе хлопьевъ, *давящая головная боль*.

Carbo vegetabilis — 2.

Прилично въ тѣхъ случаяхъ, какъ и *Arsen.*, когда болѣзнь *подвинулась уже впередъ*, только здѣсь при разложеніи крови преобладаетъ *упадокъ* дѣятельности организма, а тамъ (при *Ars.*) — раздраженіе. *Лихорадка, при небольшомъ, слабомъ, тихомъ или чрезвычайно быстромъ пульсѣ и крайней слабости* — характеристична, особенно, если *кожа холодна, покрыта клейкимъ потомъ, цвѣтъ лица синеватый, подкожное кровоизліяніе, кровотечение, пролежни и антоновъ огонь; дремота и одурѣніе, сопровождаемыя хрипѣніемъ, кровохарканіемъ, блѣдностью лица; неподвижность зрачковъ, ротъ открытъ, метанье въ постели; непроизвольное испражненіе, стѣсненіе дыханія; кровавыя, гниlostныя, жидкія испражненія, при вздутости живота, вѣтрахъ, безпамятствѣ и нечувствительности; въ общемъ — картина крайней тупости и ужасанія жизни, вслѣдствіе разложенія крови или тленія.*

Muriaticum acidum — 2.

Признаки тѣ же, какъ и при *Carbo veget.*, но въ *болѣе легкихъ случаяхъ*, когда возбужденіе преобладаетъ или по крайней мѣрѣ

чередуется съ безчувственностью. Сильный бредъ *при большомъ жарѣ*, слабость памяти, метанье въ постели; больной хочетъ выпрыгнуть изъ кровати, хватается хлопья, мечется какъ помѣшанный, говоритъ много и стремительно; языкъ бурый, красный, черный, *выговоръ нечистъ; кровавый поносъ съ невольнымъ испражненіемъ, вообще — признаки разложенія крови и тленія*, какъ то: сыни, антоновъ огонь, вслѣдствіе пролежней.

Phosphoricum acidum — 2.

Представляетъ картину, какъ разъ противоположную предъидущему средству; послѣднее употребляется при возбужденіи, а это — при *исчезающей энергіи отправленій организма и притупленіи нервной системы*. Медленный переходъ отъ періода *катарального* къ собственно тифозному, съ *отяжеленіемъ головы, позднѣе сонливостью, глухимъ выраженіемъ лица, бормотаньемъ въ бреду, слабостью памяти, крѣпостью на ухо, апатіей; кожа вялая, клейкая, влажная; крапивная сыть, подкожное изліяніе крови, антоновъ огонь. Языкъ влажный, блѣдный; непроизвольныя, жидкія, кровавыя испражненія. Припуханіе селезенки. Вообще полезно при тифѣ послѣ*

продолжительной скорби, заботъ, продолжительной хлосты, при гастрическихъ (желудочныхъ) симптомахъ, когда больной отличается тупостью, симптомы же матеріальнаго разстройства меньше рѣшительныя.

Rhus toxicodendron — 2.

Соотвѣтствуетъ формамъ болѣзни при *Arsen.*, но безъ несомнѣнныхъ признаковъ глубокаго разложенія крови; составляетъ какъ бы переходъ отъ *Bryonia* къ *Arsen.* Сначала лихорадка съ ознобомъ и жаромъ; приливъ крови къ головѣ, глаза налиты кровью, пульсъ полный, частое безпокойство, незначительное кровотеченіе, подкожное изліяніе крови. Въ особенности—чрезвычайное раздраженіе нервной системы съ чрезвычайною слабостью,

вслѣдствіе чего болтливый бредъ, чрезвычайная воспріимчивость чувствъ. Позднѣе наступаютъ: усталость, одурѣніе, бормотанье, крѣпость на ухо, безпамятство; по временамъ полное сознаніе, полузабытѣе, бессонница, страшныя грѣзы.—*Накожная сыпь*, просовидная сыпь, пятна, вслѣдствіе сильнаго страха и стѣсненія въ груди. Языкъ дрожитъ, красенъ, буръ, сухъ, черенъ; губы также; отсутствіе аппетита, отвращеніе къ пищѣ, рвота, цученіе живота отъ накопленія воздуха; запоръ или поносъ съ водянистыми зелено-бурыми, клочковато-бѣлыми, непроизвольными испраженіями; *катарръ* и воспаленіе дыхательныхъ путей, съ шумомъ, кровохарканіемъ, припуханіемъ селезенки. Моча слизиста, клочковата, мутна, подобна сывороткѣ, темна. Клейкій потъ.

Примѣчаніе. Кромѣ этихъ средствъ, которыхъ совершенно достаточно при вѣрномъ выборѣ и употребленіи, можно назвать еще нѣкоторыя, соотвѣтствующія болѣзни въ ея главныхъ проявленіяхъ, а именно:

Belladonna: при мозговомъ тифѣ, приливѣ крови къ головѣ, бѣшеномъ бредѣ, свѣтобоязни, расширеніи зрачковъ, краснотѣ языка, жаждѣ и проч.

China: если преобладаютъ *гастрическіе* симптомы, поносъ съ водянистыми, желтоватыми испраженіями и медленнымъ ходомъ, исхуданіе, слабость и медленное выздоравливаніе.

Kreosot: преимущественно противъ такъ называемой *тилой лихорадки*, съ подкожнымъ изліяніемъ крови, кровавыми пят-

нами, кровотеченіемъ, особенно изъ задняго прохода, и чрезвычайной слабостью.

Nitri acidum: подобно *Muriat. acid.*, при сильной чувствительности живота къ давленію (происходящей отъ кишечныхъ нарывовъ) съ щемящей, колющей болью въ прямой кишкѣ, поносомъ съ зеленоватыми, слизистыми испражнениями, затрудненіемъ при мочеиспусканіи.

Phosphor.: при чрезвычайномъ упадкѣ силъ съ жаромъ, приливомъ крови, слабымъ пульсомъ, головокруженіемъ, одурѣніемъ, тяжкимъ дыханіемъ, пораженіемъ легкихъ и кишекъ, особенно при легочномъ тифѣ и угрожающемъ параличѣ легкихъ.

Veratrum: въ случаяхъ, подобныхъ холерѣ и тогда преимущественно, когда тифъ развивается изъ холеры.

Въ отдѣльныхъ случаяхъ необходимо бываетъ имѣть въ виду промежуточные явленія переходнаго состоянія, особенно, если они обнаруживаются весьма сильно. Для этого рекомендуемъ:

а) при пораженіи мозга, когда бредъ съ упадкомъ силъ клейкая и холодная кожа, при жарѣ въ головѣ, расслабляющемъ потѣ — *Camphora*;

при бшеніемъ бредъ съ видѣніями, возбужденіемъ нервовъ, съ бессонницею или тупостью, при жарѣ въ головѣ, блескѣ глазъ и проч. — *Hyoscyamus*;

когда угрожаетъ параличъ мозга, при конвульсіяхъ — *Moschus*, а когда лихорадка съ преобладающими ненормальными явленіями дѣйствуетъ преимущественно въ области нервовъ — *Cocculus*;

при бредъ съ метаніемъ и извѣстныхъ странныхъ жестахъ и выходкахъ (какъ напр. пѣніи, танцахъ), хватаніи хлопьевъ въ воздухѣ, экзальтации — *Stramonium*;

когда угрожаетъ параличъ мозга, вслѣдствіе изнуренія нервной системы, при сонливости, безпамятствѣ, расширеніи зрачковъ, холодныхъ оконечностяхъ, какъ весьма важное средство — *Zincum*;

б) при пораженіи легкихъ, когда угрожаетъ параличъ, при хрипѣхъ въ груди, такъ что больной не можетъ свободно дышать, и при сонливости — *Tartarus emeticus*.

в) при поражении нижней части живота, съ воспалительными болями въ правой сторонѣ ея, въ первомъ периодѣ образования нарывовъ, при боли въ животѣ, поносѣ съ зеленоватыми и кровавыми испражнениями, сильной лихорадкѣ, приливѣ крови, потѣ безъ облегченія — *Mercur. solub.*

е) при поражении спиннаго мозга, стѣсненія дыханія съ истерическими судорогами и ознобомъ (передъ высыпаніемъ просовидной сыпи) — *Platina*;

и, наконецъ,

въ случаѣ судорогъ, доходящихъ до конвульсій, при трудномъ дыханіи, сильномъ возбужденіи, также при бѣлой просовидной сыпи, весьма полезно — *Valeriana*.

Новыя средства: **Baptisia tinctoria** — въ случаяхъ одурѣнія, какъ *Acid. phosphoricum*, тупая головная боль, бредъ, буро-красный языкъ, воюнчія испражнения, чрезвычайная слабость. Нарывы. Днемъ ознобъ, ночью жаръ.

Podophyllum pelt. — при осложненіи желчными признаками. Имѣя предъ собою упомянутыя выше старыя лѣкарства съ точно опредѣленными признаками, во всѣхъ почти случаяхъ можно обойтись безъ новыхъ, признаки которыхъ еще не установлены; таковы: *Dioscorea villosa*, *Iris versicolor*, *Leptandria*, *Veratr. vir.*

Неправильно даютъ самостоятельное значеніе лихорадкамъ родильной и молочной, потому что онѣ зависятъ отъ мѣстныхъ недуговъ, но такъ какъ эти названія въ большемъ ходу, мы также скажемъ здѣсь отдѣльно объ этихъ болѣзняхъ.

3. Родильная лихорадка.

Febris puerperalis.

Родильная лихорадка есть до того опасная болѣзнь, что лѣчить ее безъ помощи врача можно лишь въ рѣдкихъ случаяхъ, — развѣ только по необходимости или въ самомъ началѣ болѣзни. Мы говоримъ здѣсь о ней единственно съ той цѣлю, чтобы обратить вниманіе на ее важность и присовѣтовать противъ нея быстрыя мѣры. Настоящей причиною родильной лихорадки въ боль-

шей части случаевъ бываетъ воспаленіе и нарываніе матки или ея покрововъ, или маточнаго рукава, или наружныхъ половыхъ частей; къ этому иногда присоединяется воспаленіе грудныхъ желѣзъ. Причиною бываетъ также воспаленіе венъ, особенно бедренныхъ или брюшныхъ (такъ наз. бедреная опухоль). Опасность происходитъ отъ быстро развивающагося выпота, который отравляетъ кровь, (вслѣдствіе чего весьма скоро возникаютъ тѣ же явленія, какъ въ тифѣ, и жизнь подвергается опасности), а также отъ угрожающаго маткѣ антонова огня. Болѣзнь опредѣляется ознобомъ съ дрожью, ускореніемъ пульса, симптомами тифа (см. предъидущую статью), особенно головою болью, лихорадочнымъ безпокойствомъ, бессонницей, упадкомъ силъ, просовидной сыпью, признаками воспаленія въ груди и нижней части живота, особенной чувствительностью нижней части живота къ давленію, поносомъ, рвотою, причиняющею сильную боль, опухолью вдоль ляжки, отдѣленіемъ гнойной, зловонной жидкости изъ влагалища и остановкою отдѣленія молока или послѣродоваго очищенія, и проч. Поводами къ этой болѣзни бываютъ простуда, невоздержность въ пищѣ, испугъ и другія душевныя потрясенія, а также худосочіе, раны, разрывы, недостаточное сокращеніе матки вслѣдствіе слабости, вообще слабое тѣлосложеніе, часто также чрезмѣрная теплота въ комнатѣ родильницы и искусственнымъ образомъ вызванный потъ, нездоровый или даже заразительный воздухъ и миазмы въ помѣщеніи, особенно напр. въ больницахъ, — словомъ все, что можетъ помѣшать правильнымъ послѣродовымъ отправлениямъ, почему родильницѣ надобно быть особенно осторожною съ 3 по 10 день послѣ родовъ. Какъ скоро наступитъ ознобъ и лихорадочныя явленія, слѣдуетъ дать **Aconit.**; когда покажутся признаки воспаленія нижней части живота и приливъ крови къ головѣ — **Belladonna**; если преобладаетъ нервное безпокойство — **Bryonia**; если покажутся гной или нарывы на половыхъ органахъ — **Mercur. sol.** Лѣкарство слѣдуетъ давать часто (черезъ два часа) и въ сильныхъ приѣмахъ (2 дѣл., по 2—3 капли или по 1 грану). Если нервные и гнилостные симптомы усиливаются, то приличны охарактеризованныя въ статьѣ о тифѣ средства, особенно **Rhus, Arsen., Phosphor. acid.** и **Phosphor.**; при антоновомъ огнѣ, гноѣ, конвульсіяхъ и общемъ разстройствѣ — **Secale.** Нужна впрочемъ особенная смѣлость для

того, чтобы въ такомъ случаѣ рѣшится на лѣчение безъ помощи врача. Вслѣдствіе частыхъ злоупотребленій замѣтимъ, что чрезмѣрное употребленіе горячащихъ напитковъ (чая изъ липоваго цвѣта, бузины) или слабительныхъ средствъ, преждевременное употребленіе кофе, бульона и питательной пищи, тѣсное, душное помѣщеніе, нерѣдко способствуютъ зарожденію этой опасной болѣзни.

Новыя средства. При воспаленіи брюшной перепонки — *Podoph.*, *Veratr. vir.* (?). При конвульсіяхъ — *Gelsem.*, *Ver. vir.* При маниі — *Cimicifuga racemosa*, *Ver. vir.*

4. Молочная лихорадка,

Febris lactica.

При появленіи молока (обыкновенно на третій день послѣ родовъ) показывается лихорадка съ чувствомъ жара въ головѣ, бѣніемъ жилъ, безпокойствомъ. Тутъ помогаетъ **Belladonna 3.** (черезъ 2—3 часа по приему).

Если при отнятіи ребенка отъ груди, вслѣдствіе садненія, возникаетъ лихорадочное состояніе съ приливомъ крови, то и здѣсь лучшимъ средствомъ служить **Bellad.** Если же преобладаетъ мѣстное пораженіе грудной желѣзы, какъ-то: напряженіе, давленіе и колотье въ ней, гастрическіе припадки, — слѣдуетъ предпочесть **Bryon. 3.** (каждые 2 часа), а если воспаленіе груди достигаетъ высокой степени, такъ что можно опасаться нагноенія, то **Merc. sol. 3.** (каждые 3—4 часа).

Если лихорадка есть слѣдствіе ранъ, трещинъ кожи, ссадинъ на груди, то и здѣсь лучшимъ средствомъ служить *Aconitum* или *Arnica 2.* Въ другихъ случаяхъ надобно принять въ соображеніе средства, означенныя при воспаленіи грудныхъ желѣзъ (см. ниже объ этой болѣзни) и при накожныхъ сыпяхъ (сравни: трещины кожи). Достаточно бываетъ часто одного наружнаго употребленія *Arnica*; но если есть нагноеніе, то это средство не годится.

Скудная пища (жидкіе супы), покой, подвязываніе грудей и натираніе ихъ прованскимъ или миндальнымъ масломъ, а также прикладываніе свѣжаго, несоленаго коровьяго масла, бѣлаго спуска, а сверху ваты, — все это умѣряетъ боль въ припухшихъ (послѣ отня-

тія младенца) грудяхъ и способствуетъ уменьшенію молока. Слабительныя средства излишни. Приготовленію молока способствуютъ будто *Agnus castus* и *Pulsatilla*. Истеченію молока не во время препятствуетъ *Calc. carb.*

Б. БОЛѢЗНЕННОЕ СОСТОЯНІЕ КРОВИ ОТНОСИТЕЛЬНО КОЛИЧЕСТВА.

5. Приливъ крови, волненіе, чувство жара.

Congestiones.

И въ здоровомъ состояніи, при дѣятельности отдѣльныхъ органовъ, имѣеть мѣсто соотвѣтственный приливъ крови. Такъ напр. кровь приливаетъ къ желудку во время пищеваренія, къ мускуламъ во время движенія, къ мозгу при продолжительныхъ умственныхъ занятіяхъ, къ легкимъ при усиленномъ разговорѣ, движеніи и т. д. Но когда рѣчь идетъ о болѣзни, то подъ «приливомъ» разумѣется ненормальное распредѣленіе и застой крови въ тонкихъ сосудахъ отдѣльныхъ частей тѣла, что, если явленія эти продолжительны, можетъ легко повлечь за собой засореніе и припуханіе этихъ частей, также воспаленіе съ его послѣдствіями или же кровотечеше и водянистый выпоть. Причина этого прилива крови — или въ состояніи самой крови, или въ нервной системѣ, или приливъ происходитъ отъ болѣзненного состоянія извѣстныхъ органовъ, какъ напр. сердца, легкихъ, печени или даже тканей, когда послѣднія выды или расширены. Различаютъ: механическіе приливы, когда причиною бываетъ виѣшнее или внутреннее давленіе; активныя, которые сопровождаются усиленною дѣятельностью кровеносной системы, съ жаромъ, возбужденіемъ, биеніемъ, болью и пораженіемъ жилъ, разносящихъ красную кровь (артерій), и пассивныя, сопровождаемыя ослабленіемъ дѣятельности кровеносной системы, неправильнымъ составомъ крови, малокровіемъ, преобладаніемъ въ крови водяныхъ частицъ, съ характеромъ разстройства и слабости, пораженія темныхъ жилъ (венъ), уносящихъ кровь обратно къ сердцу. Лѣченіе естественно должно соображаться съ этими

обстоятельствами, а также съ тѣмъ, какіе именно поражены органы. Поэтому мы просимъ читателя обратиться къ отдѣльнымъ статьямъ, въ которыхъ обращено вниманіе на всѣ эти обстоятельства. Такъ напр. о приливѣ къ сердцу см. болѣзни сердца; — къ головѣ, см. головокруженіе, ударъ, головная боль; — къ слуховымъ органамъ, см. шумъ въ ушахъ; — къ спинѣ, см. боли въ спинѣ и т. д. Многое, относящееся сюда, можно также найти въ слѣдующихъ 6, 7, 8, и 9 статьяхъ.

6. Полнокровіе,

Plethora venosa, venositas.

Объ этомъ болѣзненномъ состояніи мы скажемъ здѣсь отдѣльно, потому что оно обусловливаетъ другія страданія и имѣетъ самостоятельный характеръ. При этомъ состояніи всегда сравнительно велика масса уже отслужившей свою службу крови, въ которой еще много кровяныхъ шариковъ, бѣлковины, угольной кислоты, и которая вслѣдствіе этого отличается болѣе качествами темной, венозной крови, нежели красной, артеріальной. Отсюда названіе — венозность крови. Полнокровіе иногда бываетъ преходящимъ, иногда же хроническимъ и присоединяется ко многимъ болѣзнямъ крови, а преимущественно къ недугамъ нижней части живота и страданіямъ сердца. Полнокровіе иногда бываетъ унаслѣдованное, иногда же происходитъ отъ невоздержности, сидячаго образа жизни, чрезмѣрнаго умственнаго напряженія, недостатка въ движеніи и отъ запора. Признаками полнокровія служатъ: темно-желтый цвѣтъ кожи, краснота щекъ, вздутость венъ, синеватая краснота и потѣние ногъ; влечетъ оно за собою приливъ крови къ головѣ (головная боль, головокруженіе), къ сердцу (сердцебиеніе), къ легкимъ (стѣсненіе дыханія), вздутость подъ ложечкой, запоръ, геморрой, изнеможеніе, тяжесть въ членахъ, ишохондрію. Это состояніе ухудшается отъ спиртныхъ напитковъ, неудобоваримой пищи, сидѣнія, покоя, праздности, душевныхъ потрясеній, теплыхъ ваннъ, словомъ — отъ всего, что затрудняетъ кровообращеніе; облегченіе бываетъ отъ строгой діеты, движенія, правильныхъ испражнений, развлеченія, холодныхъ омываній и ваннъ. Съ этой болѣзью можно достигъ глубокой старости, но если пренебрегать ею и не соблюдать діеты,

легко можетъ произойти порча соковъ или перерожденіе органовъ, особенно органовъ нижней части живота. Старая школа особенно охотно употребляетъ здѣсь свои пилюли и слабительныя, свои такъ наз. разрѣшающія средства, свои кровопусканія, которыя, при настойчивомъ употребленіи, часто влекутъ за собой, вмѣсто улучшенія крови, оводняющіе ея. Гомеопатія дѣйствуетъ мягче и вѣрнѣе, направляя свое дѣйствіе прямо на болѣзненный составъ крови и ея распредѣленіе. Главными средствами противъ активныхъ приливовъ, смотря по органамъ, служатъ: **Acon.** (когда при этомъ лихорадка), **Bellad.** (особенно при жарѣ въ головѣ), **Nitr. acid.** (особенно въ хроническихъ случаяхъ), **Nux vom.** (когда при этомъ пораженіе нижней части живота, запоръ, дурное расположеніе духа), **Sepia** (при сильной чувствительности, мигрени, пораженіи слизистыхъ оболочекъ, отсутствіи аппетита, хроническомъ катаррѣ желудка); особенно радикальнымъ средствомъ служитъ **Sulphur** (въ хроническихъ случаяхъ, при разстройствѣ нижней части живота, запорѣ, ипохондрии).

Если приливъ имѣетъ пассивный характеръ слабости, недостатка или оводняющія крови, то бывають очень полезны — **Puls.** (въ болѣе легкихъ случаяхъ, при пораженіи слизистыхъ оболочекъ и разстройствѣ пищеваренія); въ болѣе тяжелыхъ случаяхъ: **Calc. carb.**, **Ferrum**, а при ухудшеніи питанія, исхуданіи — **China.** (Срви. малокровіе. Признаки часто указываютъ на полнокрое, когда въ дѣйствительности существуетъ противоположное.)

При приливахъ крови къ нижней части живота (о чемъ подробнѣе—въ слѣдующей статьѣ) рекомендуемъ слѣдующіе медикаменты: **Bellad.**, **Carbo veg.**, **Nux vom.**, **Sulph.**, **Sepia**; когда при этомъ запоръ и припуханіе органовъ, особенно печени и селезенки: **Bryon.**, **Lycop.**, **Nuxvom.**, **Sulph.**; при несомнѣнномъ существованіи геморроя—**Sulphur.**

Средства здѣсь должно давать только въ болѣе высокихъ дѣленіяхъ (6 — 3 разжиженіе) и чрезъ большіе промежутки времени, когда недугъ бываетъ хроническій, т. е. черезъ каждыя 3—4 дня, или по приему черезъ день; если замѣчается улучшеніе и пока послѣднее продолжается, приемы даются рѣже. Лѣченію должна содѣйствовать соотвѣтственная діета. Непремѣнно слѣдуетъ остерегаться кофе и спиртныхъ напитковъ, а также производящей вѣтры

и неудобоваримой пищи. Движеніе, врачебная гимнастика, холодныя ванны, развлеченіе, прекрасно содѣйствуютъ лѣченію.

7. Геморрой.

Hæmorrhoides.

Хотя и справедливо, что этимъ названіемъ злоупотребляютъ, считая разнообразныя недуги слѣдствіемъ этой болѣзни, особенно такъ называемаго скрытаго геморроя, т. е. геморроя безъ истленія крови но все-таки нѣкоторые приверженцы новой школы заходятъ слишкомъ далеко, считая геморрой лишь мѣстнымъ недугомъ прямой кишки. Геморроидальное состояніе заднепроходной кишки можетъ, правда, явиться вслѣдствіе механическихъ причинъ, какъ напр. отъ продолжительнаго сидѣнья, отъ чрезчуръ жесткихъ испражнений, слишкомъ сильно грѣющихъ перинъ, но въ большинствѣ случаевъ причиною его бываетъ приливъ крови къ нижней части живота и переполненіе внутреннихъ частей живота отжившими кровяными шариками, т. е. негодною, темною кровью, и недугъ слѣдовательно имѣетъ болѣе общій характеръ и болѣе глубокіе корни. Часто хроническіе недуги сердца или легкихъ, въ большинствѣ случаевъ засореніе селезенки и печени и расстройство пищеваженія служатъ первыми причинами недуга. Обнаруживается онъ разнаго рода приливами, раздраженіемъ спиннаго мозга (болью въ затылкѣ и поясницѣ), пученіемъ живота, поносомъ или запоромъ, а также коликою, припуханіемъ печени, расстройствомъ желудка, зудомъ у задняго прохода, страданіями мочеваго пузыря (такъ наз. геморрой мочеваго пузыря), лишайною сыпью на мошонкѣ и у задняго прохода, потомъ ногъ, плохимъ настроеніемъ духа и ипохондрією. Всѣ эти недуги являются періодически, усиливаются отъ горячительной пищи, особенно отъ кофе и спиртныхъ напитковъ, сидѣнья и т. д., и затѣмъ снова ослабѣваютъ. При дальнѣйшемъ развитіи болѣзни, образуются выпуклости на жилахъ (венахъ) прямой кишки, которыя переходятъ въ шишки величиною въ вишню и затѣмъ еще увеличиваются, часто болятъ и раздражаются отъ давленія, могутъ также воспалиться. Они сидятъ или на внутренней, или на внѣшней поверхности прямой

кишки. Если приливъ крови еще усиливается, то эти шишки лопаются и отдѣляютъ кровь, или же кровь отдѣляется безъ шишекъ изъ прямой кишки, большею частію вмѣстѣ съ испраженіями. Но иногда прямая кишка отдѣляетъ вмѣсто крови только значительное количество слизи. Это — такъ называемый слизистый геморрой, который, какъ и кровавый геморрой, именуется открытымъ, въ противоположность скрытому, при которомъ нѣтъ истеченій. Такъ какъ это отдѣленіе крови обыкновенно сопровождается минутнымъ облегченіемъ боли, то пациенты часто стараются содѣйствовать ему, что, вслѣдствіе сопряженнаго съ этимъ раздраженія, такъ же вредно, какъ и прекращеніе отдѣленія. Бываетъ, что геморроидальное истеченіе переносится на пузырь, у женщинъ на половые органы, а также, что приливъ крови и засореніе принимаютъ невѣрное направленіе, напр. къ сердцу, легкимъ, почкамъ, печени, селезенкѣ и т. д.; это — аномаліи, которыя легко дѣлаются опасными.

Геморроемъ страдаютъ чаще мужчины, нежели женщины; вѣроятно, у послѣднихъ мѣсячное очищеніе отвлекаетъ кровь. Поэтому геморрой у женщинъ является часто лишь по прекращеніи регуль, въ старости. Вообще эта болѣзнь присуща болѣе среднему возрасту, но иногда, при наслѣдственномъ расположеніи къ ней, я встрѣчалъ ее у молодыхъ людей и даже у дѣтей.

При лѣченіи людей полныхъ, у которыхъ избытокъ соковъ, слѣдуетъ держаться совершенно иныхъ правилъ (срвн. статью 6.), нежели при лѣченіи худыхъ и малокровныхъ. Въ послѣднемъ случаѣ лѣченіе направляется часто прямо противъ малокровія (срвн. статью 9.).

Иногда кровотеченіе изъ прямой кишки, которое было слѣдствіемъ мѣстнаго пораженія слизистой оболочки кишки, принятое по ошибкѣ за геморрой, было запущено и не прекращается; тогда оно можетъ быть устранено лишь при мѣстной (хирургической) помощи.

Лѣченію подлежатъ главнымъ образомъ: 1) разстройство пищеваренія, 2) волненіе, 3) колики, 4) зудъ въ прямой кишкѣ, который весьма неприятенъ и раздражаетъ нервы, 5) запоръ или поносъ, 6) воспаленіе шишекъ, 7) отдѣленіе крови и слизи, 8) страданія мочевого пузыря. Важнѣйшія средства суть **Nux vomica** и **Sulphur**, которыя излѣчиваютъ какъ большую часть преходящихъ

состояній, такъ и главные и хроническіе педути. Противъ прилива крови и воспалительнаго состоянія употребляется въ особенности **Belladonna**.

Теперь ближе опредѣлимъ кругъ дѣйствія каждаго изъ упомянутыхъ выше и остальныхъ относящихся сюда лѣкарствъ.

Aconitum — 2.

Активный характеръ примивовъ; мисорадка, кровотечение изъ задняго прохода, съ колотьемъ, давленіемъ; колики съ чувствомъ полноты въ нижней части живота, чувство разбитости въ поясницѣ; зудъ въ заднемъ проходѣ.

Belladonna — 2.

Активный характеръ примивовъ. Кровотечение съ судорожными коликами и болью въ поясницѣ; приливъ къ головь, сердцу, легкимъ и геморроидальное раздраженіе спиннаго мозга; воспаленныя и опухшія шишки въ жилахъ, съ чувствомъ напряженія въ нихъ.

Carbo vegetabilis — 3.

Особенно полезно при приливахъ съ пассивнымъ характеромъ, когда больной слабъ. Весьма хорошо дѣйствуетъ противъ геморроидальныхъ примивовъ къ головь (кровотечение носомъ) и груди. Шишки припухаютъ и принимаютъ синеватый цвѣтъ, въ

нихъ сильный жаръ. Обильное отдѣленіе слизи изъ прямой кишки съ жгучей болью. Колющія боли въ поясницѣ, неподвижность спиннаго хребта, жженіе и ломъ въ членахъ. Запоръ съ горячими испражнениями, отдѣленіемъ крови. Особенно также при *разстройствѣ пищеваренія* съ кислотой, изжогой, давленіемъ въ желудкѣ, пученіемъ отъ вѣтровъ.

Chamomilla — 2.

Особенно противъ *нервныхъ и судорожныхъ* припадковъ, а потому полезно лицамъ чувствительнымъ и раздражительнымъ. Открытый геморрой съ стягиваніемъ нижней части живота, *поносъ съ натую и давленіемъ, судорожная боль въ поясницѣ, тянущая, рвущая*, особенно ночью. Причиняющія боль гнойныя трещины въ заднемъ проходѣ. *Сильное безпокойство, раздражительность.*

Lycopodium — 3.

Употребляется болѣе, когда преобладаютъ *физическія* измѣненія, особенно *припуханіе печени, страданіе почекъ*, хроническое

ослизненіе желудка съ запоромъ, склонность къ сытямъ, ревматизму, приливамъ. Служить для радикальнаго исцѣленія, устраняетъ самое расположеніе къ болѣзни.

Nitri acidum — 3.

Средство, весьма хорошо дѣйствующее противъ сильнаго прилива крови, когда шишки воспалены, опухли, болятъ; біеніе въ жилахъ и чувство жара въ различныхъ частяхъ тѣла; истеченіе крови изъ задняго прохода, шишекъ, поносъ съ зеленою слизью.

Nux vomica — 2.

Главное средство, послѣ *Sulphur*, для радикальнаго излѣченія и устраненія главныхъ симптомовъ болѣзни, особенно также *ипохондрій*; скрытый и открытый геморрой послѣ сидячаго образа жизни, чрезмѣрнаго употребленія кофе, умственныхъ занятій; давленіе и боль въ поясницѣ, которая какъ будто разбита, запоръ съ натурою. Задній проходъ какъ-бы закрытъ. Истеченіе слизи и крови изъ задняго прохода. Приливы къ головь. Тяжесть и давленіе въ животѣ, желудкѣ; колики, утомленіе. Всѣ симптомы ухудшаются къ утру, послѣ умственнаго напряженія и употребленія спиртныхъ напитковъ.

Pulsatilla — 2.

При преобладаніи ослизненія (слизистый геморрой), склонности къ катарру желудка и кишекъ, поэтому и при поносѣ. Кровоточивыя шишки. Кровавыя и слизистыя испраженія съ давленіемъ въ шишкахъ, боль въ поясницѣ, сильный позывъ на мочу, чувство обморока, блѣдность лица, слабость; къ вечеру признаки ухудшаются. Особенно полезно лицамъ чувствительнымъ, женщинамъ, при неправильной менструаціи.

Sepia — 3.

Подобно тому, какъ *Pulsatilla*, но когда состояніе продолжительнѣе и болѣе слизи при большемъ полнокровіи, давленіи и чувствѣ растяженія въ нижней части живота, при болѣзненномъ состояніи селезенки, головной боли въ одной половинѣ головы (мигрень), вздутости подъ ложечкой, хроническомъ катаррѣ желудка. Запоръ. Зудъ въ заднемъ проходѣ. Также какъ радикальное средство.

Sulphur — 3.

Главное средство противъ болѣе части геморроидальныхъ принадлежковъ. Позывъ на низъ, поносъ или запоръ или поперемен-

но тотъ и другой; истеченіе крови или слизи, воспаленіе шишекъ, колющая, саднящая боль въ заднемъ проходѣ; поясница какъ-бы разбита, въ ней жаръ, колотье, давленіе; боли въ затылкѣ и плечахъ; потъ, сыти, ревматизмъ,

всякаго рода приливы, недуги мочевыхъ органовъ, колики около пупка и т. д. Разстройство пищеваженія, *ипохондрія*. Какъ радикальное средство попеременно съ *Nux vomica*.

Примѣчаніе. При очень сильныхъ коликахъ съ рвзью отличное средство — **Colocynthis 3.**

При зудѣ въ прямой кишкѣ, который часто трудно бываетъ устранить, если *Sulphur* не помогло достаточно, то слѣдуетъ обратиться къ *Ignat.*, *Graph't*, *Zincum*, *Thuja*. Отъ **Phosph. 3.** я часто видѣлъ пользу, еще болѣе отъ **Petroleum 5.**

Относительно чрезмѣрнаго кровотеченія срвн. въ слѣдующей статьѣ: *Arsen.*, *Kreos.*, *Sulph. acid.* Тутъ помогаетъ особенно и **Millefol.**, даже при хроническомъ повтореніи кровотеченія.

При страданіяхъ пузыря (слизи: мочевые недуги) главнымъ средствомъ служитъ *Cantharid.*, затѣмъ *Bellad.*, *Lycopod.*, *Pulsat.*

При расширеніи жилъ, особенно у женщинъ, я съ успѣхомъ употреблялъ *Hamamelis 2.* При болѣе сильной степени необходимо предупреждать разрывъ жилъ посредствомъ повязки или лучше — эластичныхъ чулковъ со шнуровкой.

Воспаленіе геморроидальныхъ шишекъ часто требуетъ вспомогательнаго наружнаго лѣченія саломъ, цинковой мазью, теплыми сидячими ваннами, при болѣе сильномъ воспаленіи — льдомъ; внутрь — **Bell. 3;** если явится нагноеніе, то слѣдуетъ употреблять мѣстные паровыя ванны (на суднѣ), припарки изъ льняной муки, а внутрь самое полезное средство — **Mercur. sol. 3;** при болѣе сильной степени, если притомъ истеченіе жидкой крови со жженіемъ въ шишкахъ, большою слабостью, жаждой: *Arsen.*

Послѣ *Sulphur*, главными средствами противъ геморроидальной сыти суть: *Graphit.*, *Hepar sulph.*

Для радикальнаго излѣченія склонности къ геморрою служитъ также **Calc. carb.**, особенно при приливѣ крови къ головѣ (срвн. головная боль), часто повторяющемся кровотеченіи, расширеніи жилъ, причеиъ хроническое ослизненіе желудка, склонность къ ожи-

рѣнію, ломота, особенно если замѣчается присутствіе кислоты въ органахъ пищеваренія.

Пріемы. Лѣкарство слѣдуетъ давать въ случаяхъ остраго заболѣванія черезъ 2—3 часа и въ низкихъ дѣленіяхъ, въ хроническихъ случаяхъ—рѣже, только утромъ и вечеромъ или, смотря по состоянію больного, съ промежутками въ 2, 3 дня и болѣе, притомъ — болѣе высокія дѣленія, напр. **Nux 5 — 3, Sulph. 6.** к еще выше.

Изъ новыхъ лѣкарствъ сюда относится множество: *Aesculus Hippocastanum*, *Collinsonia canadensis*, *Dioscorea*, *Erigeron canadense*, *Hamamelis virg.*, *Hydrastis canadensis*, *Leptandria*, *Phytolacca decandra*, *Polygonum hydropiper*, *Podoph.*, *Veratr. vir.* Если чувствуются сухость въ прямой кишкѣ, сильныя геморроидальныя боли безъ истеченія крови, боль въ поясницѣ, то принимаютъ *Aesculus*; *Coll.* дается противъ расширенія жилъ, поноса или запора; *Erig.*—противъ открытаго геморроя съ жесткими, комковатыми испражнениями; **Ham.**—при истеченіи крови, рвотѣ кровью, запорѣ; *Lept.*—кровоточивыя шишки съ запоромъ и сильной болью подъ крестцемъ; **Podoph.**—во время беременности; при выпаденіи прямой кишки, хроническомъ поносѣ, утромъ хуже; головная боль, вѣтры. Особенно при страданіяхъ печени.

8. Кровотеченія.

Подкожное кровотеченіе, кровотеченіе въ подкожной клѣтчаткѣ (подкожное кровоизліяніе); кровотеченіе носомъ, *epistaxis*; кровотеченіе изъ легкихъ, кровохарканіе, *haemoptoe* или *haemoptysis*; рвота кровью, *vomitus cruentus*; *haematemesis*; кровавыя испраженія, *haemorrhagia intestinorum*; кровотеченіе изъ почекъ, пузыря, мочеваго канала, кровавая моча, *haematuria*; кровотеченіе изъ матки, *metrorrhagia*, и выкидышъ, *abortus*.

Мы имѣемъ здѣсь дѣло съ наружными кровотечениями, т. е. съ такими, при которыхъ кровь выступаетъ наружу, производя трещины, разѣдая стѣнки сосудовъ или являясь наружу чрезъ выпотѣніе (которое по новѣйшимъ изслѣдованіямъ становится по крайнѣй мѣрѣ вѣроятнымъ; это т. н. *diapedesis*). Внутреннія кровоте-

нія, когда кровь изливается въ полости тѣла, напр. въ мозгъ, нижнюю часть живота, труднѣе распознавать, и они требуютъ, вслѣдствіе сопряженной съ этими явленіями опасности, непосредственной помощи врача. Кровотеченія являются обыкновенно въ наружной кожѣ и клетчатой ткани, въ слизистыхъ оболочкахъ (носа, желудка и т. д.) или въ обильныхъ кровью нѣжныхъ органахъ, каковы легкія, матка. Кровотеченіе происходитъ каплями, тонкою или даже сильной струею. Опасность заключается въ скоромъ истощеніи и недостаткѣ крови въ организмѣ, при продолжительномъ же кровотеченіи происходитъ перерожденіи пострадавшихъ органовъ; такъ напр. осаждается волокнистое вещество на ткани, является воспаленіе и гноеніе, а затѣмъ ткани сокращаются.

При лѣченіи кровотеченія слѣдуетъ обратить вниманіе на характеръ его: артеріальное ли оно (красная кровь), т. е. берущее начало въ бьющихъ жилахъ, или венозное (темная кровь), происходящее изъ венъ, или капиллярное, — изъ находящейся между артеріями и венами сѣти мелчайшихъ собственно питательныхъ, такъ называемыхъ волосныхъ сосудовъ. Артеріальное кровотеченіе — наиболѣе опасное, потому что чрезъ него скорѣе всего должно пострадать питаніе тѣла. Затѣмъ слѣдуетъ узнать, сопровождають ли кровотеченія полнокровіе (активныя) или малокровіе (пассивныя), и, наконецъ, — каковы причины кровотеченія. Последнія бывають обыкновенно слѣдствіемъ болѣе глубокихъ условій, не обративъ вниманія на которыя, невозможно радикальное устраненіе кровотеченій. Кровотеченія, когда къ нимъ не было внѣшняго повода (толчка, пораненія, паденія, ссадины), а) происходятъ отъ приливовъ (чрезмѣрная дѣятельность сердца вслѣдствіе напряженія, употребленія спиртныхъ напитковъ, органическаго порока сердца, душевныхъ движеній), б) бывають слѣдствіемъ или служатъ замѣною (подавленного или остановившагося) геморроидальнаго и мѣсячнаго истеченія, в) возникаютъ при состояніяхъ, отъ которыхъ кровь становится жиже и бѣднѣе фибриномъ (тифъ, цынга, воспаленіе мозга у пьяницъ), г) бывають слѣдствіемъ болѣзненнаго состоянія тканей отъ гноенія, бугорковъ (наиболѣе частая причина кровотеченія изъ легкихъ), нарывовъ, рака и т. п. злокачественныхъ опухолей (наиболѣе частая причина кровотеченій изъ желудка, кишекъ, матки), и слѣдствіемъ мѣстнаго расширенія особенно боль-

шихъ кровеносныхъ сосудовъ; расширение артерій называется аневризмомъ, расширение венъ — varices; къ послѣднимъ принадлежатъ и геморроидальныя шишки. Далѣе, кровотечение является вслѣдствіе задержанія кровообращенія, напр. чрезъ давленіе на одну или нѣсколько большихъ венъ, будь причина давленія внутренняя или внѣшняя; наконецъ, кровотечения бывають вызваны, особенно у лицъ пожилыхъ, ненормальными измѣненіями и слабостью стѣнокъ сосудовъ. У недавно разрѣшившихся отъ бремени часто можетъ явиться сильное кровотечение вслѣдствіе недостаточнаго сокращенія матки или вслѣдствіе остатковъ послѣда и яичной оболочки; у беременныхъ причиною бываетъ впереди лежащій послѣдъ, и въ этомъ случаѣ необходима быстрая помощь врача. Во время исчезновенія регуль, когда женщина старѣетъ, также часто бывають сильныя кровотечения. Наконецъ, многіе страдаютъ кровотечениями по наслѣдственному расположенію. Когда кровотечение остановлено, къ чему служатъ слѣдующія ниже средства, тогда слѣдуетъ обратить все вниманіе на устраненіе упомянутыхъ выше первичныхъ причинъ. Поэтому надобно обратиться къ главамъ: приливы крови, параличъ; при *кровотеченіи изъ легкихъ* см. кашель и чахотку; при *рвотѣ кровью, кровотеченіи изъ желудка и кишекъ* — болѣзни желудка и кишечнаго канала и тифъ; при *кровавой мочѣ* — болѣзни мочеваго пузыря и мочеваго канала; при *кровотеченіи изъ матки* — неправильности менструацій.

Противъ кровотечения носомъ лучшимъ средствомъ служить **Bryon.**; противъ кровотечения изъ легкихъ — **Aconit., Arnica** и **Ferrum**; противъ рвоты кровью — **Nux vomica** и **Ipecac.**; противъ кровотечения изъ кишекъ (испражненія съ кровью) — **Arsen.** и **Kreosot.**; противъ кровавой мочи — **Terebinthina** (при боли въ почкахъ, натугѣ и давленіи въ мочевомаъ пузырьѣ), **Cantharides** (при жгучихъ боляхъ); противъ кровотечения изъ матки — **Croc., Sabina, Secale.**

Кромѣ того слѣдуетъ обратить вниманіе на слѣдующія спеціальныя указанія:

Aconitum — 2.

При *активномомъ, артеріальномъ кровотеченіи изъ носа, лег-*

кихъ, желудка, матки, когда до или во время кровотечения были: волненіе, тоска, сердцебіеніе, мигорадка, безпокойство.

Arnica — 2.

Активная, артеріальная и венозная кровотеченія изъ носа, легкихъ, желудка, мочевого пузыря, матки, большую частью отъ наружныхъ поврежденій или механическихъ причинъ. При кровохарканіи: легкое изверженіе черной свернувшейя или свѣтло-красной пѣнистой, смѣшанной со слизью крови, *вкусъ крови во рту, въ горлъ какъ бы поднимаются теплыя пары*; щебетаніе подь грудной костью; колотье, жженіе, чувство разбитости при кашлѣ и движеніи, стягиванье въ груди, давленіе и *потрясающій кашель*. При кровотеченіяхъ изъ матки — когда больная оступилась, послѣ подниманія тяжестей. —

Arsenicum — 3.

Пассивное кровотеченіе изъ носа, почекъ, мочевого пузыря, легкихъ, кишекъ и желудка. Сильное кровотеченіе вслѣдствіе органическихъ пороковъ сердца, большихъ сосудовъ, легкихъ. Сильный страхъ и слабость, сердцебиеніе, безпокойство; сухой, *жгущій жаръ*, особенно при темной крови.

Belladonna — 2.

Активная истеченія красной крови изъ носа, легкихъ, желуд-

ка, кишекъ, матки, съ приливами, жаромъ въ груди, колотьемъ; кашель съ перхотою и постоянное щебетаніе въ горлъ, сердцебиеніе, приливъ крови къ *головѣ*, краснота лица. — Кровотеченія изъ матки, когда кровь бываетъ ни свѣтла, ни темна, съ *рзью въ животъ, внутренности какъ будто загребають рукой*, кровотеченіе съ остановками, при стягиваніи, давленіи, какъ будто внутренности стремятся выйти наружу, боль въ мышцахъ.

Bryonia — 2.

Активное кровотеченіе носомъ. Рѣже при кровотеченіи изъ легкихъ, когда указываютъ на это средство сухой кашель, колотье въ груди, тяжелое дыханіе, продолжительная лихорадка, если послѣдняя уже умѣрена посредствомъ *Aconit*.

Chamomilla — 2.

Кровотеченіе изъ матки, въ болѣе легкихъ случаяхъ, когда пѣтъ органическаго разстройства, послѣ неправильныхъ менструаций, простуды, душевныхъ потрясеній. Характеръ пассивный и судорожный. Темнокрасная и черная кровь, зловонная, въ перемежку съ сгустками, вытекаетъ порывами и съ болью. Холодѣніе членовъ, блѣдность лица, чрез-

вычайная слабость, припадки обморока, шумъ въ ушахъ, помраченіе зрѣнія.

China — 1 или тинктура.

Всякаго рода *пассивная кровотоечения* съ характеромъ *слабости, недостатка крови, истощенія*, поэтому особенно при *водянистой крови* или темной, безжизненной. Кровотеченіе изъ *легкихъ*: кашель сильный, глухой, сухой, причиняющій боль; ознобъ и жаръ попеременно; холодныя ноги; *потъ, дрожаніе, подериваніе, обмороки, поносъ, изнуреніе*. Изъ *матки*: истеченіе *порывами*, съ *судорожной болью*, потугами, рвѣзью въ животѣ, позывомъ къ мочѣ; голова тяжела, головокруженіе, обморокъ, наступающій недостатокъ крови и *истощеніе*.

Crocus — 2.

Пассивное, венозное кровотоеченіе, особенно изъ матки. Кровь *черна, клейка, съ сгустками*: давленіе и боль въ маткѣ; въ животѣ какъ будто движется и прыгаетъ что-то живое; *желтоватый цвѣтъ лица*, обморокъ, *печальное настроеніе духа*, слабость, чувство озноба.

Ferrum — 2.

Активное кровотоеченіе; со *свѣтлокрасной, чистой, скудной*

кровью, легкимъ кашлемъ, стѣсненіемъ дыханія, особенно ночью; томъ между плечами, чрезвычайная слабость голоса, когда болѣзнь длится долгое время. — *Кровотоеченіе изъ матки*: *много жидкой, черной крови*, съ болью въ *ляшкахъ, коликою*, подобной *потугамъ при родахъ*; *сильное возбужденіе сосудистой системы*, *головокруженіе, красное, горячее лицо*. Пульсъ полный и твердый.

Trisacchara — 1.

Главное средство во *всѣхъ формахъ средней степени*, особенно при *кровотоеченіи изъ желудка, кишекъ, (рѣже) изъ легкихъ*; въ послѣднемъ случаѣ, когда бываетъ *легкій кашель, стѣсненіе въ груди, изверженіе кровяныхъ жилокъ, тошнота*. При *кровотоеченіи изъ матки* — рѣдко и только въ томъ случаѣ, когда кровь обильна, жидка и *свѣтло-краснаго цвѣта*, съ *рвѣзью въ животѣ, тошнотой, ознобомъ, обморокомъ*. *Поносъ, склонность къ лежащему положенію*.

Kreosotum — 3.

Особенно при *кровотоеченіяхъ изъ кишекъ, рѣже—изъ носу, легкихъ и матки*. Главное средство при *пассивномъ характерѣ, состояніи гнилостнаго разложенія, испорченной крови (черной)*, съ

слабостью и органическими недугами (нарывы, ракъ и т. п.).

Nux vomica — 2.

Главное средство при *кровотеченіяхъ изъ желудка*, затѣмъ — *кишечъ* и *мочевого пузыря*, если кровь свѣтлоокрасная, и истеченіе не слишкомъ сильное. Весьма рѣдко — изъ носу и легкихъ; когда кровотеченіе является послѣ употребленія кофе и вина. Когда *полнокровіе нижней части живота* бываетъ причиною или сопровождаетъ истеченіе, при холерическомъ темпераментѣ, растрействѣ пищеваенія, позывѣ на рвоту, головной боли. Также при кровотеченіи послѣ простуды. Часто служить лишь промежуточнымъ средствомъ.

Platina — 2.

Кровотеченіе изъ матки: когда кровь *темна*, съ *сгустками*, при боли въ *ляшкахъ*, распространяющейся до *паховъ*, съ *судорожными припадками*, усиленнымъ стремленіемъ къ соитію.

Pulsatilla — 2.

При *пассивныхъ, венозныхъ* кровотеченияхъ. При *дѣвической немочи* и *малокровіи*. Когда причиною бываетъ *подавленіе* или *остановка менструаций*. При *кровотеченіи изъ легкихъ*: въ упр-

ныхъ случаяхъ, съ изверженіемъ черной и свернувшейся крови, большею частію *вечеромъ или ночью*, со страхомъ, содроганіемъ, слезливостью, при флегматическомъ темпераментѣ. — При *кровотеченіи изъ матки* это средство слѣдуетъ употреблять съ осторожностью, только когда течетъ черная кровь, послѣдъ не выходить, и надо устранить препятствіе. — При *кровоавой мочѣ*, съ жгучей болью у отверстія, стягиваніемъ и рѣзью около пупка и до поясицы, при судорожномъ стягиваніи мошонки и судорожной боли въ ногахъ.

Sabina — 2.

Главное средство при *кровотеченіи изъ матки* послѣ родовъ, до или послѣ *выкидыша*, при рѣзи въ животѣ, *потунахъ*, боли во всѣхъ членахъ и чрезвычайной слабости. Дѣйствительнымъ оно оказалось болѣе при *свѣтлоокрасной*, нежели при *темной*, свернувшейся крови, особенно при *выкидышѣ*. Прилично въ особенности сангвиническимъ, полносочнымъ женщинамъ.

Secale — 2.

При *пассивномъ* *кровотеченіи* изъ носа, *мочевого пузыря*, особенно — *матки*. — Главное сред-

ство для людей *старыхъ, страдающихъ блѣдной немочью, слабыхъ, истощенныхъ*. Поэтому — при недостаточной реакціи, слабостью пульса, холодѣніи членовъ, блѣдности лица, безпокойномъ состояніи духа, дрожаніи и нервныхъ припадкахъ. — Кровь темна, не свертывается, течетъ безъ боли и безостановочно.

Sulphuricum acidum — 1.

Помогаетъ часто въ самыхъ упорныхъ случаяхъ всякаго рода артеріальныхъ и венозныхъ кровотеченій. Употреблять необходимо въ сильныхъ приѣмахъ: 2, 1 дѣлен., по нѣскольку капель.

Примѣчаніе. Если гдѣ-либо важно обратить вниманіе на причину страданія, то именно здѣсь. Необходимо узнать причину и источникъ кровотечения, особенно органическую основу, мѣсто зараженія его; напр. при кровотеченіи изъ желудка (кровавая рвота) слѣдуетъ опредѣлить, нѣтъ ли нарыва въ желудкѣ, рака и т. п., при кровотеченіи изъ легкихъ, — служитъ ли причиною состояніе сердца (органическіе пороки) или легкія (буторки). Само собою разумѣется, что при большомъ разнообразіи случаевъ, упомянутыхъ выше лѣкарствъ не всегда бываетъ достаточно. Такъ напр., если полнокровіе не умѣряется, полезно *Calc.*, а при болѣе высокой степени, когда можно опасаться возвращенія кровотеченій — *Nitr. acid.* Противъ *кровотеченія носомъ* слѣдуетъ въ особенности указать еще на *Alum.*, противъ *кровохарканія* — *Nitr. ac.*, **Phosphor.**, а *Digitalis* или *Spigelia*, когда поражено сердце; противъ *кровотеченія изъ желудка и кишекъ* — **Phosphor.**, **Plumb.**, *Argentum nitricum*, *Acid. nitr.*; противъ *кровавой мочи* — **Secale**, *Phosphor*, *Terebinth.*, **Lycopod.** (геморрой мочевого пузыря), **Mezereum**, *Uva ursi*; противъ *кровотеченія изъ матки*: **Cinnam.** (0), **Hamamelis**, **Canth.** Противъ этого кровотечения на ряду съ **Crocus** употребляютъ: *Arnica*, *China*, *Kreosot.*, *Phosphor.*, на ряду съ **Sabina**: *Bell.*, *Cham.*, *Platina*; на ряду съ **Secale**: *Ars.*, *Chin.*, *Ipec.*, *Ferr.*, *Plumb.* Въмѣсто **Secale**, въ послѣднее время охотно также употребляютъ болѣе сильно дѣйствующее *Ergotin.* (*алколондъ Secale*), по нѣскольгу грановъ 2-го растиранія, черезъ 2 два часа по приѣму; это же средство хорошо дѣйствуетъ и противъ кровотечения изъ легкихъ. Противъ *активнаго* кровотечения во всѣхъ его видахъ рекомендуютъ также **Millefolium**.

Большая часть средствъ, служащихъ противъ кровотеченія изъ матки, вслѣдствіе находящихся въ связи съ этимъ причинъ, употребляются также при выкидышѣ (*abortus*). Для предотвращенія **выкидыша** при полнокровіи полезно — **Sepia**, при первомъ, истерическомъ состояніи — **Platina**; оба средства употребляются по одному разу въ день. Срви. также статью: *разстройство регулъ*.

Непосредственныя слѣдствія кровотеченій устраняются: *обморокъ* съ сильнымъ ознобомъ — посредствомъ **Veratrum** или **Phosphor.**, *конвульсіи* — **Moschus**, остающаяся *слабость* и *недостатокъ крови* — **China** и **Ferrum**.

Если кровотеченіе чрезвычайно сильно и грозитъ опасностью, особенно если кровеносные сосуды до того ослабѣли, что кровь можетъ протекать безостановочно, а поэтому нѣтъ времени дожидаться дѣйствія лѣкарствъ, слѣдуетъ прибѣгнуть къ наружному употребленію уксуса, внутреннему и наружному — льда, къ холоднымъ компрессамъ, тампонированію, т. е. затыканію отверстія носіею, къ перевязкѣ членовъ. Кровотеченіе изъ легкихъ часто останавливаетъ почти мгновенно приѣмъ небольшого количества поваренной соли, растворенной въ водѣ. Противъ кровотеченія изъ носу и матки въ послѣднее время съ пользою употреблялось выпрыскиваніе *Tct. Ferri sesquichlorati* (чайную ложку на стаканъ воды).

Пища необходима легкая; смотри по обстоятельствамъ (если больной очень слабъ), она должна быть и питательна, но не разгорячать; поэтому слѣдуетъ остерегаться спиртныхъ напитковъ.

Изъ новыхъ средствъ вообще противъ кровотеченій дѣйствуютъ: **Eriger.**, **Gelsem.**, **Hamam.**, **Senecio aureus**, **Trillium pendulum**. *Erig.* преимущественно противъ активныхъ, артеріальныхъ кровотеченій; *Trill.* противъ пассивныхъ; *Senec.* противъ кровотеченій въ слизистыхъ оболочкахъ, если прекратились обычные отдѣленія.

Въ частности, противъ кровотеченія носомъ: *Erig. Ham., Trill.*, первое — при приливѣ, лихорадкѣ, краснотѣ лица; противъ *кровохарканія*: *Collins* (темная кровь, обернутая въ клейкую мокроту), *Hamam.* (венозное кровотеченіе; какъ-будто теплый потокъ изъ груди), *Sanguin.* (?), — *Senec.* (при задержаніи регулъ); — *Trill.*; — противъ *кровоавой рвоты*: *Erig.* (при позывѣ на рвоту и жженіи въ желудкѣ); *Ham.* (при кровавыхъ испражненіяхъ съ предшествующимъ чувствомъ полноты и болью въ нижней части живота; при-

падки лихорадки, холодный потъ, слабый, быстрый пульсъ); — противъ *кровоавой мочи*: *Chimaphila umbellata* (при триперѣ), *Erig.*, *Eupatorium purpureum.*, *Hamam.*, *Senec.*, *Trill.* (указанія на всѣ эти средства — эмпирическія!); — противъ *кровотеченія изъ матки*: *Arcyuthum cannabinum* (при усиленіи), *Caulophyllum thalictroides* (если можно опасаться выкидыша, при раздраженіи сосудовъ, давленіи книзу, или при пассивномъ кровотеченіи послѣ выкидыша, послѣ родовъ, при дрожаніи, слабости), *Erig.* (до и послѣ родовъ или послѣ выкидыша), *Helonias dioica* (при слабости), *Hamam.* (пассивное кровотеченіе), *Phytol.*, *Senec.*, *Trill.*

Пріемъ. Во время припадка средства слѣдуетъ давать быстро, смотря по степени опасности, даже черезъ каждыя полчаса, и въ сильныхъ пріемахъ, по 3 — 5 капель или, если лѣкарство въ порошкахъ, то по нѣскольку грановъ. Для радикальнаго излѣченія и въ этихъ случаяхъ полезны рѣдкіе пріемы и высокія дѣленія.

9. Малокровіе, *anaemia*, и дѣвичья немочь, *chlorosis*.

Хотя послѣдняя изъ этихъ болѣзней собственно должна бы быть помѣщена въ слѣдующемъ отдѣлѣ, однако мы сочли болѣе удобнымъ сказать о ней здѣсь же, потому что она сродна малокровію и излѣчивается почти тѣми же средствами, какъ и это послѣднее.

Малокровіемъ называется такое болѣзненное состояніе, при которомъ кровеносные сосуды заключаютъ въ себѣ чрезвычайно мало крови, и эта послѣдняя страдаетъ недостаткомъ кровяныхъ шариковъ. Кровь бѣднѣ питательными составными частями (фабриномъ, желѣзомъ), легче, жиже и блѣднѣе. А потому, когда состояніе это дѣлается хроническимъ, развивается дѣвичья немочь, при большемъ же развитіи болѣзни — оводянѣніе крови (водяная болѣзнь). Симптомы: блѣдность внутреннихъ слизистыхъ оболочекъ (ротъ, десны — свѣтлоокраснаго цвѣта, какъ телятина) и кожи лица, которая принимаетъ желтоватый и зеленоватый оттѣнокъ; иногда бываетъ при этомъ легкій, летучій румянецъ на щекахъ; холодъ въ ногахъ, ознобъ; слабый, мягкій пульсъ; мускулы слабы, вялы, вслѣдствіе чего слабость, неспособность къ ходьбѣ; сердцебіеніе; одышка, если подниматься на лѣстницу; чрезвычайная тяжесть въ ногахъ;

различныя недуги пищеваренія, отсутствіе аппетита, отвращеніе къ мясу, за исключеніемъ копченаго, склонность къ кислому; судороги въ желудкѣ, вѣтры; различныя первныя страданія, головная боль, сонливость, судороги, чрезвычайная чувствительность и слезливость. вмѣсто здоровой крови, регулы отдѣляютъ жидкую, водянистую или грязно-красную; или регулы совершенно прекращаются, и вмѣсто нихъ являютъ бѣли. Во многихъ случаяхъ бѣли являютъ на долгое время и внѣ сроковъ мѣсячнаго очищенія. Весьма характеристическимъ признакомъ служитъ такъ называемый «шумъ дуновенія», который при помощи стетоскопа является въ формѣ жужжанія въ венахъ правой стороны шеи, у ключицы, на осязаніе онъ происходитъ какъ бы отъ колебанія фортепіанной струны. — Все, что препятствуетъ питанію и образованію здоровой крови, въ особенности же уменьшаетъ количество кровяныхъ шариковъ, можетъ произвести малокровіе и дѣвичью немочь. Последнюю поэтому можно встрѣтить не только въ періодъ развитія и не только у женскаго пола, но во всѣхъ возрастахъ и у обоихъ половъ. Совершенно ошибочно дѣйствовать противъ отсутствія мѣсячнаго очищенія и считать последнее причиною болѣзни, ибо отсутствіе менструацій есть лишь слѣдствіе дѣвичьей немочи, и съ излѣченіемъ последней и регулы становятся опять нормальными.

Причинами этихъ болѣзней бывають: потеря крови и расточеніе соковъ (кормленіе грудью, распутная жизнь, поносы, потѣніе), недостатокъ и дурное качество пищи, недостатокъ въ хорошемъ воздухѣ (это часто бываетъ причиною у дѣтей, когда они начинаютъ посѣщать школу, у деревенскихъ жителей, когда они переселяются въ городъ), стѣсненіе дыханія вслѣдствіе черезчуръ узкаго платья, недостатокъ въ свѣтѣ, теплѣ, движеніи, снѣ (въ тюрьмахъ, школахъ, фабрикахъ), быстрый ростъ, слишкомъ сильныя напряженія всякаго рода, въ особенности умственныя, злоупотребленіе лѣкарствами, душевныя потрясенія (въ особенности скорбь), раздраженіе фантазіи чрезъ чтеніе романовъ, неестественное удовлетвореніе полового влеченія. Сюда же относятся разнаго рода явленія, какъ-то: недуги желудка, сердца, матки, болѣзни печени и селезенки, пораженіе почекъ, наконецъ, злокачественныя быстро размножающіяся опухоли въ различныхъ частяхъ тѣла, въ особенности же золотуха и легочныя бугорки; все это можетъ причинить малокровіе и блѣдную немочь. Лѣченіе должно

сообразоваться съ этими обстоятельствами, и въ особенности слѣдуетъ заботиться о приличной діетѣ, легкой, питательной и удобоваримой пицѣ (жареное мясо, дичь, яйца, баварское пиво), причѣмъ не должно быть недостатка въ свѣжемъ воздухѣ, свѣтѣ, развлеченіяхъ. Перемѣна образа жизни есть главное условіе полнаго выздоровленія.

Во многихъ случаяхъ доказано также, что питаніе и введеніе въ организмъ желѣза, служащаго въ глазахъ старой школы главнымъ средствомъ противъ этой болѣзни, не приносятъ никакой пользы, и что, даже при благопріятныхъ матеріальныхъ условіяхъ, дѣвичья немочь все-таки развивается, такъ какъ она весьма часто зависитъ отъ расстройства нервной системы. Поэтому слѣдуетъ допустить, что дѣвичья немочь часто беретъ начало единственно въ нервной системѣ, и всѣ остальные явленія, сопровождающія болѣзнь, обусловлены этимъ, такъ какъ расстройство нервной системы сильно вліяетъ на движеніе кровяныхъ сосудовъ и вообще на питаніе организма. Отсюда и благопріятное дѣйствіе гомеопатическихъ средствъ. Даже въ наиболѣе содержащихъ желѣза минеральныхъ водахъ, каковы Пирмонтскія, Швальбахскія, Спа, количество послѣдняго все-таки должно быть названо гомеопатическимъ, и вообще оно дѣйствуетъ, вѣроятно, болѣе динамически, нежели чрезъ возстановленіе недостающихъ составныхъ частей крови.

Главными средствами противъ дѣвичьей немочи и малокровія служатъ:

Calcarea carbonica — 2.

Въ періодъ развитія, при *золотушиномъ* сложеніи, страданіи желѣзъ, ожирѣніи, расположеніи къ искривленію костей, къ недугамъ легкихъ, хроническому ослизненію желудка; аппетитъ на кислое, извѣсть, мѣлъ; всякаго рода странныя прихоти. Головная боль въ формѣ мигрени, съ давленіемъ и клокотаніемъ въ

мозгу; утомленіе и сонливость, сердцебіеніе; тоскливое расположеніе духа и т. п.; сновидѣнія; бѣли вмѣсто регуль, или послѣднія *являются слишкомъ часто, или продолжаются слишкомъ долго* и ослабляютъ организмъ. (Часто достаточно одного этого средства для излѣченія, но въ другихъ случаяхъ необходимо принимать послѣ него еще желѣзо.)

China — 1 или тинкт.

Когда были *ослабляющія* причины, особенно *потери крови и соков*, безсиліе съ крайней раздражительностью, *оводяніе* крови; послѣ чрезмѣрныхъ кровотеченій, перемежающейся лихорадки, холеры, страданій печени и селезенки. *Только при высокой степени развитія болѣзни.*

Ferrum — 1 или Ferr. acet.
въ тинктурѣ.

Главное средство для *улучшенія крови*, особенно если пищевареніе уже улучшилось. Преимущественно противъ слабости мускуловъ, чувства онѣмѣнія, разстройства дѣятельности сердца, кровообращенія, питанія; при

слабости, но съ характеромъ раздраженія (обморокъ, головокруженіе, сердцебіеніе, одышка). — Бѣли или чрезмѣрныя менструаціи.

Pulsatilla — 2.

Особенно въ началѣ и въ легкихъ случаяхъ, когда преобладаютъ недуги пищеваренія, масса крови еще не заражена глубоко, слизистое состояніе преобладаетъ, и расположеніе духа слезливое, мрачное; при состояніи, когда напряженіе и ослабленіе являются попеременно; продолжительный ознобъ; кожа холодна, пульсъ слабъ, дыханіе затруднено, *рециды отсутствуютъ*; вмѣсто нихъ, а также до или послѣ — продолжительныя бѣли. Часто бываетъ удобно послѣ *Calc.* и передъ *Ferr.*

Примѣч. Въ данномъ случаѣ лѣкарства давать слѣдуетъ въ рѣдкихъ *приемахъ*, но употреблять долгое время, даже нѣсколько мѣсяцевъ подъ рядъ. Иногда необходимо бываетъ прибѣгать и къ другимъ лѣкарствамъ, кромѣ упомянутыхъ выше; такъ напр. при разстройствѣ *нервовъ*, *судорожныхъ принадлежкахъ*, дѣвичьей немочи, явившейся преимущественно вслѣдствіе душевныхъ потрясеній, давать **Ignat.**, когда принадлежности сильны или продолжительны — **Plat.**, или, когда съ этимъ соединено мѣстное *истощеніе*, особенно *половой системы* — **Acid. phosph.** или **Phosphor.** (Послѣднее употребляется и противъ малокровія послѣ тифа, при легочныхъ бугоркахъ.)

Когда неправильно *біеніе сердца*, разстроена половая жизнь и сильно понижилось *питаніе* — *Natr. mur.*; если пухнуть ноги отъ водянки, разстроены отправления сердца, при одышкѣ, без-

сонницѣ, страданіяхъ печени, сильныхъ судорогахъ въ желудкѣ, бросающемся въ глаза зеленомъ цвѣтѣ лица, также противъ послѣдствій чрезмѣрнаго употребленія желѣза — **Arsen.**; послѣ половой невоздержности, при завалахъ въ нижней части живота, *неправильныхъ реулажъ*, особенно при *блѣжъ*, съ односторонней мигренью — *Sepia*; наконецъ **Sulphur**, когда *Puls.* недостаточно для улучшенія **пищеваренія**, если притомъ **завалы** въ нижней части живота, приливъ крови, стѣсненное дыханіе, бугорки въ легкихъ (часто также какъ промежуточное средство, чтобы побудить организмъ къ реакціи). Изъ *железныхъ* препаратовъ слѣдуетъ выбирать — углекислое, укусокислое или молочнокислое желѣзо; самый легкій препаратъ — *Tinct. ferri pomati* (яблочнокислое желѣзо), которое можно принимать по нѣскольку капель 1 дѣленія или неразжиженнымъ 2 раза въ день. Я часто имѣлъ случай испытать слѣдующій способъ лѣченія желѣзомъ, который легко переносятъ больныя: слѣдуетъ принимать, ежедневно по одному разу, въ продолженіе 4-хъ недѣль немного сѣрнокислаго желѣза (сколько помѣстится на кончикѣ ножа) въ стаканѣ содовой воды, не натощая.

В. БОЛѢЗНЕННОЕ СОСТОЯНІЕ КРОВИ ОТНОСИТЕЛЬНО ЕЯ КАЧЕСТВА.

10. Золотуха, *serophulosis*, и Английская болѣзнь, *rhachitis*.

Золотуха (которую новая школа основательно считаетъ лишь высшей степенью расположенія къ бугоркамъ) происходитъ частію отъ наследственнаго расположенія, когда родители были поражены золотухой или во время прижитія страдали бугорками, сифилисомъ и т. п., или если они были слишкомъ близкими родственниками, — частію отъ дурнаго питанія (переполненіе пищей или дурная пища, картофель, кислый хлѣбъ, кормленіе ребенка посредствомъ рожка), дурнаго и сыраго воздуха, вслѣдствіе тѣсноты помѣщенія, неопытности. Признаки расположенія къ золотухѣ: нѣжная кожа, толстыя носъ и губы, вздутый животъ, затрудненіе при ходьбѣ, мед-

ленное прорѣзываніе зубовъ, дурные зубы и позднее срастаніе головныхъ костей. Золотуха проявляется иногда въ цвѣтущей формѣ (розовый цвѣтъ лица, бѣлая кожа, синія жилы, пылкій умъ), иногда въ вялой (пухлое тѣло, грубыя черты лица, пухлое лицо, толстый черепъ, вялый умъ). Въ полномъ своемъ развитіи золотуха обнаруживается весьма разнообразно и въ различныхъ степеняхъ;

1) въ формѣ разстройства пищеваренія: ослизненіе, катарръ желудка, образованіе въ немъ кислотъ, жадность на пищу, желаніе ѣсть извѣсть, мѣлъ или простую пищу (хлѣбъ, картофель и проч.), то поносъ, то запоръ, страданіе отъ глисть и проч. Здѣсь всего полезнѣе, какъ радикальныя средства — **Calc., Lycop., Puls.**; а какъ промежуточныя средства — **Magn. carb., Natrum mur., Puls., Sulph.** и т. д. Подробнѣе объ этомъ сказано въ статьяхъ: недуги желудка, поносъ, запоръ, глисты и т. д.;

2) въ формѣ припуханія желѣзъ: лимфатическая золотуха подъ мышками, въ пахахъ, на шеѣ, затылкѣ, за ушами, въ животѣ, припуханіе печени и селезенки, затвердѣлости, опухоли. Эти желѣзы то припухаютъ, то спадаютъ, сидятъ или отдѣльно, или по нѣсколь- ку въ рядъ, величина ихъ въ горошину или бобъ, сначала онѣ бываютъ мягки и подвижны, затѣмъ твердѣютъ, увеличиваются, становятся комковатыми, достигаютъ величины голубиного яйца, часто онѣ подвергаются видоизмѣненію, дѣлаются мягки какъ сыръ и остаются въ этомъ состояніи даже до періода развитія, или онѣ воспаляются, гноятся, или образуютъ долговременныя нарывы съ злокачественнымъ отдѣленіемъ, которые трудно заживаютъ и оставляютъ послѣ себя слѣды. Опасно бываетъ, когда золотуха поражаетъ желѣзы нижней части живота или бронхиальныя (болѣе глубоко сидящія желѣзы вѣтвей дыхательнаго горла), ибо это можетъ повлечь за собой продолжительныя и опасныя болѣзни. Въ періодъ воспаленія этихъ опухолей полезны: **Bellad.** — при болѣе внѣшнемъ, рожевидномъ воспаленіи, **Mercur.** при болѣе глубокомъ пораженіи клѣтчатой ткани, угрожающемъ гноеніи. Для содѣйствія нагноенію, или когда нужно разбить опухоль, послѣ **Mercur.**, если нельзя было болѣе задержать нагноенія: **Hep. Sulphur.** При затвердѣлостяхъ, опухоляхъ: **Iod.**; при фистулахъ: **Silicea.** При твердыхъ опухоляхъ желѣзъ: **Baryta carb.** или **Baryta mur.** При затвердѣніи желѣзъ въ паховой полости: **Carbo anim., Mercur. bijodat.** 3. Противъ опухо-

ли желѣзъ, особенно послѣ ушиба или ущемленія: **Conium**. Главными средствами противъ страданія желѣзъ послѣ **Calc. carb.**, которое полезно болѣе лицамъ раздражительнымъ, всегда будутъ **Iod.** (іодистый калий) и **Brom.**, *) преимущественно для лицъ вялыхъ, организмъ которыхъ мало способенъ на реакцію. Отъ послѣдняго средства я видѣлъ особенный успѣхъ и даже предпочитаю его, вслѣдствіе болѣе нѣжнаго дѣйствія, *iody*; въ подходящихъ случаяхъ можно употреблять его и въ формѣ мази (нѣсколько капель (20) 1 дѣлен. на 3 золотника жира);

5) въ формѣ слизетеченія, особенно изъ глазъ (воспаленіе глазъ; см. болѣзни глазъ), изъ ушей (см. истеченіе изъ ушей), изъ дыхательныхъ путей (хроническій насморкъ, кашель; см. насморкъ, кашель), изъ половыхъ частей (см. бѣли);

4) въ формѣ кожныхъ болѣзней: лишаевъ, парши, припуханія губъ, нарывовъ и проч. Здѣсь особенно полезны: **Antim. crud.**, **Arsen.**, **Baryt.**, **Calc.**, **Hepar sulph.**, **Iod.**, **Rhus**, **Sulph.** (см. кожныя болѣзни);

5) въ формѣ пораженія костей: воспаленій, опухолей, искривленій, костофды. Такъ называемая англійская болѣзнь опредѣляется неправильнымъ составомъ костей и въ особенности размягченіемъ ихъ. Встрѣчается эта болѣзнь преимущественно въ низшихъ сословіяхъ и тамъ, гдѣ ребенка кормили не грудью. Ходъ болѣзни обыкновенно таковъ: поносъ, плохое пищевареніе, желаніе есть хлѣбъ и картофель, вздутый животъ, неповоротливость, боль въ костяхъ и суставахъ. Концы костей ручнаго сустава, сустава стопы и грудной части реберъ опухаютъ шарообразно, утолщаются, становятся бугорчатыми. Мускулы худѣютъ, особенно на ногахъ. Кости размягчаются, почему ноги выпябаются, грудныя кости выдаются впередъ, позвоночный столбъ искривляется, головныя швы долго не заростають. Остальныя золотушные страданія костей текутъ весьма медленно, легко образуется костофда, а вслѣдствіе нея нарывы съ фистулами, которыя заживаютъ иногда черезъ нѣсколько лѣтъ лишь, по излѣченіи костей чрезъ удаленія осколковъ; рѣже дѣло оканчивается сухоткой (которая является преиму-

*) Это вещество легко разлагается, а потому нужно довольно часто возобновлять его.

шественно послѣ воспаленія позвоночнаго столба съ нарывами), но если поражены суставы, то часто происходитъ неправильное и неизлѣчимое срастаніе костей суставовъ и искривленіе позвоночнаго столба. Изъ средствъ сюда относятся преимущественно, въ острыхъ случаяхъ — **Mercur.**, въ хроническихъ — **Baryt.**, **Calcarea carbonica** и **Calc. phosph.**, **Phosphor. acid.**, **Silicea**, **Sulphur**. Что касается до искривленія позвоночнаго столба, которое случается или въ сторону или впередъ, то нельзя достаточно рано обратить на него вниманіе; причиною, въ особенности у золотушливыхъ, часто бываютъ школа, кривое и согнутое положеніе при писаніи, разнаго рода работы. Въ этихъ случаяхъ слѣдуетъ заниматься подъ надзоромъ врача гимнастическими упражненіями по научной системѣ, слѣдуетъ держаться прямо, употребляя для этого даже легкіе, не стѣсняющіе грудь аппараты; слѣдуетъ часто лежать въ вытянутомъ положеніи;

б) при высшемъ развитіи золотуха переходитъ въ головную водянку, страданіе бугорками (чахотка, бугорки въ мозгу), дѣвичью немочь, сухотку желѣзъ или брюшную чахотку, о чемъ см. ниже изнурительныя болѣзни. Въ болѣе преклонныхъ лѣтахъ возникаетъ ожирѣніе печени, ракъ и т. д.

Весьма и весьма часто методическое употребленіе нашихъ средствъ (въ хроническихъ случаяхъ принимать слѣдуетъ рѣдко, но впродолженіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ) приводитъ къ полному выздоровленію, въ особенности, если этому содѣйствуетъ соотвѣтственный образъ жизни, который при благопріятныхъ условіяхъ часто уже самъ по себѣ творитъ чудеса (для этого необходимы легкая, питательная пища, въ особенности легкія мясныя блюда, но безъ картофеля и хлѣба, немного зелени, свѣжій воздухъ, чистота, купанье, плаваніе, гимнастика).—Главными средствами всегда будутъ: **Baryt.**, **Brom.**, **Calc. carb.**, **Con.**, **Iod.**, **Mercur.**, **Silic.**, **Sulphur**, хотя иногда нѣкоторые особенные симптомы и требуютъ другихъ лѣкарствъ. Употребленіе *рыбьяго жира*, *ваннъ изъ морской соли* и *разсола*, употребленіе *Аделейской*, *Галлерской*, *Крейцнахской* минеральныхъ водъ и т. п., все, это главнымъ образомъ основывается также на заключающихся въ этихъ веществахъ частицахъ *іода* и *брома*.

Вотъ еще нѣкоторыя новыя средства: *Chimaphila*; по свидѣтельству преимущественно аллопатовъ, дѣйствіе его сходно съ дѣйствіемъ рыбьяго жира, іода и желѣза; еще недостаточно изслѣдовано. *Iris*, при накожныхъ болѣзняхъ, прыщахъ и другихъ золотушныхъ страданіяхъ. Сходно по дѣйствію съ меркуриемъ.

11. Ломота,

arthritis.

Ломота есть болѣзнь внутренняя, и будучи основана на ненормальномъ составѣ крови (излишекъ мочевиныхъ и фосфорнокислыхъ солей, негодныхъ частицъ крови), она родственна геморрою, полнокровію нижней части живота, каменной болѣзни. Она бываетъ наследственной или является вслѣдствіе слишкомъ невоздержной жизни (ломота у богатыхъ, въ особенности послѣ чрезмернаго употребленія винограднаго вина) или вслѣдствіе недостатка въ необходимомъ (ломота у бѣдныхъ). Болѣзнь эта является не въ первомъ уже возрастѣ, приблизительно отъ 35 до 70 лѣтъ, поражаетъ болѣе мужчинъ, нежели женщинъ, и начинается съ разстройства пищеваренія, причемъ образуются кислоты, является изжога, рвота, поносъ, всякаго рода страданія желудка, моча даетъ осадокъ. По временамъ образующіяся въ организмѣ соли отлагаются въ формѣ известковыхъ пластовъ на кости и производятъ воспаленіе ихъ, являются выпоты, шишки, острые припадки съ лихорадкою, потомъ, рожеобразнымъ воспаленіемъ и опуханіемъ пальцевъ на ногахъ или другихъ костей и суставовъ; или болѣзнь принимаетъ хроническій характеръ и производитъ наконецъ неровныя, горбовидныя опухоли, контрактуры (сокращенія), затвердѣлости, искривленіе костей и сухотку мускуловъ, особенно у суставовъ, причемъ члены обезображиваются, пальцы искривляются и т. п. На ряду съ этимъ — плохое пищевареніе, геморроидальное состояніе, страданія почекъ, являются легочный катарръ, отложенія на сердцѣ, а вслѣдствіе этого припадки удушія (астма). — У лицъ, сильно разстроенныхъ физически, ломота является въ формѣ атонической, т. е. она бываетъ такъ упорна, что въ организмѣ невозможна никакая реакція. Скрытною она называется, когда различныя внутреннія страданія

указываютъ на ломоту, какъ на причину, отъ которой они зависятъ; сюда относятся воспаленія, страданія сердца. Такъ называемая правильная ломота иногда поражаетъ малые суставы ногъ (подагра), въ особенности суставы большого пальца и плесневую кость; сначала бываетъ сильная сверлящая, ухудшающаяся ночью боль, а затѣмъ является рожевидное воспаленіе сустава; иногда бываетъ поражена рука (хирогра). Неправильная ломота поражаетъ большіе суставы, каковы колѣна, локтевые суставы, голову и другія части. Когда ломота переходитъ съ одного мѣста на другое, она называется также летучею и въ такихъ случаяхъ она легко становится опасной. То же самое случается, когда выдѣленіе наружу было задержано простудой, ложнымъ лѣченіемъ и т. п., и вслѣдствіе того поражаются внутреннія части, это — такъ наз. лomotныя метастазы (переходъ страданія съ одного органа на другой), вслѣдствіе которыхъ легко могутъ явиться воспаленія легкихъ и живота, болѣзни сердца, удушіе, ударъ, параличъ, водянка и т. д. Острые припадки излѣчить легче, нежели хроническую ломоту.

Въ случаяхъ острыхъ особенно полезны: **Acon.**, **Arnic.**, **Bellad.**, **Bryonia**, **Colch.**, **Mangan.**, **Mercur.**, **Rhus tox.**, **Sab.**, — противъ хроническихъ формъ: **Calcarea carb.**, **Caust.**, **Chin.**, **Ferrum**, **Mangan.**, **Sulphur**, — также **Iod.**, **Ledum** (см. прим.).

Такъ какъ припадки часто имѣютъ характеръ ревматическій, и поражены бываютъ тѣ же части, какъ при ревматизмѣ (чтобы различить эти два страданія, слѣдуетъ обратить вниманіе на общее состояніе организма, особенно на упомянутый выше составъ крови и на состояніе пищеваренія), то я ссылаюсь на слѣдующую главу (ревматизмъ) относительно ближайшаго опредѣленія дѣйствія упомянутыхъ здѣсь лѣкарствъ, которыя отчасти употребляются и тамъ; здѣсь скажу, что изъ подходящихъ лѣкарствъ дѣйствуютъ:

Aconit. — 2. особенно противъ лихорадочнаго состоянія.

Arnica — 2. противъ летучей ломоты, подагры съ опухолью, боли какъ отъ вывиха.

Belladonna — 2. противъ лихорадочныхъ припадковъ съ рожевидной краснотой, напряженіемъ, приливомъ крови.

Bryonia — 2. въ тѣхъ же случаяхъ, если боли усиливаются отъ движенія, если при этомъ разстройство пищеваренія или отравленій желчи.

Colchicum — 2. особенно если поражены большіе суставы, плечи, колѣна, локти, при боли въ костяхъ, чувствѣ онѣмѣнія, дерганіи.

Manganum — 3. при хронической и воспалительной ломотѣ въ суставахъ, при летучей ломотѣ съ опуханіемъ суставовъ, колотьемъ, подергиваніемъ, рвущей болью въ опухоли, болью какъ отъ вывиха или отъ напряженія, ночью боль хуже, а при переměнѣ погоды — нестерпима, поражаетъ одинъ суставъ за другимъ.

Mercur. viv., Merc. solub., и Merc. sublim. — 3. Главные средства въ острыхъ формахъ ломоты, особенно при сверлящихъ боляхъ въ костяхъ, когда отъ теплоты въ постели чувствуется ухудшеніе, потъ не приноситъ облегченія, являются: опухоль и припуханіе костей, лихорадка, безпокойство (*Merc. sublim.* дѣйствуетъ очень хорошо и противъ застарѣлыхъ хроническихъ недуговъ этого рода).

Rhus toxicodendron — 2. Употребляется болѣе въ острыхъ формахъ, при опуханіи суставовъ, одеревянѣніи, чувствѣ онѣмѣнія, тянущихъ, рвущихъ боляхъ, отъ теплоты лучше, отъ покоя хуже.

Sabina — 2. Особенно противъ подагры, когда при этомъ блестящая, красная опухоль, сильныя боли въ костяхъ, чувство недомоганія; при блуждающей ломотѣ, когда попеременно бьются поражены пальцы ногъ и рукъ, съ рвущимъ колотьемъ въ опухшихъ суставахъ, онѣмѣніемъ, всеобщимъ недомоганіемъ; если прохладный воздухъ, вообще прохлада облегчаетъ боли, и если бываетъ потребность переменить положеніе тѣла.

Эти средства дѣйствуютъ главнымъ образомъ противъ острыхъ и хроническихъ формъ ломоты; но важной задачей медицины все-таки остается радикальное излѣченіе ломоты, т. е. лежащихъ въ основаніи ея разстройства пищеваренія и дурнаго качества крови, для предупрежденія возврата болѣзни и чтобы, на сколько это возможно, произвести всасываніе выдѣленій въ суставахъ, костяхъ и т. д.

Главное средство для радикальнаго излѣченія — **Sulph.** (давать 3-е растираніе, но рѣдко, не болѣе 2 — 3 разъ въ недѣлю), которое соотвѣтствуетъ всей суммѣ симптомовъ; затѣмъ слѣдуетъ **Calc. carb.** 3., особенно при разстройствѣ пищеваженія, **Silie** 3. — противъ ломоты въ костяхъ и суставахъ и находящихся въ связи съ этимъ страданій костей, и **Iod.** въ видѣ **Kali jodatum.**

Примѣчаніе. Чѣмъ труднѣе излѣчить болѣзнь, тѣмъ болѣе обыкновенно предлагаютъ лѣкарствъ, поэтому и противъ ломоты существуетъ еще много средствъ, хотя дѣйствіе нѣкоторыхъ извѣстно только на бумагѣ. Не говоря о другихъ средствахъ, которыя при извѣстныхъ обстоятельствахъ, быть можетъ, приносятъ пользу, я укажу на нѣкоторыя средства, которыя помогали во многихъ случаяхъ. Сюда относятся: **Guaj.** 3., **Her. Sulph.** 3., **Iod.** 3., **Led.** 3. (последнее особенно противъ подагры, ломоты въ суставахъ, сокращеній). Если ломота явилась слѣдствіемъ излишняго употребленія вина — **Antim.** 2., если отъ половыхъ излишествъ, при безсиліи — **Chin.** 1., **Acid. phosph.** 2. При пораженіи колѣна даютъ **Baryt.** 3.

Въ последнее время я достигъ чудесныхъ результатовъ посредствомъ методическаго употребленія **Kali jodatum** въ довольно сильныхъ приемахъ и съ частыми промежутками (т. е. принимать напр. 2 недѣли, а затѣмъ недѣлю не принимать); лѣченіе удавалось даже при явившемся уже параличѣ движенія вслѣдствіе сокращенія и срастанія суставовъ.

Страдающіе ломотой много грѣшили противъ правилъ діеты, а потому имъ приходится при лѣченіи особенно ревностно слѣдовать ея предписаніемъ. Больные изъ достаточнаго класса должны довольствоваться легкой пищею, избѣгать преимущественно спиртныхъ напитковъ и частыхъ мясныхъ блюдъ. Но существуютъ больные ломотою, составъ крови у которыхъ такъ плохъ, что слѣдуетъ поправить дѣло посредствомъ питательной пищи.

Изъ новыхъ средствъ — *Asocynum androsemfolium*, при ломотѣ въ правомъ плечѣ и правомъ колѣнѣ, въ большомъ пальцѣ ноги, со рвотою желчью, поносомъ; **Eupat. purp.** (извѣстно только эмпирически).

12. Ревматизмъ.

(Сюда относятся: ревматическая лихорадка; сѣдалищная боль, *ischias*; боль въ поясницѣ.)

Ломота — болѣе внутренняя болѣзнь, зависящая отъ порчи соковъ, образованія кислотъ или избытія пищи; ревматизмъ же поражаетъ только мускулы, сухожилье, надкостныя плевы, суставы, лимфатическія плевы, оболочки нервовъ, является во всѣхъ возрастахъ и встрѣчается чрезвычайно часто; возникаетъ онъ, повидимому, отъ задержанныхъ испареній, которыя производятъ болѣзненное раздраженіе. Ревматизмъ является отъ причинъ внѣшнихъ, особенно отъ простуды, сыраго жилья, сквознаго вѣтра, нездороваго климата, выражается онъ въ формѣ нервныхъ болей, невралгій (ревматалгій) или воспаленія и поражаетъ или мускулы (=ревматизмъ въ мускулахъ), или суставы (=ревматизмъ въ суставахъ). Является онъ въ формѣ или острой (отдѣльные припадки или лихорадка), или длительной (хронической), поражаетъ одну часть тѣла или переходитъ съ одной на другую. При лихорадкѣ, особенно при ревматизмѣ въ суставахъ — наиболѣе опасной формѣ ревматизма, ибо здѣсь обыкновенно поражается одинъ суставъ за другимъ — легко могутъ возникнуть чрезвычайно опасныя воспаленія околосердечной сумки и сердца (вслѣдствіе отложенія тамъ ревматическаго вещества), даже поврежденіе мозга, иногда съ весьма тяжкими послѣдствіями (воспаленіе мозговой плевы, выпотѣнія и т. д.). Особенности виды ревматизма суть сѣдалищная боль и боль въ поясницѣ. Нервный ревматизмъ причиняетъ иногда чрезвычайно сильныя боли, а если онъ произвелъ органическія измѣненія въ нервныхъ оболочкахъ или даже въ самыхъ нервахъ, что часто случается при сѣдалищной боли, то бываетъ также весьма упоренъ. Сѣдалищная боль зависитъ отъ поврежденія или мускуловъ бедра или нервовъ бедра и лядвей. Такъ какъ съ этимъ легко смѣшать воспаленіе и другія болѣзни бедреннаго и лядвейнаго суставовъ, которые при запущеніи легко могутъ сдѣлаться опасными (особенно для способности движенія), то слѣдуетъ поскорѣе обратиться къ врачу. — Боль въ поясницѣ, которая является обыкновенно внезапно, при нагибаніи, надѣваніи обуви и т. п., основывается или

на простудѣ, или на застоѣ крови въ нижней части живота, или также на порваніи или растяженіи мелкихъ (микроскопическихъ) мускульныхъ пучковъ.

Въ острыхъ случаяхъ полезны преимущественно: **Aconit., Bellad., Bryon., Cham., Mercur., Puls., Rhus;**

въ случаяхъ хроническихъ: **Arsen., Colch., Ferr., Sulph.;** противъ боли въ поясницѣ: **Arnica.** (внутри и снаружи), **Ledum, Rhus tox.,** а при запорѣ, геморроѣ — **Nux vom., Sulph.** противъ сѣдалищной боли: **Coloc., Nux vom., Puls., Rhus tox.** — также **Arsen., Bellad., Bryon., Lycop.**

Aconitum — 2.

Лихорадочныя припадки съ жаромъ, жаждою; колотье и рвущія боли, хуже ночью, отъ вина, горячительныхъ напитковъ, прикосновенія, движенія, душевныхъ потрясеній. При пораженіи сердца или грудной плевы.

Arnica — 2.

Чувство какъ отъ вывиха или ущемленія, расслабленіе, зудъ въ страдающихъ частяхъ. *Опухоль* красна, глянцевита, жестка на осязаніе. — *Безпокойство*, побуждающее двигать больную часть.

Arsenicum — 3.

При очень сильной боли, возбуждаемой сухимъ холодомъ. Жженіе, ломъ, ночью невыносимы; холодъ усиливаетъ, теплота умѣряетъ боли.

Belladonna — 2.

Острые припадки. Опухоль, колотье, жженіе, хуже ночью и отъ движенія, съ глянцевитой, *рожевидной краснотой*, электрическимъ подергиваніемъ. *Блуждающія боли*, давящій ломъ въ костяхъ, лихорадка съ жаромъ и *примивомъ крови*, биеніе въ головѣ, сердцѣ и проч.

Bryonia — 2.

Острые и хроническіе припадки; стягиваніе, ломъ, съ колотьемъ при движеніи; въ суставахъ, въ мускулахъ, особенно грудныхъ; блуждающія боли; красная блестящая или блѣдная, натянутая опухоль, съ одеревянѣніемъ, ознобомъ и жаромъ, причѣмъ разстройство отправления *желчи или желудка*, лихорадочное безпокойство, сердитое настроеніе духа, кислый потъ. — Давленіе,

движеніе, ночное время, усиливаютъ боли.

Chamomilla — 2.

Въ болѣе *нервныхъ* припадкахъ, при потягиваніи, ломѣ, чувствѣ онѣмѣнія, особенно *ночью*, въ сухожильѣ, связкахъ, мускулахъ, нервныхъ оболочкахъ, безъ припуханія, съ лихорадочнымъ *безокойствомъ*, сердитымъ настроеніемъ духа. Лихорадка, проявляющаяся въ потѣ и *ознобѣ*, съ краснотою щекъ. Лучше при сидѣніи и движеніи.

China — 2.

Ревматизмъ отъ сквознаго вѣтра, злоупотребленія ртутью. — *Ревматическое опъмнѣніе*, особенно *острое* съ опухолью. Характеристическіе признаки: боль усиливается отъ *прикосновенія*, *движенія*; *является периодически*, *ночью*, съ онѣмѣніемъ, слабостью, подергиваніемъ, напряженіемъ, подергивающимъ ломомъ, бѣніемъ жилъ, лихорадкою съ потомъ.

Colchicum — 1 или тинкт.

При *пораженіи суставовъ* безъ опухоли и красноты, особенно также, когда бываютъ поражены большіе суставы, плечи, локти, колѣна. Слѣдствія простуды отъ сырости, мокроты *осенью и весной*.

Всеобщая чувствительность и раздражительность; односторонняя боль. Ломъ, колюще, тянущее дерганіе чрезъ страждущую часть, до *кости*, особенно въ теплую погоду; въ холодную погоду: колюще, чувство онѣмѣнія въ частяхъ, хуже вечеромъ, отъ движенія и прикосновенія; ночью невыносимо; темная моча съ осадкомъ; ночью жаръ и жажда; желтый цвѣтъ кожи, расстройство желудка. Лицамъ раздражительнымъ, склоннымъ къ *потѣнью* и *образованію кислотъ* и имѣющимъ нѣжную кожу.

Colocynthis — 3.

Съдамлициная боль, какъ будто суставъ прикрѣпленъ *скобками* къ тазу и крестцовой кости, съ болью внизъ до ступни, *щемленіе и давленіе*, потягиваніе, чувство онѣмѣнія. Ходить трудно, боли доводятъ до отчаянія.

Ferrum — 2.

Преимущественно при *ревматизмѣ* въ верхней части рукъ и при *ревматическомъ опъмнѣніи*, особенно плечнаго сустава; форма *нервныхъ болей*, усиливающихся отъ движенія, *ночью* отъ *теплоты въ постели*, когда поражено нѣсколько частей за разъ, сильное колюще и ломъ, при *блѣд-*

номъ митъ, истуданіи, общій порчь крови, оводянніи ея; у людей пожилыхъ.

Mercurius vivus, Merc. sol. или
Merc. sublim. — 3.

Важное средство въ острыхъ формахъ, при пораженіи какъ мускуловъ, такъ и суставовъ и костей, когда боль является при каждой переѣнѣ погоды. Симптомы: колотье, ломъ, жженіе, болѣе ночью, отъ постельной теплоты, на открытомъ воздухѣ; твердо сидящая опухоль; чувство жара и холода, мигорающее состояніе, вечеромъ и ночью сильное безпокойство, біеніе, потъ безъ облеченія. (При сѣдалищной боли особенно помогаетъ Merc. sublimat.)

Nux vomica — 2.

Главное средство противъ боли въ поясницѣ, но и въ другихъ случаяхъ, если чувствуется напряженіе, подергиваніе въ спинѣ, ляшкахъ, груди, суставахъ, съ блѣдной опухолью, параличъ или онѣмѣніе въ страдающей части.

Подергиваніе мускуловъ. Отвращеніе къ свѣжему воздуху.

Особенно полезно противъ ревматизма въ области спины, с... дающимъ геморроемъ, холерикамъ, шпохондрамъ, совмѣстно съ разстройствомъ пищева...

запоромъ, иоловной болью. — Боли ночью или періодическія, являющіяся особенно рано утромъ.

Pulsatilla — 2.

Болѣе легкія формы мускульнаго ревматизма, боли въ крестцѣ, ischias, также при опухолью на большихъ суставахъ; блуждающія боли, особенно вечеромъ или ночью, а именно: потягиваніе, ломъ, подергиваніе, въ постели, отъ комнатнаго тепла, переменныя положенія. — Колотье и холодъ при переѣнѣ погоды. Боли умѣряются отъ обнаженія большихъ членовъ и на открытомъ воздухѣ, вновь появляются при возвращеніи въ жилище. При ознобѣ, отсутствіи жажды, блѣдности, малокровіи; лицамъ флегматичнымъ, слезливымъ, чувствительнымъ (женщинамъ и дѣтямъ) особенно полезно.

Rhododendron chrys.

Хроническій ревматизмъ — 2.

въ крестцѣ), если онъ мизмъ (болѣе) сѣя отъ холоднаго. ухуждаетъ духа, при кажесъ суроваго воздуха, особенной переменный положеніе, р... отъ вѣтра; потягиваніе, р... вущія боли въ членахъ и суставахъ; ночью и во время сна хуже; чувство одеревянѣнія и онѣмѣнія послѣ болей; периодическій ломъ нижнихъ конечностей.

шекъ. Опухоль на суставахъ, при переменѣхъ погоды хуже, — боль въ поясницѣ до мошонки и чревнаго кольца. Ревматическая личная боль.

Rhus toxicodendron — 3.

Острыя и хроническія формы боли *сѣдалищной и въ поясницѣ*. Опухоль на суставахъ, ревматизмъ съ искривленіемъ, одеревянѣніемъ, *онѣмѣніемъ*. Когда состояніе такого рода является послѣ *просьртня*, при переменѣхъ погоды, и сопровождается *потягиваніемъ*, рвущей болью, напряженіемъ, особенно чувствомъ боли какъ отъ *вывиха*, съ *онѣмѣніемъ*, *зудомъ*. Весьма подходитъ, когда отъ *теплоты мучше*, отъ *покоя* — *хуже*. Также весьма дѣйствительно противъ *нервнаго* ревматизма (ревматалгія), противъ лихорадки съ слабостью, указывающей на нервное разстройство.

Sulphur — 3.

Важное средство особенно при хроническихъ формахъ, по-

Примѣчаніе. Изъ большого числа средствъ, которыя рекомендуютъ противъ ревматизма, если упомянутыхъ выше окажется мало, мы укажемъ еще на слѣдующія: а) противъ ревматизма въ *суставахъ*: *Нер. sulph* (особенно послѣ злоупотребленія ртутью), **Iod.** (послѣ сифилиса, употребленія ртури; если болѣзнь зависитъ отъ золотушливости, но и въ другихъ упорныхъ формахъ, когда понемногу поражаются различныя суставы и кости, напр.

раженіи суставовъ, страданіи костей и мускуловъ. При искривленіи, одеревянѣніи. Послѣ *злоупотребленія меркуріемъ*. — При *геморрой*, страданіи нижней части живота, полнокровіи. — Для противодѣйствія расположенію къ этой болѣзни.

Tartarus stibiatus — 2.

Острый и хроническій ревматизмъ въ мускулахъ и особенно въ *суставахъ*, съ незначительной болью, краснотой, опухолью, которая поражаетъ нѣсколько частей за разъ; когда бываетъ судорожное стягиванье мускуловъ, особенно если при этомъ разстроено пищевареніе.

Zincum — 2.

Особенно *нервные* и судорожныя формы *ревматизма въ мускулахъ и суставахъ*, съ *блуждающей болью*; рвущія, тянущія боли во всѣхъ частяхъ тѣла, *онѣмѣніе*, *трясеніе*. *Подергиваніе мускуловъ*, чувство стѣсненія, подергиваніе, вскакиваніе во снѣ. Отъ разгоряченія и движенія хуже.

ребра, позвонки, особенно дѣйствительно въ формѣ **Kali iodatum**, сравни выше «ломоту»), **Silic.**, *Thuja* (бьющее колотье, щелканіе при вытягиваніи, хуже въ теплѣ и покоѣ, ночью; вздутіе подкожныхъ венъ); въ частности противъ ревматизма въ суставахъ ногъ и рукъ: *Ruta*; в) противъ *хроническаго ревматизма* вообще: *Carb. veg.*, *Her. sulph.*, **Lycop.** (тянущая и рвущая боль, болѣе ночью и въ покоѣ, съ одеревянѣніемъ мускуловъ и суставовъ и съ чувствомъ онѣмѣнія), **Phosphor.** (рвущія, тянущія боли, напряженіе, при малѣйшей простудѣ, съ головной болью, головокруженіемъ, одышкой, слабостію и пр.), **Causticum** (боли на открытомъ воздухѣ невыносимы, въ комнатѣ и постели легче; рвущія боли, колотье съ чувствомъ онѣмѣнія и одеревянѣніемъ суставовъ). При слабомъ пульсѣ, усиленномъ сердцебіеніи и задержаніи мочи, противъ лихорадочнаго ревматизма можетъ хорошо подѣйствовать и **Digital.** При пораженіи сердца важны *Spigel.* и *Arsenic.* (см. болѣзни сердца). Противъ боли въ поясницѣ весьма дѣйствительно втираніе тинктуры *Belladonna*, нѣсколько капель на чайную ложку прованскаго масла; е) при сѣдалищной боли наиболѣе вниманія заслуживаетъ *Lycopod.*

Въ тѣхъ случаяхъ, когда подходит *Bryonia*, преимущественно при ревматизмѣ съ опуханіемъ мягкихъ частей, я не могу достаточно нахвалиться дѣйствіемъ этого средства при наружномъ употребленіи (3 капли тинктуры или 5 капель 1 дѣленія на чайную ложку виннаго спирта) его въ формѣ втиранія. Этимъ способомъ я часто излѣчивала упорныя боли и одеревянѣнія.

Относительно сходныхъ явленій, особенно при пораженіи костей, мы ссылаемся на предъидущую главу: *ломота*.

Сюда относится множество новыхъ средствъ. Противъ ревматизма вообще: *Aroc. andr.* (см. въ концѣ предъид. статьи), *Baptisia tinctoria* (лихорадочный ревмат.), *Cact. grandiflorus* (ревм. въ мускул., угрожающій пораженіемъ сердца, съ чувствомъ стягиванія въ послѣднемъ), *Caulophyll.* (ревм. суставовъ руки и пальцевъ съ значительнымъ опуханіемъ, или при блуждающихъ боляхъ въ спицѣ, шеѣ, съ одеревянѣніемъ, давленіемъ въ груди, одышкой, нервнымъ состояніемъ, бредомъ); *Eupat. perfoliatum* (при потѣ, боли въ костяхъ, опухоли на суставахъ), *Gelsemium* (при лихорадкѣ и безъ нея), *Ham.* (при опухоли на суставахъ), *Phytol.* (хроническій

ревм. съ глухими болями, съ опухашемъ и безъ него, хуже при переменѣхъ погоды, одеревянѣлость шеи), **Sanguin. can.** (при ревмат. боляхъ въ бедра и другихъ мѣстахъ, хуже при вставаніи, члены какъ будто сломаны; колотье, одеревянѣлость, судороги, потягиваніе; большая слабость въ крестцѣ, острее опуханіе суставовъ; воспалительный ревматизмъ; боль особенно тамъ, гдѣ кости покрыты только кожей); *Veratr. vir.* (особенно для лѣваго плеча, бедра, колѣна).

При невралгическомъ ревматизмѣ: *Apoc. andr.*, *Cimicifuga racemosa*, послѣднее и при лихорадкѣ, оба противъ мигрени; при ревматизмѣ въ суставахъ преимущественно: *Cauloph.*, *Collins.*, *Sticta pulmonaria* (съ сильнымъ колотьемъ); — при *спинальной боли*: *Cimic.*, *Phytol.* (въ наружной сторонѣ бедра давленіе, колотье, потягиваніе, хуже отъ давленія, движенія, ночью.).

Что касается до *пріема* лѣкарствъ, то не слѣдуетъ увлекаться чрезмѣрными дозами и частымъ повтореніемъ. Лишь весьма острые случаи съ лихорадкой и чрезмѣрной болью, какъ напр. при *спинальной боли*, могутъ служить исключеніемъ. Рѣдко приходится давать лѣкарство съ пользой чаще чѣмъ черезъ 3 часа, въ большинствѣ случаевъ достаточно бываетъ давать его одинъ или два раза въ день, а для радикальнаго излѣченія еще рѣже, — даже черезъ день. Слѣдуетъ избѣгать чрезмѣрно теплой одежды и стараться укрѣпить свое тѣло посредствомъ вытиранія по утрамъ холодно-сырыми (т. е. обмокнутыми въ холодную воду и затѣмъ выжатыми) полотенцами, при соблюденіи необходимыхъ предосторожностей. При остромъ ревматизмѣ въ суставахъ я видѣлъ отличный успѣхъ отъ употребленія такъ называемыхъ компрессовъ Присница, холодно-сырыхъ, сверхъ которыхъ кладется шерстяная матерія; прикладываются они только къ больному мѣсту. Чтобы произвести потъ на пораженныхъ суставахъ, это — наилучшее средство; при ломотѣ же слѣдуетъ предпочесть покрываніе клеенкой и ватой, если нѣтъ признаковъ воспаленія.

13. Водянки, *hydropses*.

Всеобщая водянка; подкожная водянка, водянка клетчатой ткани, называемая также отекомъ, *anasarca* и *oedem*; мозговая водянка, *hydrocephalus*; грудная водянка; водяная околосердечной сумки, *hydropericardium*; водяная легкихъ, водянка груди, *hydrothorax*; водяная живота, *hydrops ascites*; — мошонки, *hydrocele*; — матки, *hydrometra*; — яичниковъ *hydrops ovarii*; — желчнаго пузыря, *hydrops cystidis felleae*; — фаллопиевыхъ трубъ, *hydrops tubarum*; — почечной чашечки, *hydronephrose*; — суставовъ, особенно колѣнъ, *hydrops articularis*, *hydrarthros*; — почекъ, или отдѣленіе мочи, содержащей много бѣлковины, *albuminuria*, *morbus Brightii*.

Водяная всегда бываетъ лишь симптомомъ другаго, лежащаго глубже въ организмъ недуга, большею же частію его исходомъ. Лѣченіе водяной, особенно въ хроническихъ случаяхъ, труднѣе, чѣмъ всякой другой болѣзни, потому что для радикальнаго излѣченія надо дѣйствовать на основную причину и на общее состояніе болѣзни, и сообразно съ этимъ весьма осмотрительно выбирать лѣкарство, а на ряду съ этимъ симптомы водянки часто грозятъ опасностью жизни, и ихъ бываетъ необходимо устранить во что бы то ни стало, — сложная задача, которая представляетъ часто недолжныя трудности даже для врача.

Острыя, т. е. внезапно наступающія послѣ острыхъ болѣзней водянки скорѣе можно излѣчить (особенно тѣ, которыя случаются послѣ сыпей, какъ напр. скарлатины), нежели хроническія, которыя основываются или на всеобщемъ оводянѣніи крови, или на органическихъ недугахъ отдѣльныхъ органовъ. Первые, происходящія отъ порчи крови, суть слѣдствія недостатка пищи и потери здоровыхъ соковъ, поэтому они являются особенно послѣ кровотеченія или зависятъ отъ другихъ болѣзней, которыя разстраиваютъ все питаніе тѣла, каковы, напримѣръ, болѣзни сердца. Изъ органическихъ частей чаще всего подвергаются водяной: мозгъ (напр. послѣ воспаления), легкія, сердце и большіе сосуды (вслѣдствіе органическихъ недуговъ), печень, селезенка, яичники, желѣзы нижней части живота, почки (особенно когда онѣ отдѣляютъ бѣлковину), а изъ тка-

ней — особенно кожистыя части грудной плевры и брюшины, околосердечной сумки, суставовъ, мошонки. Водянка обыкновенно сопровождается также или бываетъ исходомъ многихъ изнурительныхъ болѣзней, какъ напр. рака, буторчатки. Если происходитъ продолжительное задержание мочи, то легко можно подозрѣвать водяную.

Если моча содержитъ бѣлковину (о чемъ можно узнать посредствомъ варки, химическаго и микроскопическаго изслѣдованія), то въ большинствѣ случаевъ можно подозрѣвать органическое вырожденіе почекъ, т. е. Брайтову болѣзнь. (Мы говоримъ въ большинствѣ случаевъ, потому что отдѣленіе бѣлковины имѣетъ мѣсто и при другихъ недугахъ, послѣ скарлатины, при малокровіи и т. п., но никогда не слѣдуетъ пренебрегать этимъ явленіемъ.) Болѣзнь эта начинается съ воспалительныхъ симптомовъ и выпотѣнія, часто весьма скрытнаго характера, и оканчивается органическимъ вырожденіемъ выдѣляющихъ мочу частей почекъ, съ опасной формой водяной, проявляющейся въ разложеніи крови, которое развивается сначала въ кожѣ, а затѣмъ и во внутреннихъ полостяхъ. Можетъ оно идти быстро, а также продолжаться годы. Изцѣленія случаются въ молодомъ возрастѣ и при пораженіи лишь одной почки.

Слѣдующія средства, расположенные по пораженнымъ частямъ, наиболѣе приносятъ пользы.

- 1) Водяная мозга: **Apis, Arsen., Bryon., Helleb., Merc., Sulph.**
- 2) Водяная груди: а) свободное изліяніе въ полости: **Digit., Squill.**; б) вслѣдствіе недуговъ сердца: **Arsen., Digit., Kali carb., Spig.**; в) при водѣ въ легкихъ, такъ называемомъ отека въ легкихъ (водяная въ легкихъ, которая имѣетъ слѣдствіемъ сильное удушеніе): **Arsen., Phosph., Tart. stib.** (если — хрипѣніе, необходимость сидѣть прямо).
- 3) Водяная живота, большею частію зависящая отъ органическихъ недуговъ отдѣльныхъ частей: **Arsen., Hell.,** также **Bryon., Iod., Lycop., Sulph.,** рѣже *Chin., Ferr.*
- 4) Подкожная водянка: **Arsen., Helleb.,** также **Apis, Bryon., Colech., Iod., Merc., Sulph.**
- 5) Брайтова болѣзнь: **Apis, Arsen., Merc. jod., Nitri acidum.**
- 6) Общая водянка вслѣдствіе порчи крови: **Arsen.,** также **Chin., Ferr., Helleb., Sulphur.**

Въ частности:

Arsenicum — 3.

Во всѣхъ формахъ водянки. Слѣдствіе *недуговъ* кожи, мозга, сердца, легкихъ, живота (матки, яичниковъ, особенно почекъ). При истощеніи, исхуданіи, ознобѣ, темномъ цвѣтѣ лица, — въ періодѣ *изнеможения* и *полнаго разстройства*. *Стѣсненіе въ груди* съ удущемъ, особенно при лежаніи на спинѣ; *сильная жажда*, красный, сухой языкъ, слабый пульсъ, *изнурительная мигорадка*, ломъ въ членахъ. При водяной въ груди главными признаками служатъ *принадки удущья*, *сильная тоска* ночью.

Bryonia — 2.

Противъ *легкихъ* формъ припуханія *внутренностей живота*, (рѣже при *подкожной водянкѣ*), когда прочія явленія, особенно желудочныя и желчныя, указываютъ на это средство; также въ первую стадію *водяной мозга*. При водяной груди только какъ вспомогательное средство противъ кашля, колотья въ боку. Большею частью въ острыхъ случаяхъ и какъ промежуточное средство.

China — 2.

Противъ водяной съ *слабостью*, послѣ *потери соковъ*;

при недугахъ *воротныхъ венъ*, *поджелудочной желъзы*, печени, селезенки, матки. Подкожная водянка, водянка живота съ органическимъ вырожденіемъ органовъ нижней части живота, чрезвычайной слабостью, блѣдностью лица, слабымъ пульсомъ, тягостнымъ, порывистымъ кашлемъ съ стѣсненіемъ дыханія, при задержаніи мочи, всеобщемъ оводненіи крови. (Принадлежить къ числу менѣе вѣрныхъ средствъ.)

Colchicum — 1.

Опуханіе кожи послѣ *промоchenія* въ сырую погоду. Послѣ *ревматизма*. Рѣже при *водянкѣ* живота. *Водяная груди* (околосердечной сумки?) съ невыносимымъ (по вечерамъ), *ввергающимъ въ отчаяніе*, по временамъ *усиливающимся стѣсненіемъ* дыханія, при быстромъ упадкѣ силы.

Digitalis — 1.

Имѣетъ часто лишь *палліативное* дѣйствіе, усиливая отдѣленіе мочи; но оно служитъ главнымъ средствомъ противъ *водяной груди*, *произшедшей отъ органическихъ пороковъ*, какъ-то — суженія и стѣсненія венъ, болѣзней артерій, органическихъ недуговъ легкихъ и сердца, суженія, стра-

данія кланановъ. При задержаніи мочи, слабомъ, нитеобразномъ, перемежающемся пульсѣ, стѣсненіи дыханія, опуханіи ногъ. Противъ водяной мозга — весьма не надежно. Замѣчательно, что *Digitalis* дѣйствуетъ мочегонно меньше въ видѣ тинктуры, чѣмъ въ формѣ настоя изъ 5—6 грановъ травы на 4—6 унцій воды.

Ferrum — 1.

Главное средство при малокровіи, дѣвичьей немочи, оводненіи крови. — Въ подобныхъ случаяхъ, какъ и *China*, особенно если злоупотребляли послѣдней, при опуханіи селезенки и водяной послѣ перемежающейся лихорадки. Особенно при брюшной водянкѣ или всеобщей, когда — земляной извѣтъ лица, исхуданіе, чрезвычайная слабость, ночные припадки, слабый, едва замѣтный пульсъ, дурное пищевареніе; давленіе послѣ ѣды, тошнота, рвота, запоръ.

Helleborus — 2.

Весьма сильно дѣйствуетъ на отдѣленіе мочи, особенно въ острыхъ, но и въ хроническихъ случаяхъ; поэтому полезно во всехъ формахъ водянки, особенно при подкожной водянкѣ, послѣ сыпей (скарлатины), при внезапномъ опуханіи и когда есть стра-

даніе почекъ (*Брайтова* болѣзнь); также весьма дѣйствительно при водянкѣ мозга, въ воспалительныхъ и длительныхъ случаяхъ брюшной водянки. Менѣе полезно при водяной груди, гдѣ можетъ служить только промежуточнымъ средствомъ. — Весьма полезно при опухоли половыхъ частей.

Iodium — 2.

Особенно въ хроническихъ формахъ, съ разстройствомъ, опуханіемъ, орубнѣемъ тканей, а потому преимущественно при брюшной водянкѣ (поджелудочной желъзы, печени, селезенки, почекъ, матки, яичниковъ, мошонки). Также и при подкожной водянкѣ. Рѣже при водяной въ груди, въ тѣхъ только случаяхъ развѣ, когда она произошла отъ утолщенія стѣнокъ сердца, ожирѣнія его, или при переходѣ ревматизма суставовъ на околосердечную сумку. (Дѣйствуетъ лучше въ формѣ *Kalium jodatam*, по 15 грановъ на унцію воды.)

Kali carbonicum — 2.

Преимущественно при подкожной и брюшной водянкѣ вслѣдствіе задержанія менструаций; также у людей пожилыхъ. Важное средство при водянкѣ послѣ не-

дуговъ сердца, когда — сильное утомленіе по вечерамъ, подниматься на верхъ и говорить трудно, стѣсненіе въ груди, одышка, сердцебіеніе.

Lycepodium — 2.

Въ *хроническихъ* случаяхъ, съ органическимъ измѣненіемъ *внутренностей живота*; главное средство при *пораженіи почекъ* и происходящей отъ того *водяной*; при *водяной груди*, когда притомъ чувство полноты, стѣсненіе, *тоска*, особенно *послѣ ужина*, *вздутость живота*, біеніе подъ ложечкой, сердцебіеніе — Рѣже при подкожной водянкѣ.

Mercur — 2.

Въ *острыхъ* случаяхъ, особенно *послѣ простуды, сыпей*, и въ *хроническихъ*, какъ промежуточное средство, когда существуетъ *воспалительное волненіе крови*, съ болью, опухолью, жаромъ, лихорадкою, потомъ, тоскою, стѣсненіемъ, короткимъ сухимъ кашлемъ, *ионосомъ*. При *подкожной водянкѣ*, но преимущественно при *водяной живота* съ недугами *печени, поджелудочной желѣзы, селезенки и почекъ*, при *водяной мошонки, матки, личишковъ*. — При *водяной мози* въ первомъ періодѣ развитія.

Spigelia — 2.

При *водяной груди*, особенно при *органическихъ страданіяхъ сердца*. (См. статью 21.)

Squilla — 2.

Дѣйствуетъ *сильно на отдѣленіе мочи*, а потому *полезно при всякъ формѣ* *водяной*, но особенно при *водяной груди* съ продолжительнымъ кашлемъ, изверженіемъ мокроты, стѣсненіемъ въ груди, *колотьемъ въ боку* ревматическаго свойства. (Дѣйствуетъ *повидимому болѣе на подреберную плеву*; поэтому не полезно при недугахъ сердца.) При *водянкѣ живота* нельзя употреблять съ увѣренностью. (Лучше принимать въ видѣ порошка изъ *луковницъ*, въ большихъ приѣмахъ.)

Sulphur — 2.

Въ *хроническихъ* формахъ, также какъ промежуточное средство для возбужденія реакціи, особенно при дезорганизациі тканей, преимущественно при *водяной нижней части живота*. — При *острой и хронической водянкѣ мози* оказывало полезное дѣйствіе.

Примѣчаніе. Само собою разумѣется, что кромѣ этихъ лѣкарствъ, при столь важной и трудно лѣчимой болѣзни, рекомендуютъ еще много другихъ средствъ. Мы упомянемъ признанныя наиболѣе полезными. Они суть: *Rhus* 2. (при водянкѣ груди и подкожной, послѣ сыней), *Calcarea* 2. (послѣ скарлатины, при золотухѣ), *Lachesis* 6. (при органическихъ недугахъ сердца), *Dulcamara* 2. (при подкожной водяной отъ простуды, послѣ скарлатины, съ ревматическими недугами), *Prunus spinosa* 2. (подкожная и водянка живота), *Lactuca* 2. (при водянкѣ груди и подкожной, съ сильнымъ опуханіемъ ногъ, живота, лица), *Sanguin.* (при водянкѣ груди), *Sambucus* 2. и *Solanum nigrum* 2. (водянки: подкожная и общая), *Euphorb. cyprariss.* 2., *Oleum terebinth.* 3. (водянки: брюшная и общая), *Coccus cacti.* (по моимъ опытамъ, особенно при брюшной водянкѣ), *Graphit* и *Silic.* 2. (водяная мошонка), *Aurum muriat.* 2. (противъ недуговъ печени и общей водянки), *Fluor. acid.* 3. по мнѣнію нѣкоторыхъ весьма облегчаетъ неизлѣчимую водяную грудь. **Apis** (тинктура изъ пчель) въ высокихъ и низкихъ дѣленіяхъ (30—3) также совѣтуютъ противъ всѣхъ формъ водянки, особенно противъ водяной мозга, подкожной и водяной груди, а въ послѣднее время я видѣлъ успѣхъ отъ *Aposuntum cannabinum* (чистой тинктуры по нѣскольку капель).

Изъ новыхъ средствъ — *Apos. andr.* (при пораженіи печени), и *Apos. cannab.* *) *Asclepias tuberosa* (послѣ скарлатины, воспаления почекъ), *Chimaph.* (противъ брюшной водянки, водянки почекъ и проч.), *Eupat. purp.*, *Helon.*, (подкожная водянка и др., вслѣдствіе слабости, малокровія, истощенія отъ кровотеченія), *Leptandria*, при страданіяхъ печени, послѣ воспаления воротной вены, дѣйствуетъ тонически [укрѣпляющимъ образомъ], какъ желѣзо и *Helonias*), *Senecio.* Для отдѣльныхъ формъ: при водяной мозга — *Apos. cann.*, *Ver. vir.*; при водяной груди — *Apos. cann.*; брюшная водянка — *Apos. c.* и *Senec.*; при водяной почекъ, бѣлковинѣ въ мочѣ — *Eup. purp.*, *Chimaph.*, *Helon.* (послѣ скарлатины).

При состояніи съ столь слабой реакціей, приемы лѣкарствъ въ большинствѣ случаевъ должны быть сильны и часты. Поэтому

*) Я самъ примѣнялъ съ успѣхомъ это средство противъ всеобщей водянки, но въ формѣ тинктуры!

Arsen., *Chin.*, *Ferrum.*, *Iod.*, *Lycopodium*, *Mercur.*, *Sulphur*, слѣдуетъ принимать часовъ черезъ 5 или 4, остальные лѣкарства еще чаще, черезъ 3—2 часа, по нѣскольку капель или щепоткѣ порошка (сколько помѣщается на кончикѣ перочиннаго ножа). Полезно также содѣйствовать отдѣленію испарины и мочи чрезъ тепло и ванитки, причѣмъ однако слѣдуетъ избѣгать лѣкарственныхъ часевъ, какъ напр. чай изъ петрушки и т. п.

Впрочемъ, слѣдуетъ указать на относящіеся сюда главы; т. п. относительно водинки мозга см. *воспаленіе мозга*, относительно водинки груди — *болѣзни сердца* и т. д.

14. Сахарное мочеизлученіе.

diabetes mellitus.

Въ здоровомъ состояніи печень производитъ небольшое количество сахару, но вслѣдствіе многочисленныхъ причинъ отдѣленіе сахара до того усиливается, что приноситъ вредъ всему организму. Болѣзнь эту можно узнать прежде всего по чрезвычайной, почти неутолимой жаждѣ, по усиленному отдѣленію мочи, насыщенной сахаромъ (для опредѣленія этого существуетъ нѣсколько способовъ химическаго анализа) — въ другихъ, менѣе опасныхъ болѣзняхъ, также часто является усиленное отдѣленіе мочи, но безъ примѣси сахара — странному запаху изо рта (исловатый, напоминающій запахъ яблока), исхуданію, не смотря на достаточную пищу. Позже могутъ являться еще слѣдующія признаки: рвота, поносъ, слабость, онѣмѣніе, слабость умственныхъ способностей, слабость зрѣнія, слѣпота, истощеніе, изнурительная лихорадка. Ходъ болѣзни медленный, излѣченіе случается довольно часто. Вѣрнѣе всего излѣчится въ Карлсбадѣ, Виии, Гантейнѣ, Рагацѣ и на другихъ водахъ. Дѣта состоятъ въ томъ, чтобъ избѣгать всѣхъ веществъ, образующихъ сахаръ; поэтому не слѣдуетъ употреблять растительную пищу, хлѣбъ, сахаръ, а напротивъ — азотистую, животную и жирную, слѣдовательно болѣе мясныя блюда.

Лѣкарства употребляются слѣдующія: *Arsenic.* (исцѣленія этимъ средствомъ извѣстны въ литературѣ), *Phosph.*, *Kalium iodatum.* Ганеманнъ совѣтовалъ: *Arg. foliat.* Испробовать можно: *Supr.*,

Phosphor. acid., Plumb., Sulph. Бэръ (Bähr) успѣшно употребляетъ **Uran. muriat.** Изцѣленіе посредствомъ пивныхъ дрожжей можно привести какъ куріозъ. Имѣя въ виду хорошее дѣйствіе щелочныхъ водъ (для питья), въ послѣднее время не безъ основанія рекомендуютъ фосфоробислый натронъ, углекислое кали.

Новыя средства: *Erig.*, **Helon.**, *Senec.*, *Tril.*, *Ver. vir* (?), но положительныхъ данныхъ для употребленія этихъ средствъ почти нѣтъ.

15. Ожирѣніе,

obesitas.

Смотря по причинамъ, производшимъ болѣзнь, употребляютъ: при золотушномъ тѣлосложеніи — **Calc. 3.**; при невозддержности въ пищѣ и питьѣ — **Antim. 2.**, а также **Arsen. 5.**, въ рѣдкихъ приѣмахъ, но долгое время; при болѣзняхъ печени, органовъ нижней части живота — **Iod. 3.**; при дурномъ составѣ крови, что часто бываетъ соединено съ ожирѣніемъ, — **Ferr. 2.**; при полнокровіи нижней части живота, ломотѣ и геморроѣ — **Sulph. 3.** Въ послѣднее время специально противъ этого состоянія совѣтуютъ **Fucus vesiculosus.** Само собою разумѣется, что употребленіе этихъ средствъ должно быть продолжительно, и что легкая пища, движеніе (гимнастика) и весь образъ жизни должны содѣйствовать лѣченію. Недавно вошелъ въ употребленіе т. п. англійскій способъ лѣченія (*Banting*), который состоитъ въ томъ, что избѣгаютъ всѣхъ веществъ, образующихъ жиръ, какъ напр. зелени (рисъ, крупа, стручковые плоды), молока, пива, сахара, мучныхъ блюдъ. Результаты этого лѣченія дѣйствительно замѣтны, но они рѣдко бываютъ продолжительны, и лѣченіе это часто приноситъ вредъ въ другомъ отношеніи. Съ осторожностью также слѣдуетъ прибѣгать къ разрѣшающему лѣченію въ Карлсбадѣ, Мариенбадѣ, Крейцнахѣ.

(16 — 20). Чахотки, изнурительныя болѣзни, *phthises, tabes*, изнурительныя лихорадки.

Изнурительныя болѣзни и чахотки большею частью бывають исходомъ другихъ процессовъ, какъ напр. нагноенія, раковиднаго, бугорчатаго вырожденія внутреннихъ органовъ, медлительнаго воспаленія, истощенія соковъ или нервной силы чрезъ истеченіе слизи, крови, гноя, продолжительное кормленіе грудью и другія потери соковъ, а также слѣдствіемъ отравленія металлами. Мы различаемъ чахотки: горла (гортани), груди, живота, нервовъ, а также происходящія отъ разрушенія мускуловъ, костей, суставовъ и проч. Старческое истощеніе — *marasmus senilis* — есть явленіе, естественно являющееся въ извѣстномъ возрастѣ.

Лѣченіе должно быть направлено на лежанія въ основаніи чахотки страданія, какъ напр. на воспаленіе, образованіе бугорковъ, золотуху и проч., и бываетъ чрезвычайно трудно, даже для врача, потому что съ этимъ основнымъ страданіемъ бывають соединены важныя симптомы изнурительной лихорадки, истощеніе соковъ вслѣдствіе пота, поноса, кашля съ изверженіемъ мокроты и т. д. Исхуданіе, лихорадка, изнуряющій (являющійся особенно ночью) потъ и поносы, нарывы, антоновъ огонь, бессонница, къ чему часто присоединяется наконецъ и водянка, — всѣ эти симптомы составляютъ картину собственно изнурительнаго страданія и всѣ они заслуживають вниманія на ряду съ главнымъ недугомъ.

Противъ исхуданія служатъ главнымъ образомъ питательныя вещества: бульонъ или концентрированный сокъ изъ мяса (экстрактъ *Либиха*), разнаго рода мясо, баварское пиво; изъ лѣкарствъ жетѣ, которыя дѣйствуютъ противъ причинъ болѣзни, такъ напр. противъ изверженія мокроты, нагноенія, особенно: **Arsen.**, **Calc.**, **Chin.**, **Ferr.** Противъ изнурительной лихорадки: **Arsen.** (ознобъ), **Carb. veg.**, **Chin.**, **Nitr. acid.**, **Phosph. acid.** Лучшія средства противъ пота: **Chin.** (*Chinin. 1.*), **Merc.** (ночной потъ), **Nitr. acid.**, **Phosph. acid.**, **Boletus laricis** по 1—2 щепотки. Противъ поноса: **Arsen.** (кровоавый поносъ), **Chin.**, **Ferr.** (изнуряющій, водянистый), **Kreos.** (грязно-или гнилостно-кровоавый), **Mercur.** (ночной,

съ болью), **Phosph.** (непроизвольный, съ болью, изнуряющій), **Phosph. acid.**, а при болѣе сильной степени — **Petrol.** (безъ боли, непроизвольныя, водянистыя испражнения), **Rhus** (слизистыя, кровавыя, съ натугой), **Secal.** (какъ бы параличъ запирающаго задній проходъ мускула), **Sulphur** (испражнения слизистыя, кровавыя). Противъ нарывовъ изнурительнаго свойства съ зловоннымъ гнойнымъ отдѣленіемъ или антоновымъ огнемъ (пролежни), при соответственномъ наружномъ лѣченіи, полезны: **Arsen.**, **Secal.**, **Nitri acid.** Безсонница исчезаетъ часто вмѣстѣ съ лихорадкой (**Arsen.**, **Merc.**) или послѣ удаленія извѣстныхъ мѣстныхъ причинъ, ее обусловливающихъ. Когда указанные въ статьѣ «ненормальный сонъ» средства не помогаютъ противъ безсонницы, то остается лишь прибѣгнуть къ *кларалу* или *морфию*, но употреблять ихъ слѣдуетъ подъ надзоромъ врача. *Tinctura sedativa (Magendie или Battley)* удобна въ этихъ случаяхъ; дается она по 5—8 капель. Насчетъ водяночекъ см. выше статью 13.

Что касается до лѣченія отдѣльных видовъ чахотки, то по причинѣ сложности этихъ болѣзней, лѣченіе ихъ безъ врача почти невозможно, и я ограничусь только нѣсколькими самыми необходимыми замѣчаніями на случай, если нельзя воспользоваться совѣтомъ врача.

16. Горловая (гортанная) чахотка,

phthisis laryngea, trachealis etc.

Зуда принадлежать чахотки гортани и дыхательнаго горла, происшедшія отъ хроническаго воспаленія, нагноенія, нарывація, образованія бугорковъ въ этихъ частяхъ. Важнѣйшими признаками этой болѣзни служатъ: кашель, охриплость, боль, мокрота и т. д. Главныя средства, особенно въ первомъ періодѣ, суть: **Baryt.** (золотушливое сложеніе, опуханіе желѣзъ), **Calc. carb.**, **Brom.** (упорная охриплость), **Carb. veg.** (охриплость, жженіе), **Iod.** (охриплость, нарываніе, разрыхленіе слизистой оболочки), **Merc. sol.** (воспалительное и лихорадочное состояніе), **Sulph.** (сухой кашель, стѣсненіе въ груди). См. болѣзни дыхательныхъ органовъ, кашель.

17. Легочная чахотка, *tuberculosis* или *phthisis pulmonalis* и *psittonia chronica caseosa*, просачивающаяся бугорчатка, и слизистая чахотка, *phthisis pituitosa*.

Чаще всѣхъ случается легочная чахотка, которая является обыкновенно въ молодости и среднихъ лѣтахъ, но не чужда и старости. Она основывается на образованіи туберкулъ и продуктахъ хроническаго слѣйнаго воспаления легкихъ и ихъ нагноенія въ легкихъ, вълѣдствіе чего страдаетъ составъ крови и соки отравляются гноемъ. Причиною этого бываютъ: золотуха, дурная пища, сырое помѣщеніе, недостатокъ въ воздухѣ и движеніи (почему болѣзнь эта часто развивается на фабрикахъ, въ тюрьмахъ), слишкомъ быстрый ростъ, подавляющія душевныя волненія (скорбь, тоска по родинѣ), внезапная перемена образа жизни, потери соковъ (кровотеченіе, кормленіе грудью, распутство), слишкомъ узкое платье (корсеты), нѣкоторые роды занятій (портной, писарь, каменщикъ, мельникъ), воснаденіе легкихъ и подреберной плевы, продолжительныя катарры, тифъ, блѣдная немочь, сахарное мочеизнуреніе, сифилисъ. Туберкулы сидятъ преимущественно на краяхъ легкихъ. Они образуются медленно, или же подъ вліяніемъ лихорадки отлагаются быстро (хроническіе или острые мліарныя туберкулы), или же продуктъ выпотѣнія при воспаленіи легкихъ превращается въ бугорчатую массу (просачивающіеся бугорки). Кашель и затрудненное дыханіе, особенное строеніе груди и звуки, которые являются при проходѣ воздуха чрезъ больной органъ, а также симптомы другихъ пораженныхъ одновременно органовъ (сердце, печень, желудокъ и кишка особенно), служатъ въ данномъ случаѣ признаками. (Срви. ниже: органическій кашель). Главныя средства суть: **Calc. carb., Chin., Ferr., Iod., Kali carb., Phosph., Silic., Stann., Sulph.** Дальнѣйшее смотри въ статьяхъ: болѣзни дыхательныхъ органовъ, кашель.

Чахотки, происходящія отъ болѣзней глубже лежащихъ развѣтвѣній дыхательныхъ путей (бронхій), а именно ихъ желѣзъ и слизистыхъ оболочекъ (т. и. слизистая чахотка), являются большею частью у людей сравнительно старыхъ и случаются рѣже только что описан-

ныхъ двухъ видовъ чахотки; еще рѣже случаются чахотки, происходящія отъ изнурительныхъ страданій околосердечной сумки, сердца, грудной плевы (отложение гноя).

18. Брюшная чахотка, *phthisis abdominalis*, сухотка дѣтей, *tabes meseraica*.

Онѣ происходятъ отъ органическихъ недуговъ (отложения бугорковъ, нагноенія, рака, разложенія) печени, селезенки, брюшины, желудка, поджелудочной желѣзы, почекъ, мочевого пузыря, яичниковъ, матки, или отъ нарывовъ въ кишкахъ и хроническихъ поносовъ, расстройства пищеваренія. Всего чаще встрѣчается такъ называемая сухотка дѣтей, которой сущность состоитъ въ расстройствѣ всего процесса питанія и раннемъ увяданіи организма; она основывается большею частью на отложеніи бугорковъ въ брыжейныхъ желѣзахъ, на увеличеніи или на высыханіи (маразмъ) этихъ желѣзъ, или она происходитъ отъ катарровъ желудка и кишекъ, также отъ кишечныхъ нарывовъ, или, наконецъ, отъ органическаго вырожденія (большею частью отъ образованія туберкулъ) легкихъ, мозга, печени, селезенки. Главнымъ признакомъ служитъ сильный и постоянно возвращающійся поносъ съ исхуданіемъ и рвотою. Это состояніе весьма часто влечетъ за собой смерть, если къ нему присоединяется еще выпотѣніе въ мозгу (*hydrocephalus*).—Важнѣйшія средства въ началѣ болѣзни, смотря по причинамъ ея, суть: **Baryt., Brom., Calc., Iod., Locop., Silic., Sulph.**; позднѣе: **Arsen., Chin., Ferr., Kreos., Phos. acid.** — О подробностяхъ см. золотуху, недуги пищеваренія, поносъ и т. д.

19. Нервная чахотки: страданія головного мозга, изнурительная нервная горячка, *febris nervosa lenta*.

Эту болѣзнь производятъ частью органическія измѣненія головного и спиннаго мозга, частью истощеніе нервной системы отъ бессонницы, душевныхъ потрясеній, распутства. Такъ называемая изнурительная нервная горячка лишь въ весьма рѣдкихъ слу-

чаяхъ является безъ видимыхъ матеріальныхъ причинъ; она часто соотвѣтствуетъ тифу или основывается на органическихъ, хотя и трудно опредѣляемыхъ измѣненіяхъ центральныхъ органовъ нервной системы (головной мозгъ, спинной мозгъ, система нервныхъ узловъ) или отдѣльныхъ нервныхъ стволовъ. Весьма часто встрѣчающаяся форма — пораженіе спиннаго мозга. Оно начинается съ раздраженія и его симптомовъ, а затѣмъ обнаруживается онѣмѣніе ногъ и разстройство половыхъ отправленияхъ. Въ первомъ періодѣ своего развитія, когда преобладаетъ раздражительное состояніе, весьма хорошо противодѣйствуютъ болѣзни преимущественно: **Nitr. acid.**, **Nux vom.**, **Phosph. acid.**, **Sulph.**, поздиѣе, когда преобладаетъ онѣмѣніе: **Argent. nitr.**, **Chin.**, **Phosph.**, **Rhus**, **Secal.**, **Silic.** Сравнительно новое средство — **Aluminium**. — См. болѣзни нервной системы.

20. Чахотки, происходящія отъ разрушенія мускуловъ, костей и суставовъ.

Эти болѣзни, происходящія отъ нагноенія, костоѣды и т. п. страданій, требуютъ прежде всего разсмотренія этихъ мѣстныхъ недуговъ, о чемъ сказано ниже. Если гдѣ-либо, то и здѣсь во время слѣдуетъ обратиться къ помощи врача, такъ какъ наука въ этомъ случаѣ можетъ много помочь и предохранить отъ опасныхъ послѣдствій.

Укажемъ на слѣдующія новыя средства, касающіяся упомянутыхъ изнурительныхъ болѣзней. Противъ изнурительной лихорадки — *Sanguinaria can.*, сходно съ *Phosph.* Ознобъ и летучій жаръ попеременно, жаръ въ ладоняхъ, біеніе жилъ во всемъ тѣлѣ, красныя щеки, тошнота, обморокъ, кашель съ изверженіемъ, чрезвычайная слабость, особенно въ чахоткѣ (хроническая пневмонія, туберкулы). При существованіи послѣднихъ признаковъ слѣдуетъ прибѣгнуть и къ *Cimicifuga*, какъ въ острой такъ и хронической *phthisis tuberculosa*, даже при лихорадочныхъ припадкахъ, поносъ, потѣ; въ первой и въ послѣдующихъ стадіяхъ. На кашель оно дѣйствуетъ какъ *Acon.*, *Bry.*, *Arn.*, *Veratr. vir.* Кашель чахоточныхъ умѣряется и чрезъ *Sticta pulm.*

Въ сухоткѣ дѣтей, при исхуданіи, утреннихъ поносахъ, или даже при нормальныхъ испражненіяхъ, употребляютъ и *Podophyll.*

Г. БОЛѢЗНИ КРОВЕНОСНОЙ СИСТЕМЫ.

21. Болѣзни сердца, *affectio cordis*, сердцебиеніе, *palpitatio cordis*.

Болезни сердца бываютъ: а) неорганическія, и въ этомъ случаѣ завяютъ или отъ нервовъ (вслѣдствіе слабости нервовъ, раздраженія спиннаго мозга, истерики и т. п.), или отъ крови (полнокровіе, напряженіе мускуловъ, опуханіе печени, геморрой, дѣвичья немочь и малокровіе), и б) органическія. Эти послѣднія проявляются въ отложеніяхъ (завалахъ, вслѣдствіе ревматизма, ломоты, рака), окостинѣніи жилъ или клапановъ (преимущественно въ старости), ожирѣніи сердца, увеличеніи, утолщеніи, расширеніи сердца (самая легкая форма), суженіи отверстій сердца, неудобозакрываемости клапановъ (самая опасная форма), рѣже въ размягченіи, высыханіи самаго вещества сердца. Органическія недуги — частью первичныя, самостоятельныя недуги сердца, частью присоединившіяся впродолженіе другихъ болѣзней, вторичныя (напр. послѣ ревматизма суставовъ, Брайтова вырожденія почекъ и т. д.) — болѣею частью ухудшаются отъ движенія, улучшаются въ покоѣ и почти никогда не прерываются. Напротивъ того, неорганическія отъ движенія облегчаются, являются періодически, усиливаются отъ горизонтальнаго положенія, покоя, наполненія желудка, праздности; уменьшаются отъ работы, развлеченія. Но не всегда можно полагаться на это различіе, такъ какъ бываютъ отклоненія отъ этихъ явленій. Истиннымъ критеріумомъ служить изслѣдованіе объема сердца посредствомъ постукиванія (перкуссія) и біенія сердца посредствомъ выслушиванія (аускультация), на что требуется особенный навыкъ. Предварительное изслѣдованіе такого рода необходимо для правильнаго лѣченія.

Недуги сердца суть: биение, дрожь и замирание сердца, одышка, тоска и стѣснение сердца, обмороки, головокружение, головная боль, биение въ различныхъ частяхъ тѣла, особенно въ груди, шеѣ, головѣ, неровное биение пульса. Но эти явленія случаются и при другихъ болѣзняхъ. Иногда они бываютъ (особенно въ началѣ органическаго недуга) такъ слабы, что сами больные не подозрѣваютъ въ себѣ болѣзни сердца. Многіе случаи удара обусловливаются болѣзнию сердца.

Лѣчение:

а) Неорганическія болѣзни сердца.

Главнѣйшія средства:

- 1) при приливѣ крови, при такъ наз. количественномъ страданіи сердца: *Acon.*, *Bellad.*, — *Nitr. acid.*, *Spigelia* (см. ниже б.);
- 2) при такъ называемомъ нервномъ страданіи сердца, происходящемъ отъ нервовъ: *Ignat.*, *Phosphori acid.*, *Phosph.*, *Plat.*;
- 3) при малокровіи: *Chin.*, *Phosph. acid.*, *Puls.*, — также *Ferrum* (см. также б.) или *Calc. carb.*
- 4) при страданіяхъ нижней части живота: *Nux vom.*, *Sulphur*, — также *Natrum mur.* (ср. также б.)

Aconitum — 2.

Сердцебиеніе съ тоскою и жаромъ въ лицѣ. — Послѣ воспаленія, ревматизма, тифа. У полносочныхъ особъ, отъ прилива крови; когда бываетъ возбужденіе кровеносныхъ и лимфатическихъ сосудовъ, стучь, биеніе, лихорадочное безпокойство, бессонница, — давленіе, стѣсненіе дыханія при движеніи, колотье, приливы къ легкимъ.

Belladonna — 2.

Тоже, что и при *Acon.*, когда притомъ приливы, жаръ въ

головѣ, головокруженіе, полнокровіе, стучь въ головѣ и шеѣ, шумъ въ ушахъ, рябь въ глазахъ, жаръ, безпрестанно усиливающийся, хуже при ходѣ и ночью.

China — 2.

Нервные, періодически наступающіе недуги сердца, отъ слабости, отъ рукоблудія, послѣ потери соковъ, при малокровіи и дѣвичьей немочи. — Также жаръ въ лицѣ, стѣсненіе сердца. Сердца часто почти вовсе не слышно, какъ будто бы его останавливаетъ вышнее давленіе. Наружный холодъ. Мягкій, слабый пульсъ.

Ignatia — 2.

*Нервное страдание сердца послѣ печали, огорченія; при истерикѣ съ судорожными симптомами. Дыханіе со вздохами. Сердцебиеніе, ночью колотье въ сердцѣ. (Подобное же дѣйствіе имѣетъ *Nux moschata*.)*

Nitri acidum — 2.

Нервный и конкестивный недугъ сердца. Съ стѣсненіемъ дыханія, одышкой; хуже отъ движенія, даже незначительнаго. Слабость съ кажущимся приливомъ крови. При полнокровіи нижней части живота.

Nux vomica — 2.

Отъ прилива крови, при недугахъ нижней части живота, отъ употребленія кофе и спиртныхъ напитковъ; также при нервныхъ недугахъ сердца. Боль въ спинѣ. Біеніе съ тошнотою, давленіе, тяжесть въ груди и головѣ, увеличивающаяся отъ запора, особенно рано утромъ и ночью.

Phosphoricum acidum—2.

Нервный недугъ сердца, при слабости, послѣ потери соковъ. Зудъ въ сторонѣ сердца, одышка; чувство слабости, истерическіе припадки.

Phosphor — 2.

Нервная бользнь сердца, біеніе при сидячемъ положеніи; чрезвычайная слабость, стѣсненіе въ груди, такъ что даже боишься задохнуться; отдѣльные припадки одышки, припадки обморока.

Platina — 2.

Нервный, особенно истерическій недугъ сердца. Стѣсненіе дыханія, съ ощущеніемъ подымающейся теплоты подъ ложечкой. Колотье, давленіе, напряженіе, толчки въ груди. Въ соединеніи съ другими судорожными симптомами, въ особенности при неправильности мѣсячныхъ очищеній у полносочныхъ.

Pulsatilla — 2.

Нервный недугъ; при дѣвической немочи съ остановкой мѣсячныхъ очищеній или при недугахъ нижней части живота, при геморроѣ. Тяжесть, давленіе, жженіе около сердца. Біеніе послѣ душевныхъ волненій, послѣ стола; ночью, съ тоскою, печальнымъ расположеніемъ духа, въ видѣ сильныхъ припадковъ, съ удущьемъ, особенно во время лежанія на боку, отъ разговора; отъ движенія, а также отъ свѣжаго воздуха уменьшается. Зябкость.

Sulphur — 3.

Отъ прилива крови, особенно при полнокровіи нижней части живота, запорѣ и т. д. Біеніе, стугъ, безъ тоски, безъ всякаго повода, во всякое время или периодически по вечерамъ, ночью, съ приливомъ крови къ груди; облегчается послѣ испражненія и выхода вътровъ. (Подобно *Lycor.*)

Прим. Изъ вышеозначенныхъ средствъ **Acon., Bellad., Nitr. acid., Phosph., Veratr., Sulph.** можно также давать и при органическихъ недугахъ, если только ихъ симптомы согласны съ означенными при лѣкарствахъ. При этомъ *Acon., Bell., Nitr. acid.* даются особенно при утолщеніи и огрубѣніи стѣнокъ сердца, *Phosph.* при расширеніи ихъ, *Veratr.* при недостаткахъ заслонокъ сердца.

Истерикамъ съ успѣхомъ дается *Asa 3.* При страданіяхъ спины *Arg. nitr.* Если причиною болѣзни разстройство пищеваренія, то прибѣгаютъ также къ **Lycor. 3.** Противъ конгестивнаго сердцебіенія употребляется также *Aurum. met. 6—3.* Приливъ крови къ сердцу въ тѣ годы, когда прекращается мѣсячное очищеніе, лучше всего облегчаетъ *Nitr. acid.*

б) Органическія болѣзни сердца.

Arsenicum — 3.

При ночныхъ припадкахъ съ сильной тоской, стѣсненіемъ дыханія, потребностью сидѣть и наклоняться впередъ, хуже при ходьбѣ; стягиваніе, колюще; такое стѣсненіе въ груди, что больной боится задохнуться; противъ бессонницы, при затрудненномъ

Veratrum — 2.

Нервный недугъ сердца. Ночью со смертельнымъ страхомъ, холоднѣемъ членовъ и холоднымъ потомъ; лучше при лежаніи; припадки сердцебіенія съ прерывающимся біеніемъ пульса; кажется органическимъ недугомъ, но прекращается. Дыханіе ускорено. — Послѣ страха и тоски. (Подобное же дѣйствіе имѣетъ *Camphora.*)

дыханіи, пораженіи печени и почекъ при ненормальности заслонокъ сердца.

Digitalis — 2.

Главное средство для излѣченія или облегченія сильнаго, почти слышнаго и видимаго сердцебіенія съ тоскою, удушьемъ, по-

требностью сидѣть, *особенно ночью*, съ прерывчатымъ сномъ и съ *слабымъ пульсомъ*. Когда артеріальная дѣятельность увеличилась, а венозная уменьшилась, когда сердце сильно бьется, а энергія тѣмъ не менѣе ослабла; при послѣдствіяхъ болѣзней мозга, легкихъ (катарръ, приливъ крови, кровотечение, одышка), печени (желчное состояніе, доходящее до желтухи), желудка и кишекъ (катарръ), когда сверхъ того отдѣляется меньше мочи и бываютъ водяныя опухоли. Особенно дѣйствительно противъ пораженія правой части сердца, противъ ожирѣнія. При расширеніи (страдающихъ заслонокъ сердца) это средство палліативное. Должно употреблять осторожно, такъ какъ оно можетъ помѣшать стремленіямъ природы излѣчить страданія заслонокъ сердца уравнивающимъ расширеніемъ (такъ наз. компенсація).

Ferrum — 2.

При *расширеніи и ослабленіи стѣнокъ*. Судороги и стѣсненіе въ груди, облегченіе отъ движенія. *Приливъ крови съ признаками раздражительности и слабости*, въ особенности къ груди и селезенкѣ (отеки); кровохарканіе, признаки малокровія, си-

неватый цвѣтъ лица. (Поэтому служитъ также главнымъ средствомъ противъ дѣвичьей немочи; вообще болше дается молодымъ субъектамъ.)

Iod. — 3.

Въ особенности противъ *расширенія или ожирѣнія* сердца; сильное стѣсненіе сердца и *дыханіе со свистомъ*; серддебіеніе, въ особенности при движеніи, доходящее до обморока.

Kali carbonicum — 3.

При органическихъ порокахъ сердца, явившихся послѣ *воскаленія, ревматизма*. *Щемлящая боль въ сердцѣ или около него, какъ будто оно крѣпко стянуто бинтами*, особенно при дыханіи, кашлѣ. Колотье и жженіе въ сердцѣ. Серддебіеніе съ тоскою и тошнотою, одурѣніе головы, прерывающееся серддебіеніе.

Natrum muriaticum — 3.

Прерывающееся біеніе сердца и пульса, движеніе сердца неправильное, *колеблющееся*; хуже отъ движенія, послѣ ѣды; облегчается нажатіемъ руки; отрыжка. *Напряженіе* и стѣсненіе въ груди. Весьма характеристично: *біеніе подъ ложечкой, съ давленіемъ и чувствомъ полноты въ этомъ мѣстѣ*.

Spigelia — 2.

Главное средство против органических пороков сердца послѣ ревматизма, воспаления, особенно когда поражены *сердечныя заслонки*, при *утолщеніи* и *расширеніи* сердца. — *Возмообразное*, дрожащее бѣіеніе сердца, причемъ *удары какъ будто сливаются* одинъ съ другимъ, бурное во время лежанія и сидѣнія, слышимое и ощутительное

спнаружи, не согласующееся съ бѣіеніемъ пульса; *колотье подъ ложечкой при чувствительности этой полости*, пульсація шейныхъ жилъ, стѣсненіе въ груди; колотье при каждомъ движеніи, рѣзущія боли, распространяющіеся на плечи, голову и руки; *боль въ членахъ*. На сердцѣ какъ будто лежитъ тяжесть. Холодныя оконечности. Принадлежи по утрамъ.

Прим. Противъ расширенія сердца и пораженія заслонокъ сердца можно также употреблять: *Aurum*, *Argent.*, *Plumb.*; противъ ожирѣнія сердца: *Calc. carb.* Въ послѣднее время стали рекомендовать *Cact. grandiflorus* и *Naja tripudians* G., но отъ этихъ средствъ мнѣ рѣдко приходилось видѣть удачныя результаты, и во всякомъ случаѣ имъ слѣдуетъ предпочесть *Kalmia latifolia* L., которая употреблялась мною съ большимъ успѣхомъ даже противъ сильной степени болѣзни заслонокъ сердца. Для облегченія одышки, обусловливаемой какою-нибудь болѣзنیю сердца, кромѣ *Arsen.* 5—3., хорошо также *Phosphor.* 5—3.

Теперь скажемъ нѣсколько словъ о новѣйшихъ средствахъ противъ страданій сердца. *Cimicifuga* ослабляетъ симптомы и регулируетъ лучше, чѣмъ *Digitalis*, при ревматическихъ пораженіяхъ и пораженіяхъ матки, при грудной жабѣ, воспаленіи околосердечной сумки послѣ ревматизма. *Gelsemium* облегчаетъ органическія страданія и излѣчиваетъ неорганическія; даетъ хорошіе результаты, когда причиною болѣзни полнокровіе, приливы крови, ревматизмъ, истерика; уменьшаетъ вліяніе больного сердца на голову и глаза. *Leptandria*, при отраженіи страданій печени на сердцѣ. *Lycopus virginicus*, противъ страданій легкихъ и происходящихъ отъ того страданій сердца (сердце стѣсняется, слышится шумъ какъ будто отъ мѣховъ, сердце сильно раздражается отъ всякаго движенія). *Rumex crispus*, не выяснилось достаточно, помогаетъ ли оно противъ боли сердца отъ

лежания и дыхания. *Sanguinaria* (также не вполне определенное средство), против давления в области сердца, сердцебиения, сопряженного с необыкновенной слабостью, при неправильном, медленном, слабом пульсе (венозный прилив?). *Veratr. vir.* действует паллиативно.

Диета помогает также чрезвычайно много. Легко варимая, питательная, негорячительная пища (особенно вредны кофе, вина и т. п.), избѣжаніе сильнаго мускульнаго напряженія, сильнаго и утомительнаго движенія, особенно восхожденія на гору, гимнастики, плаванія, послѣобѣденнаго сна, ужина и т. п., а также всякой невоздержности, потери соковъ и употребленія сильнодѣйствующихъ лѣкарствъ, пользованіе чистымъ и свѣжимъ воздухомъ на мѣстахъ возвышенныхъ, богатыхъ кислородомъ, которыя, не будучи слишкомъ близки къ сѣверу или югу, имѣютъ умѣренный, мягкій климатъ, забота о правильности испраженія, душевный покой, — все это даетъ возможность дожить до глубокой старости. При такомъ образѣ жизни органическія несоотвѣтствія между сердцемъ, его заслонками и легкими сглаживаются иногда до такой степени, что жизнь становится довольно сносною.

Пріемъ лѣкарствъ долженъ быть рѣдокъ и только въ крайнихъ случаяхъ можетъ повторяться чаще 2, 3 разъ въ день. Давать высшія разжиженія и рѣдко болѣе 1 — 2 капель или 2 — 4 крупинокъ за разъ.

22. Воспаленіе сердца и околосердечной сумки,

myo - и *endocarditis* и *pericarditis*.

Эти болѣзни большею частью встрѣчаются вмѣстѣ. Первая есть одно изъ самыхъ обыкновенныхъ послѣдствій остраго ревматизма, особенно ревматизма суставовъ, изрѣдка является послѣ скарлатины, кори и тифа и влечетъ за собой много органическихъ измѣненій сердца (см. болѣзни сердца). Воспаленіе поражаетъ или околосердечную сумку, или мускульное мясо, или внутреннюю пленку сердца. Симптомы: лихорадка, сильные удары сердца, слабый пульсъ, синія губы и холодныя конечности, дурнота, особенно при движеніи и вставаніи, тоска, сильное безпокойство, судороги. Но

этихъ признаковъ не достаточно для того, чтобы отличить эту болѣзнь отъ другихъ, а потому единственнымъ вѣрнымъ средствомъ къ распознаванію ея можетъ служить только физическое изслѣдованіе сердцеваго шума (посредствомъ простаго выслушиванія или стетоскопа), положенія и величины сердца. Лѣченіе можетъ совершаться безъ врача только въ началѣ, да и то лишь въ крайнемъ случаѣ, такъ какъ опасность велика.

Aconitum — 2.

Главное средство. *Лихорадка*, въ высшей степени *возбужденное состояніе*, полный пульсъ, *сильное сердцебіеніе съ тоской*, стѣсненіе дыханія, *колотье* и давящая боль въ сердцѣ. (Принимать слѣдуетъ какъ можно дольше.)

Arsenicum — 3.

При *органической ненормальности* сердца отъ распространившагося въ глубь выпота, причемъ большею частью *жгучая боль*, *тоска по ночамъ съ одышкою*, не дающей лежать; сильное безпокойство, жажда, обморокъ, *упадокъ силъ*, водянка.

Belladonna — 2.

При ясно обнаруживающемся волненіи, при болѣе *нервныхъ*, нежели воспалительныхъ симптомахъ, при судорогахъ; *волнообразное біеніе сердца съ приливомъ къ верхней части тѣла*; *клокотанье* и дрожаніе сердца; сильное біеніе съ подергиваніемъ въ головѣ, затылкѣ, шеѣ.

Bryonia — 2.

Особенно противъ *воспаленія околосердечной сумки*, когда ощущается давленіе, тоска (*признаки выпота*), *острое колотье*, когда больному покой и *движеніе* одинаково *тягостны*. Бывающее при этомъ пораженіе подреберной плевы обнаруживается *колотьемъ*, увеличивающимся при *глубокомъ вдыханіи*. Одновременно — ревматизмъ въ суставахъ.

Spigelia — 2.

Одышка, стѣсненіе, стягиваніе груди, *волнообразное біеніе сердца*, причемъ удары какъ будто сливаются. *Колотье*, чувство дрожанія въ груди и ощущеніе, будто что-то готово порваться въ ней, когда поднимаешь руки надъ головою; біеніе аорты; сильное біеніе сердца, осязаемое также извнѣ, весьма красныя щеки и губы, блѣднѣющія при каждомъ движеніи. При *ревматически-воспалительномъ страданіи сердца*. (См. болѣзни сердца.)

Примѣч. Сверхъ того мы можемъ рекомендовать: **Digit. 1.**, послѣ *Aconitum*, главнымъ образомъ при воспаленіи околосердечной сумки, но и при воспаленіи сердца безъ особенной мѣстной боли, съ стѣсненіемъ дыханія, съ отрывистымъ біеніемъ пульса и сердца, съ водяною опухолью рукъ и ногъ, при скудномъ мочеотдѣленіи. **Phosphor. 3.** — при сильномъ стѣсненіи дыханія, судорогахъ; **Kalium jodatum** (2 — 3 гран. на 1 унц. воды) — если есть водянистый выпотъ въ околосердечной сумкѣ, какъ послѣ ревматизма въ суставахъ; **Tart. stib. 2.** — если присоединяется воспаленіе легкихъ; еще лучше при хрипѣнн въ груди, когда угрожаетъ параличъ легкихъ влѣдствіе застоя крови въ легкихъ отъ затрудненной дѣятельности сердца; **Sulph. 3.** — когда симптомы воспаленія исчезли, для устранения послѣдствій и остатковъ выпота или противъ длительного воспаленія околосердечной сумки. Изъ множества другихъ рекомендуемыхъ лѣкарствъ особеннаго вниманія достойны **Lachesis** и **Nitrum**.

Новѣйшія средства. Противъ воспаленія сердца: *Ver. vir.*, дѣйствуетъ какъ *Acon.*; помогаетъ также противъ воспаленія околосердечной сумки (принадки обморока, облегченіе отъ лежанія). Въ послѣднемъ случаѣ дается также *Cact. grandifl.* (сердце сжимается какъ будто желѣзной рукой, острая боль, колотье около сердца, одышка, принадки удушья съ обморокомъ, холоднымъ потомъ, слышимымъ пульсомъ и сердцебіеніемъ) и *Rumex* — при переходѣ ревматизма на сердце.

Лѣкарства должны быть даваемы часто (даже каждый часъ), въ низкихъ разжиженіяхъ и по нѣскольку капель за разъ, особенно *Aconitum*.

23. Болѣзни большихъ кровеносныхъ сосудовъ.

Сюда мы относимъ: органическіе недостатки, особенно окостѣніе и расширеніе аорты, *) — болѣзнь, симптомы которой схожи

*) Аорта (начальственная артерія) выходитъ изъ лѣваго желудочка сердца. Выйдя, она образуетъ восходящую часть, потомъ загибается на право въ видѣ полукруга или дуги (arcus aortae), наконецъ, спускается внизъ и называется нисходящею частью.

съ признаками недуговъ сердца, и противъ которой рекомендуютъ: *Arsen.*, *Carb. veg.*, *Digit.*, *Laches.*, *Spigel.*, *Thuji.*; далѣе — расширенія венъ (*Arsen.*, *Arnica*, *Lycop.*, *Hamamel.*, *Silic.*, *Sulph.*, *Thuji.*; сравни нарывы), воспаленія ихъ, изъ которыхъ бѣлая опухоль лядвей (*phlegmasia alba dolens*, главное средство — *Arsen.*) всего чаще случается въ послѣдородовое время. Но эти недуги, по причинѣ трудности ихъ распознаванія, должны быть лѣчимы врачомъ, и потому о нихъ мы не распространяемся. Совершенно своеобразная, открытая только въ послѣднее время болѣзнь есть такъ называемая Базедова болѣзнь, которая состоитъ въ сердцебіеніи, опухоли щитообразной желѣзы и, наконецъ, въ томъ, что глазное яблоко выступаетъ изъ орбиты. Симптомы эти обнаруживаются то послѣдовательно въ томъ порядкѣ, въ какомъ мы ихъ привели, то одновременно. Но эта болѣзнь еще до такой степени мало изслѣдована, какъ въ отношеніи своего происхожденія (многіе полагаютъ, что причиною ея бываетъ страданіе симпатическаго нерва), такъ и въ отношеніи связи симптомовъ и въ особенности способа лѣченія, что мы принуждены ограничиться здѣсь только указаніемъ на ея существованіе.

ВТОРОЕ ОТДѢЛЕНІЕ.

БОЛѢЗНИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ.

А. БОЛѢЗНИ МОЗГА И ЕГО ОБОЛОЧЕКЪ.

24. Воспаленіе мозга, острая водянка мозга, мозговое выпотѣніе, *encephacitis, meningitis, hydrocephalus acutus*. Эпидемическое воспаленіе спинно-головнаго мозга, *meningitis cerebrospinalis epidemica*.

Настоящее воспаленіе мозга (причемъ поражены или вся масса мозга, или оболочки его) бываетъ или острое, или хроническое; оно встрѣчается рѣже, нежели думаютъ, и происходитъ большею частью только вслѣдствіе механическихъ поврежденій (болѣзни черепа, толчекъ, паденіе, ударъ по головѣ) или отъ сильнаго жара (солнечный ударъ, *insolatio*), холода, чрезмѣрнаго употребленія спиртныхъ напитковъ или, наконецъ, оно сопровождается другія болѣзни, какъ, напримѣръ, рожу, скарлатину, оспу, ушное воспаленіе, воспаленіе желудка и подреберной плевы, тифъ, бѣлковинное вырожденіе почекъ и родильную лихорадку. Чаще всего встрѣчается воспаленіе мозговой оболочки на основаніи черепа (надъ нѣбомъ), которое происходитъ отъ золотухи въ мозгу или образовавшихся въ немъ бугорковъ (желтовато-бѣлыя грануляціи, величиною въ просіяное зерно) и часто сопровождается выпотѣніемъ въ мозговыхъ желудочкахъ и размягченіемъ окружающихъ частей мозга

(острая головная водянка). Оно бываетъ преимущественно у дѣтей 1—10 лѣтъ, во время прорѣзыванія зубовъ, отъ слишкомъ ранняго умственного развитія, при сыпяхъ и другихъ болѣзняхъ, послѣ невоздержности въ пищѣ, или, наконецъ, безъ всякой видимой причины, просто когда у націента есть къ этому воспаленію природное расположеніе. Большой размѣръ черепа, долго не срастающіеся головные швы, блѣдный, прозрачный видъ лица, англійская болѣзнь, преждевременное умственное развитіе, вообще золотушливое сложеніе, служатъ признаками существованія такого расположенія. Часто задолго до болѣзни обнаруживаются предвѣщающія ее явленія, какъ-то: рвота, дурное расположеніе духа, робость, нетвердость походки, потѣніе, особенно задней части головы, кровотеченіе изъ носу, частые катарры. Тогда наступаетъ *первый періодъ* (стадія) болѣзни, явленія котораго схожи съ признаками зубными, глистными или желудочными, а именно наступаетъ *раздраженіе* мозга съ лихорадкой, жаромъ и болью въ головѣ, причемъ стараешься углубиться затылкомъ въ подушки; кромѣ того, при этомъ бываетъ потѣніе головы, внезапное вскрикиваніе, скрежетъ зубовъ, рвота, запоръ, впадный животъ, косоглазость или неподвижность взгляда, сѣзвившійся зрачекъ, чувствительность къ свѣту и звуку, лихорадочный бредъ, подергиваніе членовъ и лица, задержаніе мочи, безпокойный сонъ или бессонница. По истеченіи 2—5 дней и даже большаго промежутка времени наступаетъ *второй періодъ* болѣзни, а именно періодъ *выпотнѣнія*, когда показываются симптомы давленія на мозгъ излившейся на него жидкости, какъ-то: сонливость, сонъ съ открытыми или закатившимися глазами, безсознательное испусканіе мочи, параличъ одной стороны тѣла и невольное, автоматическое подергиваніе членовъ другой стороны, оконечности которой судорожно стянуты, расширеніе зрачковъ, медленный, а подъ конецъ небольшой и быстрый пульсъ, поверхностное, отрывистое дыханіе съ сощѣніемъ, холодный липкій потъ, конвульсіи и смерть. Въ большей части случаевъ болѣзнь длится 10—14 дней, но часто смерть наступаетъ по истеченіи нѣсколькихъ часовъ. Во всякомъ случаѣ излѣченіе этой болѣзни случается весьма рѣдко. Въ послѣднее время появлялось тамъ и сямъ въ видѣ эпидеміи очень сильное и часто смертоносное воспаленіе спинно-головнаго мозга, которое сопровождается судорогами и, вѣроятно, основывается на зараженіи крови. Теченіе болѣзни

весьма быстрое; начинается оно съ озноба, головной боли, рвоты, лихорадочнаго безпокойства. Въ большинствѣ случаевъ уже послѣ 24 часовъ голова бываетъ загнута назадъ; головная боль распространяется на затылокъ и спину; безпокойство растетъ; запоръ; втянутый животъ; сѣзвившіеся зрачки. На 3—4 день столбнякъ зашейныхъ и спинныхъ мышцъ, вслѣдствіе котораго тѣло загибается назадъ, сжатіе челюстей, задержаніе мочи, безсознательное состояніе, сонливость, смерть. Часто вся болѣзнь развивается втеченіе 24 часовъ, иногда даже еще быстрѣе.

Въ первомъ періодѣ полезны слѣдующія средства:

Arnica — 2.

Послѣ паденія, удара, механическихъ поврежденій. Когда произошло потрясеніе мозга, или когда уже послѣдовало выпотѣніе, но еще имѣются признаки сознанія и реакціи. (См. ниже.)

Belladonna — 2.

Главное средство, когда преобладаетъ *примѣзь крови*. *Жаръ, красные, блестящіе глаза, біеніе головныхъ жилъ, головокруженіе, бредъ, сонливость, скрежетъ зубовъ, конвульсіи, зарываніе головы въ подушку*. Свѣжій воздухъ и шумъ ухудшаютъ состояніе больного; вздохи, затрудненіе при глотаніи, непроизвольное отдѣленіе мочи (темной, зеленоватой) и испраженій, рвота. (Если это средство не окажетъ быстрой помощи, то это значитъ, что болѣзнь не ограничивается однимъ приливомъ крови, и мѣш-

кать тогда нечего. Прежде всего дается въ такомъ случаѣ **Мерс.**, въ особенности когда сильная лихорадка, чрезвычайное безпокойство, сильный потъ безъ облегченія.)

Bryonia — 2.

При *нижней степени* лихорадки въ началѣ болѣзни или при переходѣ ея во 2 періодъ своего развитія, когда начинается выпотѣніе, а потому: при преобладаніи *давящей боли* или *колотья* въ мозгу, сонливости съ бредомъ, вызываемымъ какъ будто *давленіемъ на мозгъ*, или при сильномъ безпокойствѣ, вскакиваніи во снѣ, постоянномъ жеваніи; кожа суха, горяча, лице красное, потъ льетъ градомъ, кожа горяча, моча красна, губы и языкъ сухи; незначительное отдѣленіе мочи, запоръ, тугой животъ.

Не слѣдуетъ терять времени съ *Aconit.*; лучше всего скорѣе прибѣгнуть къ **Bellad.**, а когда оно не поможетъ, то къ *Atropin.* 3. или *Apis* 3. Дѣйствіе должно обнаружиться черезъ 6—12 часовъ. Только въ видѣ *промежуточнаго средства*, съ которымъ впрочемъ не слѣдуетъ терять времени, употребляется противъ *бредъ* съ пѣніемъ, хватаніемъ ключевъ и одурѣніемъ — *Hyoscyamus* 2. — При страшныхъ *видѣніяхъ* съ *подериваніемъ членовъ*, безпокойствомъ, отсутствіемъ сознанія, судорожными движеніями, при неподвижности взгляда, при сильномъ лихорадочномъ жарѣ, краснотѣ, особенно когда съ этимъ соединено стѣсненіе дыханія: *Stramonium* 2. — Въ состояніи непреодолимой сонливости, нечувствительности, полного равнодушія, причемъ бываетъ хрипѣніе и глаза полуоткрыты: *Opium* 2. — Для предотвращенія паралича мозга, при конвульсіяхъ, безпамятствѣ, неподвижности зрачковъ, холодѣніи оконечностей: **Zincum** 2. Подобнымъ же образомъ дѣйствуетъ **Phosphor.**, оживляя и пробуждая при безпамятствѣ, *непроизвольныхъ испраженіяхъ* и проч.

Лѣкарства, рекомендуемыя противъ *выпотѣнія*, правда, были употребляемы иногда съ успѣхомъ, но вообще рѣдко и только при маломъ количествѣ экссудата.

Между этими средствами славится *Arnica*. Но вѣрнѣе, при сильной степени болѣзни, **Arsen.** 3., когда наступаетъ чрезвычайная слабость и хилость. Однако и это средство я часто прописывалъ безъ всякаго успѣха. Болѣе успѣшные результаты видѣлъ я отъ **Helleborus** 2., которое есть лучшее средство въ періодъ послѣ *выпотѣнія*, когда лихорадка не сильна, пульсъ слабъ, мягокъ, неправиленъ, дыханіе тяжкое, со стонами; апатія, холодный потъ на лбу, расширеніе зрачковъ; жажда; лице блѣдное и распухшее, сонливость, вскакиваніе во снѣ съ крикомъ; ноздри неопытныя, нижняя челюсть отвислая. Столь прославленное аллонатами *Digitalis* не всегда помогаетъ. Напротивъ того, заслуживаетъ большаго вниманія *Merc. sol.* 3., въ первомъ періодѣ болѣзни, когда еще существуетъ реакція, сознаніе и т. п., и — **Sulphur** 3., когда этихъ признаковъ нѣтъ, т. е. *въ позднѣйшемъ періодѣ болѣзни, при появленіи признаковъ водянки* (каковы: давленіе, тяжесть мозга, метаніе головою, вскакиваніе во снѣ, бредъ съ борматаніемъ, блѣдность лица, запоръ). *Sulphur.*, какъ говорятъ, вызываетъ иногда всасываніе вы-

пота. **Zincum** можно рекомендовать преимущественно при судорогахъ, которые указываютъ на возникающій *параличъ мозга*. Въ послѣднее время очень рекомендуютъ для этого періода болѣзни **Apis 3.**; другіе передаютъ объ успѣшныхъ результатахъ, достигнутыхъ ими посредствомъ **Glonoin. 2., Canthar. 3., Iod., Lachesis, Tartarus stibiatus.** Во всякомъ случаѣ достойно вниманія *Kalium jodatum*, но приемы его должны быть довольно сильны.

Во вниманіе къ недугамъ, служившимъ поводомъ къ описываемымъ болѣзнямъ, рекомендуемъ: *Rhus tox.* и *Phosph.*, послѣ острыхъ сыпей; *Rhus*, при скрывшейся рожѣ; *Sulphur*, послѣ предшествовавшего воспаления уха.

Не подлежитъ сомнѣнію, что мы еще далеко не знакомы со всѣми лѣкарственными средствами противъ этихъ болѣзней, такъ что вообще только въ рѣдкихъ случаяхъ лѣчение бываетъ удачно.

Вообще ходъ лѣченія долженъ происходить въ слѣдующемъ порядкѣ: *Bellad.* (*Atropin.* или *Apis*) или *Mercur.*, затѣмъ *Helleb., Sulphur.* (*Arsen., Iod., Zinc., Phosphor.*)

Лѣчение воспаления спинно-головнаго мозга, насколько оно допускается кратковременностью болѣзни, почти то же, только что въ этомъ случаѣ прибѣгаютъ главнымъ образомъ къ *Atropin.* и *Apis (Glonoin).*

(Противъ столбняка слѣдовало бы попробовать *Cuprum, Tabacum* и *Strychnin. 3.*)

Мозговое выпотѣніе (*hydrocephalus*) можно легко принять за тифъ или за особеннаго рода состояніе слабости, которое происходитъ отъ питанія, заключается въ безкровіи мозга, обнаруживается тѣми же признаками, какъ *hydrocephalus*, и носитъ названіе *Hydrocephaloid'a*. Характеристическое отличіе тифа составляютъ самый ходъ болѣзни и опухоль селезенки, а *Hydrocephaloid'a* — припадки поноса. Часто различить эти болѣзни крайне трудно, а потому и въ этомъ случаѣ необходимо научное образованіе врача, и безъ его помощи не обойдешься.

Касательно *хронической водянки мозга* см. *водянки*. Приведемъ новѣйшія средства противъ разсматриваемаго нами недуга. Хорошимъ подспорьемъ служить *Gelsemin.*; при раздражительномъ состояніи, приливахъ, которые предшествуютъ *meningitis*, какъ — головокруженіе, одурѣніе: *Aletr. farin., Gels., Sanguin.* (при расширеніи височныхъ жилъ); **Ver. vir.**, противъ симптомовъ, пред-

вѣщающихъ воспаленіе мозга и мозговыхъ оболочекъ (головокруженіе, головная боль, одурѣніе, налившіеся жилы, чувствительность органовъ чувствъ, ненормальность зрѣнія, тошнота, рвота, слабая память, онѣмѣніе членовъ, конвульсіи), при полнокровіи, раздраженіи кровеносныхъ сосудовъ, отъ солнечнаго удара, послѣ чрезмѣрнаго употребленія спиртныхъ напитковъ, когда прорѣзываются зубы, подавлены привычныя выдѣленія. (По мнѣнію многихъ, при приливахъ во время прорѣзыванія зубовъ у дѣтей и вообще при пораженіи мозга дѣйствуетъ лучше, чѣмъ Bell. и Acon.) Дается въ низкихъ дѣленіяхъ: — 2 дѣленіе.

Противъ воспаленія спинно-головнаго мозга: *Bapt. tinct.* (?), *Cimicifuga* (сильная головная боль, какъ будто съ каждымъ ударомъ сердца вбивается клинъ отъ затылка къ темени, неподвижность позвоночнаго столба, клоническія и тоническія судороги, сильная боль въ глазахъ, распухшій языкъ), *Gelsem.* (сильное развитіе болѣзни, слабый пульсъ, затрудненное дыханіе, тошнота, рвота, потеря зрѣнія, параличъ языка и неподвижность членовъ), *Ver. vir.*

Не слѣдуетъ класть льда на голову, потому что отъ этого легко образуется выпотѣніе; на столько же вредно содержать больного въ излишнемъ теплѣ.

Лучшее отвлекающее средство (во всякомъ случаѣ лучше безполезныхъ аллопатическихъ горчичниковъ) — завертываніе каждой ноги въ холодные, хорошо выжатые полотняные компрессы (такъ называемые компрессы Присница), поверхъ которыхъ кладется фланель.

Приемы лѣкарствъ должны быть сильны и часто повторяться, въ случаѣ надобности, даже черезъ 2—3 часа.

25. Ударъ, *apoplexia.*

Чаще всего причиною его бываетъ изліяніе крови въ полость мозга, вслѣдствіе разрыва маленькихъ кровеносныхъ сосудовъ (волосныхъ сосудовъ) или большихъ жилъ, рѣже — болѣзни мозговой субстанции (давленіе отъ опухолей, засорѣніе мозговыхъ жилъ, размягченіе, засореніе, маразмъ мозга въ старости), давленіе на мозговые сосуды вслѣдствіе нарушенія правильнаго кровообращенія (бо-

лѣзни сердца и т. п.), или расслабляющія недуги питанія (*тифъ*, болѣзнь почекъ, гнойное зараженіе крови и т. п.). Но существуютъ еще такъ называемый водяной ударъ, происходящій отъ изліянія воды, и нервный ударъ, являющійся безъ видимой матеріальной причины. Однако при діагнозѣ послѣдняго надо быть осторожнымъ, потому что въ этомъ случаѣ часто могутъ существовать настоящія внутреннія изліянія крови или заражающееся размягченіе мозга. Здѣсь мы имѣемъ дѣло съ ударомъ отъ изліянія крови, такъ какъ нервный ударъ, основывающійся на истощеніи, входятъ въ отдѣлъ о параличѣ (см. ниже). Послѣдствія удара, состоящія въ разстройствѣ разныхъ частей мозга, часто гораздо опаснѣе самаго припадка. Надежда на полное выздоровленіе омрачена между прочимъ тѣмъ обстоятельствомъ, что ударъ во многихъ случаяхъ можетъ повториться и вслѣдствіе этого въ концѣ концовъ кончиться смертью. Случайныя причины удара: душевныя потрясенія всякаго рода, напряженіе силъ, переполненіе желудка, хмѣльное состояніе, измѣнчивая температура, атмосферическія вліянія. Страдающіе болѣзнью сердца или легкихъ, ведущіе сидячую или невоздержную жизнь, сангвиники, — наиболѣе склонны къ этой болѣзни; возрастъ 40 — 70 лѣтъ чаще всего поражается ею; наследственность и періодъ равноденствій имѣютъ на нее несомнѣнное вліяніе.

Признаки, предвѣщающіе болѣзнь: приливъ крови къ головѣ (головная боль, головокруженіе, шумъ въ ушахъ) и къ сердцу, ослабленность всѣхъ членовъ, забывчивость, заиканіе, нетвердая походка, апатія, онѣмѣніе членовъ. Часто однако припадокъ случается внезапно. Больной падаетъ въ безпамятствѣ, чувства прекращаютъ свои функціи, языкъ и движеніе отнимаются; лицо опухшее, красное, или синее, или блѣдное, хрипѣніе, отрывистое дыханіе, безсознательное испусканіе мочи и испраженій; иногда рвота; пульсъ медленный, большой и полный; слезившіеся зрачки. Отличительную примѣту удара составляетъ параличъ, поражающій большею частью только одну сторону (искривленіе угловъ рта, параличъ языка, рукъ и ногъ).

Ходъ болѣзни быстрый. Если втеченіе 2 — 3 дней не видно поправленія, то слѣдуетъ опасаться смерти.

Излѣченіе обнаруживается постепеннымъ исчезновеніемъ симптомовъ болѣзни, идущимъ наравнѣ съ всасываніемъ жидкости, излив-

шейся въ мозгу. Дальше всего продолжается параличъ членовъ. Хотя трудно предположить, что при такой опасной болѣзни пренебрегутъ помощью врача, тѣмъ не менѣе я дамъ слѣдующіе совѣты для первой помощи въ отсутствіи его.

Arnica — 2.

Пульсъ *полонъ, жёстокъ*, отрывистъ; расслабленіе членовъ, безпамятство, невольное отдѣленіе мочи и испражнений; бормотаніе, вздыханіе или храпѣніе. Въ состояніи слабости, и когда болѣзнь происходитъ отъ механическихъ поврежденій. Очень полезно противъ паралича, слѣдующаго за ударомъ.

Baryta — 3.

Полезно *старикамъ*, особенно страдающимъ ломотою, золотухою. Параличъ языка, верхнихъ членовъ или одной стороны; искривленіе рта, рѣзко очерченный румянецъ; сонливость, одурѣніе, безпамятство съ ребяческими ухватками; вздохи, бормотаніе, хрипѣніе, угрожающій параличъ легкихъ.

Belladonna — 2.

Преобладаетъ приливъ крови. Глаза и лицо красны, жаръ въ головѣ, біеніе шейныхъ жилъ; *разширеніе* зрачковъ; судороги членовъ и мускуловъ лица; отнимается языкъ; безпамятство, слюнотеченіе; *моланіе невозможно*, дыханіе затруднено.

Nux vomica — 2.

Пьяницамъ, страдающимъ геморроемъ; послѣ невоздержности въ пищъ; когда преобладаетъ *параличный* характеръ; безпамятство съ хрипѣніемъ, отвислость нижней челюсти; особенно когда парализованы нижніе члены. Склонность ко рвотѣ. Передъ припадкомъ — тошнота, головная боль, запоръ.

Orium — 2.

Передъ припадкомъ: *отупленіе*, тяжесть, головокруженіе, неподвижность зрачковъ, шумъ въ ушахъ, *бессонница*, безпокойныя грезы. Во время припадка: *корчи* или *конвульсии* членовъ съ пѣною у рта; судороги нижней челюсти, бредъ, дыханіе со стономъ, тоскливое, тихое *храпѣніе* при головномъ жарѣ, *красныхъ глазахъ съ разширившимися зрачками*; раздувшееся, красное лицо; *спячка съ одурѣніемъ*, члены холодны, пульсъ слабъ и полонъ; голова какъ будто слишкомъ тяжела и падаетъ при поднятіи ея назадъ; біеніе въ вискахъ. Полезно также *пьяницамъ*.

Примѣч. Часто мнѣ приходилось замѣчать, что при совершенномъ изнеможеніи послѣ предшествовавшей слабости или прилива крови полезенъ **Phosph. 2.**, особенно старымъ людямъ; а когда болѣзнь происходитъ отъ разстройства желудка (пьяницамъ) — *Tart. emet. 2.*, причѣмъ бываетъ безпамятство, дыханіе съ хрипомъ, угрожаетъ опасность задохнуться. — Указанныя выше средства назначаются для первыхъ припадковъ болѣзни, при которыхъ Ганеманнъ разрѣшилъ также кровопусканіе, которое однако дѣйствуетъ на мозгъ не прямо и потому приноситъ гораздо менѣе пользы, чѣмъ обыкновенно думаютъ, почему на него и не слѣдуетъ рѣшаться безъ дозволенія врача. Для предупрежденія этой болѣзни и чтобы избѣгать ея возвращенія, къ которому всегда имѣется склонность, надо принимать во вниманіе ея причины: приливъ крови, вредныя привычки, невоздержность въ пищѣ и т. д. А потому при лѣченіи надо соблюдать приличную діету. О лѣченіи послѣдствій этой болѣзни, особенно *паралича*, см. ниже. Здѣсь мы только замѣтимъ, что послѣ *Arnica*, вслучаѣ это средство не окажется достаточнымъ, достойно употребленія **Sulph. 3.**, и что противъ паралича отъ удара наибольшій успѣхъ имѣютъ **Coccul., Causticum, Plumbum, Rhus, Zincum**. Должно быть осторожнымъ относительно купанія въ минеральныхъ водахъ и пользованія электричествомъ!

Изъ новѣйшихъ средствъ слѣдуетъ упомянуть о *Gelsem.* при пассивномъ приливѣ и нервномъ истощеніи; помогаетъ ли *Sanguinaria*, см. стат. 24. (венозный приливъ?) — еще вопросъ!

26. Головокруженіе,

vertigo.

Оно бываетъ предвѣстникомъ и признакомъ не только полнокровія (конгестивное голокруженіе), но часто и совершенно противоположнаго недуга, — малокровія (анемическое), а иногда оно бываетъ чисто нервнаго характера; то оно зависитъ отъ самаго мозга (здѣсь причины могутъ быть также органическія), то отъ недуговъ другихъ органовъ: носа, лобной полости, глазъ, ушей, спиннаго мозга, желудка, кишекъ, легкихъ, сердца. Къ нему не слѣдуетъ относиться съ пренебреженіемъ, такъ какъ оно часто бываетъ предвѣстникомъ опасныхъ недуговъ.

Противъ головокруженія отъ прилива крови главное средство — **Bellad.**, также *Acon.*, а въ хроническихъ случаяхъ *Sulph.*

Противъ головокруженія отъ гастрическихъ причинъ главное средство **Nux vom.**, а еще — *Antim., Puls., Sulph.*

Противъ головокруженія отъ малокровія главное средство — **Ferrum**, также *Calc., Chin., Puls.* Противъ нервнаго головокруженія (также противъ органическаго) **Phosphor., Rhus.**

При выборѣ средствъ должно принять во вниманіе еще слѣдующее:

Aconitum — 2.

При приливѣ крови. Больные чувствуютъ наклонность къ лежанію. Боли при выпрямленіи, нагибаніи, съ тошнотою; круженіе предметовъ, отуманеніе головы, чувство омыанія. Теплота и пребываніе въ комнатѣ ухудшаютъ состояніе больного.

Antimonium — 2.

Гастрическія причины. Отсутствіе аппетита, тошнота, рвота, катарръ желудка.

Belladonna — 2.

Главное средство отъ прилива крови, обнаруживающагося особенно при движеніи, наклоненіи; головокруженіе, отъ котораго больной падаетъ въ безмятежствѣ на землю; тошнота; блестяи, потемнѣніе глазъ; шумъ въ ушахъ, сердцебиеніе, жаръ въ лицѣ, тоска, одурѣніе.

China — 2.

Нервное головокруженіе, какъ слѣдствіе малокровія, съ чувствомъ слабости, или когда оно повторяется періодически. Съ послѣдующимъ жаромъ и тошнотою при вставаніи.

Ferrum — 2.

Отъ малокровія; часто однако схоже съ головокруженіемъ отъ полнокровія, а потому признаки тѣ же, что при *Bellad.*

Nux vomica — 2.

Костистивное и гастрическое головокруженіе. Послѣ стола, пощенія, отъ спартныхъ напитковъ или отъ умственныхъ занятій; бываетъ рано утромъ или послѣ прогулки на чистомъ воздухѣ, или въ постели, при лежаніи на спинѣ; при наклоненіи; съ гастрическими симптомами, шумомъ въ ушахъ, потемнѣніемъ

лица, приливами геморроидальнаго свойства, соединенными съ запоромъ. — Колебаніе въ мозгу во время ходьбы.

Phosphor. — 2.

Слѣдствіе умственной напряженія, чрезмѣрныхъ половыхъ наслажденій, особенно онанизма, а также отъ органическихъ причинъ. Является утромъ и вечеромъ въ постели, послѣ ѣды, сидѣнія, съ кажущимся приливомъ къ головѣ, давящей головной болью, неспособностью къ мышленію.

Pulsatilla — 2.

При нервной слабости, дѣвической немочи, разстройствѣ желудка, прекращеніи менструацій; головокруженіе при смотрѣніи вверхъ, вставаніи, наклоненіи.

Съ блѣдностью лица, ознобомъ, тошнотой; особенно вечеромъ и въ постели. Слезивость. Во время сидѣнія темнота въ глазахъ; тяжелая голова, какъ будто хмѣльная. Шумъ въ ушахъ.

Rhus toxicodendron — 2.

Первое головокруженіе. Когда ложишься въ постель; подергиваніе, ломъ, колебаніе въ мозгу при ходьбѣ; чрезвычайная слабость.

Sulphur — 2.

Болѣе въ хроническихъ случаяхъ; симптомы подобны означеннымъ при Nux; когда сидишь или поднимаешься куда-нибудь вверхъ, послѣ ужина, вечеромъ или ночью; на открытомъ воздухѣ. Разстройство желудка, полнокровіе нижней части живота.

Примѣчаніе. Если причиною служатъ потрясенія (паденіе, ударъ), то надо давать **Arnic. 2.**; если же пьянство, то — вслучаѣ *Nux vom.* не поможетъ — **Opium 2.** (сонливость); когда головокруженіе происходитъ отъ душевныхъ потрясеній — **Cham. 2.** (досада), **Coffea 2.** (радость), **Opium 2.** (испугъ). Во время ѣзды въ экипажѣ: **Coccul. 2.** или **Hepar. sulph. 3.** При малокровіи полезно также **Calcar. carb. (3—5.), Silicea** или **Natr. mur. 5.** При полнокровіи нижней части живота, въ особенности у женщинъ съ ненормальной менструаціей и мигренью, **Sep. 5.**, а при ясно обнаружившихся хроническихъ приливахъ крови **Nitr. ac. 3.** (біеніе, давленіе на мозгъ, также при пораженіяхъ сердца и легкихъ). Когда причиною болѣзни — органическое разстройство мозга: **Arnica, Arsenicum 5.**

Противъ *головокруженія у беременных* я совѣтую **Bellad.** (съ приливомъ крови), **Nux vom.** (съ тошнотой) или **Serpia** (когда головокруженіе продолжительно).

Противъ *головокруженія отъ глисть*: *Cina 2.* (когда причиною — аскариды) или *Spigel. 2.* (причиною круглые глисты).

Вотъ еще новѣйшія средства: *Aesculus glabra* — отъ гастрическихъ причинъ; *Euphorbia corollata* — въ головѣ какъ будто все расплывается, слабость, признаки обморока, потемнѣніе зрѣнія, шумъ въ ушахъ, предчувствіе смерти; больному кажется, что вокругъ него все качается (морская болѣзнь).

27. Головная боль, *cephalalgia.*

Головная боль или бываетъ самостоятельна, или сопровождается другіе различные недуги. Мѣстомъ пребыванія ея могутъ быть нервы кожи, мускулы, сухожилія, кости и околокостная оболочка головы, также лобная полость, оболочки мозга и самый мозгъ. Она можетъ возникнуть отъ прилива крови (конгестивная боль), отъ недостатка крови (анемическая, такъ назыв. нервная головная боль, которая часто обнаруживается совершенно какъ приливъ крови), отъ раздраженія нервной системы, отъ ревматизма, ломоты, расстройства пищеваренія, недуговъ нижней части живота, сифилиса, органическихъ недуговъ мозга. Она можетъ предвѣщать или сопровождать болѣзни и бываетъ или острая (отдѣльными сильными припадками), или хроническая. Въ послѣднемъ случаѣ она иногда наступаетъ періодически, въ формѣ мигрени, т. е. боли, которая поражаетъ большею частью только одну сторону головы, но иногда и обѣ; страдаютъ ею главнымъ образомъ женщины; по большей части она сопряжена съ болѣзнию печени, нервовъ, съ ненормальной менструаціей, съ разстройствомъ желудка и т. п. Припадки ея продолжаются 12 часовъ и усиливаются до тѣхъ поръ, пока наступитъ рвота и сонливость. При лѣченіи должно принимать все это въ соображеніе.

Изъ относящихся сюда средствъ особенно достойны вниманія:

- 1) При головной боли отъ приливовъ крови (конгестивная головная боль): **Acon.**, **Bellad.**, **Nux vom.**, — также *Arn.*,

- Bryon.*, — *Glonoin.* (волнообразное биение съ головокруженіемъ), *Nitr. ac.* (хроническая головная боль);
- 2) При головн. боли отъ малокровія: **Calc. c.**, **Ferr.**, **Puls.**, также *Natr. mur.*, а при собственно нервной головной боли: **Ignat.**, **Nux vom.**, **Phosph.**, — также *Aurum*, **Argent. nitric.**, *Caps.*, *Chin.*, *Coffea*, **Plat.**, *Spigelia*;
- 3) При головн. боли отъ растроенаго пищеваженія (гастрическая головная боль): **Antim.**, **Bryon.**, **Ipec.**, **Nux vom.**, **Sep.**, также *Natr. mur.*, *Puls.*, *Sulph.*, *Veratr.* — При недугахъ желчи: **Bryon.**, **Coloc.**;
- 4) При головной боли отъ катарра, насморка: **Acon.**, **Merc.**, **Nux vom.** **Silic.**; также *Dulc.* (сверленіе), *Euphr.* (насморкъ, слезотеченіе).
- 5) При ревматической и ломотной голов. боли: **Acon.**, **Bryon.**, **Cham.**, **Coloc.**, **Merc.**, **Puls.**, **Rhus tox.**, **Silic.**, **Sulph.**; также **Hep. sulph.** (какъ будто въ головѣ сверлятъ гвоздемъ) и иногда **Spig.** (периодическое подергиваніе въ одной сторонѣ, доходящее до лица).
- 6) При головн. боли, соединенной съ полнокровіемъ нижней части живота: **Nux vom.**, **Sepia**, **Sulph.**
- 7) При сифилитической головной боли: **Iod.**, **Merc.** и, въ особенности если послѣднее средство употреблялось уже въ слишкомъ большомъ количествѣ, **Nitr. acid.**; — также **Aur.** (чувство, какъ будто всѣ члены разбиты), **Mezer.** (какъ будто въ головѣ сверлятъ).
- 8) При головной боли отъ органическихъ недуговъ мозга: **Arsen.**, **Calc. carb.**, **Phosph.** и др. Здѣсь выборъ лѣкарствъ возможенъ только для людей опытныхъ въ лѣченіи.

Указанія для выбора лѣкарствъ:

Aconitum — 2.

Приливъ крови; катарральныя, ревматическія боли. Лихорадка, краснота или блѣдность лица, полный пульсъ; сильное возбуж-

деніе. Одурѣніе, сильныя, одуряющія, стягивающія, жгучія боли, шумъ въ ушахъ, головокруженіе; хуже отъ движенія и всякаго напряженія.

Antimonium — 2.

Головная боль съ *гастрическими симптомами*, отсутствиемъ аппетита и т. п., или съ сыщью послѣ простуды, особенно когда боль во лбу, который какъ бы готовъ лопнуть; судорожное, тушое сверление во лбу и вискахъ или ломъ. Лучше на открытомъ воздухѣ.

Arnica — 2.

Отъ *механическихъ* причинъ, паденія, удара и проч. Признаки потрясенія мозга или прилива крови, голова тяжела, головокруженіе, жаръ, давленіе во лбу, колотье какъ будто отъ гвоздя; желчная рвота, кровь носомъ.

Arsenicum — 2.

Нервная или *органическая* головная боль. Отъ невоздержаннаго образа жизни. Полустороннее, *периодически* возвращающееся бѣненіе въ одной половинѣ головы, кончающееся одурѣніемъ и причиняющее большую слабость, болѣзненность волосистой части головы; сильная головная боль, доводящая до отчаянія, съ тошнотой, шумомъ въ ухахъ и *безпокойными* ночами, хуже послѣ ѣды, въ особенности ночью, а *хуже* всего въ полночь. Прикладываніе холодной водой облегчаютъ боль, а безъ воды боль усиливается;

ходьба, внѣшняя теплота и давленіе также облегчаютъ.

Belladonna — 2.

Отъ *потрясенія мозга*, прилива крови: бѣненіе, давленіе, лобъ распираетъ, такъ что онъ какъ будто готовъ лопнуть, то же чувствуется относительно одной изъ сторонъ головы; *колебаніе*, толчки, какъ бы *клокотаніе* воды въ головѣ или одностороннее дерганіе, ломъ и *колотье*. Притомъ бѣненіе жилъ, ощущеніе какъ бы ударовъ на тонкій черепъ, *головокруженіе*, шумъ въ ухахъ, одурѣніе, краснота и жаръ въ лицѣ; чувствительность къ свѣту, къ толчкамъ, къ прикосновенію; сильнѣе ночью, отъ движенія, прикосновенія, постельной теплоты, нагибанія.

Bryonia — 2.

Конгестивная, *гастрическая*, *ломотная* головная боль. Растягиваніе или *сдавливаніе*; бѣненіе, подергиваніе, колотье, одностороннее, во лбу или въ вискахъ. При томъ *чувство полноты*, ощущеніе, будто *передо лбомъ* — *доска*, *тяжесть*, жженіе во лбу, жаръ въ головѣ; рвота, тошнота, языкъ нечистъ, желчные признаки, запоры, хуже отъ ѣды, рано утромъ, отъ движенія, при-

косновения, особенно отъ *наибанія*.

Calcaerea carbonica — 3.

Головная боль отъ давленія, *малокровія и ломотная, мирень*. — *Біеніе*, удары какъ бы молоткомъ, давленіе, одурѣніе, сверленіе въ верхней части головы или въ одной изъ половинокъ ея; подергиваніе съ тошнотою; рвота. Притомъ *жаръ* или чувство холода въ головѣ, отуманеніе, голова какъ будто *сжата тисками*, больной отъ тяжести въ головѣ едва можетъ открывать вѣки; волосистая кожа болѣзненна; припадки усиливаются рано утромъ, отъ умственного напряженія, движенія, нагибанія, досады. — У людей золотушныхъ.

Chamomilla — 2.

Ревматическая и нервная головная боль съ катарральными, истерическими припадками. Полезно очень чувствительнымъ раздражительнымъ особамъ. — *Ломъ, подергиваніе*, даже до челюстей, колотье, біеніе, *краснота одной и блѣдность другой щеки*, жаръ и потъ на головѣ.

China — 3.

Нервная головная боль или боль отъ *малокровія*; главнымъ

образомъ при *периодически, въ опредѣленное время* возвращающихся головныхъ боляхъ съ *ознобомъ и потомъ: давленіе*, особенно ночью, дерганіе во лбу, *сверленіе* въ маковкѣ, ощущеніе будто *мозгъ стиснуть*. Жаръ или холодъ въ больныхъ мѣстахъ. *Подергиваніе* и *ломъ*, какъ будто черепъ готовъ лопнуть. *Чувствительность волосной кожи*, капризное настроеніе духа, блѣдность, смѣняющаяся летучимъ жаромъ и краснотой. Хуже отъ *прикосновения* къ головѣ, напряженія, на свѣжемъ воздухѣ, отъ холода.

Colocynthis — 3.

Нервная, ломотная головная боль и боль при *желчныхъ* припадкахъ. Чрезвычайно сильный *ломъ* въ одной сторонѣ, *судорожное давленіе, сдавливаніе* во лбу, усиливается отъ лежанія и нагибанія; въ послѣобѣденное время и вечеромъ присоединяется тоска и безпокойство. Периодическіе приступы тошноты, рвоты, языкъ *покрытъ желчью*; потъ съ запахомъ мочи; моча свѣтла какъ вода.

Ignatia — 2.

Истерическая, нервная головная боль. Главное средство противъ *мирени у истерическихъ особъ*. *Давленіе* надъ носомъ, подергива-

ніе, біеніе, *растираніе*, *сверлящее* *колотье* *глубоко въ мозгу*; ломъ во лбу или ощущение, какъ будто бы *въ мозгъ вбитъ гвоздь*; притомъ тошнота, свѣтобоязнь, *блѣдность* *лица*, *блѣдная* *моча*, робость, раздражительность, капризное настроеніе. Всякое возбужденіе отъ разговора, спиртныхъ напитковъ и т. п. усиливаетъ боль.

Гресасуанѣа — 2.

Гастрическая головная боль. Какъ будто все въ головѣ разбито, притомъ тошнота и рвота.

Меркур. — 3.

Коместивная, *катарральная*, *ревматическая*, *ломотная*, *сифилитическая* *головная* *боль*. Ломъ, жженіе, колотье, *сверленіе*, *біеніе* и такіе сильные удары въ *черепъ*, что, кажется, онъ *долженъ лопнуть*; чувство полноты, кажется, что голова стянута бинтомъ; головная боль въ одной сторонѣ, доходящая даже до *зубовъ* и до *костей*; стрѣльба въ ушахъ; безпокойство, *мигорадка*, *потъ безъ облеченія*. — Боль сильнѣе: ночью, отъ *постельной теплоты*, отъ жара, холода и на открытомъ воздухѣ.

Nux vomica — 3.

При *коместивной*, *гастриче-*

ской *головной* *боли*, происходящей отъ *спиртныхъ* *напитковъ*, *сидячаго* *образа* *жизни*, напряженія, и сопровождаемой *полнокровіемъ* *нижней* *части* *живота* и геморроемъ, — рѣдко при *нервной*, *катаррал.*, *ревм.* *головной* *боли*; особенно когда — *давящая* *боль*, въ голову какъ будто вбитъ гвоздь; *тяжесть*; періодическая боль; *мозгъ* какъ бы *помятъ*, сотрясенія при каждомъ шагѣ, движеніи, нагибаніи; припадки ограничиваются иногда одной стороной головы. Притомъ тошнота, шумъ въ ушахъ, головокруженіе, *блѣдность* *лица*, *запоръ*. Горячій, холерическій темпераментъ. Припадки усиливаются рано утромъ, послѣ пробужденія, *движенія*, наклоненія, *пды*, *кофе*, *усиленныхъ* *размышленій*, на *открытомъ* *воздухѣ*. Очень хорошее средство для излѣченія *миреной* (рѣдкіе приемы и высокія дѣленія) и для сокращенія припадковъ (въ такомъ случаѣ частые приемы, черезъ каждые 2 — 1 часа), особенно при позывѣ ко рвотѣ.

Phosphor. — 3.

Нервная *головная* *боль*, происходящая также отъ малокровія. Тяжесть; кажущійся *приливъ* *крови*; одуряющее давленіе; *стягиваніе*, *ломъ* *во* *лбу*, *біеніе*

и колюще въ темени, а въ затылкѣ *жжение* съ жаромъ; расположение къ обмороку и чрезвычайная слабость.

Pulsatilla — 2.

Боль отъ *малокровія, гастрическая, катарральная, ревматическая*. — Хорошее средство для *флегматичныхъ, нъжныхъ, страдающихъ блдною немочью* особъ. — Ломъ, *подериваніе, колюще съ біеніемъ, толчки, головокруженіе, шумъ въ ушахъ, тошнота, свѣтобоязнь, потемнѣніе въ глазахъ, стрѣльба въ ушахъ, ознобъ, слезливость, блдность, тоска, сердцебіеніе*. Хуже *вечеромъ, въ покоѣ, при сидѣніи, лучше на открытомъ воздухѣ, отъ теплаго закутыванія головы, нажатія*.

Platina — 2.

Нервная головная боль, особенно у женщинъ, при слишкомъ сильной менструаціи, съ рѣзью въ животѣ, у полнокровныхъ и раздражительныхъ особъ. Сильная боль, то какъ будто происходящая отъ *ударовъ* какимъ-нибудь тупымъ орудіемъ, то давящая, какъ отъ повязки; въ передней части головы, надъ носомъ; шумъ въ головѣ, какъ будто отъ воды; жаръ и краснота лица, или холодъ въ

ушахъ, въ одной сторонѣ головы; искры передъ глазами, обманы зрѣнія (иллюзіи), безпокойство. *Слезливость*. — Судороги, тоска, одышка.

Rhus toxicodendron — 3.

Ревматическій, нервный ломъ, распространяющійся по лицу и проч. *Дерганье, колебаніе въ мозгу при ходьбѣ, колебаніе и зудъ въ головѣ, хуже въ покоѣ. Отъ тепла легче*.

Sepia — 3.

При *полнокровіи нижней части живота*; при *ломотной, нервной головной боли*. Главное средство противъ *мигрени*, особенно у женщинъ, когда она находится въ связи съ недугомъ нижней части живота, разстройствомъ менструацій (поэтому боли наступаютъ во время мѣсячнаго очищенія), и противъ *односторонней головной боли съ колющемъ, сверленіемъ, дерганіемъ, давленіемъ, тяжестью, уныніемъ* тошнотою, рвотой, желчными припадками, *менструальными недугами, сильнымъ половымъ влеченіемъ, свѣтобоязнию, разстройствомъ пищеваженія, запоромъ, чувствительностью, бѣлями*.

Silicea — 3.

Катарральная, ревматическая, ломотная головная боль,

особенно *хроническая*; бiеніе ночью отъ затылка до маковки; голова готова *лопнуть*, боль во лбу и *глазахъ*; въ одной сторонѣ головы стрѣльба и *ломъ*. Съ *опухолями*, потомъ на головѣ, выпаденіемъ волосъ, *жаромъ въ голову*; сильнѣе утромъ, въ полдень, отъ умственныхъ занятій, разговора, наклоненія, прикосновенія.

Sulphur — 3.

Головная боль отъ прилива крови, *гастрическая*, *ломотная*, *ревматическая*, особенно *хроническаго характера*. — *Полнокровіе нижней части живота*, геморрой. Ощущеніе полноты, *дав-*

леніе, тяжесть, расpiratione, *ломъ*, *колотье*, дерганье, *бiеніе*, *клокотаніе*, шумъ въ ушахъ; *запоръ*; хроническая головная боль; сильнѣе утромъ или ночью, послѣ *пды*, *размышленія*, на открытомъ воздухѣ.

Veratrum — 2.

Гастрическая и нервная головная боль, доводящая до помѣшательства, съ *слабостью*, доходящей до *обморока*, съ *ознобомъ*, *холоднымъ потомъ*; въ одной сторонѣ головы, давленіе и бiеніе, *стягиваніе мозга*, голова какъ бы разбита; тошнота, рвота, поносъ.

Примѣчаніе. При чрезвычайномъ разнообразіи головныхъ болей можно, конечно, прибѣгнуть еще ко множеству другихъ средствъ, но въ большей части случаевъ вышеозначенныхъ лѣкарствъ бываетъ достаточно. Гомеопатія именно въ области этой болѣзни особенно счастлива, требуется лишь, чтобы строго различали различные виды головной боли. Противъ *ревматическихъ* и *нервныхъ* головныхъ болей гомеопатія употребляетъ также *магнетизмъ*. Электричествомъ должно пользоваться съ большою осторожностью.

Для полноты упомянемъ еще о новѣйшихъ средствахъ, рекомендуемыхъ противъ головной боли.

Aescul. — гастрическая и конгестивная головная боль; *Aroc. andr.* — ревматическая, желчная, конгестивная, нервная головная боль; *Asclep. syr.* — головокруженіе, послѣ скрывшагося пота, нервная головная боль съ обильнымъ выдѣленіемъ мочи; *Bart.*, какъ *Bry.*, *Gels.*, *Arn.* и *Mur. ac.*, въ тифѣ, при желчной, нервной, ревматической головной боли; *Cauloph.* — головокруженіе, помраче-

ніе зрѣнія, давленіе позади глазнаго яблока, вспуханіе височныхъ артерій; при ревмат. и нервной головной боли, съ пораженіемъ матки и позвоночнаго столба; **Cimicifuga** — нервная и ревмат. головная боль, въ связи съ разстройствомъ регуль, подобно Nux., Glon., Spig., Digit., Ign., Bell.; отъ движенія боль усиливается; *Nuphar lutea* — сверлящая, давящая, тупая боль, особенно около глазъ; *Phytol.* — ревматическая, катарральная, нервная, сифилитическая головная боль, по большей части тупая, но бываетъ и острая, съ колотьемъ, давленіемъ въ вискахъ.

Противъ мигрени, такъ наз. sick-headache: *Eupat. perf.*, періодически, ежедневно, колотье, стукъ и т. п.; *Apos. a.* (см. выше); *Cact. grandifl.*, боль въ правомъ вискѣ, по утрамъ, отъ вина, отъ театра и поздняго ужина; свѣтъ и шумъ невыносимы; требуется величайшее спокойствіе; *Cimicif.* (см. выше); **Gelsem.**, боль исходитъ изъ затылка, поражаетъ только одну сторону головы и сопряжена съ помраченіемъ зрѣнія, слабостью, головокруженіемъ, отягченіемъ головы, легкимъ одуреніемъ, полнымъ и медленнымъ пульсомъ (большіе приемы!); **Iris vers.**, боль во лбу, поражаетъ только одну сторону, усиливается отъ покоя, наступаетъ при первомъ движеніи, но затѣмъ облегчается отъ движенія; устраняетъ упадокъ духа, тошноту (хвалятъ за необыкновенно быстрое дѣйствіе!), въ особенности когда она происходитъ отъ разстройства желудка или печени (противъ чисто конгестивной или нервной головной боли оно не помогаетъ) быстро устраняетъ рвоту; **Sanguin canad.**, давно уже извѣстно какъ главное средство противъ мигрени; боль начинается въ затылкѣ и затѣмъ распространяется до праваго глаза; тошнота, рвота, ознобъ, сильная склонность къ лежанію, въ темнотѣ, боль періодическая; роняющая и стучащая боль, прохватывающая насквозь.

Приемы вообще должны быть средніе (5 — 3 разжиженія). Повтореніе, даже въ острыхъ случаяхъ, должно быть рѣдкое (черезъ 3 — 2 часа), въ хроническихъ же по 1 разу утромъ и вечеромъ, или 1 разъ въ день при сильныхъ нападахъ, а иногда даже съ промежутками въ нѣсколько дней, особенно при *Sep.*, *Sil.*, *Sulph.* и вообще лѣкарствахъ, дѣйствующихъ глубже, т. е. на самыя причины болѣзни.

Для радикальнаго излѣченія, особенно *мигрени*, противъ которой иногда употребляютъ и *Gelseminum*, *Sanguinaria*, *Paris quadrif.*, слѣдуетъ пользоваться болѣе высокими дѣленіями (5) и принимать лѣкарство рѣдко, не болѣе 2 — 3 разъ въ недѣлю. Во время припадка не пьющимъ кофе лучше всего помогаетъ *Coffein.* (а также крѣпкій настой кофе безъ сливокъ, по нѣсколь-ку чайныхъ ложекъ), пьющимъ же кофе въ этихъ обстоятельствахъ полезнѣе всего *Nux vomica* (частые приемы). Последнее средство, а также *Sepia* и *Calc. carb.*, — главные средства для радикальнаго излѣченія.

28. Кровяная опухоль головы у новорожденныхъ,

cephalaematoma, и болѣзни черепа.

Въ большинствѣ случаевъ эта опухоль наружныхъ покрововъ головы, происходящая почти всегда отъ давленія при родахъ (искусственныхъ), излѣчивается накладываніемъ компрессовъ изъ разжиженной *арниковой* тинктуры. Если наступаетъ воспаленіе, давать *Mercur. 3.* растир. или, если это средство не поможетъ втеченіе нѣсколькихъ дней, то *Hep. sulph. 2.* растир., черезъ каждые 5 часовъ по приему величиной въ горошину. Если есть нагноеніе, то слѣдуетъ удалить гной посредствомъ прокола. Когда нагноеніе затнулось, или гной очень жидокъ, то слѣдуетъ давать *Silic. 3.*, утромъ и вечеромъ по 1 приему.

Прочія болѣзни черепа, какъ напр. наросты, утолщеніе, переломы костей, костоѣда, относятся частью къ области другихъ болѣзней, которыя требуютъ тщательнаго и продолжительнаго лѣченія, частью къ области хирургіи.

29. Ненормальный сонъ.

Очень часто средства противъ этого недуга не помогаютъ, такъ какъ упускается изъ виду, что ненормальный сонъ бываетъ лишь слѣдствіемъ другихъ болѣзней и только тогда устраняется,

когда представляется возможность дѣйствовать противъ основной причины. Поэтому достаточно указать здѣсь на характеръ разнообразныхъ ненормальностей сна, чтобы дать возможность сдѣлать правильный выборъ. Только въ крайнихъ случаяхъ, когда угрожаетъ больному истощеніе, а стараніе устранить основной недугъ не сопровождается успѣхомъ, можно прописать прямо усыпительное средство, т. е. опіатъ (большею частію *Morphium acet.*), которымъ однакоже аллонатія слишкомъ злоупотребляетъ. Впрочемъ этотъ препаратъ долженъ быть принимаемъ непременно съ разрѣшенія и подъ наблюденіемъ врача.

1) Бессонница, *agrypnia, insomnia*, можетъ быть слѣдствіемъ:

а) слишкомъ сильнаго нервнаго возбужденія, послѣ душевныхъ волненій, страха, испуга, печали, умственныхъ напряженій, бдѣнія, распутства и проч. Здѣсь помогаютъ, смотря по обстоятельствамъ: **Coffea 2.** (радость, чрезвычайное раздраженіе), **Ignat. 2.** (печаль, истерика), **Nux vom. 3.** (умственное напряженіе, спиртные напитки, бдѣніе), **Opium 3.** (испугъ); — *Valeriana*.

б) слишкомъ сильнаго прилива крови къ мозгу, частью непосредственнаго, частью же происходящаго отъ недуговъ сердца, нижней части живота или другихъ органовъ: **Acon. 2., Bellad. 2., Nux v. 3., Sulph. 3.,** также **Merc. 3., Nitr. ac. 3.;**

в) разстройство желудка, вѣтровъ и проч.: **Bryon. 2., Nux vom. 3.**

г) глубокой старости: **Con. 2., Opium 3.**

Во всѣхъ прочихъ случаяхъ надо брать во вниманіе мѣстныя или общія причины, обуславливающія бессонницу; такъ напр. при бессонницѣ дѣтей отъ прорѣзыванія зубовъ: **Acon., Cham., Merc.** (см. ниже); при органическихъ страданіяхъ сердца: **Arsen., Spig.** и т. д. Въ этихъ случаяхъ нерѣдко излѣчивается бессонница, если только удастся найти главную причину ея, хотя послѣднюю и не всегда можно устранить вполне. — Также надо поступать относительно

2) спячки (*sopor*), т. е. и здѣсь средства выбираются подобно съ недугами, лежащими въ основаніи болѣзни. Са-

мыя важныя изъ этихъ средствъ суть: **Opium, Bellad., Tart. stib.**

3) Наконецъ, что касается до ненормальныхъ явленій, сопровождающихъ сонъ, то при безпокойномъ снѣ (смотря по обстоятельствамъ) даютъ: *Acon., Bellad., Bryon., Cham., Nux vom., Rhus tox.*; если онъ сопровождается множествомъ сновидѣній: *Bellad., Nux vom., Puls., Sulph.*; — нервными симптомами, какъ напр. вздрагиваніемъ: *Cham., Cupr., Hyosc., Opium.*; если же — подергиваніемъ и искаженіемъ чертъ лица: *Bellad., Cham., Cupr., Hyosc., Ignat., Stram.*; — разговоромъ и крикомъ: *Arsen., Bellad., Cham., Ignat., Nux vom., Sep., Stram.*; — судорогами: *Cupr., Hyosc., Opium., Stram., Veratr., Zinc.* (см. судороги); — лунатизмомъ: *Bryon., Natr. mur., Opium., Phosph., Silic., Sulph.*; — стѣсненіемъ въ груди: *Phosph., Ipec.* (см. болѣзни легкихъ, сердца и проч.); — храпѣніемъ: *Opium.*

4) Противъ слишкомъ продолжительнаго сна можно испытать: *Anac., Her., Kali carb., Lach., Phosph., Stram.*; когда сонъ не подкрѣпляетъ: *Her.*; противъ слишкомъ короткаго сна: *Bryon., Calc., Nux vom.*, — причемъ, конечно, остальные явленія должны быть согласны съ симптомами этихъ лѣкарствъ.

*Приведемъ новѣйшія средства. Бессонница: *Caulophyll.* (нервная слабость), *Cypripedium pubescens* (нервная раздражительность и чрезмѣрная чувствительность), *Gelsemium* (дѣйствуетъ только косвенно, черезъ устраненіе нервной раздражительности), *Senecio* (чрезвычайно живые сны, частое пробужденіе, больной не знаетъ, спалъ ли онъ), *Sticta pulm.*

Спячка: *Gelsemium* (при приливахъ къ мозгу, при лихорадочномъ состояніи у дѣтей, при тифѣ, послѣ усиленныхъ умственныхъ занятій, послѣ чрезмѣрнаго употребленія спиртныхъ напитковъ, съ одурѣніемъ).

О бессонницѣ дѣтей вслѣдствіе прорѣзыванія зубовъ было уже говорено выше, причемъ присовѣтованы: **Acon.** (при лихо-

рабочномъ возбужденіи), **Cham.** (при нѣкотораго рода нервномъ безпокойствѣ и возбужденіи), **Merc.** (при дѣйствительной зубной боли, распухшихъ деснахъ и т. п.; см. зубная боль). Если замѣчается приливъ крови, то **Bellad. 3.** оказываетъ наилучшія услуги. При недугахъ пищеваренія, вѣтрахъ, помогаютъ непремѣнно **Carb. veget. 3.** или **Puls. 3.** (языкъ нечистъ, катарръ желудка). Когда бессонница сопровождается крикомъ: **Ialap. 3.** При вѣтрахъ, съ возбужденіемъ кровеносной системы: **Senna 2.**, если даже нѣтъ притомъ поноса. При нѣкоторомъ нервномъ безпокойствѣ также **Cham. 2.** или **Coff. 2.**, а когда притомъ чрезмѣрная веселость и смѣхъ: **Hyosc. 2.** Если причина безпокойнаго сна съ сновидѣніями и крикомъ — глисты, то: **Cina. 2.** — Въ очень многихъ случаяхъ причиною бессонницы бываетъ безпокойство, которое ощущаетъ ребенокъ или оттого, что онъ лежитъ въ мокротѣ, или оттого, что его дурно спеленали, или отъ насѣкомыхъ, голода. Тутъ помогаютъ не лѣкарства, а устраненіе причинъ безпокойства.

Примѣчаніе. Впрочемъ здѣсь не всегда бываетъ достаточно давать лѣкарство не задолго до сна, и если хочешь устранить основную болѣзнь, то необходимо отъ времени до времени давать по приему и днемъ.

30. Душевные (психическіе) недуги,

psychopathiae.

Эти недуги, лѣченіе которыхъ требуетъ глубокаго изученія организма и душевныхъ силъ человѣка, рѣдко поддаются лѣченію не врача. Но такъ какъ они бываютъ также переходящими симптомами другихъ болѣзней и опредѣляютъ выборъ лѣкарствъ противъ этихъ болѣзней, то я хочу привести здѣсь главнѣйшія средства противъ нихъ.

- а) Подавленное состояніе (депрессія). Противъ меланхолии главныя средства суть: **Arsen.**, когда сильная тоска и отчаяніе; **Aur.**, при отвращеніи къ жизни, склонности къ самоубійству; **Ign.**, при печали и апатіи; **Laches.**, при тоскѣ,

отчаяніи, вздохахъ; **Puls.**, при слезливости, расположеніи къ молитвѣ; **Sulph.**, при чрезвычайной апатіи къ окружающему міру, при религіозномъ настроеніи и отчаяніи; **Nux vom.**, при тоскѣ и безпокойствѣ; **Veratr.**, при *страхъ и отчаяніи*, пугливости, безпамятствѣ, причемъ больной поетъ, свиститъ, занятъ сладострастными мыслями. — *Arsen.* прилично также при чрезвычайной *тоскѣ, страхъ предъ привидніями*, ворами и одиночествомъ; *Cuprum.*, при недостаткѣ въ *нравственной силѣ, при ворчливости*; *Silicea*, при *молчаливости*, равнодушіи, *отращеніи къ работѣ*.

- б) Возбужденное состояніе (экзальтація), какъ напр. бѣшенство, неистовство, видѣнія. **Bellad.** (*бѣшенство, крикъ, судороги*), **Canth.** (при возбужденной *половой похоти*); **Hyosc.** (*неистовство съ бессонницей, бредомъ, видѣніями, судорогами, дрожью*); **Opium** (при *спячкѣ, смѣняющейся съ бессонницей, помѣшательствѣ (idée fixe), судорогахъ, страшныхъ видѣній*); **Stram.** (*видѣнія съ болтливостью, подергиваніе, странные жесты, смѣхъ, пѣніе, потребность въ свѣтѣ и обществѣ*).
- в) Помѣшательство, въ которомъ больные очень часто воображаютъ себя великими людьми: **Phosph. ac., Stram., Sulph.** — Далѣе **Hyosc., Opium., Phosph., Veratr.**, при одной неотступной мысли, разныхъ представленіяхъ; — **Bell., Stram.**, при дурачествѣ, смѣшныхъ жестахъ; **Stram.**, преимущественно при болтливости; **Opium** и **Veratr.**, преимущественно при чрезвычайной суетливости; — **Coffea, Cann., Stram.**, при неестественной веселости.

Arsen., Aur., Puls., Selen., Sulph., Verat., рекомендуются при религіозномъ помѣшательствѣ.

Phosph., Phosph. ac., Plat., при чрезмѣрной чувственности.

- г) Слабость памяти, тупоуміе, слабоуміе: **Anac.** (главное средство противъ первой), **Helleb., Nux moschata., Oleand., Phosph. ac., Rhus.**

- д) Возрастающій общій параличъ душевно-больного, который очень часто начинается съ затрудненнаго выговора и мало по малу можетъ поразить весь организмъ, такъ что наконецъ наступаетъ смерть: **Rhus, Phosph.** (см. параличъ.)

Во вѣсхъ этихъ случаяхъ надо также обращать вниманіе на основныя причины болѣзни; напр. послѣ душевныхъ потрясеній особенно полезны: *Ignat.* (печаль), *Opium.* (испугъ), *Staph.* (продолжительная скорбь); послѣ чрезмѣрнаго употребленія спиртныхъ напитковъ: *Nux vom.*, *Opium.*, а также *Arsen.*; послѣ половыхъ излишествъ: *Phosph. ac.*; послѣ умственныхъ напряженій: *Nux vom.*, *Opium.*; наконецъ, если причина болѣзни состоитъ въ разстройствѣ регулы, то: *Platin.*, *Puls.* и т. д.

Въ заключеніе приведемъ новѣйшее средство — *Cimicifuga*, которое часто оказывало значительную помощь въ тѣхъ случаяхъ, когда разстройство кровообращенія (отъ полнокровія или малокровія) отзывалось на состояніе мозга, — при разстройствѣ нервовъ, при пораженіи сердца, когда смѣняются ознобъ и жаръ, дрожь, подергиваніе пальцами, боязливость, ипохондрія; но самыми обыкновенными симптомами служатъ страшные сны.

Б. БОЛѢЗНИ ОРГАНОВЪ ЧУВСТВЪ, ИХЪ АППАРАТОВЪ И ПРИЛЕЖАЩИХЪ ЧАСТЕЙ.

31. Глазныя болѣзни.

Такъ какъ лѣченіе этихъ болѣзней, легко могущихъ принять опасный характеръ, можетъ быть довѣрено только врачу, то я ограничусь здѣсь указаніемъ главнѣйшихъ средствъ и случаевъ въ началѣ болѣзни.

1. Воспаленіе глазныхъ вѣкъ, *inflammatio palpebrarum.*

а) Простое лихорадочное, весьма сильное катарральное: **Acon.**; съ свѣтобоязнью: **Bellad.**; опухшіе вѣки, нагноеніе, сліпаніе вѣкъ: **Merc.**, а затѣмъ **Hepar.**; съ текучимъ насморкомъ: **Euphr.**; хроническіе случаи: **Sulph.**, **Staphysagr.** (при сильномъ опуханіи желѣзокъ вѣкъ.)

б) золотушное, острое: **Bell.**, **Merc.**; хроническое: **Calc. c.**; при выворотѣ и изъязвленіи вѣкъ: **Iodium**; съ свѣтобоязнью: **Rhus.** Послѣ излѣченія воспаления, когда остается свѣтобоязнь: **Con. 2.**

(Въ большинствѣ случаевъ, указанныхъ подъ а) и б), достаточно *Bellad.*)

2. Воспаленіе глазъ (т. е. воспаленіе глазного яблока или его отдѣльныхъ частей), *inflammatio bulbi*.

а) Простое и катарральное: главныя средства — **Bellad., Merc.;** хроническое: *Sulph.* (какъ выше 1.); при сильномъ отдѣленіи гноя и болѣе легкой степени воспаленія: *Puls.;* при накожныхъ болѣзняхъ большею частью: **Bell., Merc., Sulph.**

б) Ревматическое: **Acon., Merc., Rhus.** (острый характеръ), **Sulph.** (въ хроническихъ случаяхъ.)

в) Ломотное: **Merc.** (съ нагноеніемъ), въ хроническихъ случаяхъ также **Hep. — Nux vom.** (давленіе), **Rhus** (подергиваніе); въ упорныхъ случаяхъ — *Colch., Led., Sulph.* и др. средства противъ ломоты (см. ломота.).

г) Золотушное: **Arsen.** (жгучая боль, частые рецидивы съ краснотою, изъязвленіемъ и припуханіемъ вѣкъ); **Bellad.** (главное средство въ началѣ и въ болѣе легкихъ случаяхъ, съ свѣтобоязнью и жаромъ). **Baryt. c.** и **Calc. carb.** или **Calc. jodat.** (хроническій характеръ); **Con.** и **Rhus** (свѣтобоязнь, **Con.** — когда при этомъ судороги вѣкъ, **Rhus** — когда сыпь на головѣ и ушахъ); **Merc. sol.** и особенно **Merc. subl.** (жаръ, нагноеніе, образованіе нарывовъ на роговой оболочкѣ); **Hepar.** и **Iod.** (въ тѣхъ же случаяхъ, когда предварительно принятія *меркуріальныя средства* не помогли, или первыя затрудненія устранены); **Graph.** (когда болѣзнь длительна, мокнущая сыпь).

д) У новорожденныхъ (одна изъ самыхъ опасныхъ формъ, которая легко можетъ кончиться слѣпотою): **Bell., Merc.,** также **Rhus, Sulph.**

е) Отъ пораненія: **Acon., Arn., Nitr. ac., Sulph.**

3. Слабость глазъ, *amblyopia* и *asthenopia*.

а) Слабость зрѣнія: **Anac., Calc. c., Caust., Chin., Rhus., Phosph.** и др. — отъ прилива крови: **Bellad.;** когда при чтеніи сливаются буквы: **Bell., Graph., Hyosc., Stram.**

- б) Начинаящаяся слѣпота: *Aur.*, *Caust.*, *Chin.*, *Phosph.*, *Cyclam. europ.*, *Ruta*, *Sep.*, *Sulph.*, *Zinc.* и др., смотря по обстоятельствамъ, поводу и причинамъ болѣзни;
- в) Помраченіе зрѣнія: *Baryt.*, *Calc. c.*, *Caust.*, *Con.*, *Graph.*, *Nux vom.*, *Phosph.* и др.; когда передъ глазами чернѣть: *Bell.*, *Chin.*, *Con.*, *Hyosc.*, *Stram.*
- г) Когда предметы дwoятся: *Aur.*, *Bellad.*, *Cic.*, *Dig.*, *Hyosc.*, *Natr. mur.*, *Sec.*;
- д) Блескъ передъ глазами (искры, пламя): *Bellad.*, *Ammon. carb.*, *Calc. c.*, *Phosph.*, *Sulph.*; различныя цвѣта передъ глазами: *Aurum.*, *Bellad.*, *Euphorb.*, *Stram.*, *Spig.*, *Veratr.*
- е) Летаящія мушки передъ глазами (*mouches volantes*): *Acon.*, *Agar.*, *Ammon. mur.*, *Bellad.*, *Calc. c.*, *China*, *Phosph.*, *Sep.*, *Silic.*;
- ж) Если больной видитъ только днемъ: *Bellad.*, *Ranunc. bulbos.*;
- з) Если только ночью: *Phosph.*
- и) Параличъ вѣкъ: *Bellad.*, *Plumb.*, *Sep.*, *Zinc.*
- к) Предметы представляются въ увеличенномъ видѣ: *Euphorb.*, *Hyosc.*, *Laur.*, *Staphys.* — въ уменьшенномъ видѣ: *Hyosc.*, *Stram.* — въ опрокинутомъ видѣ: *Bell.*, *Stram.*

Противъ мутности глазъ (роговой оболочки), которая остается послѣ воспаленія и мѣшаетъ зрѣнію, хорошими средствами оказались *Con.*, *Hepar.* и въ особенности *Cannabis* (внутреннее и наружное употребленіе; въ послѣднемъ случаѣ 2 — 3 капли тинктуры на столовую ложку воды).

Если причина воспаленія — чрезмѣрное напряженіе глазъ, то рекомендуемъ: *Bell.*, *Cannab.*, *Euphras.*, *Nux vom.*, *Ruta.*

Противъ чрезмѣрнаго слезотеченія изъ глазъ: *Euphr.*, *Croc.*, *Digit.*, *Graph.*, *Phosph.* или *Spigel.*

Противъ такъ назыв. гноеточивости глазъ: *Euphr.*, *Merc.*, *Puls.* и *Rhus.*

Противъ косоглазія, обусловливаемаго разстройствомъ нервовъ, а не кривымъ положеніемъ или органическою контракціею мускуловъ: *Bell.*, *Hyosc.*, *Stram.*; вслѣдствіе глнствъ: *Cina.*, *Spig.* — *Euphrasia* удобна также для наружнаго употребленія въ видѣ ра-

створа изъ 2—3 капель перваго дѣленія на столовую ложку воды, а именно для смачиванія глазъ при помощи полотняной тряпочки.

Примѣчаніе. Многія болѣзни глазъ требуютъ изслѣдованія посредствомъ глазнаго зеркала; поэтому необходимо посоветоваться съ глазнымъ врачомъ; точно также и относительно употребленія очковъ, особенно при **близорукости** и **дальнозоркости**.

Въ заключеніе скажемъ нѣсколько словъ о новѣйшихъ средствахъ. Противъ воспаленія глазъ: *Apos. cann.*, *Varf.* (золотуха и гной), *Hydrast. can.* (катарральное поражение слизистой оболочки съ сильнымъ выдѣленіемъ гноя, слезаніе вѣкъ при воспаленіи соединительной и роговой оболочекъ, которыя въ этомъ случаѣ затемняются; дѣйствіемъ своимъ похоже отчасти на *Puls.*, *Euphr.*, *Her. s.* и *Ser.* и поэтому дается какъ въ хроническихъ, такъ и острыхъ случаяхъ для внутренняго и наружнаго употребленія, въ 3-емъ дѣл.); *Phytol.* (противъ ревматической, катаральной, золотушной, меркуріальной, сифилитической глазной боли, при хроническомъ воспаленіи соединительной оболочки съ грануляціей); *Podoph.* (хроническое страданіе глазъ съ нарывами, употребляется также наружно); *Xanthoxylum fraxineum* (для внутренняго и наружнаго употребленія).

Противъ косоглазости дается *Gelsem.*, а противъ слѣпоты — *Cim.*, *Gels.*, *Ver. v.*

Пріемы въ такихъ случаяхъ при острой формѣ болѣзни должны быть низкаго дѣленія и часты, черезъ 2 — 3 часа, а въ хроническихъ случаяхъ болѣзни — болѣе высокаго дѣленія и рѣдки, часто только разъ въ недѣлю.

4. Ячмени, *hordeolum*.

Какъ разрѣшающее средство: **Merc.**; для предупрежденія возврата недуга всего лучше: **Calc. carb.**

5. Просовидные наросты, *chalazium*.

Они являются на краяхъ вѣкъ, бываютъ прозрачны или красноваты, болѣе или менѣе подвижны. Большею частью устраняются хирургическимъ способомъ.

32. Болѣзни уха.

Лѣчение ихъ очень трудно. Уже одно разпознаніе причинъ ихъ и симптомовъ, а равно и необходимый для изслѣдованія навыкъ предполагаютъ такія спеціальныя занятія этими болѣзнями, что даже не каждый врачъ обладаетъ знаніемъ всѣхъ подробностей. Очень часто лѣчение бываетъ вообще невозможно. А потому я долженъ отказать отъ подробнаго изложенія этой темы и ограничусь одними краткими указаніями.

а) Глухота, *barycoia*.

Если причиною приливъ крови, то выбирать изъ: **Bellad.**, **Bryon.**, въ хроническихъ случаяхъ; **Calc. c.**, **Graph.**, при полнокровіи нижней части живота особенно хорошо **Nitr. acid.**, **Sulph.**

Если она есть слѣдствіе катарра или ревматизма: **Acon.**, **Merc.**, **Puls.**, **Sulph.** — также **Arn.**, **Calc. c.**, **Caust.**, **Rhod.**

Если причиною параличъ слуховаго нерва или чрезмѣрная раздражительность: **Arnic.**, **Phosph. ac.** — также **Caust.**, **Con.**, **Petr.**, **Plat.**, **Veratr.** — и при случаѣ осторожное употребленіе электричества.

Если имѣютъ мѣсто матеріальныя причины, какъ-то: скрывшіяся сыни, недуги желѣзь, истеченія, страданіе Евстахіевой трубы, соединяющей ротъ съ внутреннимъ ухомъ, то: **Graph.**, **Hep.**, **Iod.**, **Lycop.**, **Merc.**, **Sulph.** и др.

Иногда причиною глухоты бываетъ просто катарральное накопленіе и затвердѣніе ушной сѣры. Тогда достаточно удалить ее, размягчивъ парами горячей воды (не молока), а еще лучше посредствомъ выпрыскиванія; если же этого недостаточно, — посредствомъ инструментовъ, для чего нужна помощь доктора.

б) Шумъ въ ушахъ, *tinnitus aurium*.

(Бываетъ слѣдствіемъ прилива крови, нервнаго раздраженія, ревматизма, органическихъ растройствъ, какъ напр. давленія на

слуховой нервъ отъ вышота въ слуховомъ проходѣ и накопленія ушной сѣры).

Свистъ въ ушахъ: **Acon.**, **Ammon. c.**, **Arn.** (пожилымъ людямъ), **Bellad.**, также *Calc. c.*, *Chin.*, *Con.*, *Merc.*, *Nitr. ac.*, *Phosph.*, *Puls.*, *Sulph.*

Жужжаніе: **Ammon. c.**, **Bell.**, также *Graph.*, *Natr. mur.*, *Puls.*, *Sulph.*, смотря по обстоятельствамъ.

Шумъ, громъ, перекаты: **Calc. c.**, также *Graph.*, *Plat.*

Пѣніе, звонъ: **Dulc.**, — также *Ammon. c.*, *Bell.*, *Calc.*, *Chin.*, *Graph.*, *Lycop.*, **Petrol.**, *Puls.*, *Silic.*, *Sulph.*

Шумъ какъ бы отъ порханія: **Sulph.**; также *Bellad.*, *Calc.*, *Graph.*, *Petrol.*, *Puls.*, *Spigel.*

Трескъ: **Calc. c.**, также *Graph.*, *Mangan.*, *Nitr. acid.*, *Petrol.*

33. Воспаленіе уха, *otitis.*

Оно часто смѣшивается съ недугами мозга, а также подаетъ поводъ къ послѣднимъ. А потому при пораженіяхъ головы, особенно въ дѣтскомъ возрастѣ, необходимо изслѣдовать ухо: нѣтъ ли истеченія или боли.

Воспаленіе уха бываетъ острое или хроническое; оно поражаетъ или наружное ухо: боль, жаръ, краснота, опухоль слуховаго прохода, ломъ въ головѣ, щекахъ, зубахъ, истеченіе — сначала слабое, потомъ сильнѣе, глухота или шумъ въ ушахъ, или внутреннее: жженіе, колотье, ломъ, біеніе глубоко въ мозгу, головокруженіе и рвота, увеличивающіяся отъ малѣйшаго движенія; слухъ необыкновенно остръ или тупъ. Принимать:

Belladonna 3., при сильномъ, рожистомъ, глубоко проникающемъ воспаленіи.

Mercur. 3., когда нагноенія уже нельзя устранить, образуются шишки, нарывы, опухоли.

Pulsatilla 2., когда причиною катарръ, и болѣзнь имѣетъ болѣе легкій характеръ, съ истеченіемъ слизи.

Кромѣ того **Bryon. 2.**, при опухоли окружающей клѣтчатки; **Chamom. 2.**, при ломѣ, подергиваніи, опухоли, словомъ при ревма-

тическомъ характерѣ недуга, причемъ сильное безпокойство; **Rhus 3.**, при томъ же характерѣ болѣзни, преимущественно когда отъ движенія — хуже, а отъ тепла — лучше; *Nux vom.* 3., когда преобладаетъ давящая боль; **Silic. 3.**, или **Lycop. 3.**, при золотушномъ характерѣ болѣзни, когда сопряжены съ этимъ болѣзнями костей; **Sulph. 3.**, когда притомъ накожныя болѣзни, худосочіе, парывы въ ухахъ, хроническое истеченіе слизи и гноя.

34. Боль, ломъ (стрѣльба) въ ухахъ (ревматизмъ уха).

Belladonna — 2.

Примивъ крови; жужжаніе и свистъ въ ухахъ, жаръ и краснота лица, *колотье* въ ухахъ и за ушами; боль въ зѣвѣ и при *глотаніи*; блестяи передъ глазами; чувствительность къ шуму, свѣтобоязнь.

Chamomilla — 2.

Нервно-ревматическій характеръ. Сильное колотье какъ бы отъ ножей; напряженіе, подергиваніе до мочець, сильная чувствительность, безпокойство, дурное расположеніе духа; уши какъ бы засорены.

Mercur. — 2.

Компестивно-ревматическій и воспалительный ломъ. Глубокое колотье или *стрѣльба* до щекъ, зубовъ, *головныхъ костей*; *истеченіе ушной спры*;

чувство озноба или жара въ ухахъ; хуже *ночью* или отъ постельной *теплоты*.

Nux vomic. — 2.

Давленіе, дерганіе, стрѣльба, какъ бы толчки, распространяющіеся до лба, висковъ, *лицевыхъ костей*, преимущественно утромъ или ночью, со звономъ, трескомъ когда говоришь или жуешь. У *холерическихъ* особъ; при *полнокровіи нижней части живота, разстройствѣ пищеваженія* или *ревматическихъ* причинахъ.

Pulsatilla — 2.

Катаральный и ревматическій характеръ болѣзни. *Подергиваніе, стрѣльба,* давленіе изнутри уха наружу, съ жаромъ и краснотою уха, опухолью. Во всей больной половинѣ головы *колотье* и *стрѣльба,*

вечеромъ и ночью хуже. Полезно малокровнымъ, зябкимъ особамъ, женщинамъ и дѣтямъ.

Sulphur — 3.

Ревматическій или конгестивн. характеръ. Особенно въ хронич.

случаяхъ. Подергиваніе, ломъ, стрѣльба до горла и черепа; жгучій жаръ, выходящій изъ уха. Сильная чувствительность къ шуму. При страданіяхъ нижней части живота, хроническомъ ревматизмъ и насморкъ.

Примѣчаніе. Кромѣ того — сравнивать средства, указанные противъ прилива крови и ревматизма.

35. Истечение изъ уха,

otorrhoea.

Оно бываетъ весьма разнообразно: 1) смотря по поводу: катарръ, золотуха, болѣзнь костей, сыпи (подавленные), злоупотребленіе ртутью, потрясеніе головы, 2) смотря по исходной точкѣ: изъ полости черепа, изъ каменной части кости, изъ сосцевиднаго отростка, изъ слуховаго прохода, 3) смотря по симптомамъ, сопровождающимъ болѣзнь: воспаленіе, опухоль слуховаго прохода, головная боль, глухота, 4) смотря потому, какого рода — истечение, которое можетъ состоять изъ крови, слуховой влаги (при сотрясеніи), слизи (золотуха, катарръ), ушной сѣры, гноя (воспаленіе) или зловоннаго гноя (костоѣда).

Надо очищать ухо впрыскиваніемъ тепловатой воды посредствомъ маленькой ушной спринцовки отъ 2 до 3 разъ въ день, но избѣгать всѣхъ вяжущихъ и прекращающихъ истечение средствъ, каковы свинцовые препараты, *танинъ* и т. п., потому что въ такомъ случаѣ глухота можетъ остаться навсегда. Всего лучше лѣченіе внутреннее: **Bellad. 3.**, при скарлатинѣ, послѣ сыней, при воспаленіи, катарръ съ болью, напряженіи, истеченіи гноя; **Merc. 3.**, когда течетъ гной или кровь, при воспаленіи, золотухѣ, костоѣдѣ; **Puls. 3.**, при катарръ, послѣ сыней, при кровяномъ истеченіи, съ болью, стрѣльбой (см. боль въ ушахъ); **Aurum 3.**, при костоѣдѣ, разрушеніи барабанной перепонки, послѣ сифилиса и злоупотребленія ртутью; **Hepar sulph. 2.**, при хроническомъ золотушномъ и катарральномъ, зловонномъ, гнойномъ истеченіи;

Calc. carb. 3., а при закоренѣломъ недугѣ **Calc. jod. 3.**, — главные средства противъ золотушнаго истеченія; **Silic. 3.**, въ хроническихкихъ случаяхъ, подобныхъ означеннымъ при **Aurum** и **Mercur.**, особенно при костоѣдѣ. — Въ послѣднихъ случаяхъ средства надо давать рѣдко, по высшей мѣрѣ одинъ разъ въ день. Если глухота остается, особенно послѣ катаррального истеченія: **Dulcam. 3.** (срвн. выше 32, а.)

36. Воспаленіе околоушныхъ слюнныхъ желѣзъ, свинка, *parotitis.*

Оно появляется отдѣльными случаями или эпидемически отъ простуды, особенно у молодыхъ людей, предъ тифомъ и во время тифа, при скарлатинѣ и т. д., бываетъ опасно, когда оно внезапно исчезаетъ, или при сильномъ нагноеніи и вслѣдствіе близости мозга; обнаруживается оно въ видѣ опухоли различной величины передъ внѣшнимъ слуховымъ проходомъ, позади и ниже его, которая распространяется на сосѣднія части щекъ и шеи, обезображиваетъ лицо, затрудняетъ жеваніе, глотаніе и разговоръ и иногда сопровождается лихорадкой; большею частью она ограничивается одной стороною, но въ тяжкихъ случаяхъ поражаетъ обѣ стороны. Кожа на опухоли большею частью бываетъ блѣдная. Замѣчательно, что при внезапномъ исчезновеніи этой болѣзни, очень часто поражаются воспаленіемъ дѣтородные органы (воспаленіе яичекъ, яичниковъ, грудныхъ желѣзъ). Разрѣшеніе происходитъ большею частью отъ **Bellad. 3.**, когда притомъ боль, происходящая отъ напряженія, рожевидная блестящая опухоль, приливъ крови, головокруженіе, поражение мозга; также при скарлатинѣ; **Brom. 3.**, при тугой, но не воспаленной опухоли, у золотушныхъ людей (при высокой степени: **Jod. 3.**); **Rhus. tox. 3.**, когда причиною недуга ревматизмъ или золотуха, особенно когда преобладаетъ нервный характеръ, какъ напр. при скарлатинѣ. При опухоли и угрожающемъ нагноеніи лучшимъ средствомъ служить **Mersur. sol. 3.**; если облегченіе замедляется: **Hep. sulph. 3.**; при медленности разрѣшенія опухоли послѣ нагноенія, особенно у людей золотушныхъ: **Calc. c.**, **Silic. 3.**; когда остается злокачественная

или доброкачественная затвердѣлость: **Aurum, Baryt. acet.** или **Baryt. carb. 3.** и **Jod. 3.**

Въ новѣйшее время стали также давать *Phytolacca dec.*

37. Разстройства обонянія.

Указанія тутъ еще очень шатки и основываются большею частью на однихъ догадкахъ и теоретическихъ предположеніяхъ.

1) Противъ потери обонянія можно попробовать, если причиною катарръ: **Нер., Puls., Alum.,** особенно *Lyc.* — также *Sepia, Sulph.*; если — нарывы: **Aurum, Merc., Calc.,** также *Mez., Silic.*; если причиною нервный параличъ: **Phosph.,** а также *Arg. nitr., Caust., Hyosc., Rhus, Veratr.* — Гальванизмъ.

2) Противъ раздраженія органовъ обонянія. Чувствительность ихъ и обманы обонянія: *Agar., Agn., Chin., Con., Nux. vom., Phosph. ac., Plumb.* — *Puls., Sepia,* — *Aur., Baryt., Calc., Graph., Silic.* Всегда надо изслѣдовать нервныя, катарральныя или органическія причины, лежащія въ основаніи болѣзни.

Въ новѣйшее время противъ потери обонянія стали давать *Gelsem.,* и притомъ болѣе въ острыхъ случаяхъ, при насморгѣ и гриппѣ.

38. Разстройство вкуса или болѣзненное состояніе органа вкуса.

См. Разстройство пищеваренія.

39. Разстройство чувствъ или болѣзненное состояніе нервовъ чувствъ.

См. отд. В., раздраженіе спиннаго мозга (41), истерика (42), и отд. Г., нервныя боли (46, 47) и нечувствительность (48).

В. БОЛѢЗНИ СПИННАГО МОЗГА И ЕГО ОБОЛОЧЕКЪ.

40. Воспаленіе спиннаго мозга,

inflammatio medullae spinalis, myelitis

acuta et chronica.

— Чаше воспаляется оболочка спиннаго мозга (*perimyelitis*) и кости (*spondylitis*), нежели самый мозгъ. Воспаленіе костей, встрѣчающееся иногда въ дѣтскомъ возрастѣ, имѣеть обыкновенно своимъ послѣдствіемъ ихъ размягченіе, костоѣду съ выгнуеніемъ наружу и горбатость. Мы будемъ имѣть здѣсь дѣло съ воспаленіемъ самага мозга и его оболочекъ, такъ какъ на практикѣ очень труд но отдѣлить эти 2 болѣзни одну отъ другой (не слѣдуетъ съ ними смѣшивать воспаления надкостныхъ мускуловъ [какъ напр. послѣ поврежденій, паденія, при ревматизмѣ]). Воспаленіе начинается съ лихорадки и озноба; колотье вглубь, ломъ, жженіе, затрудненное движеніе. Боль находится обыкновенно въ одномъ мѣстѣ, обнаруживается иногда только послѣ постукиванія и давленія на позвонки и вызываетъ зудъ, онѣмѣніе или боль въ членахъ и туловищѣ, а также параличъ, судороги, подергиваніе, смотря по тому, какія части поражены. Особенно опасенъ параличъ дыхательнаго мускула, вслѣдствіе чего легко можетъ наступить смерть. Пузырь и задняя кишка большею частью парализованы. Всего чаще причинами этого недуга бываютъ простуда, болѣзни костей, прерванныя кровотеченія, сифилисъ или потрясенія отъ паденія, удара, переломъ позвоночнаго столба. Затѣмъ наступаетъ разрѣшеніе или выпотѣніе, и въ этомъ послѣднемъ случаѣ параличъ принимаетъ хроническій характеръ. Сюда же относится самостоятельный дѣтскій параличъ *paralysis spinalis essentialis*, при которомъ обѣ ноги въ короткое время нѣмѣютъ и холодѣютъ. — (См. ниже главу 45.)

Чаще всего къ этимъ болѣзнямъ подходятъ:

Aconitum — 2.

Во всякомъ случаѣ главное средство въ острыхъ случаяхъ послѣ *простуды*, слишкомъ сильнаго напряженія; въ началѣ болѣзни, при сильной лихорадкѣ.

Belladonna — 2.

При болѣе нервномъ характерѣ, съ *приливомъ крови къ голове, судорогами*. Въ особенности, когда пораженіе спиннаго мозга отзывается на *головномъ мозгу*, сопровождается бредомъ.

Bryonia — 2.

Когда воспаленіе уже ослаблено посредствомъ *Acon.*, *Bell.*, *Merc.*, если причиной ревматизмъ. Мѣстопребываніе воспаленія болѣе *въ странѣ бедръ и крестцовой кости*, причѣмъ поражены органы нижней части живота, движеніе затруднено, *запоръ*.

Mercur. sol. — 2.

Послѣ *Aconit.* самое лучшее средство при *простудѣ*, слиш-

комъ сильнымъ напряженіи; когда сильная мѣстная боль, *сверлящая, сильная воспалительная боль; кости и ихъ оболочки поражены*, притомъ *ночь, безпокойство, бессонница, подергиваніе, нечувствительность кожи*.

Nux vomica — 3.

Болѣе въ *хроническихъ* случаяхъ *ревматическаго* характера. Лихорадка умеренная, съ пораженіемъ *органовъ нижней части живота*, запоромъ. Боли внутри, въ позвоночномъ столбѣ, *давящая, дергающаго свойства*. Чрезмѣрная чувствительность нервовъ кожи, судороги *по устраненіи воспаленія*.

Rhus — 3.

При *нервныхъ* симптомахъ, *ломъ, подергиваніи, вслѣдствіе ревматизма* или послѣ сыпей; параличеобразная слабость, причѣмъ также поражены члены. Удобно болѣе для послѣдствій воспаленія, по устраненіи его.

Примѣчаніе. Лѣченіе этой болѣзни еще недостаточно установилось. Кромѣ названныхъ лѣкарствъ, сюда относятся еще другія. **Arsen. 5.**, въ сильно-воспалительныхъ случаяхъ, когда

Mercur. не достаточно; **Arnica. 2.**, хорошо противъ поврежденій отъ удара, паденія; *Calc. c. 3.*, въ хроническихъ случаяхъ, а также *Arg. nitr.* и *Plumb.*, когда сведены и парализованы оконечности, худоба. При ревматическомъ характерѣ полезны означенныя при ревматизмѣ (см. выше) лѣкарства. *Zinc.*, *Ign.*, *Cupr.*, *Nux. vom.*, *Strychnin.*, въ особенности же *Secale cornut.* и *Cocculus*, полезны при судорогахъ (особенно параличнаго свойства), которыя обыкновенно появляются вслѣдствіе воспаленія.

41. Боль въ спинѣ, раздраженіе спиннаго мозга,

irritatio spinalis.

Если боль въ спинѣ ревматическаго характера, то смотри статьи о ломотѣ (11) и ревматизмѣ (12); если она является слѣдствіемъ прилива крови, особенно изъ нижней части живота, и сопряжена съ геморроидальнымъ приливомъ, полнокроемъ нижней части живота, или съ лихорадочными состояніями, каковы перемежающаяся лихорадка, тифъ и т. п., то полезны средства противъ прилива крови (5), полнокроевія (6) и геморроя (7).

Рѣже встрѣчается органическая боль, какъ слѣдствіе костоѣды, которая здѣсь, по причинѣ трудности ея лѣченія, не можетъ быть предметомъ разсмотрѣнія.

О боли воспалительнаго свойства только что говорено (40). Чаще всего во всякомъ случаѣ встрѣчается нервная спинная боль, такъ называемое раздраженіе спиннаго мозга, служащее главнымъ основаніемъ истерики (см. слѣдующ. статью). Большею частью оно бываетъ слѣдствіемъ раздраженія нервовъ отъ душевныхъ потрясеній, умственныхъ занятій, бдѣнія, родовъ, кормленія грудью, поллюцій, изнеженности, сидячаго образа жизни, распутства, особенно противоестественнаго, въ бракѣ и виѣ его. У мужскаго пола слѣдуетъ обратить особенное вниманіе на это раздраженіе спиннаго мозга, такъ какъ оно легко можетъ имѣть опасныя послѣдствія. Точно также чрезмѣрная женская работа за швейною машиною, вязанье и игра на фортепіано, вызываютъ боль въ спинѣ, особенно между плечами, или, по крайней мѣрѣ, уси-

ливаютъ ее. Боль эта обнаруживается или независимо отъ внѣшнихъ вліяній, или при давленіи на позвоночный столбъ, то въ одномъ позвонкѣ, то въ нѣсколькихъ, переходитъ затѣмъ на прилежащія части и далѣе вызываетъ разнообразныя страданія, каковы: всеобщая раздражительность кожи, чувствъ, крови (сердцебіеніе, головокруженіе), желудка (судороги желудка, рвота), кашель, одышка, болѣзненное отдѣленіе или задержаніе мочи, запоръ, колики, геморроидальныя припадки, раздражительность или слабость и другіе недостатки половой системы, боли и всякаго рода ощущенія во всѣхъ частяхъ тѣла, всеобщія судороги и особенно раздражительность и дурное расположеніе духа. Съ другой стороны, мѣстныя болѣзни различныхъ органовъ, особенно матки, вызываютъ раздраженіе спиннаго мозга. Во всякомъ случаѣ недугъ бываетъ хроническій, но не опасенъ до тѣхъ поръ, пока онъ пребываетъ въ періодъ раздраженія. Впрочемъ, позднѣйшія послѣдствія могутъ быть опасны.

При лѣченіи надо обращать вниманіе на особенный видъ болей и сообразно съ этимъ сдѣлать выборъ изъ слѣдующихъ лѣкарствъ:

Сверлящая боль: *Bism. 3.*

Жуучая боль: *Phosph. 5.,* также *Ars. 5., Bry. 3., Carb. an. 3., Magn. т. 3.,* съ зудомъ или колющемъ въ спинѣ и затѣмъ въ особенности съ сверлящимъ колющемъ между плечами; уменьшается отъ движенія.

Давящая боль: *Nux vom. 5. — Plat. 3., Rut. 3., Sep. 3.*

Щемлящая боль: *Led. 3., Nitr. 3.; — тянущая и щемлящая: Arg. nitr. 5.*

Ломъ: *Rhus. 5. или Bry. 3., Sil. 3., Sulph. 3.*

Рѣзь: *Aur. mur. 3., Sep. 3.*

Напрягающая боль: *Con. 3., Natr. mur. 5., Sulph. 3.*

Колюще: *Nitr. ac. 3. или Caust. 3., Caps. 3., Spig. 3., Strontiana 3.*

Боль какъ бы отъ вьиха: *Agar. 3., Sulph. 3.*

Боль какъ отъ раны: *Sulph. ac. 2., Nitr. ac. 3.*

Боль какъ бы отъ разбитія: *Arn., Chin. 3., Nux vom. 5., Plat. 3., Rut. 3., Zinc. 3.*

Дерганіе: *Coccul. 3., Nux vom. 5., Rhus. 5., Cham. 2.*

Примѣчаніе. Что касается до отдѣльныхъ частей спины, то, если болятъ спинные мускулы, достойны особеннаго замѣчанія: *Mere.*, *Rhus.*, *Spig.* Если болятъ кости: *Asa*, *Staph.*, также *Calc. phosph. 3.* — *Calc. c.* и *Phosph. 3.* (искривленіе), *Sil.* (опухоль, нагноеніе, искривленіе). — При боли въ позвонокахъ: *Acon.* (жженіе), *Asa* (давленіе), *Cic.* (удары), *Led.* (давленіе и стрѣльба), *Nitr. ac.* (колотье), *Nux vom.* (давленіе), *Ruta* (давленіе какъ бы послѣ паденія), *Sabina* (стрѣльба), *Staph.* (боль какъ бы отъ пораненія). Въ большинствѣ случаевъ я видѣлъ отличные результаты отъ *Arg. nitr. 5.*, *Nux vom. 5.* и *Sulph. 3.*, а при ощущеніи жара, бшенія и ударовъ съ половымъ возбужденіемъ отъ *Bell.*, *Atropin.*, *Nitr. ac. 3.*, вечеромъ 2 — 3 капли. Въ случаяхъ закоренѣлой болѣзни, подходящихъ къ *Nux*, мнѣ оказало блестящую помощь *Strychnin. 3.*, не въ частыхъ приемахъ.

Въ новѣйшее время открыли, что въ болѣзняхъ спиннаго мозга и его оболочекъ весьма важную роль играетъ *Cimicifuga*, которая облегчаетъ раздраженіе, не имѣющее органическаго основанія, у женщинъ, во время мѣсячныхъ очищеній, отъ переменъ погоды, при ломотномъ и ревматическомъ характерѣ болѣзни; дается въ большихъ приемахъ; *Phytolacca* (ревмат.?).

42. Истерика и ипохондрия, *hysteria, hypochondriasis.*

Хотя мѣстопробываніе истерика часто бываетъ иное, нежели ипохондрия, однако признаки обѣихъ болѣзней такъ схожи между собою, что мы не затруднились говорить о нихъ здѣсь вмѣстѣ.

Поводы къ той и другой болѣзни бываютъ весьма различны. Поводомъ къ истерикѣ служатъ чаще всего нервныя страданія спиннаго мозга (вышеупомянутое раздраженіе спиннаго мозга) или ненормальности въ отправленияхъ половой жизни, малокровіе; причинами же ипохондрии чаще всего бываютъ недуги пищеваренія, ге моррой, ломота, болѣзни сердца, кишекъ, запоръ, болѣзни спиннаго мозга и половыхъ органовъ, завалы въ органахъ живота, преимущественно печени и селезенки. Кромѣ того, обѣ болѣзни очень

часто бывают наследственны. Проявленія ихъ также очень различны, а именно: психическое разстройство, раздражительность при малѣйшихъ физическихъ и душевныхъ влѣяніяхъ, вниканіе въ свое болѣзненное состояніе съ ощущеніемъ удовольствія при возможности рассказать о немъ, странныя прихоти и игра нервовъ, особенно нервныя страданія, доходящія до настоящихъ судорогъ, кажущіеся и дѣйствительные приливы крови, недуги живота, особенно вѣтры, запоръ съ своими послѣдствіями, а у женщинъ также ненормальность менструацій. При истерикѣ бываютъ въ особенности мигрень, истерическія судороги, доходящія до обморока и мнимой смерти, лунатизмъ, одышка, сердцебіеніе, и ортангизмъ въ короткое время до такой степени измѣняется, что, повидимому, въ немъ поселяются самыя опасныя органическія и воспалительныя болѣзни, въ несуществованіи которыхъ можно убѣдиться только посредствомъ объективнаго изслѣдованія. Истерика и ипохондрія по разнымъ душевнымъ проявленіямъ близко подходят къ душевнымъ болѣзнямъ, а потому должны быть лѣчимы также и психически. Прежде всего не слѣдуетъ смѣяться надъ больнымъ и выказывать невѣріе въ его болѣзнь: этимъ его меньше всего излѣчишь. Впрочемъ, истерическіе мужчины встрѣчаются такъ же часто, какъ ипохондрическія женщины.

Смотря по преобладающимъ симптомамъ слѣдуетъ употреблять:

- 1) **Nux. vom., Sepia., Sulph.**, особенно при недугахъ пищева-
ренія, а **Calc. c.** или **Chin.** при болѣзняхъ питанія (сличить
болѣзни органовъ пищеваженія).
- 2) **Bellad., Calc. c., Chin., Ferr., Puls.**, при болѣзняхъ крови,
приливѣ, малокровіи (сличить: болѣзненное состояніе крови
относительно количества).
- 3) **Puls., Plat., Sepia.**, при разстройствѣ регулъ (см. разстрой-
ство мѣсячныхъ очищеній).
- 4) **Arg. nitr., Asa foet., Cham., Cocc., Ignat., Nux vom.,
Phosph., Phosph. ac., Plat., Valerian.**, при болѣзняхъ нер-
вной системы; особенно сличить судороги, головную, спин-
ную боль и т. д.
- 5) **Aur., Nux vom., Phosph. ac.**, при душевныхъ недугахъ
(сличить: душевные недуги).

Примѣч. Для радикальнаго излѣченія этихъ болѣзней необходимо также удаленіе причинъ ихъ.

Если эти недуги произошли отъ *потери соковъ, распутства, то лучше всего: Chin., Ferr., Phosph. ac.*; если отъ *сидячаго образа жизни*, умственныхъ занятій, чрезмѣрнаго употребленія спиртныхъ напитковъ, кофе: *Nux vom., Sulph.* Если они суть слѣдствіе вышеупомянутыхъ мѣстныхъ или общихъ разстройствъ, то съ удаленіемъ этихъ послѣднихъ исчезаютъ и послѣдствія ихъ.

Лѣченію должна содѣйствовать дѣта и приличный образъ жизни, который долженъ состоять въ развлеченіи, путешествіяхъ, занятіяхъ, отвлеченіи фантазіи отъ болѣзни, измѣненіи прежняго образа жизни и занятій, движеніи (врачебная гимнастика), бракѣ и т. п.

Изъ новыхъ средствъ противъ истерики употребляютъ: *Cauloph., Cyriped.,* подобно *Valer.,* при нервной раздражительности, бессонницѣ и т. д. *Gelsem.,* при всѣхъ формахъ, особенно судорожныхъ, при эпилепсін, столбнякѣ, при раздражительномъ состояніи, а также при нечувствительности; — *Senec.,* какъ *Coffea, Valer., Ambr., Cham;* — *Veratr. v.* успокаиваетъ при мускульномъ раздраженіи, судорогахъ; —

противъ ипохондріи: *Cornus circinnata* и *Podoph.,* при пораженіи печени; *Helon.,* при страданіяхъ желудка, матки; *Senec.* (срв. истерику); *Xanthoxyl.,* раздражительность, подавленность, страхъ, стѣсненіе въ груди.

Пріемы лѣкарствъ должны быть рѣдки и не слишкомъ низкаго дѣленія (5 — 3).

Параличъ спиннаго мозга, см. статью 45.

Сухотка спиннаго мозга, см. изнурительныя болѣзни.

Г. БОЛѢЗНИ НЕРВОВЪ ДВИЖЕНІЯ И ЧУВСТВЪ.

Сюда относятся первныя недуги, называемыя въ просторѣчїи обыкновенно судорогами и основывающіеся на болѣзненномъ состоянїи или центральной части нервной системы (мозга головного и спиннаго), или периферическихъ (окружныхъ) нервовъ. Часто тутъ имѣются матеріальныя причины внутри или внѣ нервной системы, которыя однако не всегда легко бываетъ опредѣлить. Мы главнымъ образомъ различаемъ усиленіе или ослабленіе дѣятельности нервовъ головного и спиннаго мозга въ двухъ сферахъ ихъ жизненныхъ проявленій — въ движенїи и ощущенїи. Но весьма вѣроятно, что и симпатическіе нервы и большїя гангліи, а также сосудныя и питательныя нервы, подвержены тѣмъ же измѣненїямъ въ ихъ строѣ; особенно интересными примѣрами здѣсь могутъ служить два загадочныхъ страданїя: бронзовая или Аддисонова болѣзнь и Базедова болѣзнь. Такимъ образомъ сюда относятся, если мы назовемъ общее расположенїе къ нервнымъ недугамъ —

- а) Слабостью нервовъ (см. стат. 43.), слѣдующія болѣзненныя формы:
- б) Болѣзни нервовъ движенїя съ усиленїемъ нервной дѣятельности: судороги (см. стат. 44.);
- в) Болѣзни нервовъ движенїя съ упадкомъ нервной дѣятельности: параличъ (см. ст. 45.);
- г) Болѣзни нервовъ осязанїя съ усиленїемъ нервной дѣятельности: чрезвычайная чувствительность, первныя боли (невралгія) (стат. 46. и 47.);
- д) Болѣзни нервовъ осязанїя съ упадкомъ ихъ дѣятельности: нечувствительность, параличъ чувствъ (см. стат. 48.);
- е) Прекращенїе движенїя и чувственнаго воспрїятїя: обморокъ (стат. 49.);

Въ слѣдующихъ статьяхъ мы переходимъ къ болѣе подробному разсмотрѣнїю этихъ состоянїй.

43. Слабость нервовъ,

debilitas nervosa.

Подъ этимъ именемъ разумѣють общее расположеніе къ нервнымъ болѣзнямъ, первное сложеніе тѣла, которое внѣшнимъ образомъ проявляется нѣжностью, блѣдностью лица, малокровіемъ, измѣнчивостью температуры кожи, малымъ, быстрымъ пульсомъ, водянистой мочей и обыкновенно живостью духа, воображенія, измѣнчивостью расположенія духа, наклонностью къ крайностямъ, пугливостью, раздражительностью, восприимчивостью ко всякимъ впечатлѣніямъ, уступчивостью, но эластичностью; особенно свойственно это расположеніе женскому полу, у котораго оно легко переходитъ въ истерику и вызываетъ нижеозначенные нервные припадки (судороги, обмороки и т. п.). Нервная слабость можетъ быть или природная, или приобрѣтенная отъ дурнаго питанія, чувственныхъ и неестественныхъ раздраженій, чтенія романовъ, салонной жизни, перевѣса духовной жизни надъ физической, унынія, изнуряющихъ болѣзней, праздности, чрезмѣрнаго употребленія одуряющихъ и вредныхъ лѣкарствъ (какъ напр. препаратовъ опія), электричества, слабительныхъ, отъ ночнаго бдѣнія и т. п.

Вообще сюда относится все сказанное объ истерикѣ, въ особенности относительно діеты. Сверхъ того я рекомендую методическое, укрѣпляющее лѣченіе, избѣгающее всякаго раздраженія, легко могущаго повредить, и основанное на цѣлесообразномъ питаніи, развлеченіи, холодныхъ омываніяхъ, морскихъ купаніяхъ и т. п., а также своевременное употребленіе гомеопатическихъ средствъ, въ острыхъ случаяхъ не слишкомъ частое (черезъ 3 — 4 часа), въ соответствующихъ цѣли разжиженіяхъ, а именно: **China 2.**, при дѣйствительной слабости, особенно послѣ потери соковъ; **Coffea. 2.**, во всѣхъ формахъ сильнѣйшаго раздраженія съ бессонницею (дѣйствуетъ не продолжительно и потому употребляется какъ промежуточное средство); **Asa 3.**, **Ignat. 3.** и болѣе глубоко дѣйствующее **Arg. nitr. 5.**, какъ главные средства противъ всѣхъ истерическихъ проявленій нервной слабости, особенно при перемѣнчивости расположенія духа, видѣніяхъ, пугли-

вости, судорогахъ, при мигрени и т. п.; **Nux vom. 5.**, при нервной раздражительности отъ продолжительныхъ умственныхъ занятій, злоупотребленія кофе и спиртными напитками (на женщинъ дѣйствуетъ лучше въ высокихъ дѣленіяхъ); **Rhus tox. 5.**, главное средство противъ нервной слабости, которая имѣетъ свое мѣсто-пробываніе въ позвоночномъ столбѣ, въ нервахъ движенія, и обнаруживаетъ параличный характеръ съ подергиваніемъ, болью, (лѣкарство это дается чувствительнымъ особамъ только въ высшихъ дѣленіяхъ, а въ низшихъ легко возбуждаетъ въ нихъ тошноту); **Veratr. 3.**, въ видѣ промежуточнаго средства, при тошнотѣ, ознобѣ, обморокахъ, истощенія. Прекрасное средство, полезное однако только при явныхъ признакахъ малокровія, — **Ferr.**; когда волненіе крови, раздражительность, — **Nitr. ac. 3.**, а при дѣйствительной слабости послѣ чрезмѣрнаго возбужденія нервовъ, особенно половой системы, воображенія, — **Ac. phosph. 3.**, при болѣе же сильной степени — **Phosph. 5.**

44. Судороги, *spasmi*; конвульси, *convulsiones* или *spasmi clonici*; столбнякъ, *spasmus tonicus*; сведеніе челюстей, *trismus*; судороги отъ ранъ, *tetanus*; нервное оцѣпенѣніе, *catalepsia*; самостоятельный дѣтскій параличъ; пляска св. Витта, малая — *chorea St. Viti*, и большая — *chorea Germanorum*; падучая бользнь, *epilepsia*; судороги беременныхъ и родильницъ, *eclampsia gravidarum et parturientium*.

Подъ названіемъ судорогъ разумѣютъ неестественное, болѣею частью произвольное и несоотвѣтствующее никакой цѣли, движеніе вслѣдствіе вліянія нервной системы. Въ меньшей степени они обнаруживаются въ видѣ:

- 1) Сзуженія или стягиванія извѣстныхъ полостей, напр. ягодицы, горла, глотки, — такъ наз. запирающія судороги, или въ видѣ давленія, — т. наз. давящія судороги, при испусканіи мочи, испражненій, родовыхъ потугахъ, кашлѣ; или въ видѣ пученія, — такъ называемыя судороги отъ вѣтровъ, въ кишкахъ, желудкѣ. Здѣсь употребляютъ средства противъ мѣстныхъ недуговъ (и о нихъ см. въ соотвѣтствующихъ статьяхъ), а особенно **Cham.**,

Ignat., Nux vom., Plat., Phosph., какъ скоро принадки — чисто нервнаго, судорожнаго характера.

- 2) Высшую степень этого недуга составляютъ конвульсии, подергивающія судороги, такъ называемыя въ медицинѣ клоническія судороги, состоящія въ порывистыхъ, отъ времени до времени слабѣющихъ движеніяхъ въ разные стороны. Частью они бываютъ возбужденныя, т. е. симпатическія, какъ напр. при острыхъ сыпяхъ, глισταхъ, истерикѣ и т. п., частью сопровождающія, т. е. симптоматическія, основанныя на органическихъ недугахъ нервной системы. (Сюда принадлежатъ также и судороги, бывающія у дѣтей при прорѣзываніи зубовъ и при другихъ болѣзняхъ.) Здѣсь сдѣлать выборъ (по нижеслѣдующимъ указаніямъ) изъ *Bellad., Cham., Ignat., Hyosc., Nuc vom., Veratr.* и особенно **Zinc.**, а если пораженъ главнымъ образомъ мозгъ, и **Zinc.** не помогаетъ, то **Moschus.** (Послѣднія 2 средства преимущественно при лѣченіи дѣтей!) Кромѣ того, смотря по обстоятельствамъ, также **Opium, Stram.** и, какъ радикальное средство противъ рецидива — **Cupr.** Къ этого рода судорогамъ принадлежатъ отчасти: безпокойство мускуловъ, пляска св. Витта и эпилепсія (паучая болѣзнь).
- 3) Столбнякъ, назыв. въ медицинѣ тоническими судорогами, состоитъ въ продолжительномъ опуханіи и въ сокращеніи мускуловъ. Онъ исходитъ обыкновенно изъ мозга. Виды этого столбняка составляютъ: судороги въ икрахъ и судорожное сведеніе челюстей. Если судороги простираются дальше, то происходитъ всеобщій столбнякъ (*tetanus*), который, въ видѣ частнаго случая, обнаруживается въ сведеніи челюстей; недугъ этотъ случается большею частью вслѣдствіе пораненія, простуды, разгориченія, отравленія. Высшую степень этой болѣзни представляетъ такъ называемая каталепсія, причѣмъ произвольныя движенія внезапно прекращаются, больной какъ бы каменѣетъ въ томъ положеніи, въ какомъ засталъ его припадокъ (и которое часто бываетъ создано судорогами), и мускулы приобрѣтаютъ гибкость на подобіе воска. Главныя средства въ этихъ болѣзняхъ: **Arnica.** (если предшествовали поврежденія), *Cic. vir.,*

Mosch., Nux vom., Opium, Secal. corn., Strychnin., Veratr.

Противъ судорожнаго сведенія челюстей преимущественно полезны: *Bell., Camph., Hyosc., Strychnin.* или *Veratr.* Въ рѣдкихъ случаяхъ у дѣтей вслѣдствіе такихъ судорогъ встрѣчаются сокращенія членовъ. Они обнаруживаются въ болѣзненномъ искривленіи и, не столь часто, въ томъ, что растягиваются суставы пальцевъ на рукахъ и ногахъ, а равно и суставы руки, кисти и стопы. Рука образуетъ почти прямой уголъ, ноги становятся косолапными. Причинами этой болѣзни приводятъ прорѣзываніе зубовъ, простуду, страданія мозга. Она поражаетъ большею частью дѣтей, страдающихъ Англійской болѣзью.

- 4) Особенный родъ сложныхъ, безцѣльныхъ судорожныхъ движеній составляетъ пляска св. Витта. Слабою степенью ея бываетъ безпокойство мускуловъ, страсть къ дрыганію руками и ногами, — малая Витова пляска, встрѣчающаяся у нервныхъ и одержимыхъ блѣдною немочью дѣвочекъ и состоящая въ подергиваніи отдѣльныхъ мускуловъ, постоянномъ безпокойствѣ въ движеніяхъ, въ пеловкости, неспособности держать что-либо въ рукахъ и ходить прямо и, наконецъ, въ томъ, что онѣ машутъ руками и дрыгаютъ ногами. Въ новѣйшее время она приобрѣла тѣмъ большее значеніе, что, какъ доказано, она находится въ связи съ ревматизмомъ и пораженіемъ сердца; это обстоятельство нужно на будущее время принять во вниманіе. Большая пляска св. Витта, напротивъ того, обнаруживается въ пароксизмахъ, состоящихъ изъ дикихъ и странныхъ жестикуляцій, пляски, прыжковъ, скачковъ, карабканья, плача, разгоряченнаго состоянія, экзальтаціи, экстаза, доходящаго до лунатизма, безпамятства и безстыдства. Противъ этого недуга полезны: *Calc. c.*, а для радикальнаго излѣченія: *Supr.* (особенно во время приступовъ), *Stram., Zinc.*

- 5) Самую трудную форму представляетъ эпилепсія или падучая болѣзнь, основывающаяся, вѣроятно, на малокровіи мозга, которое вызывается сжатіемъ сосудовъ. Она состоитъ изъ клоническихъ и тоническихъ судорогъ, соединенныхъ съ нечувствительностью и безпамятствомъ, и проявляется въ видѣ періодическихъ припадковъ. Иногда больной ихъ пред-

чувствуетъ, а иногда они наступаютъ внезапно, будучи сопровождаемы слѣдующими симптомами: моментальная блѣдность, за которою вскорѣ слѣдуетъ темная краснота или синева лица, крикъ, паденіе на землю, истеченіе изо рта слюны или пѣны, скрежетъ зубовъ, прикусываніе языка, хрипѣніе, сжиманіе кулаковъ, метаніе, подергиваніе, вытѣиваніе тѣла, отдѣленіе мочи, испражненій и т. д., пока наконецъ не наступитъ спячка.

Вотъ картина такъ называемаго большого припадка; но есть большое число не вполне развившихся случаевъ, когда припадокъ можетъ ограничиться скоро преходящимъ головокруженіемъ, такъ называемымъ *vertige epileptique* или *petit mal*. Эпилепсію, недавно наступившую, сопряженную съ развитіемъ дѣвушки и основывающуюся на чисто нервныхъ причинахъ, легче излѣчить, нежели эпилепсію, происходящую отъ органическаго страданія мозга, отъ эксцессовъ въ раздраженіи нервовъ, въ половыхъ и другихъ наслажденіяхъ, перешедшую по наслѣдству *) и обнаружившуюся у людей пожилыхъ. Лѣченіе требуетъ большого терпѣнія и неутомимости. Разъ наступила 2-ая стадія болѣзни, а именно та стадія, когда состояніе раздражительности, судорожные пароксизмы, переходятъ въ параличъ, особенно душевныхъ способностей, т. е. въ слабоуміе и помѣшательство, то уже надѣяться нечего. Слабость памяти наступаетъ часто даже очень скоро. Подходящія въ этомъ случаѣ лѣкарства: *Agar.*, *Artemisia*, *Bell.*, *Camph.*, *Cocc.*, *Hyosc.*, *Nux vom.*, *Stram.* (особенно при недавней болѣзни), *Strychnin.* и преимущественно радикальныя средства: *Cupr.*, *Arg. nitr.*, *Ignat.* Въ новѣйшее время стали рекомендовать *Rana bufo* (ѡ. или въ еще высшихъ дѣлен.), *Salamandra ѡ.* Впрочемъ, ни въ одной области не прибѣгаютъ къ большому количеству средствъ, какъ именно здѣсь, вслѣдствіе чего большею частью приносятъ вредъ, а не пользу.

*) По наблюденіямъ Д-ра Демо (Demeaux), большая часть эпилептиковъ рождены отъ людей, бывшихъ въ моментъ оплодотворенія не въ трезвомъ видѣ. (*Compt. rend. LI.*, p. 576., 1860.)

Пусть слѣдующее послужить къ болѣе точной характеристикѣ симптомовъ:

Arnica — 2.

Противъ *судорогъ*, особенно столбняка, послѣ пораненія.

Belladonna — 2.

При судорогахъ у дѣтей вслѣдствіе прорѣзыванія зубовъ. При первыхъ принадлегахъ *падуцей болъзни*. Во всѣхъ видахъ *судорогъ*, при подергиваніи, ощущеніи зуда въ членахъ, съ *примикомъ крови къ мозгу, головокруженіемъ, расширеніемъ зрачковъ, затрудненіемъ при глотаніи, пѣной у рта, стѣсненіемъ въ груди*. Возобновленіе *припадка* отъ прикосновенія. Сонливость и одурѣніе съ *сильною краснотою лица и искривленіемъ его*; притомъ *припадки бѣшенства, крикъ, тоска*.

Chamomilla — 2.

Судороги (особенно у дѣтей и родильницъ) съ *конвульсіями*, послѣ *раздраженія, досады, простуды*, причемъ: раздражительность нервной системы, *дурное расположеніе духа, безпокойство*, подергиваніе во снѣ, жаръ одной щеки и блѣдность другой, лобъ и голова горячи; во время

пота жажда. — Притомъ *поносы, колики, бессонница, громкій крикъ*. Расположеніе къ обмороку.

Cocculus — 2.

Судороги, столбнякъ, *пляска св. Витта, падучая болъзна*, особенно во время регуль, у истерическихъ, слабыхъ особъ.

Cuprum — 3.

Главное средство при *хронической Витовой пляскѣ и падучей болъзни*, особенно когда *припадки* бывають *по ночамъ*. Припадки начинаются съ членовъ; *безнамятство, молчаливость, слюнотеченіе, удущье (послѣ слезъ), краснота лица и глазъ; частое испусканіе мочи*.

Hyoscyamus — 2.

Сведеніе челюстей, падучая болъзна, Витова пляска, особенно съ *пораженіемъ мозга, бредомъ, болтливостью, видѣніями*; тоска съ крикомъ и по временамъ съ *одурѣніемъ*; жаръ или синева въ лицѣ, *безпокойное метаніе, скрежетъ зубовъ, стѣсненіе въ груди, сухой кашель*. Въ свободное отъ *припадка* время больной *впа-*

даетъ въ состояніе кретинизма*) является какаѣ то торопливость. (Схоже съ *Bell.* и *Op.*)

Ignatia — 2.

Слабые или сильные судороги, въ особенности если они исходятъ изъ спиннаго мозга, *конвульсіи, столбнякъ, судорожное сведеніе челюстей, Витова пляска, эпилепсія*, особенно послѣ *испуна, страха, душевныхъ потрясеній*. Хорошо чувствительнымъ и раздражительнымъ особамъ, *женщинамъ*, при судорожномъ смѣхѣ и плачѣ, зѣвотѣ, *мигрени*, давящей боли въ макушкѣ, какъ бы отъ гвоздя, *тошнотѣ, измѣнчивости цвѣта лица*, судорогахъ и подергиваніи въ отдѣльныхъ членахъ. Въ *самомъ началѣ* падучей болѣзни, вслѣдствіе душевныхъ потрясеній.

Moschus — 1.

На это средство слишкомъ мало обращено вниманія. Оно

*) Признаки кретинизма суть: низкій ростъ, уродливое образованіе всего тѣла, блѣдный цвѣтъ кожи, чрезмерно большая голова и тупоуміе. Эта болѣзнь встрѣчается преимущественно въ высокихъ, гористыхъ мѣстностяхъ, какъ напр. въ Швейцаріи и т. д.

Прим. переводч.

сильно возбуждаетъ *мозгъ при конвульсіяхъ, столбнякѣ* (дѣтей), столбнякѣ отъ пораненія съ безпамятствомъ, когда притомъ одышка, *припадки удушья*.

Nux vomica — 3.

Клоническія и тоническія судороги, исходящія изъ спиннаго мозга, столбнякъ, *падучая болѣзнь, Витова пляска, съ закинутою назадъ головою, съ болью въ затылкѣ и крестцѣ, съ чувствительностью позвонковъ*; преимущественно при *ощипленіи членовъ*, судорогахъ *икръ*; при давленіи въ желудкѣ, *гастрическихъ припадкахъ съ давленіемъ въ головѣ, запорѣ, дурномъ расположеніи духа и шпихондріи*; отъ досады и гнѣва хуже.

Opium — 3.

Конвульсіи и столбняки всякаго рода, особенно послѣ *испуна*, причемъ *глубокій сонъ, приливъ крови къ мозгу, хрипленіе и припадки удушья, нечувствительность, метаніе и крикъ*. Припадки большею частью ночью.

Platina — 2.

Судороги, особенно *столбнякъ*, утромъ, при полномъ сознаніи, у *истерическихъ особъ* и въ

связи съ *разстройствомъ рецупъ*; въ видѣ подергиванія отдѣльныхъ мускуловъ. Судорожный смѣхъ и плачь, особенно *сведеніе челюстей*. Особенно хорошо при поражении спиннаго мозга и ганглий у женщинъ.

Stramonium — 2.

Главное средство при *конвульсіяхъ*, особенно при *падучей бользни* и *большой Витовой пляскѣ*, также при *столбнякѣ* разнаго рода съ загибаніемъ тѣла назадъ и *пораженіемъ верхней его части*, причемъ *виднѣнія*, *крикъ*, *смѣхъ*, *плачь*, *пляска*, *повтореніе опредѣленныхъ движеній*, *безмысленныя выходки*, *заканіе*, *безпамятство*, *потеря языка*, *судороги горла*. Припадки часто поражаютъ въ одно время верхнюю правую и нижнюю лѣвую стороны тѣла, или наоборотъ, и выражаются въ подергиваніи отдѣльныхъ мускульныхъ группъ. Припадки вызываються раздраженіемъ во-

ображенія свѣтлыми предметами и т. д.

Veratrum — 2.

Конвульсии, столбнякъ, сведеніе челюстей, судороги икры, съ потерей чувствъ, языка, стѣсненнымъ дыханіемъ, притомъ *сильная тоска*, упадокъ духа, отчаяніе, *холодная кожа*, поносъ.

Zincum met. или Zinc. oxyd. — 1.

Лучшее средство при такихъ *конвульсіяхъ у дѣтей*, которыя имѣютъ исходною точкою *мозгъ* (при трудномъ прорѣзываніи зубовъ и глистахъ). При *Витовой пляскѣ*. Также взрослымъ при судорогахъ съ приливами (или безъ нихъ) крови къ головѣ отъ *нервнаго раздраженія мозга*, съ потерей сознанія, *разширеніемъ и нечувствительностью зрачковъ*, съ подергиваніемъ мускуловъ, *лѣною у рта*, съ параличемъ одной стороны и холодными оконечностями.

Примѣч. При правильномъ лѣченіи во всякомъ случаѣ должно прежде всего обратить вниманіе на причины болѣзни. Причинами этими, при всякихъ судорогахъ, бывають: нервность, полнокровіе или малокровіе, сильное раздраженіе или истощеніе; всеобщее разстройство системы питанія, какъ напр. при *золотухѣ*, *дѣвичьей немочи*, *отравленіяхъ крови*; сыпи, *лихорадка*, *душевные потрясенія*, *мѣстныя болѣзни головнаго и спиннаго мозга*, даже *периферическихъ нервовъ*. А потому не всегда бываетъ доста-

точно указанныхъ выше средствъ и, особенно въ хроническихъ случаяхъ, необходимо болѣе основательное леченіе болѣзни, возможное только для врача. При этихъ недугахъ, особенно при *эпилепси*, можетъ быть принято въ соображеніе еще множество другихъ средствъ, какъ напримѣръ: *Arsen.*, при органическомъ разстройствѣ; *Cale. с.*, для золотушныхъ, страдающихъ дѣвичьей немощью; *Phosph.*, при органическомъ пораженіи мозга, особенно при его размягченіи; *Plumb.*, при недугахъ позвоночнаго столба; *Silic.*, при эпилептическихъ припадкахъ, повторяющихся въ извѣстные сроки (говорятъ, во время перемѣны луны); *Stann.*, при вечернихъ припадкахъ эпилепси съ блѣдностью лица, происходящей отъ солитера; *Sulph.*, когда судороги, обнаруживаются понемногу послѣ скрывшихся сыпей и ревматизма. Противъ другихъ формъ судорогъ можно рекомендовать: *Argent. n.* (столбнякъ); *Camph.*, противъ всѣхъ видовъ судорогъ съ поражениемъ мозга, причемъ: раздутое, красное лицо, храпѣніе, одурѣніе, липкій потъ, холодная кожа; *Caust.* (хроническіе случаи); *Cina*, при легкихъ судорогахъ у дѣтей, происходящихъ отъ глисть; *Cicut.* (отъ глисть, съ блѣдностью, коликами, сведеніемъ челюстей); *Lach.* (съ безпамятствомъ, головокруженіемъ, сердцебиеніемъ, слабостью нервовъ, обмороками); *Phosph.* (дѣйствительная слабость, грозитъ параличъ мозга или легкихъ); *Secale.* (во всѣхъ судорогахъ спиннаго хребта, съ параличемъ мочевого пузыря и задняго прохода); *Strychnin.* (столбнякъ); *Valer.* (въ истерическихъ случаяхъ, при глистахъ). Аллопаты въ послѣднее время очень часто стали употреблять *Kali brom.*, но показанія ихъ и успѣхи сомнительны. Это средство можетъ быть полезно при органическихъ причинахъ, точно такъ же, какъ родственное ему *Kalium iodatum.*

При судорогахъ дѣтей надобно обратить особенное вниманіе на то, происходятъ ли они отъ прорѣзыванія зубовъ, отъ глисть и т. п., или отъ мозговыхъ туберкулъ, отъ туберкулознаго воспаленія мозговой плевы, отъ выпотѣнія и т. п.

Во время припада необходимо предохранять больного отъ поврежденій при паденіи, разстегнуть платье и т. п. Отъ средствъ, въ родѣ горчичниковъ, холодныхъ компрессовъ, обложенія головы льдомъ — я успѣховъ не видалъ. При приливахъ крови къ мозгу лучше всего компрессы Присница, — холодные, хорошо выжа-

тые компрессы на ноги (каждая нога заворачивается отдѣльно), сверхъ которыхъ туго наматывается шерстяная матерія. Мѣнять черезъ 4 — 6 часовъ.

Въ заключеніе приведемъ новѣйшія средства противъ разсмотрѣнныхъ нами болѣзней. Противъ конвульсій вообще, въ особенности у женщинъ и дѣтей — *Ver. vir.*; *Cyprip.* дается дѣтямъ, когда у нихъ показываются предвѣстники серьезнаго пораженія мозга и т. п.; противъ сведенія челюстей — *Gels.*, *Phyt.*; тѣ же средства даются противъ судорогъ отъ ранъ; судороги съ закидываніемъ головы назадъ (*opisthotonus*) — *Phyt.* (затрудненное дыханіе, подергиваніе мускуловъ лица, которые затѣмъ ослабѣваютъ, а потомъ снова судороги), *Ver. v.*; противъ пляски св. Витта — *Caul.*, *Cimic.* (послѣ ревматизма, особенно лѣвой стороны, усиливается во время мѣсячнаго очищенія), *Gels.*, *Ver. vir.*; противъ *эпилепсiи* — *Caul.* (во время или послѣ мѣсячнаго очищенія), *Cimic.* (также), *Gels.*, *Ver. vir.*, *Zizia*; противъ *эклампсiи*: *Gels.* (во время беременности, при малокровіи, при трудныхъ родахъ, у дѣтей во время прорѣзыванія зубовъ) и *Ver. vir.* (во время родовъ, послѣ потери крови.)

Дѣленія лѣкарствъ должны быть среднія (вышеозначенныя же только въ болѣе опасныхъ случаяхъ). Для лѣченія хроническихъ случаевъ можно давать не болѣе одного приѣма черезъ 3 — 4 дня. Въ острыхъ можно повторять приѣмы даже черезъ каждыя $\frac{1}{2}$ часа.

45. Параличъ органовъ движенія, *paralysis.*

Причины паралича могутъ быть нервныя, т. е. исходящія изъ нервной системы, вслѣдствіе раздраженія, истощенія и т. д., или химическія (отравленія, разстройство питанія и кровеносной системы послѣ тифа и т. д.), или механическія, отъ давленія (изліянія крови, опухоли мозга, наросты на костяхъ) и т. п. Поводами къ параличу можно признать: приливъ крови, ревматизмъ, болѣзни нижней части живота, скрившіяся сыны и т. п., а исход-

ной точкой постоянно бываетъ головной или спинной мозгъ или отдѣльные нервные узлы, и сообразно съ этимъ онъ распространяется на большую или меньшую часть тѣла. Наиболѣе часто встрѣчающіяся формы паралича суть тѣ, которыя появляются послѣ удара, ревматизма и ломоги, отравленія (свинцомъ, ртутью), нервныхъ разстройствъ, сифилиса, скорбута, тифа, дифтерита, на-кожныхъ сыпей. Параличъ послѣ удара, основанный на органическомъ только измѣненіи головного и спиннаго мозга, самый опасный и безнадежный; легче излѣчить параличъ послѣ тифа, дифтерита (ср. эту статью), сыпей, ревматизма. У дѣтей часто вызываютъ параличъ опухоли въ мозгу, иногда туберкулознаго характера, воспаленіе мозговой оболочки, выпотѣнія въ мозгу и т. п., или же костоѣда въ позвоночномъ столбѣ. Виды эти, конечно, очень опасны. На органическихъ измѣненіяхъ спиннаго мозга основывается, вѣроятно, такъже такъ наз. самостоятельный дѣтскій параличъ, который иногда исчезаетъ самъ собою, но въ большинствѣ случаевъ остается. Онъ заключается въ томъ, что терлется власть отчасти или вполне надъ нѣкоторыми или всѣми мускулами одной оконечности, рѣже обѣихъ верхнихъ или нижнихъ оконечностей. Онъ часто появляется ночью, безъ всякой причины; иногда ему предшествуютъ легкія лихорадочныя движенія, безпокойство, сонливость или бессонница, исчезающія при наступленіи паралича. Рука виситъ какъ-то расслабленно книзу и не поднимается; если парализована только верхняя часть руки, то ребенокъ можетъ рукою брать, но не поднимать; при параличѣ ноги ребенокъ тащить ее за собою и не можетъ хорошенько стоять. Во всемъ прочемъ состояніе здоровья нормальное. Другаго рода дѣтскій параличъ, открытый въ послѣднее время Дюшеномъ, есть такъ наз. псевдогипертрофическій параличъ мускуловъ, обнаруживающійся въ 3-хъ стадіяхъ, прежде всего въ видѣ слабости движенія, сначала въ ногахъ и лѣпкахъ, затѣмъ въ рукахъ до полного паралича и, наконецъ, въ видѣ увеличенія объема нѣкоторыхъ и изрѣдка всѣхъ мускуловъ парализованныхъ частей, особенно же соединительныхъ тканей, съ обильнымъ образованіемъ фибрины и жировыхъ шариковъ. Онъ появляется тотчасъ послѣ рожденія, или на 1-мъ году, или въ возрастѣ отъ 6 — 10 лѣтъ. Дѣти нагибаются впередъ, когда ходятъ или стоятъ, лядвеи у

нихъ вогнуты на подобіе сѣдла, говорятъ они медленно, умственные способности тупѣютъ, и наконецъ наступаетъ смерть отъ истощенія или чахотки. Въ первой стадіи болѣзни еще излѣчима. Мальчики страдаютъ этою болѣзнію чаще, нежели дѣвочки; иногда она поражаетъ нѣсколькихъ дѣтей въ одной семьѣ. Причины не разъяснены. Дюшенъ совѣтуетъ въ первой стадіи болѣзни лѣчение электричествомъ и водой и механическое выпрямленіе костей. Само собою разумѣется, что мы исключаемъ изъ нашей книги, какъ предметъ недоступный для нея, случаи паралича, образовавшагося вслѣдствіе вырожденія, какъ напр. послѣ пораненія, ломотныхъ отложеній, давленія на стволы нервовъ. (Сюда относятся напр. параличь новорожденныхъ, вслѣдствіе давленія при родахъ, и параличь маленькихъ дѣтей, который образуется вслѣдствіе подниманія ихъ и вообще грубаго и неосторожнаго съ ними обращенія). Вообще надо сказать, что человѣкъ, не свѣдущій въ медицинѣ, потому только имѣетъ право взяться за лѣченіе этой болѣзни, что и само искусство врача, къ сожалѣнію, борется противъ нея большею частью безуспѣшно.

При только что обнаружившемся параличѣ послѣ удара главнымъ средствомъ служить **Arnica 2**. При сильной краснотѣ лица, сонливости и одурѣніи — **Opium 3**. Если это средство не помогаетъ, то при дыханіи съ хрипѣніемъ и при угрожающемъ параличѣ легкихъ: **Phosph. 2**, а людямъ пожилымъ, при тѣхъ же обстоятельствахъ: **Baryt. m. 3**. (черезъ 3—2 часа). Если параличное состояніе затягивается: **Caust. 3**. или **Cocc. 2**. О параличѣ ревматическомъ и ломотномъ см. соответствующія статьи. Главныя средства въ этомъ случаѣ суть: **Caust.**, **Rhus** (всѣ 2-го разжиженія). *Электричествомъ* надо пользоваться съ большою осторожностію; лучше всего оно при параличѣ послѣ дифтерита.

Противъ паралича отъ отравы надо испробовать противоядія, но это — задача врача (противъ ртути — *Iod.*, противъ свинца — *Opium* и т. д.).

Противъ нервного паралича, исходящаго большею частью изъ головного и спиннаго мозга, служатъ: **Arg. nitr. 3.**, **China 2.**, (при дѣйствительной слабости); **Cocc. 3.**, **Nux vom. 3.**, **Rhus 5.**, **Zinc. 3.**, — также **Ferr. 1.** (при малокровіи), **Phosph. 5.** (послѣ излишествъ); **Secal. 3.** (причемъ параличь мочевого пу-

зыря, исходящій изъ спиннаго мозга). Можно попробовать также *магнетизмъ*. *Электричествомъ* пользоваться съ осторожностью!

Противъ паралича послѣ острыхъ или хроническихъ болѣзней соковъ (крови): **China, Rhus, Ferr., Phosph., Plumb., Sulph.**

Что касается до отдѣльныхъ частей, то особенно рекомендуемъ — при параличѣ личныхъ мускуловъ: **Caust.**; глазныхъ вѣкъ: **Spigel.**; языка: **Arn., Bellad., Cocc.**; верхнихъ оконечностей: **Cocc., Ferr., Nux. vom., Rhus tox.**; нижнихъ оконечностей: **Arg. n., Oleand., Plumb., Secal., Veratr., Zinc.**; мочеваго пузыря: **Camph., Canth., Puls.**

Въ послѣднее время стали рекомендовать также *Aluminium met.*, въ особенности противъ паралича спиннаго мозга. Вопросъ объ этомъ средствѣ еще не рѣшенъ окончательно.

Примѣчаніе. Хотя электричество во многихъ случаяхъ отличное лѣчебное средство, тѣмъ не менѣе, оно легко можетъ причинить вредъ вслѣдствіе чрезмѣрнаго раздраженія. Надо быть весьма осторожнымъ при прописываніи купаній и минеральныхъ водъ послѣ удара. Собственно говоря, до истеченія перваго года къ этимъ средствамъ прибѣгать нельзя. Противъ паралича хороши, но только послѣ тщательнаго выбора, морскія или соляныя купанья (особ. Реме, Киссингенъ, Наугеймъ), купанье въ желѣзистыхъ водахъ, или такъ наз. индифферентные источники, особенно Гаштейнъ, Вильдбадъ, Рагацъ, Иоганнисбадъ.

Приведемъ нѣсколько новѣйшихъ средствъ. Противъ паралича нижнихъ членовъ — *Aesc. glabr.*, а противъ паралича верхнихъ членовъ — *Hippocast.*; *Caul.* дается противъ паралича нижнихъ оконечностей, происшедшаго отъ рефлекса; **Gelsem.**, противъ паралича нервнаго и ревматическаго характера, вызваннаго раздраженіемъ хребта или хроническимъ воспаленіемъ спиннаго мозга и поражающаго особенно крестцовые или бедренные мышцы или запирающій мускулъ мочеваго пузыря; *Xanthox.*, противъ паралича языка, гортани, гортанной щели (безголосіе).

46. Нервные боли (невралгии),
neuralgiae.

О нервных боляхъ, насколько онѣ являются самостоятельными недугами, мы говорили въ главахъ о мѣстныхъ болѣзняхъ. А потому смотри:

Бедреная боль, боль въ мускулахъ и суставахъ (въ статьѣ о *ревматизмѣ*).

Головная боль, личная боль (въ слѣдующей статьѣ).

Спинальная боль,

Зубная боль,

Судороги желудка,

Боль въ желудкѣ (см. *колики*),

Боль въ прямой кишкѣ (см. *геморрой*),

Боли въ мочевомъ пузырьѣ (см. *мочевые недуги*),

Боли менструальныя (см. *менструальная больница*).

Особеннаго вниманія, вслѣдствіе своей своеобразности, заслуживаетъ:

47. Личная боль,
tic douloureux, prosopalgia.

Эта весьма мучительная боль имѣетъ своимъ мѣстомъ пребыванія личныя нервы, наступаетъ періодически, иногда внезапно, но можетъ также продолжаться долгое время. Она вызывается душевными потрясеніями, разговоромъ, смѣхомъ, жеваніемъ, чиханіемъ, прикосновеніемъ и т. д. Иногда она ограничивается небольшимъ пространствомъ на губахъ, на носу и т. д., иногда же распространяется болѣе, до верхней части дба. Она можетъ зависѣть отъ ревматизма, отъ воспаленія и продуктовъ его во влагалищѣ нервовъ, отъ слабости нервовъ, малокровія, зубныхъ болѣзней, или возникаетъ отъ давленія (припуханія костей, опухолей и т. д.), или состоитъ въ связи съ недугами нижней части живота, гемор-

роемъ, разстройствомъ регулъ, истерикой, ипохондріей, ломотой, сифилисомъ. Лѣченіе должно сообразоваться съ характеромъ и причинами болѣзни, а также съ характеромъ боли, который опредѣленъ при отдѣльныхъ лѣкарствахъ.

Пусть послужить слѣдующее для общаго ознакомленія съ лѣченіемъ этой болѣзни.

Главные средства противъ личной боли отъ прилива крови (конгестивная личной боли): **Acon., Bellad., Merc., Nux. vom.**

Противъ нервной личной боли: **Chin., Mez., Phosph., Plat., Rhus., Spigel., Stann.**

Противъ ревматической личной боли: **Bell., Chin., Coloc., Merc., Nux. vom., Puls., Rhod., Rhus., Spig.**

Противъ личной боли воспалительнаго характера **Bell., Merc.**

При страданіи костей: **Merc., Mez.**

При малокровіи: **Chin., Puls.**

Вотъ точные признаки:

Aconitum — 2.

Отъ прилива крови, ревматизма. Щекотаніе, колотье, рвущія боли, съ опухолью, жаръ и краснота въ лицѣ, мигорадка, жажда, безпокойство, тоска.

Belladonna — 3.

Боль нервная, конгестивная, ревматическая или воспалительная, возникающая отъ давленія, тренія, прикосновенія, движенія; рѣзь, жженіе, давленіе, ломъ, колотье, бѣненіе въ кости, въ челюстяхъ, скулахъ; судороги въѣкъ, подериваніе и искаженіе

мускуловъ лица, краснота и жаръ въ лицѣ, головокруженіе, шумъ въ ушахъ, сердцебиеніе и т. д. Около вечера и полуночи хуже.

China — 3.

Боль нервная, ревматическая или отъ кажущагося прилива крови; возобновляется периодически, въ опредѣленные часы дня или ночи, или при лежаніи въ положеніи; щиплющее, подеривающее или сверлящее колотье, рѣжущее жженіе, жгучее подериваніе; причѣмъ малокровіе, блѣдность лица.

Colocynthis — 3.

Большую частью *ревматическая боль*, весьма сильная, въ видѣ припадковъ или постоянная; *ломъ, жжение, колотье*, особенно *напряженіе* до носа, зубовъ и ушей, верхней части головы, съ опухолью, краснотою; усиливается отъ прикосновения и движенія личныхъ мускуловъ, уменьшается отъ покоя и *наружнаго тепла*; это лѣкарство полезно также при *роющемъ жженіи въ скулахъ* съ воспалительнымъ жаромъ и опухолью послѣднихъ.

Mercurius sol. — 3.

Коместивная, воспалительная, ревматическая личная боль; *ломъ, колотье*, особенно ночью, съ опуханіемъ больнаго мѣста, *сломотеченіемъ*, бессонницей, безпокойствомъ, *потнїемъ головы*, лица и т. д., *ломъ* доходить даже до верхней части головы и зубовъ. Постельная теплота и *наружный холодъ* усиливаютъ боль. Причиною часто бываютъ *гнилыя зубы*, а иногда также *сифилисъ*.

Mezereum — 3.

Когда предшествовала *больнь костей, сифилисъ*, злоупот-

ребленіе ртутиемъ; но также въ чисто нервныхъ случаяхъ. Особенно при боли въ *скулахъ, сверлящей* снаружи внутрь, при *одуряющемъ давленіи*, наступающемъ мгновенно и простирающемся до глазъ, висковъ, ушей, зубовъ, шеи, затылка, плечъ; при боли, возникающей отъ тепла, послѣ движенія на открытомъ воздухѣ—въ комнатѣ. Въ то же время: *сломотеченіе*, жженіе въ горлѣ, краснота щеки, неподвижность жевательныхъ мускуловъ, ознобъ и дрожь, подергиваніе большихъ мускуловъ.

Nux vomica — 3.

Ревматическая и нервная, особенно коместивная боль. *Давленіе*, дерганіе, *ломъ* съ опухолью и краснотою, щекотаніе, подергиваніе мускуловъ. Отъ размышленія, спиртныхъ напитковъ, *кофе*—хуже. Чувство какъ бы онѣмѣнія въ большихъ частяхъ.

Phosphor. — 3.

Ревматическая, коместивная, особенно нервная боль. *Ломъ, дерганіе, натянутая кожа, зудъ, колотье какъ бы отъ гвоздя, опухоль и блѣдность лица*; отъ раскрытія рта, движенія личныхъ мускуловъ, прикосновения и малѣйшей простуды хуже;

особенно поражены твердые части. *Примизъ крови*, головокруженіе съ слабостью.

Platina — 3.

Судорожное цекотанье съ ощущеніемъ холода и чувствомъ онѣмбнія; напрягающее давленіе, сверленіе въ костяхъ; вечеромъ и во время покоя хуже. Слезивость. Тоска, сердцебіеніе. *У истерическихъ особъ.*

Pulsatilla — 2.

Ревматическая и нервная личная боль. У женщинъ, у страдающихъ дѣвичьей немочью. *Подериваніе* до глазъ и ушей, давленіе, колотье, стягиваніе; хуже отъ тепла, лучше отъ холода и пребыванія на чистомъ воздухѣ; притомъ *блѣдность лица, ознобъ, тошнота, сердцебіеніе.* Къ вечеру хуже.

Spigelia — 2.

Отличное средство при *нервной и ревматической личной боли.* *Мгновенное подериваніе и ломъ, жженіе, давленіе и напряженіе* въ скулахъ, во лбу, въ глазныхъ впадинахъ, съ глянцевитой опухолью пораженной стороны. Отъ прикосновенія, движенія (ѣды), лежанья на больной сторонѣ, сырой погоды боль

усиливается. Наступаетъ *періодически*, скоро проходить. Тоска, безпокойство.

Stannum — 3.

Давящая, щемящая, тянущая боль, въ одной сторонѣ, ночью. *Происхожденія нервного.* *Начинается* слезка, потомъ *постепенно усиливается, затѣмъ ослабываетъ* и исчезаетъ, при ходьбѣ.

Staphysagria — 3.

Съ пораженіемъ костей или ревматической болью лица. *Давленіе, біеніе въ зубахъ, скулахъ, или колотье, жгучая, тянущая боль, рѣзь, ломъ,* хуже отъ прикосновенія. Ощущеніе опухоли, холодныя руки, потъ на лицѣ, судороги.

Verbascum — 3.

Комѣстисная и нервная личная боль. *Мгновенное дерганье.* *Давленіе (урывками, одуряющее)* въ скулахъ, *жженіе, щемленіе, какъ бы щипцами,* и колотье въ височной кости, отзывающееся въ головѣ; отъ нажиманія, дерганія, сквознаго вѣтра хуже. Сопряжена съ головокруженіемъ и ощущеніемъ полноты въ головѣ при холодѣ въ остальномъ тѣлѣ.

Примѣчаніе. При упорствѣ этого недуга, я считаю не лишнимъ, на тотъ случай, что приведенныя средства не окажутъ дѣйствія, обратить вниманіе еще на другія средства, каковы, главнымъ образомъ, отъ *нервной* личной боли: **Argent. n.**, **Arsen.** (жгучая боль какъ отъ горячихъ угольевъ или иглокъ, колотье, хуже всего передъ полночью, сопряженное съ большимъ истощеніемъ и безпокойствомъ); **Actaea, Con.** (стрѣльба и ломъ), **Cupr.** (какъ бы удары), **Lachesis, Opium, Rhus, Stram.** (ломъ, подергиваніе головныхъ мускуловъ, искривленіе рта, общее судорожное состояніе), **Zinc.**; при *ревматической боли*: **Arn., Bryon., Rhus., Sil., Sulph., Thuj.** (щемящая боль, ломъ, подергиваніе мускуловъ, сверлящая боль въ суставахъ, въ верхней челюсти, только на открытомъ воздухѣ), **Ver.** (также въ видѣ мази изъ вратрина: $\frac{1}{2}$ грана на 1 драхму свиного сала), а также въ особенности **электричество** (рѣже при нервной личной боли); отъ *материальныхъ* причинъ: **Baryt. c.** (съ опухолью), **Calc. c.** (золотуха, дѣвичья немочь), **Ferr.** (малокровіе), **Fluor. acid.** (сифились, острая боль въ личныхъ *костяхъ*), **Hep. Sulph.** (ломъ, подергиваніе въ костяхъ), **Kali bichrom.** (сифились, колотье по направленію къ ушамъ). Беременнымъ и истерическимъ, причѣмъ бываетъ также мигрень, рекомендуемъ *Ser.*

Новѣйш. средства. Нервн. боли: **Cimicif.** (особенно при рефлексѣ отъ матки), **Cyprip.** (при нервной раздражительности), **Gelsem.** (боль конгестивнаго характера, сопряженная съ страданіемъ нервовъ движенія), **Phytol.** (давящая, колющая, потягивающая боль, усиливающаяся отъ движенія, периферическое давленіе). Противъ личной боли: **Gels.**, при невольномъ подергиваніи мускуловъ и нервности; **Cact. grand.**, хроническая форма, въ которой боль усиливается отъ напряженія, а уменьшается отъ покоя и вызывается виномъ, музыкой, свѣтомъ, голодомъ; **Cimic.**, при страданіяхъ ячичниковъ; **Iris**, боль въ головѣ, вискахъ, глазахъ, рвота слезью; **Phytol.**

Лѣкарства должны быть даваемы только въ среднихъ (большею частью высшихъ, чѣмъ означенныя при отдѣльныхъ средствахъ) дѣленіяхъ и въ рѣдкихъ приѣмахъ.

48. Нечувствительность, параличъ органовъ чувствъ,
analgesia, anaesthesia.

Эта болѣзнь можетъ имѣть начало въ мозгу и его нервахъ, какъ напр. при эпилепсiи, умопомѣшательствѣ, тифѣ и другаго рода горячкахъ, обморокѣ, и въ такомъ случаѣ она бываетъ обшая. Тогда лѣченiе ея совпадаетъ съ лѣченiемъ означенныхъ состоянiй (см. судороги, лихорадка, обморокъ и т. д.). Въ другомъ случаѣ она поражаетъ нервы чувствъ и вызываетъ слѣпоту, глухоту, потерю обонянiя (см. эти статьи). Если она поражаетъ нервы внутреннихъ частей, то она принадлежитъ къ области внутреннихъ болѣзней. Но она поражаетъ также мышечные нервы и нервы кожи, какъ напр. при сухоткѣ спиннаго мозга, при истерикѣ и т. п., и по большей части бываетъ тогда симптомомъ паралича органовъ движенiя (она очень часто предшествуетъ ему), а если и нѣтъ, то во всякомъ случаѣ къ ней относится все то, что сказано о происхожденiи и лѣченiи паралича. Поэтому см. ст. 45. Впрочемъ, часто теряется способность къ одному ощущенiю или нѣсколькимъ, между тѣмъ какъ способность къ другимъ въ тоже время сохраняется (напр. чувствительность къ давленiю не существуетъ, а ощущенiе температуры, чувство осязанiя, сохранились, и т. д.).

49. Обморокъ,

syncope.

Обморокомъ называется состоянiе безпамятства, соединеннаго съ большею или меньшею неподвижностью и нечувствительностью, причемъ дыханiе бываетъ затруднено, пульсъ и биенiе сердца слабы, кожа холодна. Онъ можетъ быть слѣдствiемъ или болѣзней мозга (большею частью малокровiя, при неправильномъ развитiи мозга, у страдающихъ эпилепсiею), или затрудненнаго кровообращенiя въ сердцѣ и легкихъ (болѣзни сердца, грудная жаба, вдыханiе газовъ, слишкомъ узкое платье), или недостатка крови (кровотеченiя, голодъ), или сильнаго нервнаго возбужденiя, какъ напр. отъ боли, параненiя, душевныхъ потрясенiй, утомленiя, иди-

осинеразіи *) [относительно запаховъ]; поэтому то имъ и страдают преимущественно женщины, какъ существа болѣе нервныя. Во время самаго припадка, если онъ не продолжителенъ, рѣдко бываетъ нужно что-либо другое, кромѣ внѣшнихъ возбуждательныхъ средствъ (холодные обливанія, нашатырный спиртъ) и удаленія причинъ (расшнурованіе платья, удаленіе вреднаго запаха, провѣтриваніе комнаты и т. д.). Только при частомъ повтореніи припадковъ или чрезмѣрной продолжительности ихъ ($\frac{1}{4}$ часа — уже долго) слѣдуетъ прибѣгнуть къ:

Coff., Opium, Ignat., послѣ душевныхъ потрясеній, какъ напр. радости (*Coff.*), страха, испуга (*Opium*), печали (*Ignat.*);

Mosch., при пораженіи мозга; **Phosph.**, при возбужденіи нервовъ, стѣсненіи дыханія, недугахъ сердца; **Veratr.**, при истощеніи съ охлажденіемъ кожи; при болѣе высокой степени развитія болѣзни: **Camph.**

Ipec. и **Verat.**, при обморокѣхъ отъ недуговъ желудка, когда притомъ голодь, тошнота, поносъ; *Ipec.*, особенно при отвращеніи къ крови, гною, ранамъ и тому подобныхъ идіосинкразіяхъ;

Acon. и **Veratr.**, послѣ сильныхъ болей; *Acon.*, при сильномъ волненіи крови, *Veratr.*, при холодномъ потѣ.

China, послѣ истощенія отъ потери соковъ (поносы, кровотеченіе, кормленіе грудью, нагноеніе, голодь);

Puls., при малокровіи, дѣвичьей немочи; въ болѣе высокой степени развитія недуга: **Ferr.**

Ignat., главное средство для истерическихъ особъ.

Впрочемъ, надо главнымъ образомъ обращать вниманіе на болѣе глубокія причины, лежащія въ основаніи недуга (какъ напр. болѣзни сердца и т. п.), если желаемъ достигнуть радикальнаго излѣченія, вслѣдствіе чего здѣсь можно принимать въ соображеніе еще многія другія лѣкарства.

*) Безотчетное отвращеніе, чувствуемое къ извѣстнымъ предметамъ, животнымъ и т. д., повидимому, безъ всякой причины; напр. къ наукамъ, къ кошкамъ и т. д.

ТРЕТЬЕ ОТДѢЛЕНІЕ.

БОЛѢЗНИ СЛИЗИСТЫХЪ ОБОЛОЧЕКЪ.

А. БОЛѢЗНИ ДЫХАТЕЛЬНОГО АППАРАТА.

а. Болѣзни носа.

50. Катарръ носа, насморкъ,

catarrhus nasalis, coryza.

Предполагая, что симптомы насморка всѣмъ извѣстны, я позволю себѣ здѣсь только замѣтить, что иногда онъ бываетъ съ лихорадкой, иногда безъ оной, что въ первомъ періодѣ онъ всегда текучій (острый), во второмъ мокротный, если только онъ не обнаруживается вообще въ видѣ сухаго насморка, и что если насморкъ часто возвращается или дѣлается постояннымъ, то необходимо предположить особенное состояніе соковъ, какъ напр. у людей страдающихъ золотухою или ломотою. Далѣе надобно остерегаться, чтобы не смѣшать съ насморкомъ сифилитическихъ явленій, которыя часто обнаруживаются сначала въ подобной же формѣ. Болѣе опасный видъ представляетъ такъ назыв. скарлатинный насморкъ, *coryza scarlatino a*, такъ какъ онъ служитъ признакомъ опаснаго, распространяющагося *дифтерита*, и такъ наз. іодовый насморкъ, отъ отравленія іодомъ.

Aconitum — 2.

*Насморкъ съ лихорадкой, приче-
мъ особенно ознобъ, потъ,
жарь, общее нездоровье, безо-
койство, бессонница, головная
боль, легкая перхота, щекотанье
въ горлѣ, кашель, охрипость,
сухость въ носу, отсутствие слизи.*

Belladonna — 2.

Съ приливомъ крови къ го-
ловѣ (пульсація, жарь), горячій
лобъ и виски, опухшій *изъяз-*
вленный носъ; боль и жарь вну-
три носа, зудъ, *колотье, су-*
хость, чувствительное или сла-
бое обоняніе. Находится въ
связи съ *воспаленіемъ гортани* и
затрудненнымъ глотаніемъ. Во-
дянистое истеченіе изъ носу.

Bryonia — 2.

Лихорадочный насморкъ съ
головною болью, особенно во лбу,
охрипость съ сухимъ кашлемъ
и затрудненнымъ дыханіемъ.
Одновременно или послѣ прек-
ращенія насморка: давленіе и
колотье въ груди (*страданія по-*
дреберной плевы). Хорошо послѣ
Асон.

Chamomilla — 2.

У дѣтей, послѣ подавленна-
го пота, или въ соединеніи съ
зубными бользнями. Съ нары-
вами въ носу, воспаленными и

растрескавшимися губами, сон-
ливостью, тяжелой головой. *Оз-*
нобъ и жажда; особенно когда
притомъ сильное (ночью) *безно-*
койство съ частымъ вскрикива-
ніемъ; *слизь остра, ѣдка;*
одна щека красна, друая блѣ-
на.

Euphrasia — 2.

Текущій насморкъ съ слезо-
теченіемъ и катарромъ глазъ.
Слизь жидка, бѣла; общее из-
неможеніе.

Mercurius — 2.

Лихорадка; частое чиханье;
водянистая слизь; опухшій, изъ-
язвленный носъ; *мокрота зло-*
воонна; одурѣніе головы; ознобъ,
потъ, особенно ночью, безъ об-
легченія; ни холодъ, ни тепло
не облегчаютъ. Притомъ воспа-
леніе гортани, сухой (воспалитель-
ный) кашель. (Подобнымъ же
образомъ дѣйствуетъ *Нер. sulph.*
3., но лучше въ хроническихъ
случаяхъ, или когда *Мерс.* не
помогаетъ, или уже слишкомъ
много употреблялся.)

Nux vomica — 2.

Сухой насморкъ, давящая го-
ловная боль во лбу; жарь въ
головѣ; давящія боли въ голо-
вѣ и лицѣ, особенно утромъ
(днемъ лучше); отсутствіе аппе-

тита. Также при *сухомъ насморкѣ у новорожденныхъ*.

Pulsatilla — 2.

Съ катарромъ желудка, отсутствіемъ аппетита и чувства обоняніе; во второмъ, слизистомъ періодѣ, именно когда *слизь у рта, желтого или зеленого цвѣта*; также при нарывахъ, кровотеченіи носомъ, свѣтобоязни. Характеристическимъ признакомъ для *Puls.* служитъ усиленіе недуга *вечеромъ* или въ теплѣ и облегченіе на *открытомъ возду-*

хѣ, ознобѣ, отсутствіе жажды, плаксивое настроеніе духа.

Silicea — 3.

Хроническій, особенно *золотушинный* или *ломотный* характеръ болѣзни, особенно когда притомъ своеобразная ломящая головная боль во лбу и глазахъ (сличи *Silic.* при головной боли). При *нарывахъ въ носу* съ размягченіемъ и *опухолью* слизистой оболочки носа, съ отдѣленіемъ твердыхъ, трубчатыхъ кровяныхъ массъ.

Примѣчаніе. Въ большинствѣ случаевъ цѣлесообразнѣе всего начать лѣченіе съ *Acon.* 2., въ приемахъ черезъ 2 — 3 часа, и этого обыкновенно бываетъ достаточно, если особенныя, приведенныя выше обстоятельства не потребуютъ *Bryon.*, *Merc.*, *Nux vom.*, *Puls.* и т. д. Само собою разумѣется, что надо обращать особенное вниманіе на сопровождающія болѣзни и на личныя особенности больныхъ. Такъ напр. для истерическихъ особъ, при особеннаго рода давящей боли въ головѣ (какъ будто отъ гвоздя), полезно **Ignat. 3.** — При *золотушиномъ* насморкѣ съ размягченіемъ слизистой оболочки главное средство — **Calc. carb. 3.**, въ рѣдкихъ приемахъ. Если оно не поможетъ послѣ продолжительнаго употребленія, то **Sulph. 3.** или **Jod. 3.**

Въ одномъ случаѣ сильнаго чиханія съ истеченіемъ слизи, нервной головной и ушной болью, быстро помогло, послѣ 10 лѣтняго лѣченія другими средствами, *Cyclam. europ.*

При насморкѣ съ *нарывами въ носу* главными средствами служить: въ острыхъ случаяхъ — **Merc.**, въ хроническихъ — **Aurum 3.** Подробности объ этомъ см. въ слѣдующей статьѣ.

При насморкѣ безъ лихорадки движеніе на открытомъ воздухѣ служитъ часто лучшимъ средствомъ.

Соляныя и морскія купанья, холодное обтираніе растворомъ морской соли, служатъ часто радикальнымъ средствомъ противъ хроническаго насморка.

51. Нарывы въ носу, *ulcus nasale*; вонючее истечение изъ носу, *ozena*, и опухоль носа.

Нарывъ иногда бываетъ сухой, а иногда выдѣляетъ острую и зловонную жидкость; это выдѣленіе находится въ связи или съ насморкомъ, и въ такомъ случаѣ бываетъ доброкачественно, или съ порчею соковъ, особенно съ золотухой, причемъ болѣзнь затягивается, или съ сифилисомъ, причемъ большею частью бываетъ костоѣда; нарывъ поражаетъ въ этомъ случаѣ особенно часто носовую перемычку и иногда даже пробѣдаетъ ее. Необходимо изслѣдованіе носа и выдѣленія, а также нѣба и зѣва, для того чтобы найти мѣсто, гдѣ нарывъ.

Если нарывъ доброкачественный, съ простымъ воспаленіемъ и опухолью, то помогаетъ **Merc. 3.** (утромъ и вечеромъ по приему на кончикѣ ложечка); если причиною раздутости носа — золотуха, то **Calc. c. 3.**; если причиною нарыва вѣшнее поврежденіе: **Arnica 2.** внутрь и *арниковая* тинктура пополамъ съ водою наружно. Если нарывъ находится въ связи съ подкожными сыпями, то я совѣтую — если онъ сухой — **Graph. 2.**, если мокнущій — **Hep. Sulph. 3.** и особенно **Sulph. 3.** (утромъ и вечеромъ), а въ болѣе серьезныхъ случаяхъ — **Kali bichrom. 3.**

Далѣе:

Alumen 3., при *нарывахъ* съ жесткими краями, изъ которыхъ легко сочится кровь, и которые постоянно разрастаются; зловонное истечение изъ носу и залеганіе его; кровотеченіе изъ носу, отсутствіе обонянія, лишаи. (Для наружнаго употребленія въ видѣ порошка изъ жженныхъ квасцовъ.)

Augum 3., при рожевидной *опухолѣ*, причемъ кожа на лицѣ лупится, образуются *шелуди и струнья*, особенно при *костоѣдѣ*; поэтому — истечение зловонной, густой, желто-зеленой, кровянистой жидкости.

Calc. carb. 3., при *толстой, мясистой опухолѣ*; особенно при *нарывахъ* у золотушныхъ, съ гнойнымъ истеченіемъ.

Jod. 3., или **Kalium jodatum**, отличное средство противъ золотушныхъ, сифилитическихъ и происходящихъ отъ костофды нарывовъ, когда они имѣють характеръ хроническій и истечение сукровично.

Phosphor. 3., красная, янцевитая опухоль, залеганіе носа отъ сухихъ струевъ и образовавшейся въ немъ коры.

Rhus 2., при золотушномъ, зловонномъ, желтомъ, кровянисто-слизистомъ истеченіи (съ паршей). Часто приготовляетъ больного къ излѣченію посредствомъ *Calc.*

Примѣч. Особенно надо остерегаться наружныхъ средствъ, мазей, свинцовой примочки и т. п., отъ которыхъ нарывъ только подсыхаетъ; необходимо содержать носъ въ чистотѣ, вырывать въ него теплую воду посредствомъ ушной спринцовки, разрѣшать струя втягиваніемъ теплыхъ водяныхъ паровъ или вкладываніемъ въ ноздри маленькихъ сверточковъ корші, пропитанной льнянымъ масломъ. Ванны и питательная діета также способствуютъ лѣченію.

Въ новѣйшее время стали также употреблять *Baptis.* (не только внутрь, но и наружно), *Hydrast.*, *Phytol.*, *Sanguin.*

52. Полипы въ носу, *polypus nasi.*

Эти наросты, которые сначала обнаруживаются засореніемъ носа, а при дальнѣйшемъ развитіи выходятъ и наружу, возникаютъ или въ носу, или въ полости лба, рѣдко въ челюстной пазухѣ, со стороны зѣва или клиновидной кости, гдѣ они могутъ сдѣлаться очень опасными вслѣдствіе сопряженныхъ съ ними припадковъ удушія, кровотечения и т. п. Они бываютъ или наростами на слизистой оболочкѣ (мягкія, губковидныя), или мясистыми наростами, т. е. развившимися изъ пучковъ сосудовъ и клетчатой ткани (шишковатыя, перовныя), или жесткими, жилистыми, раковидными продуктами. Они сидятъ или на стебелькахъ, или непосредственно широкимъ основаніемъ на внутренней поверхности носа. Полипы вызываютъ разныя ненормальности, какъ напр. раздраженіе слизистой оболочки носа, кровотечение изъ носу, потерю обонянія, гнусливый голосъ, дыханіе съ открытымъ ртомъ, глухоту, затрудненіе при глотаніи и жеваніи, слезотеченіе,

затрудненіе при дыханіи, припадки удушія, кашель, сильное сморканіе, чтобы пропустить воздухъ.

Calc. c., несомнѣнно главное средство, и **Teucrium** (болѣе для наружнаго употребленія: свѣжія листья растереть въ порошокъ и вдунуть въ носъ), помогаютъ при *губчатой* формѣ; послѣднее особенно въ томъ случаѣ, когда наростъ сѣровато-бѣлый; **Phosph.**, при губчато-мясистыхъ, легко испускающихъ кровь полипахъ; **Sulphur**, при красныхъ наростахъ величиною съ горошину. Хвалятъ также *Hep. sulph.*, **Kali bichrom.**, *Sep.*, *Sil.* и друг. Но если хочешь, чтобы средства эти принесли пользу, то необходимо ими пользоваться втеченіе долгаго времени, а иногда, въ заключеніе, еще нужна бываетъ хирургическая помощь, особенно когда полипъ затрудняетъ дыханіе. (См. также наросты и вырожденія.)

Кровотеченіе носомъ, см. кровотеченія вообще.

б. Болѣзни гортани, дыхательнаго горла и его развѣтвленій (бронхій), легкихъ и подреберной плевры.

(53 — 59.) Кашель.

Кашель бываетъ весьма тягостнымъ и въ то же время важнымъ симптомомъ другихъ болѣзней. Онъ сопровождается:

1) Простой катарръ разныхъ дыхательныхъ органовъ съ лихорадкой или безъ нея, который иногда имѣетъ быстрое теченіе, иногда же медленное (острые и хроническіе катарры);

2) Катарральную лихорадку, извѣстную подъ именемъ гриппа (главный симптомъ);

3) Органическія болѣзни гортани, дыхательнаго горла, вѣтвей дыхательнаго горла, легкихъ, особенно чахотку, расширеніе легкихъ и нѣкоторые болѣзни сердца;

4) Иногда онъ случается при извѣстныхъ судорожныхъ раздраженіяхъ голосовыхъ и дыхательныхъ нервовъ, или при общей нервности въ формѣ судорожнаго кашля, и въ особенномъ видѣ этого послѣдняго —

5) Какъ признакъ коклюша;

6) Какъ симптомъ воспаленія дыхательныхъ путей и подреберной плевы и выпота внутри этихъ органовъ;

7) Какъ признакъ перепончатой жабы, такъ назыв. крупа.

О хрипотѣ, которая находится въ близкомъ родствѣ съ кашлемъ, но которая появляется иногда и безъ него, мы будемъ говорить отдѣльно.

Слѣдующіе моменты особенно важны при гомеопатическомъ лѣченіи кашля:

1) Звукъ кашля; 2) сопряженное съ нимъ ощущеніе, боль; 3) мѣсто, откуда исходитъ кашель, и происхожденіе его, насколько это можетъ объяснить больной или звукъ и глубина самого кашля; 4) повтореніе, время наступленія припадковъ и промежутки между ними; 5) сухость кашля или мокрота и характеръ послѣдней; 6) ухудшеніе и улучшеніе вслѣдствіе нѣкоторыхъ обстоятельствъ, какъ напр. вслѣдствіе ѣды, питья, лежанья, движенія, покоя, свѣжаго воздуха, тепла или холода и т. п.; 7) сопровождающія явленія, какъ напр. лихорадка, боли въ другихъ частяхъ, усложненія.

Принимая во вниманіе всѣ эти частности, которыя для врачей другихъ школъ, по большей части, не имѣютъ никакого значенія, можно опредѣлить средства, подходящія къ отдѣльнымъ случаямъ.

53. Простой катарральный кашель; катарральная лихорадка; *catarrhus acutus* и *chronicus*; *febris catarrhalis*.

Подъ названіемъ катарра разумѣютъ поверхностное воспаленіе, припуханіе и отдѣленіе слизистой оболочки. Это отдѣленіе сначала (1 стадія) водянисто, потомъ слизисто или гнойно (2 стадія). Иногда однако катарръ бываетъ сухой, безъ отдѣленія мокроты — такъ наз. *catarrhe sec.* Катарральный кашель сопровождаетъ обыкновенно катарръ дыхательныхъ путей отъ гортани до легкихъ. Если онъ соединенъ съ лихорадкой, то образуетъ катарральную лихорадку. Эти катарры имѣютъ склонность затягиваться и образуютъ въ такомъ случаѣ хроническій катарръ, который можетъ представлять чисто мѣстное по-

раженіе. При высшей степени развитія катарръ называется также воспалительнымъ.

Противъ этой болѣзни употребляютъ:

Aconitum — 2.

Воспалительный и простой катарръ, особенно въ *начатъ*, когда *лихорадка*, жажда, безпокойство, жаръ въ головѣ. Кашель *коротокъ*, *хриплъ*, *сухъ*, съ постояннымъ задыханіемъ, *раздраженіемъ* и *болью* въ пораженной части. Боль при дыханіи.

Arnica — 2.

Катарръ съ лихорадкой или безъ нея, когда кашель *сухой* съ *щекотаньемъ*, *утренній*; съ трудно-отдѣляющеюся или *кровянистой мокротою*; кашель *приводитъ въ сотрясеніе* голову и грудь, съ *болью* въ *ляжкахъ* и *равматизмомъ*.

Arsenicum — 5.

Въ *хроническомъ катарръ*; рѣже при сильныхъ приступахъ *катарральной лихорадки*. Кашель *сухой*, *потрясающій*, *изнуряющій*, особенно *вечеромъ*, *ночью*; хуже отъ *питья*, *ѣды*, *лежанья*, *сыраго воздуха*, *сухаго холода*; или кашель съ затрудненнымъ отдѣленіемъ мокроты, вязкой слизью въ *горлѣ*; *извер-*

женіе *гноино*, *зеленовато*, *сѣро*, *зловонно*, *селено*, *горько*, *гнило*. Колотье, *щекотаніе*, *кряхтніе*, *стѣсненіе въ груди*, *одышка*, *утомленіе*, *истощеніе*.

Belladonna — 3.

Воспалительный, *лихорадочный* и *судорожно-нервный* характеръ. Кашель *сухъ*, *похожъ на лай*, *судорожный*, съ *щекотаньемъ въ дыхательномъ горлѣ*, *ночью*, *утомительный*; *больному кажется, будто онъ намотался нити*; отъ движенія возобновляется, съ ощущеніемъ будто *стягивается* горло и съ *опасностью задохнуться*; *изверженіе* *вязко*, *горловая боль*, *затрудненіе при глотаніи*, *приливъ крови къ голове*, *краснота лица и глазъ*, *колотье въ груди*. Холодное облегчаетъ. Особенно хорошо для особъ раздражительныхъ, для женщинъ и дѣтей.

Brom. — 3.

Употребляется въ формахъ болѣе легкихъ, нежели тѣ, въ которыхъ употребляется *Jod.*, (имѣющій дѣйствіе сходное съ его дѣйствіемъ), и занимаетъ мѣсто между *Spongia* и *Jodium*;

особенно при *воспалительныхъ* формахъ катарра *верхнихъ дыхательныхъ путей, гортани*; при мелкой сыпи въ зѣвѣ; кашель *сухой, похожей на жабный, съ продолжительнымъ, скребущимъ щекотаньемъ и хрипотою.* (При послѣднемъ симптомѣ помогаетъ особенно хорошо и скоро.)

Bryonia — 3.

Катарральный или воспалительный кашель, съ лихорадкою или безъ нея, острый и хроническій. Сухой кашель, идущій изъ глубины груди, съ тошнотою до рвоты, особенно послѣ ѣды; грудь какъ будто готова лопнуть; съ давленіемъ въ головѣ, разстройствомъ желудка, особенно же когда колотье въ груди при дыханіи, колотье въ головѣ при кашлѣ. (Полезенъ большею частью только послѣ *Acon., Bell., Merc.,* при переходѣ ко 2-ой стадіи съ отдѣленіемъ мокроты.)

Hepar sulphuris — 3.

Главнымъ образомъ въ *катаррахъ*, гдѣ уже отдѣляется мокрота, съ *мокротнымъ хрипомъ, съ сильною болью въ кадыкѣ и съ кашлемъ по вечерамъ; огрипlostь, отъ питья хуже.*

Jod. — 3.

При *воспалительныхъ и хроническихъ катаррахъ верхнихъ частей, когда кашель сухой, жабоподобный, съ щекотаніемъ и съ ощущеніемъ ссадинъ въ гортани; покашливаніе съ постояннымъ раздраженіемъ; кашель похожій на лай, утомительный, съ сѣрымъ (бѣлымъ), соленымъ, сладковатымъ изверженіемъ; пшящее и пишящее дыханіе, рѣзкій свистъ и хрипъ въ груди.* (Дѣйствуетъ подобно *Brom.* и *Spongia*, но сильнѣе, хотя и медленнѣе.)

Iresacuanha — 2.

Отличное средство въ *остромъ катаррѣ, при отсутствіи всякаго воспалительнаго раздраженія, когда притомъ: судорожный кашель съ мокротнымъ хрипомъ до тошноты, или судорожный удушливый кашель съ синевою лица и одеревянѣніемъ тѣла; щекотаніе и стягиваніе въ кадыкѣ; или сухой кашель съ тошнотою, особенно при стѣсненіи дыханія (удушливый кашель), съ незначительнымъ изверженіемъ мокроты, возбуждающей отвращеніе и чувство омерзения и похожей на яичный бѣлокъ. Съ болью въ животѣ, желудочными припадками, нѣтомъ.*

Mercurius — 3.

При *воспалительномъ катарѣ* во всѣхъ частяхъ дыхательныхъ путей, съ лихорадкою или безъ нея; въ *1-ой стадіи* не замѣнимъ другимъ средствомъ, когда *осиплость, жжженіе, ощущение ссадинъ* въ гаджкѣ и глѣбже, *охриплость*, или кашель *сухой, потрясающій, хриплый, утомляющій, беруцій начало мучо въ дыхательныхъ путяхъ, ночью и вечеромъ* хуже. Изверженіе вязко, гнило, водянисто. Изверженіе крови, колотье въ груди, головная боль, текучій насморкъ, поносъ, *потнїе*, особенно по ночамъ, не доставляющее облегченія.

Nux vomica — 3.

При *катаррахъ* съ лихорадкою или безъ нея, съ сильнымъ понужденіемъ къ кашлю. Кашель *сиплый, выходитъ изъ гортла* или глотки, причемъ щечотеть въ зѣвѣ и нѣбѣ и *скребетъ подъ верхней частью грудной кости*; сухой, утомительный кашель, съ труднымъ отдѣленіемъ вязкой слизи, *пробуждающій рано утромъ ото сна*, хуже отъ ѣды; или конвульсивный кашель со рвотою и кровотеченіемъ изо рта и носа. При *сухомъ насморкѣ, сухости рта*; ознобъ съ жаромъ и такая го-

ловная боль, что голова, кажется, готова лопнуть; запоръ, давящая боль въ обѣихъ сторонахъ живота. (Въ особенности когда поражены части зѣва и глотки.)

Pulsatilla — 2.

Въ *последней стадіи острого катарра* и въ *хроническомъ*, когда *сырой кашель* (сначала сухой, потомъ уже сырой), съ *обильнымъ отдѣленіемъ* соленой, горькой, *желтоватой, зеленоватой, бѣловатой мокроты*; со вздыманіемъ груди, тошнотою, рвотою, чувствомъ удушья, какъ будто отъ вдыханія *сѣрныхъ паровъ*, съ *мокротнымъ хрипомъ*; иногда съ изверженіемъ, подернутымъ кровяными жилками; *вечеромъ и ночью* кашель усиливается, потрясаетъ все тѣло, хуже отъ лежанья, ходьбы, разговора. Раздраженіе въ гортлѣ, щекотаніе въ дыхательномъ гортлѣ, подъ ложечкой. Порывистая боль въ рукахъ и животѣ, которые какъ будто разбиты отъ кашля. Съ насморкомъ, отсутствіемъ аппетита. Болѣзненный позывъ на мочу, стѣсненіе дыханія, сердцебіеніе, ознобъ внизъ по спинѣ, потъ. У больнаго чрезвычайно болѣзненный видъ, слезливость. — Также при разстройствѣ регуль, малокровіи.

Senega — 2.

Въ послѣдней стадіи катарра, лучше всего въ хроническомъ катаррѣ, когда *мокрота вязка, съ трудомъ отдѣляется, хрипъ* въ кадыкѣ и въ дыхательномъ горлѣ, свистъ въ груди, боль отъ сотрясенія при кашлѣ, *стѣсненіе въ груди*, затрудненіе при лежаніи на боку. Мокрота желта или прозрачна, весьма обильна. Особенно полезно пожилымъ людямъ и при медленномъ теченіи болѣзни. (Сильно разрѣшающее средство.)

Sepia — 3.

Въ *острыхъ случаяхъ*, при щекотаніи въ глоткѣ и въ дыхательномъ горлѣ, особенно вечеромъ и ночью; *сухой и судорожный кашель*, какъ будто *поднимающийся изъ желудка и нижней части живота*, причѣмъ отдѣляется мокрота, *хотя и съ трудомъ*, и бываетъ боль въ горлѣ, такъ что оно какъ будто въ ранахъ и надсажено; или противъ хроническаго катарра, когда ознобъ, ревматическіе припадки, мигрень, головн. боли, кашель съ обильнымъ отдѣленіемъ гнилой, бѣловатой, сѣрой, желтой, зеленой, гнойной мокроты, особенно утромъ, мокротный хрипъ ночью.

Spongia — 2.

Дѣйствуетъ легче и менѣе продолжительно, чѣмъ *Brom.* и *Jod.*, въ подобныхъ, но болѣе легкихъ случаяхъ *воспалительнаго* катарра, когда бываетъ *сильный, порывистый, сухой, похожий на лай* кашель, исходящій изъ кадыка, наступающій періодически, особенно ночью, и продолжающійся по цѣлымъ часамъ. Съ *охрипlostью*, жженіемъ въ горлѣ, *болью при прикосновеніи къ гортани*. (Особенно полезно дѣтямъ при ложномъ крупѣ.)

Sulphur — 3.

Главное средство въ *хроническомъ катаррѣ*, когда днемъ кашель *мокротный*, съ обильнымъ отдѣленіемъ густой, бѣловатой, желтоватой мокроты, а ночью *сухой*; или при кашлѣ *упорномъ, сухомъ*, потрясающемъ, съ щекотаніемъ, *охрипlostью*, *колотьемъ* въ груди, при накопленіи мокроты, хрипѣ, одышкѣ; ощущение давленія въ головѣ и груди. Запоръ, геморрой, ипохондрія; ревматическіе и ломотные припадки, сыпи, золотуха, бугорки. Отъ ѣды, лежанья, движенія на открытомъ воздухѣ и переменны погоды кашель усиливается.

Tartarus emeticus — 2.

Острый и хроническій кашаръ, съ кашлемъ и сильнымъ мокротнымъ хрипомъ, который принуждаетъ больного сидѣть и доводитъ до рвоты и удушья, притомъ стѣсненіе дыханія, осо-

бенно послѣ дня и ночью. Хрипъ слышенъ издали. При угрожающемъ параличѣ легкыхъ. (Очень хорошо дѣйствуетъ на младенцевъ при такъ называемомъ зубномъ кашлѣ и вообще если имѣются указанные симптомы.)

Если все сказанное выразить въ немногихъ словахъ, то (помимо ихъ употребленія въ другихъ случаяхъ) особенно хороши:

1) а) противъ остраго катарра съ лихорадкой: **Acon., Bell., Bryon., Merc.;**

б) противъ остраго катарра и въ особенности въ 1-ой стадіи: **Acon., Bellad., Brom., Bryon., Jod., Merc., Spong.;** противъ катарра въ верхнихъ частяхъ (въ гортани, дыхательномъ горлѣ) особенно хороши: *Bell., Brom., Jod., Spong.;* — въ нижнихъ частяхъ: *Bellad., Bryon., Merc.;* вообще никогда не мѣшаетъ преднослать нѣсколько приемовъ *Acon.;*

в) противъ остраго катарра не воспалительнаго характера или во 2-ой стадіи воспалительнаго (когда отдѣляется мокрота): **Hep. sulph., Ipec., Puls., Seneg., Tart. emet.;**

2) противъ хроническаго катарра: **Hep. sulph., Puls., Seneg., Sep., Sulph., Tart. emet.** — Здѣсь надо также обратить вниманіе на *Ammon. muriat.* (кашель съ обильнымъ отдѣленіемъ густой, бѣловатой мокроты, но звукъ при этомъ таковъ, какъ будто-бы мокроты было болѣе, чѣмъ сколько ея есть на самомъ дѣлѣ; у пожилыхъ людей).

3) дѣтямъ особенно полезны: **Acon., Bell., Ipecac., Merc., Spongia** (или *Bromium* и *Jodium*) и **Tart. emet.**

Здѣсь надо также помнить, что часто катарра принимаютъ такую форму, которая требуетъ употребленія средствъ, означенныхъ при судорожномъ и органическомъ кашлѣ, а потому

при опредѣленіи болѣзни необходимо принять во вниманіе статьи, трактующія объ этихъ видахъ кашля.

54. Гриппъ, influenza,
febris catarrhalis epidemica.

Такъ называется эпидемическая катарральная лихорадка, которая обнаруживается нервнымъ разслабленіемъ, особенно въ ногахъ, сильною головою болью, катарромъ носа, груди и желудка, утомительнымъ, преимущественно судорожнымъ кашлемъ, который исходитъ изъ болѣе глубокихъ развѣтленій дыхательнаго горла, тошнотою, рвотой, поносомъ, отсутствіемъ аппетита, лихорадкой, бессонницей, и которая, кромѣ того, вслѣдствіе медленнаго возстановленія здоровья, сопровождается потерей силъ, изнуреніемъ всего организма, а при дурномъ тѣлосложеніи можетъ имѣть опасныя послѣдствія, особенно относительно легкихъ.

При воспалительныхъ формахъ и въ первой стадіи кашля особенно полезны: **Acon.**, **Bellad.**, **Merc.**; при вышеозначенныхъ изнурительныхъ формахъ: **Arnica.**, **Bryon.**, **Brom.**, **Iod.** или **Spong.**, *Nux vom.*; въ судорожныхъ формахъ преимущественно: **Con.**, **Dros.**, **Hyosc.**, **Ipec.**, **Op.**, **Phosph.** (см. судорожный кашель); при мокротномъ кашлѣ и въ позднѣйшемъ періодѣ: **Puls.**, **Seneg.**, **Tart. emet.**; преимущественно въ хроническихъ случаяхъ: **Carb. veg.** (см. ниже органическій кашель), **Hep. sulph.**, **Sepia.**, **Sulph.** и др. Всѣмъ признакамъ болѣзни, вмѣстѣ взятымъ, и ея нервному характеру соотвѣтствуетъ: **Caust.** (особенно въ началѣ, при насморкѣ, кашлѣ, головной боли), позднѣе **Arsen.** и **Rhus.**

Относительно подробностей для выбора средствъ см. выше катарральныи кашель и нижеслѣдующія статьи.

55. Органическій кашель.

Подъ этимъ именемъ я разумѣю тѣ формы хроническаго катарра, въ основаніи которыхъ лежитъ болѣе серіозное измѣненіе тканей дыхательныхъ органовъ.

Если катарръ затягивается, соединяется съ недугами дыханія и пищеваренія, истощеніемъ, лихорадкою, то можно подозрѣвать образованіе бугорковъ въ легкихъ или осадокъ сырнаго вещества отъ воспаленія легкихъ, а это бываетъ причиною легочной чахотки. Последнюю вѣрнѣ всего можно узнать черезъ физическое изслѣдованіе груди (черезъ постукиваніе и выслушиваніе), по крайней мѣрѣ въ случаяхъ болѣе сильной инфильтраціи (переполненія) легкихъ.

Въ первыхъ, раннихъ степеняхъ своего развитія она еще излѣчивается, но въ позднѣйшихъ — съ трудомъ и чрезвычайно рѣдко. См. выше лѣченіе изнурительныхъ болѣзней.

Образованіе туберкулъ бываетъ по большей части слѣдствіемъ болѣзней, происходящихъ отъ недостатковъ тѣлосложенія и развивающихся, вѣроятно, на той же почвѣ, какъ золотуха; обыкновенно образуются мало по малу единичные, разбросанные узлы — то по одиночкѣ, то въ кучкахъ (большею частью на оконечности легкихъ), — которые заживаютъ, засыхая или превращаясь въ известь; или же они раздражаютъ ткань легкихъ, размягчаютъ её, переходятъ въ гной и образуютъ гнойныя пазухи, которыя однако иногда могутъ закрыться и опять зарости, вслѣдствіе чего больной выздоравливаетъ; или же ткань легкихъ мало по малу разрушается, и наступаетъ смерть. Это такъ назыв. хроническая милиарная туберкулоза, обыкновенное теченіе легочной чахотки. Не столь часто встрѣчаются виды острой милиарной туберкулозы, когда внезапно, при лихорадочныхъ симптомахъ, даже подъ видомъ *тифа*, образуются туберкулы въ разныхъ частяхъ тѣла (скоротечная чахотка). Среднее мѣсто между этими двумя видами, относительно количества случаевъ, занимаетъ превращеніе выпота послѣ воспаленія легкаго въ сырное вещество, которое нагноеніемъ ведетъ къ чахотки, или измѣненіе выпота въ туберкулы (инфильтрированныя туберкулы), причемъ теченіе болѣзни также довольно быстрое. Такого рода исходъ дѣлаетъ всякое воспаленіе легкаго опаснымъ. Но и въ этомъ случаѣ приходится большею частью предположить склонность организма къ болѣзни. (См. выше стат. 17.)

На кровохарганіе (хотя и не всегда изъ него развивается чахотка) должно обратить серіозное вниманіе, такъ какъ нако-

пляющаяся кровь легко может привести легкія въ хронически-воспалительное состояніе, которое очень часто приводитъ въ концѣ концовъ къ чахоткѣ.

Если есть охриплость, сухой, причиняющій боль кашель, сильная боль въ гортани и дыхательномъ горлѣ, гноевидное изверженіе, истощеніе, лихорадка, то это указываетъ на нагноеніе въ дыхательномъ горлѣ и гортани, которое, при участіи легкіхъ, можетъ повести къ горловой и гортанной чахоткамъ, если больной расположенъ къ бугоркамъ. Эти болѣзни еще труднѣе лѣчить, чѣмъ простую легочную чахотку.

Вырожденія въ гортани, дыхательномъ горлѣ, бронхіяхъ и легкіхъ, какъ напр. нарывы, полипы, ракъ, окостенѣлость, суженія и, наконецъ, болѣзни подреберной плевы, могутъ вызвать хроническій кашель, который трудно излѣчить.

Менѣе опасенъ такой хроническій катарръ, который соединенъ съ расширеніемъ болѣе глубокихъ развѣтвленій дыхательнаго горла и легочныхъ кѣлочекъ (такъ называем. эмфиземъ) и который встрѣчается чаще у пожилыхъ людей. Но иногда и эта болѣзнь ведетъ къ истощенію и порождаетъ такъ называемую слизистую чахотку.

При нѣкоторыхъ болѣзняхъ сердца производимое его биеніемъ раздраженіе легкіхъ, выражающееся въ видѣ кашля, можетъ получить опасный характеръ. Отъ значенія самой болѣзни сердца зависить вопросъ о томъ, насколько опасенъ кашель, происходящій отъ раздраженія легкіхъ вслѣдствіе болѣзненного сердцебиенія.

При лѣченіи кашля, смотря по свойству его, можно употреблять также, въ видѣ промежуточныхъ средствъ, лѣкарства, означенныя при катарральномъ и судорожномъ кашлѣ. При надлежащемъ терпѣніи наиболѣе пользы принесутъ слѣдующія лѣкарства:

Calcareæ carbonica — 3.

Сухой, сильный кашель съ шекотаньемъ какъ бы отъ пы-

ли, съ частою и упорною *охриплостью*; особенно утромъ, вечеромъ, ночью; изверженіе *пустой*, желтой, зловонной, *мой-*

ной, сладковатой или *кисловатой* мокроты; отъ ѣды хуже. Притомъ колотье въ головѣ и груди, стѣсненіе дыханія, какъ будто легкія не могутъ расширяться, поносы, потъ; истощеніе, печальное настроеніе духа.

Carbo vegetabilis — 3.

Судорожный кашель съ *охрипlostью*; *орубнїе* голоса; является въ видѣ припадковъ; хуже отъ разговора, холодной погоды; или изверженіе зеленоватой, *шоймой*, *зловонной*, вязкой слизи, особенно утромъ и вечеромъ, съ чувствительностью и жженіемъ въ гортани, ревматизмомъ, давящей болью въ головѣ. — (*Эмфиземъ.*)

China — 2.

Сухой, *судорожный*, какъ будто отъ сѣрныхъ паровъ, удушливый, *ночной* кашель; или гнойная, водянистая, *вязкая*, съ трудомъ *отдѣляющаяся* мокрота съ охрипlostью; хуже отъ ѣды, питья, разговора, смѣха, глубокаго дыханія.

Ferrum — 2.

Кашель съ *прозрачной*, вязкой мокротой или *кровянистымъ*, *гноевиднымъ*, *гнилостнымъ* изверженіемъ. Съ стѣсненіемъ въ

груди. Послѣ потери соковъ, въ послѣднихъ стадіяхъ.

Kali carbonicum — 3.

Главное средство при *изнуряющемъ*, *ночномъ* кашлѣ, съ щекотаньемъ, доводящимъ до рвоты; *обильное изверженіе мочы* (утромъ и еще болѣе вечеромъ), съ болью въ гортани, колотьемъ въ груди, свистомъ и *удушьемъ*, пробуждающимъ ото сна.

Phosphori acidum — 2.

Кашель и *щекотаніе* въ горлѣ; скребеніе въ гортани или надъ „ложечкой“, вечеромъ сухой кашель, утромъ съ отдѣленіемъ *желтовато-бѣлой*, гноевидной мокроты травянаго вкуса и запаха; рвота послѣ ѣды, головная и грудная боль, расположеніе къ потѣнію и *поносамъ*.

Stannum — 3.

Преимущественно при *мокрономъ* кашлѣ, съ *обильнымъ отдѣленіемъ соленой* или *сладковатой*, *желтоватой* или *зеленоватой мокроты*, съ осипlostью и охрипlostью, причемъ часто бываетъ и сухой, потрясающій кашель съ тошнотой, рвотой. Больной чувствуетъ какъ бы разбитость подъ ложечкой. Боль какъ будто отъ ранъ и чувств

слабости въ груди; стѣсненіе въ | ложеіе духа. (Въ слизистой ча-
груді, истощеніе; дурное распо- | хоткѣ.)

Кромѣ того, изъ означенныхъ выше (стат. 53) средствъ особенно хороши при органическихъ болѣзняхъ: **Brom., Spong.** и **Jod.**, для сухаго, свистящаго кашля, преимущественно въ верхнихъ частяхъ дыхательныхъ органовъ (см. характеристику въ ст. 53); **Sep.** (при сухомъ кашлѣ), **Seneg.** (когда трудно отдѣляется мокрота), **Kali bichrom.** (хроническій щекотный кашель), **Нер. sulph., Puls., Sulph.** (при обильной мокротѣ); **Tart. em.** (хрипѣніе, угрожающій параличъ легкихъ). — Противъ болѣзни, взятой во всей ея общности, особенно при ночномъ кашлѣ, истощеніи, чрезвычайно помогаетъ **Ars.** — **Bryon., Merc.**, помогаютъ какъ промежуточные средства.

Облегчающими (палліативными) средствами служатъ изъ числа означенныхъ при *судорожномъ кашлѣ* (стат. 56): **Con., Dros., Hyosc., Ipec., Phosph., Ver.**

Кромѣ того можно посоветовать — при горловой чахоткѣ: **Mezer. 3.** (при потерѣ голоса, позывѣ ко рвотѣ), при легочной чахоткѣ: **Natr. carb. 3.** (соленая, зловонная мокрота), **Nitr. ac. 3.** (въ позднѣйшихъ стадіяхъ, при кашлѣ, похожемъ на лай, со рвотой), но особенно **Kreosot. 5.** (когда уже образовались гнойныя язвы; кашель со свистомъ, густая, желтоватая мокрота). — Также **Lycop., Petrol., Silic., Staphys.**, весьма могутъ быть полезны при развившейся уже легочной чахоткѣ.

При катаррѣ отъ расширенія легкихъ (эмфиземъ) заслуживаютъ особенно вниманія: **Ars., Carb. veg., Phosph., Tart. em.** и **Drosera.**

Пріемы лѣкарствъ должны быть умѣренны и рѣдки (часто только черезъ 3—4 часа).

56. Судорожный кашель, *catarrhus spasmodicus.*

Такъ называется кашель нервный, короткій, порывистый или свистящій (большой глубоко втягиваетъ воздухъ), щекочущій, чаще всего сухой, съ склонностью къ судорогамъ, который возникаетъ

или самостоятельно, какъ напр. при истерикѣ, недугахъ спиннаго мозга, или вслѣдствіе катарра, гриппа, органическихъ недуговъ дыханія и сердца, у нервныхъ особъ, а также при особенныхъ, не всегда понятныхъ условіяхъ, вслѣдствіе своеобразнаго состоянія голосовыхъ и дыхательныхъ нервовъ. Самыми дѣйствительными средствами противъ него служатъ:

Chamomilla — 2.

Сухой кашель съ постояннымъ *щекотаніемъ* въ гортани или въ груди, стѣсненіе дыханія, глотка какъ будто затянута, хуже отъ разговора, досады, слезъ, *ночью*; мокрота водяниста, или ея мало, или она горька. Съ охрипlostью, насморкомъ, дурнымъ расположеніемъ духа, вечерней лихорадкой, *сильнымъ безпокойствомъ*. Особенно хорошо для женщинъ и дѣтей. (При т. н. зубномъ кашлѣ.)

Conium — 3.

Періодическій, особ. *ночной* кашель, со рвотой, нѣбнистою слизью, съ гнойнымъ ядромъ и отдѣленіемъ крови. Кашель возбуждается отъ зуда, перхоты, *щекотанія въ горлѣ* или подъ верхней грудной костью, съ стѣсненіемъ дыханія, отъ лежанья хуже, съ тошнотой. При кашлѣ колотье въ боку, боль въ животѣ, бессонница. Дѣйствуетъ особенно хорошо, когда кашель *вызванъ разговоромъ, смѣхомъ*.

(При чахоткахъ, особенно легочной; при *гриппѣ*.)

Drosera — 2.

Кашель сухой, *со свистомъ, порывистый*. Раздражается продолжительными *припадками*, послѣ чего наступаютъ довольно продолжительныя промежутки, втеченіе которыхъ больной слегка покашливаетъ. Раздраженіе, вызывающее кашель, ощущается *въ глубинѣ груди, или въ серединѣ ея*, или въ горлѣ въ формѣ щекотанія; больной во время припадка усиленно втягиваетъ въ себя воздухъ; кашель, заставъ больного въ лежачемъ положеніи, *принуждаетъ его встать*. Безпрестанно повторяется порывистый кашель, съ глубокимъ вдыханіемъ, продолжается отъ минуты до 1 часу, до тѣхъ поръ, пока не наступитъ рвота или не начнетъ отдѣляться мокрота, причемъ стѣсненіе въ груди, *одышка, тоска, потъ*. Кашель *звучитъ какъ мокротный*, а между тѣмъ мокрота не отдѣляется. Отъ куренія табаку, нѣнія,

разговора, хуже. Отъ сотрясенія при кашлѣ — боль мускуловъ живота и груди. (Во 2 стадіи *коклюша*, см. ниже, съ кровотеченіемъ изо рта и носа, сишевою лица; при *катарральной михорадкѣ*; также при *хроническомъ катаррѣ* у старыхъ людей, при эмфиземѣ. При *чахоткахъ* — какъ промежуточное средство противъ указанныхъ здѣсь симптомовъ).

Hyoscyamus — 3.

Весьма важное средство при *сухомъ кашлѣ*, особенно *ночномъ*, или возникающемъ отъ лежащаго положенія; въ сидячемъ положеніи легче; кашель потрясающій, удушливый, съ *щекотаньемъ въ дыхательномъ горлѣ*, въ видѣ припадковъ. (При *судорогахъ* въ кадыкѣ и дыхательномъ горлѣ. Въ *хроническихъ катаррахъ*, остающихся послѣ гриппа).

Phosphor. — 3.

Постоянный, продолжительный, *сухой* кашель, съ *щекотаніемъ*, осплостью и *охрипlostью*, *доходящей до потери голоса*, бо-

льзменная чувствительность гортани, съ *колотьемъ въ ней*, въ *груди боль будто отъ ранъ*; изверженіе *клейкой, кровянистой, мойной, соленой или сладковатой, гнилой, кислой мокроты*. Разговоръ, смѣхъ, ѣда, движеніе, вызываютъ кашель. Послѣдній раздражается въ короткихъ, порывистыхъ припадкахъ и не продолжается непрерывно, какъ при *Dros. Одышка, приливъ крови къ головѣ и груди*, меланхолия, доходящая до отчаянія. (При *острыхъ и хроническихъ катаррахъ, гриппѣ, чахоткахъ*, особенно воспалительной и скоротечной.)

Veratrum — 3.

Глухой и глубокой кашель, выходящій какъ бы изъ глубины груди или нижней части живота, съ продолжительными *порывами*, вязкой слизью, отрыжкой, возбуждающей рвоту, чувствомъ разбитости въ груди, *стѣсненіемъ въ груди*, тоскою, чрезвычайной слабостью, ознобомъ, блѣдностью лица. — (При *судорогахъ, гриппѣ, коклюшѣ*; см. ниже.)

Примѣч. При судорожномъ кашлѣ полезны также: **Bellad.**, **Chin.**, **Ирес.**, **Nux vom.** Удачно выбранное средство изъ числа указанныхъ произвести надлежащее дѣйствіе. При постоянномъ покашливаніи, перхотѣ и густой мокротѣ полезно также **Ambra 3.**;

въ хроническихъ болѣзняхъ, особенно при легочной чахоткѣ, когда бываетъ постоянное раздраженіе съ щекотаньемъ, перхота и стѣсненіе дыханія: **Lauroc. 2.**; при ощущеніи, какъ будто въ горлѣ находится пухъ или паръ: **Ignat. 3.**; при постоянномъ, не ослабѣвающимъ, ночномъ щекотномъ кашлѣ: **Orium 2.**; а при стѣсненномъ дыханіи, со свистомъ, крикомъ, и при удушливомъ кашлѣ: **Samb. 2.** При глухомъ, сухомъ, сишломъ, порывистомъ, удушливомъ кашлѣ: **Lactuca vir. 3.**

Особенно рекомендуемъ **Brom.** или **Kali bichrom.** противъ продолжительнаго *щекотнаго* кашля, исходящаго особенно изъ верхнихъ частей, отъ маленькихъ желѣзкозъ у задней стѣнки глотки.

Здѣсь часто нужно давать *пріемы* быстро одинъ за другимъ (иногда каждый часъ) и въ не слишкомъ слабыхъ дозахъ, такъ какъ эта форма очень тягостна и истощаетъ силы.

57. Коклюшъ, *tussis convulsiva.*

Это особенный родъ судорожнаго кашля, который часто является эпидемически и чаще поражаетъ дѣтей, нежели взрослыхъ. Кашель этотъ обнаруживается періодическими приступами, которые иногда продолжаются по цѣлымъ часамъ. Вся болѣзнь, которая продолжается не менѣе 4 недѣль, большею же частью дольше, иногда даже цѣлые мѣсяцы, ясно обнаруживаетъ въ своемъ ходѣ 3 періода. Въ первомъ періодѣ кашель имѣетъ форму простаго, но сильнаго катарра, а потому этотъ періодъ называется катарральнымъ; при этомъ бываетъ чиханіе, насморкъ, сухой кашель, особенно по ночамъ, а также лихорадка. Второй состоитъ изъ приступовъ судорожнаго кашля, вызываемыхъ ѣдой, питьемъ, душевнымъ волненіемъ, движеніемъ, или же возникающихъ безо всякаго повода, причемъ имъ иногда предшествуетъ какое-то болѣзненное предчувствіе. Дѣти становятся беспокойны, начинаютъ плакать, малытки боязливо хватаются за большихъ, и тогда начинается особеннаго рода удушливое вдыханіе и втягиваніе воздуха, который какъ будто проходитъ сквозь трубу, причемъ быстро издаются короткіе звуки кашля, похожіе на лай, вздохи и свистъ; этотъ кашель непрерывно во-

зобновляется до тѣхъ поръ, пока ребенокъ не извергнетъ мокроты или его не вырветъ, иногда даже кровью. Часто мокрота только слышится въ кашлѣ, или же дѣти проглатываютъ ее. При сильныхъ приступахъ дѣти задыхаются, краснѣютъ или синѣютъ, впадаютъ въ судороги, изъ глазъ, рта и носа выступаетъ кровь, невольно испускаются моча и испражненія. Такого рода припадки повторяются, черезъ большіе или меньшіе промежутки, отъ 12—60 разъ въ теченіе 24 часовъ и продолжаются отъ $\frac{1}{2}$ до 3-хъ минутъ. Послѣ этого періода, продолжающагося до 4 недѣль, наступаетъ снова слизистый, катарральный періодъ, который, какъ заключительный, называется критическимъ.

Но еще долго, во время выздоравливанія, повторяются отъ времени до времени сильныя припадки, которые напоминаютъ болѣзнь въ полной ея силѣ. Опасныя усложненія являются въ видѣ воспаленія бронхій или легкихъ, кровотеченія изъ легкихъ или другихъ частей тѣла, порванія барабанной перепонки, сопливости, судорогъ, выпаденія прямой кишки. Какъ особенно характеристичное явленіе въ послѣднее время нашли нарывы на подъязычной уздечкѣ, которые, быть можетъ, происходятъ отъ поврежденія зубами во время припадковъ. Въ видѣ послѣдствій развиваются, иногда на всегда, разстройства органовъ дыханія и кровообращенія, въ особенности эмфизема легкихъ, разширеніе сердца, бугорчатки, водянки. Сверхъ того, сильное потрясеніе во время припадковъ причиняетъ иногда грыжу.

Лѣченіе должно сообразоваться съ этими періодами. Но опытъ доказалъ, что различныя эпидеміи требуютъ и различныхъ средствъ, что лѣкарства оказавшія услуги въ одномъ случаѣ эпидеміи въ другомъ случаѣ не помогаютъ.

Въ первомъ періодѣ, который имѣетъ воспалительный характеръ, лучшимъ средствомъ служатъ **Bellad. 3.**, которое полезно также въ періодъ судорожныхъ припадковъ, когда послѣдніе сопровождаются *примвомъ крови къ головъ* (сравнить: катар. кашель, *Bell.*).

Во 2 періодѣ можно посоветовать **Грес. 3.**, при *рвотѣ* и тѣхъ симптомахъ, которые обозначены при этомъ лѣкарствѣ въ статьѣ 53; при сильныхъ приступахъ *рвоты* съ спазмами, сопровождаемыми припадками удушья, съ холоднымъ потомъ на лбу и на

оконечностяхъ, а послѣ припадка состояніе разслабленности, — **Verat. 3.** (см. судор. кашель.) При ночныхъ приступахъ можно надѣяться на **Con. 3.** (см. судорожн. кашель.)

Но главные средства здѣсь —

прежде всего **Drosera. 2.**, при симптомахъ, описанныхъ выше при судорожномъ кашлѣ;

потомъ **Cuprum 3.**, при внезапныхъ приступахъ съ прерываніемъ дыханія, коченѣніемъ, конвульсіями, мокротнымъ, слизистымъ хрипомъ, тоскою, удушьемъ, рвотою; причемъ непрерывный кашель съ сморканіемъ кровью, истечение кровянистой слизи изъ носа и рта, синее лицо и губы;

менѣе вѣрно, однако рекомендуется многими **Cina. 3.**, когда сухой кашель, незначительное изверженіе мокроты, судорожное раздраженіе въ гортани, малокровіе, клохтаніе отъ горла къ нижней части живота, затрудненное дыханіе, коченѣніе, конвульсіи, нестерпимый голодь, рвота слизью, золотушные и глистные припадки.

Примѣчаніе. Для случаевъ очень упорныхъ и истощающихъ силы больного можно рекомендовать **Arsenic.** и **Carb. veg.** Пребываніе на чистомъ воздухѣ сокращаетъ и облегчаетъ болѣзнь. Если дѣти извергаютъ всю пищу рвотою, то я имъ часто даю чайную ложку венгерскаго вина или малаги.

Въ послѣднемъ, критическомъ періодѣ должно употреблять, сообразуясь съ указаніями статьи 53, **Hep. sulph.**, а также **Puls.** Но надо остерегаться преждевременнаго обращенія къ этимъ средствамъ.

При преобладаніи *стѣсненія дыханія*, съ удушливымъ кашлемъ, полезно **Samb. 3.** (См. выше судорожн. кашель, прим.)

Не слѣдуетъ упускать изъ виду возможность усложненія болѣзни воспаленіемъ легкихъ, которое часто незамѣтнымъ образомъ сопровождается коклюшъ, а потому необходимо посоветоваться съ докторомъ, какъ скоро покажется лихорадка, затрудненное дыханіе и постоянный кашель.

Пріемы должны быть не слишкомъ слабы, но и не слишкомъ часты. Достаточно большею частью пріемовъ черезъ 4—5 часовъ въ этой весьма продолжительной болѣзни, которую, правда, нельзя прервать, но можно сократить. Если болѣзнь ограничитъ

ся 3—4 недѣлями, то лѣченіе надо уже считать особенно счастливымъ.

58. Воспаленіе гортани, *laryngitis*, дыхательнаго горла, *tracheitis*, и его развѣтвленій (бронхій), *bronchitis*.

Высшая степень катарра гортани и дыхательнаго горла есть воспаленіе, которое обнаруживается краснотою зѣва, постоянными жгучими, давящими болями въ гортани и дыхательномъ горлѣ (эти боли увеличиваются отъ внѣшняго давленія, разговора, крика, кашля, возбужденія), изверженіемъ мокроты, подернутой кровяными жилками, густой, даже гнойной, охрипlostью до утраты голоса, чувствомъ суженія и стѣсненія въ горлѣ, свистомъ, шумомъ при дыханіи, затрудненнымъ глотаніемъ пищи и питья, сухостію горла, жаждой, горячей кожей, полнымъ пульсомъ, горячею мочей и лихорадкой. Кашель часто имѣетъ звукъ крупа.

Воспаленіе бронхій есть усиленіе груднаго катарра, и вслѣдствіе своего близкаго родства съ воспаленіемъ легкихъ, отъ котораго его отличить только весьма опытный врачъ, оно очень опасно. Кашель сухъ и причиняетъ боль, мокрота вязка, похожа на стекло или яичный бѣлокъ, подернута кровью, вслѣдствіи же гнойна, смѣшана съ плѣнками, клочками. Въ среднѣй груди (подъ грудною костью) стоитъ сильная, простирающаяся до боковъ и спины, боль. Лихорадка сильна и упорна, дыханіе стѣснено, больной вдыхаетъ отъ 50—70 разъ въ минуту, доходитъ до припадковъ удушья и синевы лица. Это воспаленіе бронхій бываетъ особенно часто у дѣтей въ видѣ такъ наз. капиллярнаго бронхита, т. е. воспаленія самыхъ тонкихъ изъ дыхательныхъ трубочекъ, и тѣмъ опаснѣе для нихъ, чѣмъ они моложе. Отличить его отъ обыкновеннаго катарра не легко, а потому, вслучаѣ лихорадки, надо всегда имѣть въ виду бронхитъ, въ особенности когда дыханіе отрывистое, ускоренное, и когда носовыя крылья усиленно двигаются вслѣдствіе задержанія дыханія.

Лучшія средства при воспаленіи гортани и дыхательнаго горла — **Асон.** (въ началѣ), **Bell., Merc.;** при воспаленіи бронхій

(особенно у маленькихъ дѣтей) также **Bryon.**, **Phosph.** и **Tart. emet.**; при воспаленіи гортани и дыхательнаго горла: **Brom.** и **Jod.**, когда характеръ кашля требуетъ этихъ средствъ; въ болѣе легкихъ случаяхъ: **Spong.**; при кашлѣ съ мокротою особенно хорошо: **Her. sulph.** Болѣе точныя указанія относительно выбора средствъ см. въ стат. 53, катар. кашель.

Примѣчаніе. *Пріемы* сообразуются съ обстоятельствами (чаще 3—2 разжиженіе), и необходимо частое повтореніе ихъ (черезъ 3—2 часа).

59. Крупъ,
angina membranacea.

Если бы противъ этого недуга, особенно свойственнаго дѣтскому возрасту, съ самаго начала прибѣгли къ помощи гомеопатіи, то онъ не распространялъ бы своимъ появленіемъ такого паническаго страха. Наши средства, употребленныя во время, дѣйствительнѣе всякихъ другихъ и даже лучше знаменитаго разсѣченія горла, этого новаго изобрѣтенія старой школы. Если его сдѣлать слишкомъ рано, то это будетъ жестоко и опаснѣе другихъ средствъ, если же слишкомъ поздно, то это будетъ только лишнее мученіе. Кому разъ доведется услышать звукъ крупознаго кашля, тотъ не забудетъ этого звука во всю жизнь. Золотушныя, но хорошо выкормленныя дѣти чаще всего страдаютъ этою болѣзнию, блондины чаще брюнетовъ, мальчики чаще дѣвочекъ. Припадки часто вызываются сѣвернымъ вѣтромъ. Большею частью послѣ непродолжительныхъ катарральныхъ припадковъ, но часто также внезапно (и въ такомъ случаѣ обыкновенно ночью), раздается этотъ хриплый, короткій, дикій, похожій на лай собаки, на крикъ иѣтуха, кашель, который имѣетъ ту особенность, что за первымъ звукомъ не слѣдуетъ второй, такъ наз. дополнительный. Ребенокъ просыпается съ чувствомъ удушья. Носъ сохнетъ, кожа горитъ, наступаетъ лихорадка, голосъ становится глухимъ, слабымъ, наконецъ совершенно пропадаетъ; въ гортани боль, особенно при нажиманіи. Дыханіе во время сна стѣснено; при вдыханіи кажется, будто звукъ проходитъ сквозь трубочку, и кадыкъ двигается вверхъ и внизъ. Если не удастся втеченіе этого времени

устранить воспаленіе гортани и дыхательнаго горла, которое иногда спускается до легкихъ, то часто уже черезъ нѣсколько часовъ наступаетъ выпотѣніе толстыхъ, трубчатыхъ пленокъ, которыя прилипаютъ ко внутреннимъ стѣнкамъ вышесказанныхъ органовъ и вслѣдствіе этого вызываютъ стѣсненіе дыханія, свистящій, шипящій, хриплый кашель, напоминающій звукъ при пиленіи, возвращающійся періодически и возбуждаемый преимущественно разговоромъ и питьемъ. Лицо опухаетъ, синѣетъ, ноздри раздуваются, ребенокъ съ трудомъ дышетъ, на границѣ между грудью и животомъ образуется впадина, ребенокъ всячески старается втянуть въ себя воздухъ, вскакиваетъ въ постели, хватается за окружающіе предметы, закидываетъ голову и вытягиваетъ шею, но въ то же время онъ становится все слабѣе и слабѣе. Въ счастливыхъ случаяхъ за этимъ состояніемъ слѣдуетъ разрѣшающее изверженіе, сначала слизи, потомъ трубчатыхъ пленокъ, а вслѣдствіе этого облегченіе дыханія и всего состоянія, иногда въ сопровожденіи мочеваго или потнаго кризиса, послѣ чего нерѣдко въ нѣсколько часовъ восстанавливается здоровье или совершенно, или съ остаткомъ катарра. Въ случаяхъ же неблагоприятныхъ стѣсненіе дыханія, удушье, доводятъ до ужасной тоски, прерываемой снѣжкой и моментальнымъ безпамятствомъ, и наступаетъ смерть при судорогахъ и подергиваніяхъ вслѣдствіе отравленія угольной кислотой, нерѣдко даже въ нѣсколько часовъ. Иногда также верхніе дыхательные пути очищаются, но остается замѣтное только для слуха опытнаго врача воспаленіе легкихъ, которое требуетъ опять особеннаго лѣченія.

Болезнь продолжается 36—48 часовъ, а иногда образуются усложненія, такъ что болѣзнь затягивается на 6—8—14 и 21 день. Продолжительнѣе всѣхъ — такъ наз. восходящій крупъ, который развивается изъ крупознаго бронхита иногда по истеченіи 12—18 дней.

Кромѣ настоящаго крупа съ образованіемъ трубочекъ, есть еще дифтеритный, который обнаруживается выпотѣніемъ дифтеритныхъ массъ съ образованіемъ нарывовъ (самый опасный видъ), и гнойный крупъ, при которомъ вмѣсто пленокъ образуется гной.

Болезнь имѣетъ большую склонность повторяться у одного и того же лица и въ той же семьѣ.

Главные средства :

Aconitum — 2.

Полезно только въ *начатъ*, т. е. въ первые часы болѣзни, для излѣченія лихорадки, или при болѣе легкой степени болѣзни, въ періодъ катарральный, особенно при слѣдующихъ симптомахъ: безпокойство, жаръ, жажда, *лихорадочное возбужденіе*, полный пульсъ; голосъ хриплый; глотка болить отъ прикосновенія. — (Давать надо часто, даже каждые полчаса по 3 капли. Лучше всего попеременно съ *Jod.*, *Brom* или *Spongia*, черезъ 1—1½ часа. Одного *Acon.* недостаточно противъ настоящаго крупа.)

Brom. или **Jod.** — 2.

Главная средства. Мѣшаютъ дальнѣйшему развитію болѣзни, а также, когда *уже образовались трубчатая пленки*, кашель *сухой, свистящій, сильный*, съ стѣсненіемъ дыханія и опасностью задохнуться; тоскливые стоны, боль въ глоткѣ. (Черезъ ½—1 часъ по нѣскольку капель. Болѣе точныя опредѣленія см. въ примѣч.)

Hepar sulphuris — 2.

Подъ конецъ, когда кашель становится сырымъ и насту-

паетъ *слизистый хрипъ*; или противъ остающихся катарральныхъ симптомовъ, охриплости. Особенно характеристиченъ хрипъ при дыханіи, кашель, *напоминающій звукъ пиль.* (Черезъ 2—3 часа по приему на кончикъ ножа.)

Phosphor. — 2.

Только для оживленія, для отвращенія *опасности задохнуться* или угрожающаго паралича легкихъ. Служить промежуточнымъ средствомъ при спломъ кашлѣ, когда больной *задыхается*, ощущаетъ сильную тоску. Также когда затѣмъ послѣдуетъ охриплость, сухость гортани и дыхательнаго горла. (По 2—3 капли черезъ 1—2 часа.)

Spongia — 2.

Охриплость, опухлость кадыка, въ которомъ чувствуется какое-то движеніе; кашель *глухой, сухой*, со стонами, *кряхтнѣемъ*: громкое, поющее, шумное, шипящее, свистящее дыханіе; руки и ноги холодны, пульсъ слабъ; холодный потъ.

Tartarus emet. — 1.

Полезьа его противъ настоящаго крупа сомнительна; иногда

оно удаляетъ рвотою трубчатая пленки и чрезъ это временно, паллиативно облегчаетъ, доставляя доступъ воздуху. Послѣ того давать *Jod.* Такимъ образомъ, оно только промежуточное средство при угрожающемъ параличѣ легкихъ, съ кашлемъ, охрипlostью и шипѣніемъ, при

дыханіи съ *xрипомъ*, свистомъ, страхѣмъ задохнуться. Грудь расширяется только при величайшихъ усиліяхъ. Пульсъ малъ, ускоренъ. Холодный потъ. (Употреблять 1-е растираніе, по приему на кончикѣ ножа, или 1-е разжиженіе, 5—8 капель черезъ 1—2 часа).

Этихъ средствъ, если только ихъ употребить во время, въ большинствѣ случаевъ достаточно. Если удастся захватить болѣзнь въ самомъ ея началѣ, то слѣдуетъ, послѣ нѣсколькихъ приемовъ *Acon.*, давать *Spongia*, съ промежутками въ $\frac{1}{2}$ —1 часъ. Средство это дѣйствуетъ навѣрняка въ воспалительномъ катарѣ, въ незлокачественныхъ видахъ крупа и въ такъ назыв. ложномъ крупѣ (безъ выпота), который очень трудно отличить отъ настоящаго крупа; иногда оно даже прерываетъ выпотѣніе, такъ что можно ограничиться однимъ этимъ средствомъ. Если же это не удастся, то слѣдуетъ дать *Brom. 2.*, которое дѣйствуетъ легче и быстрѣе, нежели медленный, но за то болѣе положительный *Jod.* Если болѣзнь усиливается втеченіе нѣсколькихъ часовъ, то слѣдуетъ дать *Jod.*, не останавливаясь слишкомъ долго на *Brom.* Иногда, наоборотъ, помогаетъ *Brom*, когда не оказываетъ дѣйствія *Jod.* Дѣйствіе лекарства зависитъ отъ индивидуальныхъ свойствъ больнаго. *Hepar* слѣдуетъ давать не прежде, чѣмъ наступитъ отдѣленіе мокроты. Противъ оставшейся охрипlosti и сухаго кашля можно также употребить *Brom.* или *Spongia*. Последнее средство я при крупѣ употребляю также для втиранія въ гортань, а именно черезъ 2—3 часа по 3—5 капель тинктуры на чайную ложку виннаго спирту.

Сверхъ того я видѣлъ успѣхъ отъ *паровъ іода*. (Налить 20 капель іодовой тинктуры въ чашку горячей воды, поставить последнюю надъ пламенемъ спиртовой лампы и вдыхать затѣмъ носомъ пары.)

Аллопаты придаютъ большое значеніе рвотнымъ средствамъ; но пока нѣтъ выпотѣнія, они раздражаютъ и поэтому вредны, а

когда воспослѣдовало выпотѣніе (въ особенности, если оно наполнило болѣе глубокіе дыхательные пути), ихъ уже недостаточно. Трубочки часто отдѣляются и безъ рвотныхъ средствъ и вышлевываются или проглатываются въ видѣ водянистой слизи. Только при *опромныхъ массажахъ выпота*, если при этомъ легкія еще свободны, рвотное средство можетъ оказать облегченіе и отвратить опасность, угрожающую жизни, и тогда достаточно *Tart. em.*, въ указанныхъ (см. выше) или нѣсколько усиленныхъ дозахъ; во всякомъ случаѣ оно лучше ненадежнаго *Cuprum sulphuricum*, главнаго средства аллопатовъ. Но такъ какъ рвотное средство только механически доставляетъ доступъ воздуху, то, сверхъ того, слѣдуетъ продолжать динамическое лѣченіе крупа, чтобы предупредить повтореніе выпотѣнія. Къ разсѣченію дыхательнаго горла слѣдовало бы прибѣгать только въ томъ случаѣ, когда внутреннія средства не оказываютъ никакого дѣйствія, ребенокъ отъ стѣсненія дыханія посинѣлъ, такъ что ему грозитъ опасность, задохнуться, и когда при этомъ можно предположить, что легкія еще свободны. Въ послѣднее время стали вставлять трубки въ дыхательное горло — отчасти для того, чтобы вводить черезъ нихъ лѣкарства, отчасти для устраненія суженія.

Прикладываніе къ горлу теплыхъ компрессовъ изъ мучнистыхъ отваровъ или, еще лучше, губки, смоченной въ теплой водѣ, служить хорошимъ вспомогательнымъ средствомъ при лѣченіи. Холоднымъ обливаніемъ затылка и шеи я спасъ ребенка, который былъ близокъ къ смерти.

Разсмотрѣвъ разные виды кашля, я позволю себѣ въ заключеніе привести нѣкоторые средства, которые стали въ новѣйшее время употреблять противъ всѣхъ этихъ видовъ.

Противъ катарральной лихорадки: *Apos. andr.*, *Asclep.*, *Baptis.*, *Gelsem.*; притомъ *Apos.* дается противъ ночнаго, сухаго кашля съ незначительнымъ отдѣленіемъ мокроты, слабостью; *Asclep.* способствуетъ отдѣленію мокроты; *Gels.* дается болѣе противъ воспалительныхъ и конгестивныхъ формъ.

Противъ сухаго кашля даются: *Ascl.*, *Cimic.*, *Podoph.*, *Rum.*, *Sanguin.*; противъ мокротнаго кашля: *Apos. cann.*, *Podoph.*, *Senec.*, *Silphium lanciniatum*, *Sticta.* (*Cimic.* при нерв-

номъ, щекочущемъ кашлѣ; *Rumex* дѣйствуетъ подобно *Bell.* и *Phosph.*, при безпрерывномъ, сухомъ, щекочущемъ кашлѣ, особенно если онъ исходитъ изъ кадыка и верхнихъ бронхій, вызывается холоднымъ воздухомъ, давленіемъ на дыхательное горло или напряженіемъ голоса; *Sanguin.* въ хроническихъ случаяхъ; *Senec.* подобно *Pulsat.*). Почти во всѣхъ этихъ случаяхъ старыя средства помогаютъ лучше. *Arum triphyllum* способствуетъ отдѣленію мокроты. *Eupat. perf.*: катарръ при синомъ и хрипомъ голосѣ. При гриппѣ: *Eupat.*, *Gels.*, *Sticta*. При чахоточномъ кашлѣ: *Eupat. perf.* Противъ коклюша: *Sticta*. При бронхитѣ: *Eup. purp.*, *Gelsem.*, *Hydrast.*, *Rum.* и *Sanguin.* (*Eup.* при сильномъ удушѣ съ болью; *Gelsem.* подобно *Acon.* и *Ver. vir.*; *Hydrost.* у стариковъ, причемъ отдѣляется густая, вязкая и тягучая мокрота; *Rumex* [см. выше], *Sanguin.* часто даются съ большимъ успѣхомъ). Противъ крупа: *Sticta*.

60. Охрипость,

raucedo.

Она часто бываетъ только симптомомъ воспаления или катарра дыхательныхъ путей и большею частью сопровождается кашель. Но иногда она имѣетъ самостоятельный характеръ. При воспалительномъ характерѣ болѣзни всего лучше помогаетъ *Acon. 2.*, когда при этомъ лихорадка, а при высшей степени воспаления — ***Merc. sol. 3.***; при болѣе катарральномъ характерѣ, особенно когда охрипость не въ верхнихъ частяхъ (гортань и дыхательное горло), послѣ устранения лихорадки посредствомъ *Acon.*, помогаютъ: ***Bryon. 3.***, ***Nux vom. 3.***, смотря по признакамъ, означеннымъ выше при катаррѣ (стат. 53); *Puls.*, когда при этомъ насморкъ или кашель, или въ періодъ, когда отдѣляется мокрота. Когда охрипость тянется черезчуръ долго, то лучшимъ средствомъ служить ***Her. sulph. 3.*** При ощущеніи жженія, утратѣ голоса, когда пациентъ слабосиленъ, полезно ***Phosph. 3.*** При видахъ сильного воспаления гортани и дыхательнаго горла, причемъ въ этихъ органахъ чувствуется боль, щекотанье, и кажется, будто они ссаднены и въ ранахъ — ***Spongia 2.***, а при сильнѣйшей степени — ***Jod. 5.*** — ***3.*** При болѣе легкихъ, а такъ

же при хроническихъ формахъ, особенно когда притомъ разрыхлена слизистая оболочка, и развиваются маленькія желѣзки въ задней части зѣва (такъ называемая зернистая форма) — **Brom. 5.—2.**, утромъ и вечеромъ по 1 или по 2 капли.

Послѣднее средство часто оказывало въ моей практикѣ необыкновенно быструю помощь при катарральной охриплости, при ощущеніи сухости и израненности въ горлѣ, особенно у пѣвцовъ и пѣвицъ.

Если охриплость становится хроническою, то надо опасаться органическихъ измѣненій въ дыхательныхъ путяхъ золотушного, сифилитическаго или туберкулознаго (бугорчатаго) свойства. Тутъ бывають нагноенія, нарывы, затвердѣлости, опухоли или водянистое опуханіе щиточерпаловидныхъ связокъ или удлинненіе и увеличеніе миндалевидныхъ желѣзъ. Въ этихъ случаяхъ слѣдуетъ употребить: **Calc. carb., Carb. veg. 3., Baryt. carb.**, при симптомахъ, означенныхъ при органическомъ кашлѣ; **Brom.** и **Jod 5.—3.**, при нарывахъ, припуханіи и опухоляхъ съ сухостью и болью (какъ выше); **Merc. 3.** и **Mezer. 3.**, при сифилитическихъ и золотушныхъ нарывахъ; **Sep. 3.** и **Sulph. 3.**, при страданіяхъ слизистой оболочки въ связи съ недугами нижней части живота; второе средство особенно при прерванномъ потѣніи ногъ, при скрывшемся геморроѣ и сыпяхъ. **Hep. sulph. 3.** хорошо при свободно отдѣляющейся слизи и послѣ злоупотребленія ртутью. **Mangan. 3.** — главное средство при органической болѣзни горла съ обильнымъ накопленіемъ слизи (зеленой, въ формѣ комковъ), когда охриплость облегчается отъ куренія табаку.

Если охриплость зависитъ болѣе отъ нервныхъ причинъ, какъ наприм. отъ душевныхъ потрясеній, испуга и т. п. (сюда же относится охриплость у истерическихъ особъ, продолжающаяся иногда цѣлыя недѣли и мѣсяцы), и кончается совершенною потерей голоса, то всего лучше помогаетъ **Phosph. 5.**, средство, наиболѣе соответствующее разслабленію мускуловъ, припуханію щиточерпаловидныхъ связокъ и параличеобразной слабости. Также дѣйствуетъ **Caust. 3.**, которое особенно полезно при склонности пациента къ простудѣ и при частомъ возвращеніи охриплости, съ сухимъ кашлемъ, щекотаніемъ и чувствомъ ссаденности въ груди.

Пѣвцамъ, которые чрезмѣрно напрягали голосъ, полезно **Selen. 3.**; не слѣдуетъ также пренебрегать **Natr. mur. 5.—3.**, въ подобныхъ случаяхъ и во всѣхъ тѣхъ, когда въ охриплости играетъ роль золотуха.

Приведемъ еще новѣйшія средства: *Arum.*, *Baptis.*, *Iris.*, *Rum.*, которые даются большею частью въ случаяхъ катаррального характера.

61. Воспаленіе легкихъ,

pneumonia.

Тѣ симптомы, которые обыкновенно выставляются характеристическими симптомами этой болѣзни, обманчивы, потому что бываютъ и при другихъ болѣзняхъ. Воспаленіе легкихъ обнаруживается то самостоятельно, то какъ слѣдствіе другихъ болѣзней, въ различныхъ катарральныхъ и крупозныхъ формахъ и случается во всѣхъ возрастахъ; симптомы ея: лихорадка, боль при дыханіи (ея можетъ и не быть), кашель съ отдѣленіемъ мокроты (крови, кровянистой, ржаваго цвѣта слизи) или безъ него, затрудненіе при дыханіи, ускореніе пульса и т. п. Лучшими средствами къ распознаванію служатъ постукиваніе и выслушиваніе, потому что чрезъ нихъ становятся доступными точные признаки мѣстнаго расстройства. Анатомическій ходъ настоящаго (крупознаго) воспаленія легкихъ бываетъ слѣдующій: сначала переполненіе легкихъ кровью; дня черезъ 3 въ ткани легкихъ отдѣляются красные комочки крови и гноя, которые мало по малу теряютъ свой цвѣтъ и наконецъ представляютъ сѣрую массу. Потомъ, обыкновенно черезъ 6 дней, происходитъ выпотѣніе водянистой жидкости, которая растворяетъ эту массу, такъ что она удаляется съ изверженіемъ мокроты въ видѣ гноя или всасывается. Въ случаяхъ болѣе злокачественныхъ осаждается сырный продуктъ, воспаленіе дѣлается хроническимъ, ткань легкихъ гноится, образуются гнойныя пазухи и даже бугорки. Въ болѣе рѣдкихъ случаяхъ встрѣчается затвердѣніе или даже антоновъ огонь легкихъ. Излѣченіе еще возможно, даже при нагноеніи, затвердѣніи и антоновомъ огнѣ, если болѣзнь ограничивается опредѣленнымъ мѣстомъ. Такъ какъ одно выслушиваніе можетъ дать понятіе о состояніи легкихъ, то

всякое другое изслѣдованіе останется недостаточнымъ для полного распознаванія болѣзни.

Ходъ воспаленія легкихъ въ большинствѣ случаевъ слѣдующій: сильный ознобъ, послѣ чего слѣдуетъ жаръ съ необыкновенной утомленностью, полный, напряженный пульсъ, доходящій до 100 ударовъ, чрезвычайно красныя щеки, живые, налитые кровью глаза, отсутствіе аппетита. Колотье въ заболѣвшей части легкихъ, увеличивающееся, когда дышешь, разговариваешь, кашлишь. Кашель сначала сухой, короткій; дыханіе ускоренное, затрудненное, поверхностное, потому что отъ глубокаго вдыханія усиливаются боли, причѣмъ ноздри раздуваются, тоска, безпокойство. Голосъ слабый, отрывистый. Мокрота весьма характеристична для опредѣленія періода воспаленія. Сначала она смѣшана съ кровью, вязка, цвѣта ржаваго, кирпичнаго или буро-краснаго, послѣ она становится свѣтлѣй, гуще, слизистѣе и совершенно теряетъ примѣсь крови. Лихорадка усиливается часто до 3-ьяго дня и долѣе, доходить до 120 ударовъ пульса; въ самыхъ благопріятныхъ случаяхъ унимаются на 5—6 день лихорадка и мѣстные боли, мокрота принимаетъ лучшій цвѣтъ, дыханіе становится легче и глубже, наступаетъ потный и мочевоу кризисъ, очищается языкъ и т. д. Часто передъ поправленіемъ, и послѣ 6-го дня еще, вновь усиливается лихорадка. Большею частью уже черезъ 14 дней все кончено, и наступаетъ быстрое выздоравливаніе. Болѣе продолжительная лихорадка указываетъ на приведенные выше болѣе опасные исходы.

Статистика доказала, что гомеопатическое лѣченіе успѣшнѣе естественнаго лѣченія, которое стала рекомендовать новѣйшая физиологическая школа, убѣдившись въ безуспѣшности и вредности своихъ средствъ; ибо аллопатическое лѣченіе и въ особенности кровопусканіе мало приносить пользы, въ чемъ сознаются самые знаменитые врачи старой школы.

Противъ этой болѣзни съ успѣхомъ даются слѣдующія гомеопатическія средства:

Aconitum — 2.

Особенно хорошо для *сильныхъ*, цвѣтущихъ особъ, муж-

чинъ, въ *первой стадіи*, при сильной *лихорадкѣ*, ознобѣ, потомъ жарѣ, горячей кожѣ; бы-

стрый, жесткій пульсъ, жажда; красноватая моча; чрезвычайно *ускоренное дыханіе*, невозможность лежать, метаніе, сердцебіеніе, приливъ крови къ голо- вѣ, летучее *колотье* при глубо- комъ вдыханіи, также при лежа- нии; на боку лежать трудно; сверхъ того давленіе и тяжесть въ груди; короткій, острый, *су- хой* кашель съ изверженіемъ *жидкой, слизноподобной* или *по- дернутой кровью* мокроты, имѣю- щей цвѣтъ ржавчины; хуже ве- черомъ.

Belladonna — 2.

Лучше для *слабыхъ, чувстви- тельныхъ* особъ, для женщинъ и дѣтей, при сильной раздражи- тельности; иногда послѣ *Асон.*, особенно при ясно обнаружива- ющихся явленіяхъ *раздраженія моза, прилива крови*, при бре- дѣ, сонливости, головокруженіи, шумѣ въ ушахъ, чрезвычайно красномъ лицѣ, неподвижности взгляда, безпокойствѣ, жгучемъ жарѣ, жаждѣ.

Bryonia — 2.

Рѣдко въ началѣ, болѣе же *во 2 стадіи*, когда *начинает отдѣляться мокрота* (примѣрно на 3 день), особенно когда бо- лѣзнью поражена *подреберная плева*, а потому и *колошная* боль,

усиливающаяся отъ *дыханія и дви- женія*, или также, когда легкое *нервное* раздраженіе, безпокой- ство, видѣнія, давящая боль во лбу. — Также когда болѣзнь усложнена *железными и желу- дочными* недугами, съ запоромъ.

Phosphor. — 2.

Главное средство для разрѣ- шенія *выпота*, а потому рѣдко въ началѣ, большею частью на 3 или 4 день, причемъ иногда оно одно излѣчиваетъ, если толь- ко его твердо держаться; при *давленіи, боли, жарѣ, жженіи* въ груди; *пѣнистая, ржавая* или вообще *грязного цвѣта* мо- крота, затрудненное дыханіе, удущье; также при *нервной сла- бости*, при воспаленіи легкиехъ у *стариковъ, слабыхъ, чахоточ- ныхъ* особъ; при угрожающемъ переходѣ воспаленія въ чахот- ку или антоновъ огонь;* при хватаніи руками хлопьевъ въ воздухѣ, бредѣ съ бормотань- емъ, упадкѣ силъ, блѣдности лица съ *потомъ*, невольномъ ис- праженіи, угрожающемъ *пара- лизъ легкиехъ*.

Sulphur — 3.

При *частыхъ рецидивахъ* бо- лѣзни, послѣ *Асон.* и др. средствъ, или когда *разрушеніе выпота* происходитъ *медленно*, когда

послѣ *Phosphor.* на 5 или 6 день нѣтъ никакого замѣтнаго успѣха противъ *воспалительнаго* состоянія; ощущеніе давленія, тяжести во время дыханія; умѣренное колотье и незначи-

ная лихорадка. Особенно полезно особамъ *слабымъ, страдающимъ бурчаткою, золотушнымъ.* (Многіе гомеопаты считаютъ его важнѣйшимъ средствомъ и предпочитаютъ *Phosphor'у*).

Въ новѣйшее время стали совѣтовать при сильной степени болѣзни тотчасъ прибѣгать къ *Jod.* (1. дѣленіе, или *Kalium jodatium* — $\frac{1}{2}$ грана) или къ *Brom.* а не къ *Acon.*

Кромѣ того, но рѣже, употребляются: **Arsen.**, при воспаленіи легкихъ, при тифѣ съ унадкомъ силъ, пролежняхъ, антоновомъ огнѣ легкихъ (противъ антонова огня рекомендуютъ также *Carb. veg., Camph., Kreos.*); *Merc.* (подобно *Acon.*), какъ промежуточное средство, когда щемающая и тянущая боль, жгучее, рѣжущее колотье, обильный потъ, въ особенности же при катаральномъ воспаленіи легкихъ, какъ напр. при гриппѣ; **Rhus**, при общей слабости, при воспаленіи легкихъ въ тифѣ, подобно *Phosph.*, при значительныхъ органическихъ измѣненіяхъ, выпотѣніи, разложеніи крови, антоновомъ огнѣ; **Tart. emet.**, въ позднѣйшіе періоды болѣзни, когда начинается выпотъ, при сильномъ стѣсненіи, но безъ большой боли, когда больному кажется, будто у него бархатъ въ груди, или когда онъ ощущаетъ жженіе, вынужденъ сидѣть прямо, бьется задохнуться, притомъ хрипѣніе, много слизи, кровохарканіе, угрожаетъ параличъ легкихъ, словомъ, употребляется для отвращенія крайней опасности; особенно хорошо также дѣйствуетъ на пѣяницъ. **China** также оказывала услуги при антоновомъ огнѣ и при изнурительномъ характерѣ болѣзни послѣ разслабленія отъ кровоупусканія.

Въ новѣйшее время стали, по примѣру аллопатів, выставлять **Ver. vir.** главнымъ средствомъ противъ этой болѣзни въ началѣ ея развитія, при ощущеніи слабости или безсилія подъ ложечкой, при перемежающемся пульсѣ; дѣйствуетъ подобно *Acon.*, но слѣдуетъ давать въ большихъ приѣмахъ (1 разж., отъ 5—15 капель). А то еще даютъ *Asclep., Eupat. perfol., Gelsem.* (только при конгестивныхъ предвозвѣстникахъ болѣзни), *Sanguin.* (въ стадіяхъ позднѣйшаго развитія).

Примѣч. *Приемы* въ этой болѣзни должны быть сильные. Поэтому необходимы по крайней мѣрѣ 3—2 разжиженіе. За исключеніемъ *Sulphur* (которое достаточно давать черезъ каждые 5—4 часа), надо повторять приемы каждые 3—2 часа. — Теплыя припарки изъ отвара льняной или овсяной муки, крупы и т. п., служатъ важнымъ вспомогательнымъ разрѣшающимъ средствомъ. Новѣйшая школа, напротивъ того, употребляетъ холодныя компрессы, что совершенно противно имѣющимся указаніямъ опыта. Полезно прохладное питье, строгая діета. Не вызывать чрезмѣрнаго пота!

62. Воспаленіе подреберной плевы (плевры), *pleuritis.*

Это воспаленіе или сопровождается воспаленіе легкихъ или имѣетъ самостоятельный характеръ; оно поражаетъ иногда только внѣшнюю сторону, обращенную къ мускуламъ, а иногда также внутреннюю, т. е. обращенную къ легкимъ. Последнее опаснѣе; оно производитъ выпотѣніе жидкостей, которыя или вновь всасываются, или сгущаются и въ такомъ случаѣ давятъ на легкія, срастаются съ ребрами или легкими или обращаются въ гной, который можетъ отдѣлиться внутрь или наружу (черезъ стѣнки груди). Последнее случается рѣже. Признаки этой болѣзни суть: колотье или давленіе въ боку, усиливающееся отъ разговора, дыханія, кашля, чиханія, движенія, затѣмъ отрывистое короткое дыханіе, одышка, легче всего лежать на спинѣ, иногда сухой кашель, лихорадка. И здѣсь выслушиваніе и постукиваніе, вмѣстѣ съ указанными признаками, служатъ лучшимъ средствомъ къ распознаванію. Если болѣзнь во время захвачена, то ее легко устранить. Надо здѣсь быть осторожнымъ, такъ какъ выпотъ можетъ образоваться безъ значительной боли и безъ лихорадочныхъ явленій и своимъ давленіемъ на легкія и вообще вліяніемъ на кровь и т. д. съ теченіемъ времени сдѣлаться опаснымъ. Воспаленіе подреберной плевы безъ выпотѣнія называется меди-ками сухимъ.

Воспаленіе подреберной плевы самостоятельнаго характера происходитъ большею частью отъ простуды или развивается вслѣдствіе ревматизма. Но чаще оно является въ видѣ усложненія

воспаленія легкихъ, сердца или околосердечной сумки, брюшины, острыхъ кожныхъ сыпей, бугорчатки легкихъ или Брайтовой болѣзни и т. п. Опасность обусловливается главнымъ образомъ качествомъ выпота — волокнистаго ли онъ вещества, жидокъ ли, или гноевиденъ — и распространеніемъ его. Выздоровленіе бываетъ быстрое при гомеопатическомъ лѣченіи, оказывающемъ большую помощь даже въ застарѣлыхъ случаяхъ. Болѣзнь очень склонна къ рецидивамъ.

Aconitum — 2.

Болѣе въ началѣ; но часто достаточно одного этого средства, если вскорѣ обнаруживается улучшение. Сильная *лихорадка*, сухая кожа, жаръ, ознобъ, жажда. *Колотье въ боку при каждомъ движеніи, при дыханіи, безпокойство и тоскливость.*

Bryonia — 2.

Главное средство. Большею частью послѣ *Acon.* или тогда, когда лихорадка не такъ сильна, и преобладаетъ *колотье въ боку, усиливающееся отъ движенія, дыханія, кашля*; когда существуютъ признаки совершившагося *выпоттнія*, именно давленіе въ извѣстномъ мѣстѣ, и когда кашель сухъ.

Для очень упорныхъ случаевъ, противящихся всасыванію, можно также рекомендовать **Hep. sulph.** Можетъ тутъ принести пользу и *Jod.* Пребываніе въ тепломъ климатѣ при упорныхъ случаяхъ этой болѣзни очень полезно.

Примѣч. И здѣсь нужно давать по нѣскольку капель черезъ 3—2 часа. *Sulph.* дается рѣже, черезъ 5—4 часа.

Phosphor. — 3.

Въ опасныхъ случаяхъ и когда обильный выпотъ, летучее колотье, когда ощущается тяжесть и натянутость, давленіе, *чрезвычайная одышка, и когда боль усиливается отъ прикосновенія.*

Squilla — 2.

Сухой, жгучій жаръ, ознобъ при всякомъ обнаженіи тѣла, сильное *колотье* отъ реберъ до плечъ, увеличивающееся отъ *кашля* и *изверженія мокроты*. Болѣе въ *хроническихъ формахъ*, въ соединеніи съ водянкою, чахоткою.

Sulphur — 3.

Когда *Bryon.* недостаточно для разрѣшенія, и въ хроническихъ случаяхъ.

63. Воспаленіе грудныхъ желѣзь, *mastitis.*

Оно случается у новорожденныхъ отъ давленія при родахъ и у взрослыхъ вслѣдствіе механическихъ причинъ; у кормящихъ грудью особенно отъ давленія, душевныхъ потрясеній, при отнятіи ребенка отъ груди. Оно бываетъ или поверхностное или глубокое и тогда легко переходитъ въ нагноеніе, а если это послѣднее затягивается, то образуются фистулы и (доброкачественныя) затвердѣнія.

Arnica — 2.

Когда воспаленіе бываетъ слѣдствіемъ помятія, давленія и другихъ *внѣшнихъ причинъ*. (Особенно у новорожденныхъ. Въ этомъ случаѣ надо употреблять *Arn.* также наружно, а при нагноеніи — теплыя припарки изъ льняной муки, внутрь же *Merc.*)

Belladonna — 2.

Рожевидное воспаленіе. Грудь опухла, отвердѣла, лоснятся, *натянуты*, съ *примесью* крови, жаромъ, летучимъ *колотьемъ*, ломомъ. (При воспаленіи у новорожденныхъ и взрослыхъ, когда еще нечего опасаться нагноенія)

Bryonia — 2.

Родильницамъ, послѣ *отнятія ребенка отъ груди*, при давленіи, опухоли, маленькихъ узелкахъ, ощущеніи *натянутости*, *колотьѣ*, наружномъ *жженіи*, лихорадкѣ съ *запоромъ*.

Hepar sulphuris — 3.

Когда *образованіе гноя* медлительно, но неизбежно, и когда послѣ отдѣленія гноя остаются фистулы и затвердѣнія краевъ.

Mercurius — 2.

Когда тѣ же симптомы, которые обозначены при *Bell.* и *Bryon.*, но *сильнѣе*. Съ *образованіемъ гноя*. Для размягченія и излѣченія *нарывовъ* (особенно у новорожденныхъ).

Phosphor. — 3.

Препятствуетъ образованію гноя. Полезно при *наклонности* грудей къ *нарыванію*, при фистулахъ съ *чрезвычайной слабостью*, при потѣ съ *лихорадкою*.

Silicea — 3.

При *хроническомъ затвердѣніи* и образованіи фистулъ; при *нарывахъ* съ жесткими краями.

Кромѣ того можно посовѣтовать противъ затвердѣнія и остающихся узловъ: **Brom.** (употреблять внутрь и наружно, въ видѣ мази изъ $\frac{1}{2}$ драхмы 1 разжиж. на 4 драхмы свиного сала), **Sulphur**, а также *Lycop.*, *Graph.* или *Carb. an.* Если узлы образуются отъ внѣшнихъ причинъ или вслѣдствіе порчки соковъ, то вѣрнѣйшимъ средствомъ служить **Conium 3.** въ рѣдкихъ приемахъ (втирать также тинктуру снаружи). Противъ доброкачественныхъ узловъ, которые часто бываютъ на грудяхъ у молодыхъ дѣвицъ, я весьма успѣшно употреблялъ *Clematis 2.*

Новѣйшія средства: *Helonias* (?), **Phytolacc.** (при ранкахъ на соскахъ, отсутствіи молока, нарывахъ, затвердѣніи желѣзъ), *Ver. vir.* (при сильной лихорадкѣ); когда соски сильно болятъ и изъ нихъ сочится кровь: *Hamam.*

Примѣч. Хорошимъ вспомогательнымъ средствомъ вслучаѣ предстоящаго нагноенія служатъ теплыя припарки изъ льняной, овсяной муки и т. п. Искусственного вскрытія нарывовъ надо остерегаться до послѣдней крайности.

64. Стѣсненіе дыханія, одышка (стѣсненіе въ груди), судорожная одышка, *asthma*; грудная жаба, *angina pectoris*, *stenocardia*; Миллярова одышка, или судороги гортанной щели, *laryngismus stridulus* (*spasmus glottidis*).

Подъ именемъ одышки, стѣсненія въ груди, разумѣются періодическіе припадки удушья съ произвольнымъ вдыханіемъ и выдыханіемъ (судороги груди), что иногда сопровождается особенными звуками при дыханіи, какъ-то свистомъ, хрипѣньемъ и т. п., и симптомами, указывающими на недуги сердца. Приступы болѣею частью бываютъ періодическіе, съ большими или меньшими промежутками времени, и вызываются невоздержностью въ пищѣ, особенно пученіемъ живота, простудой, переменной погоды, душевнымъ потрясеніемъ и т. п. Одышка же — симптомъ другаго, глубже лежащаго недуга, который рѣдко бываетъ чисто гервного свойства. Хотя каждый припадокъ и обусловливается нервами, но тѣ случаи, гдѣ нѣтъ другихъ причинъ, кромѣ нервного возбужденія, какъ напр. у истерическихъ, разслабленныхъ, страдающихъ

болѣзнями спиннаго и головнаго мозга особѣ, очень рѣдки. Этого рода одышку мы называемъ по преимуществу судорожною или нервною.

Другаго рода одышка обусловливается *приливомъ крови* къ легкимъ, сердцу, большимъ сосудамъ, нижней части живота. Мы называемъ ее конгестивною одышкою.

Сюда же въ особенности относится тотъ видъ, который вызывается давленіемъ распухнуваго живота у невоздержныхъ въ пищѣ и питѣ (въ особенности послѣ баварскаго пива), встрѣчается при вздутости живота отъ судорогъ у страдающихъ дѣвичьей немочью, у первныхъ особѣ, у которыхъ почти механически выширается вверхъ грудобрюшная преграда, вслѣдствіе чего происходитъ стѣсненіе легкихъ и сердца.

Но чаще всего встрѣчается органическая одышка, бывающая слѣдствіемъ органическихъ измѣненій слизистой оболочки дыхательныхъ путей (слизетеченіе, воспаленіе), болѣзней легкихъ (разширеніе, или такъ называемая эмфизема, бугорки, затвердѣлости, малокровіе), подреберной плевы (изліяніе воды и гноя, сращенія), мускуловъ діафрагмы и груди (ревматизмъ, раны), сердца и большихъ кровеносныхъ сосудовъ (сгущеніе крови, увеличеніе, расширеніе, окостянѣніе и проч.).

Подъ выраженіемъ грудная жаба собственно разумѣютъ совокупность мучительныхъ симптомовъ, указывающихъ на высокую степень развитія болѣзни и исходящихъ главнымъ образомъ изъ сердца; они обнаруживаются слѣдующимъ образомъ: мгновенно прерывается дыханіе, сердце, повидимому, останавливается, страхъ задохнуться, особеннаго рода боль въ области грудной кости, начинающаяся надъ ложечкой и простирающаяся затѣмъ влѣво на грудь и руку, въ которой чувствуется натянутость и онѣменіе, и доходящая до ушей. Эти припадки повторяются отъ времени до времени, усиливаются, причемъ къ нимъ присоединяется чувство приближенія смерти, сердцебиеніе, остановка пульса, обмороки, отчаяніе и часто внезапная смерть (вслѣдствіе разрыва или паралича сердца, отъ удара). Причины этого мучительнаго страданія могутъ находиться или исключительно въ нервахъ сердца (въ особенности въ *vagus u sympathicus*), или эти послѣдніе могутъ имъ

служить проводниками при органическихъ болѣзняхъ сердца (недостатки сердечныхъ заслонокъ, ожерѣіе сердца) и при болѣзняхъ большихъ бьющихся и вѣчныхъ жилъ (осадокъ пленокъ — атеромъ, — окостанѣіе, суженіе). Во всякомъ случаѣ грудная жаба есть смѣшанная невроза, сложившаяся изъ разстройства нервовъ осязанія и движенія.

Такъ называемая Миллярова или Коппова одышка, которая бываетъ у дѣтей и имѣетъ большое сходство съ крупомъ (только при ней нѣтъ воспаленія, и приступы бываютъ періодическіе), въ сущности есть не что иное, какъ судороги гортанной щели.

Вслѣдствіе мгновеннаго сокращенія гортанной мышцы, могущаго произойти отъ причинъ центральныхъ (мозгъ) или периферическихъ, лицо вдругъ краснѣетъ или подергивается синева-то-краснымъ цвѣтомъ, вокругъ губъ ложится синее кольцо, глаза выступаютъ и обнаруживаютъ большой страхъ, голова закидывается назадъ, члены расслаблены, вытянуты или скорчены судорогамъ. Дитя холодѣетъ, тяжело и мучительно дышетъ, издаетъ рѣзкій звукъ, похожій на свистъ или на пѣтушинный крикъ, иногда втеченіе одной минуты. Въ большинствѣ случаевъ сохраняется сознаніе. Послѣ припадка дѣти чувствуютъ себя хорошо. Припадки повторяются 2 — 3 и даже 60 разъ въ сутки. Часто они влекутъ за собою эпилептическіе припадки. Со временемъ увеличиваются промежутки между припадками, и болѣзнь исчезаетъ, но иногда она и смертоносна. Она поражаетъ большею частью дѣтей малокровныхъ и одержимыхъ англійскою болѣзнію. Чаще всего причинами ея бываютъ: дурное питаніе мозга, раздражительность его, катарръ дыхательныхъ путей, болѣзни бронхіальныхъ желѣзокъ, чрезмѣрный крикъ, зубная боль, катарръ кишекъ, глисты.

Само собою разумѣется, что лѣченіе, смотря по описаннымъ признакамъ, должно быть очень различно. Въ большей части случаевъ надо устранить сначала самые припадки, а потомъ уже ихъ причину, для того чтобы воспрепятствовать возврату болѣзни. Лучшія средства для этой цѣли слѣдующія:

Aconitum — 2.

Коместивный и органический характеръ болѣзни. Въ острыхъ случаяхъ и, какъ промежуточное средство, въ хроническихъ, особенно при *болѣзняхъ сердца, полнокровіи, приливѣ крови, жарѣ, безпокойствѣ, потѣ, удушливомъ кашлѣ, тоскѣ, стѣсненіи въ груди; пульсъ и біеніе сердца полны, сильны; микс-радка.*

Arsenicum — 3.

Главное средство при *органической* формѣ, особенно при *расширеніи лекихъ, хроническомъ катаррѣ и недугахъ сердца* и т. д., въ *припадкахъ послѣ ѣды, при каждомъ движеніи; особенно при ночныхъ припадкахъ удушья, когда стягиваетъ грудь, горло, подъ ложечкой, когда притомъ: лицо чрезвычайно блѣдное или синее, быстрый упадокъ силъ, удушье, дыханіе со свистомъ, ротъ раскрытъ, сильная тоска и холодный потъ, кашель и слизистый хрипъ; изверженіе слизи къ концу припада; жже-ніе въ груди, сильная жажда, чрезвычайная слабость; хуже въ суровую погоду, на открытомъ воздухѣ, отъ тепла, тѣснаго платья и т. д.*

Belladonna — 2.

Коместивная форма, съ *біеніемъ, головокруженіемъ, чувствомъ напряженія или колотьемъ въ груди; сухой кашель съ щекотаньемъ; боязливое, ускоренное, нервозное дыханіе; съ приступами удушья; нервное безпокойство, судороги и конвульсіи.*

Bryonia — 2.

Полезно послѣ *ревматическихкихъ недуровъ сердца; послѣ воспалительныхъ страданій легкихъ или плевры; при ступеніи или сращеніи легочной ткани, изліяніи воды илигноя, пораженіи мускуловъ, или при одышкѣ вслѣдствіе недуровъ нижней части живота (завалы печени). Приступы почные или утренние, съ коликой, запоромъ; колотье, давленіе въ груди, хуже отъ разговора и движенія; животъ натянутъ, туго; отъ кашля легче.*

Cuprum — 3.

Судорожная форма. Грудная жаба у дѣтей, *Миллярова одышка, у женщинъ, съ стягиваніемъ и стѣсненіемъ въ груди; дыханіе со свистомъ, ускоренное, съ конвульсивнымъ движеніемъ мускуловъ нижней части живота, слизистымъ хрипомъ, водянистымъ изверженіемъ; чувство цу-*

стоты и утомленія подъ ложечкой; сердцебіеніе съ волненіемъ крови; красное, потное лицо.

Тресасуанһа — 2.

Преимущественно при *судорожной* формѣ болѣзни у дѣтей, *Милляровой одышки*, но облегчаетъ и въ другихъ случаяхъ, когда *кашель*, слизистый хрипъ, тоска, безпокойство, лицо то блѣдно, то красно; ускоренное, боязливое, *со вздохами* выдыханіе; свободное вдыханіе, напоръ воздуха къ кадыку; въ немъ какъ будто что-то застряло, или онъ стянутъ; *тошнота*, конвульсія, холодный потъ, частое испусканіе водянистой мочи.

Nux vomica — 3.

Судорожная и комативная форма, происходящая, главнымъ образомъ, отъ недуговъ желудка и нижней части живота, причемъ *давленіе, стѣсненіе*, ночью, *утромъ послѣ пды; страна подъ ложечкой и животъ натянуты, тули; запоръ*, желудочные симптомы; отъ *вѣтровокъ*, разстегиванія платя легче. Короткое, медленное, свистящее дыханіе съ стягиваніемъ, побуждающимъ къ сидячему положенію; хуже отъ разговора, ходьбы, холоднаго воздуха. Грѣзы, ночное без-

покойство; отъ лежанія на спи-нѣ легче.

Phosphor. — 2.

Главное средство при *судорожныхъ* формахъ, въ особен-ности при судорогахъ въ гор-танной щели, но также очень дѣйствительно при органиче-скомъ недугѣ, когда существу-ють: расширеніе легкихъ, бугорки, недуги сердца, хрониче-скій катарръ. Симптомы: стѣ-сненіе, удушье, *тоска; ночные припадки удушья*; легкія какъ бы парализованы; *судорожное стягиваніе* груди, *короткій кашель* съ изверженіемъ то соле-ной, то сладковатой мокроты. *Колотье, давленіе, приливъ кро-ви къ груди*.

Pulsatilla — 2.

Дѣтямъ, истерическимъ осо-бамъ, страдающимъ бугорчаткою; главное средство послѣ *невоздер-женности въ пищъ, при вѣтравъ*, страданіи печени, послѣ задер-жанія регуль, послѣ простуды; *ночные приступы* съ короткимъ кашлемъ, *обильной слизью*, осо-бенно *при лежаніи въ положеніи*; чувство напряженія и полноты, *колотье въ груди и бокахъ*; же-лудочные припадки.

Sambucus — 2.

Главное средство при *судорогахъ* (особенно при судорогахъ гортанной щели), при ночныхъ приступахъ: удушья со свистомъ, кошмаромъ, стягиваніемъ груди; *внезапное вскакиваніе во снѣ съ крикомъ*; тоска, дрожь, лицо посинѣвшее и обрюзглое, руки и ноги холодныя и посинѣвшія, *удушливый кашель*, слизистый хрипъ, говорить трудно.

Tartarus stibiatus — 2.

При *страданіяхъ легкихъ* (вода въ легкихъ), *рудной водянкѣ*,

кѣ, *урожающемъ параличъ легкихъ*; расширеніе легкихъ у особъ пожилыхъ; затрудненное дыханіе, съ шумомъ отъ мокроты и *хрипѣемъ*, *удушливый кашель*; *потребность выпрямляться*, стоять смирно.

Veratrum — 2.

При подобныхъ, но болѣе сильныхъ случаяхъ, чѣмъ означенные при *Ires.*, когда удушье, *стягиваніе глотки*, *припадки обморока*, *холодный потъ* или *холодные члены*, *судорожный кашель*, тоска, сердцебиеніе.

Примѣчаніе. Кромѣ этихъ средствъ, можно, смотря по обстоятельствамъ, присовѣтовать множество другихъ. Упомянемъ только:

- а) при чисто *судорожной* формѣ: **Mesch.** (особенно при судорогахъ гортанной щели у дѣтей, когда въ горлѣ ощущаются какъ будто сѣрные пары, дыхательное горло стянуто, подергиваніе въ членахъ, или когда послѣдніе какъ будто сведены), **Argent. n.**, при страданіяхъ спины, **Stram.** (при пораженіи спиннаго мозга или страданіи мозга, паллиативно также при страданіяхъ сердца) и **Ammon, carb.** или **Ignatia**, при не столь сильныхъ припадкахъ нервной одышки, особенно у истерическихъ особъ;
- б) при *констививной* формѣ, особенно въ хроническихъ формахъ болѣзни: **Carb. veg.** (вѣтры, давленіе въ желудкѣ, желудочная кислота, полнокровіе живота, посинѣвшее лицо, внезапное ослабленіе съ дрожью и дурнотою); **Sulphur.** (геморрой, засореніе и утолщеніе органовъ живота); **Lycop.** (при страданіяхъ желудка);
- в) при *органической* формѣ: **Lobel.** (недуги легкихъ, особенно бугорки, расширеніе легкихъ, хроническіе недуги слизистыхъ

оболочекъ: гортани, дыхательнаго горла и легкихъ); **Digitalin.**, при сердцебиеніи съ расширеніемъ венъ, головной болью, послѣ чрезмѣрнаго раздраженія половыхъ органовъ; **Aurum**, при усложненіи болѣзнями сердца. — Въ послѣднее время стали въ этихъ случаяхъ, по примѣру индѣйцевъ, рекомендовать **Coca**.

Само собою разумѣется, что для радикальнаго излѣченія болѣзни, надо обращать вниманіе на лежащія въ ея основанія недуги.

Новѣйшія средства: *Arum triph.*, *Baptis.*, *Eupat. perfor.*, *Silph. lacin.* (стѣсн. дыхан., точныхъ опредѣленій нѣтъ); какъ средство противъ судорогъ гортанной щели хвалять **Gelsem.** (вдыхаешь долго, съ крупознымъ звукомъ, а выдыхаешь, напротивъ того, быстро и сильно).

Что касается до *пріемовъ*, то во время самыхъ приступовъ надо давать лѣкарства въ сильныхъ дозахъ, по нѣскольку капель или щепотокъ каждый часъ или каждые полчаса, смотря по обстоятельствамъ. Для радикальнаго же излѣченія необходимы рѣдкія дозы, даже съ промежутками въ нѣсколько дней. — Отъ виѣшнихъ раздражающихъ средствъ, какъ-то горчичниковъ, ножныхъ ваннъ, я не видалъ большой пользы; наплативное облегченіе даетъ, пожалуй, еще „*rapier nitré*“, отъ вдыханія дыма, образующагося при его сжиганіи. Аллопаты предписываютъ куреніе сигаръ изъ листьевъ *страмоніума*, что также часто облегчаетъ. Воздухъ и освобожденіе отъ стѣснительнаго платья суть важнѣйшія средства для сокращенія припадка, а при вѣтрахъ такимъ средствомъ служить еще клистиръ изъ холодной воды.

Б. БОЛѢЗНИ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО АППАРАТА.

а. Болѣзни органовъ жеванія и глотанія.

65. Гнилость рта, *stomacace*; водяной ракъ, *nota*.

Гнилость рта есть собственно воспаленіе слизистой оболочки рта или слѣдствіе гниlostнаго разложенія ея при цынгѣ, гнилыхъ зубахъ и осадкѣ на нихъ виннаго камня, а также является

послѣ злоупотребленія ртутью, послѣ отравленія свинцомъ, послѣ сифилиса и дифтерита. Особенная, встрѣчающаяся довольно рѣдко форма гнилости рта есть такъ называемый водяной ракъ или, вѣрнѣе, антоновъ огонь щеки, встрѣчающійся особенно у дѣтей; начинается онъ обыкновенно отъ угла рта и затѣмъ распространяется все дальше, проѣдая щеку; состояніе весьма опасное, иногда сопровождающее и другія болѣзни. Вотъ симптомы гнилости рта: слизистая оболочка губъ, десенъ, языка, внутренность рта, опухаютъ, краснѣютъ, горятъ, легко выдѣляютъ кровь; изо рта зловоніе; образуются нарывы, губчатые наросты, отдѣляется вязкая слизь, отърывается слюноотеченіе, расшатываются зубы, опухаютъ шейныя желѣзы. При воспаленіи бываютъ также способныя свертываться выпоты (экссудаты) и антоновъ огонь.

Лѣченіе:

Вогак 2.: образованіе нарывовъ, молочница во рту и на языкѣ, скопленіе слизи; особенно дѣтямъ (также наружно, въ видѣ раствора изъ 5-ти грановъ буры на 2 драхмы воды, намазывать кисточкой).

Mercur. 3.: нарывы съ сильной болью, кровотеченіе изъ десенъ, опуханіе десенъ и губъ; пораженіе слюнныхъ желѣзъ; нечистота языка, опухоли щекъ, зловоніе изо рта.

Muriaticum acidum 2.: при болѣе глубокихъ нарывахъ, сильной боли; при общей порчи соковъ.

Nitri acidum 3.: дѣйствуетъ сильнѣе предыдущаго средства и особенно хорошо послѣ злоупотребленія ртутью.

Staphysagria 3.: десны легко выдѣляютъ кровь, блѣдны, отстаютъ отъ зубовъ; образованіе узловъ, губчатые наросты, зубы расшатываются и гниютъ, колющая боль въ языкѣ. Дурной видъ пациентовъ. Опухоль шейныхъ желѣзъ.

Кромѣ того, при воспаленіи можно рекомендовать *Hellebor. 2.* и, послѣ *Merc.*, особенно *Kali. iod.* (1. разж.). **Ars. 6.** полезно при антоновомъ огнѣ. *Spir. nitr. dulc. O.*, когда гнилость есть слѣдствіе излишняго употребленія соленой пици. Въ хроническихъ случаяхъ важно также *Kali bichromicum.*

Полосканія служатъ скорѣе къ очищенію, чѣмъ къ излѣченію. Изъ нихъ самыя простыя, не лѣкарственные, вмѣстѣ съ тѣмъ и

лучшія, какъ напр. теплая вода, настой чая. Другія полосканія, какъ напр. шалфей, квасцы, часто возбуждаютъ даже боль.

66. Молочница,

aphthae.

Эта болѣзнь грудныхъ младенцевъ происходитъ отъ образованія кислотъ (вслѣдствіе кормленія рожкомъ, дурной пици и т. п.) или неопрятности. Она заразительна, потому что состоитъ изъ удобо-переносимой плѣсени (грибочковъ). Последняя представляетъ пленкообразное вещество, которое съ теченіемъ времени образуетъ узлы, отдѣльные круги, пузырьки или пятна, нарывы и кору. Она имѣетъ перловый, желтоватый или молочный цвѣтъ, который позднѣе переходитъ въ черноватый или буроватый. Молочница иногда проходитъ чрезъ всю слизистую оболочку, начиная ото рта и кончая заднимъ проходомъ, на внѣшнемъ краю котораго появляется тогда та же бѣлая матерія.

Здѣсь лучшими средствами служатъ, въ болѣе легкихъ случаяхъ: **Vorax 2.** (употребляется также наружно, для полосканія, а 1-ое растираніе ваточкой накладываютъ на пораженныя мѣста) и **Merc. 5—3.**, черезъ каждыя 4 часа по приему, когда притомъ лихорадка, безпокойство, катарръ желудка, поносъ, особенно зеленоватаго цвѣта, образованіе нарывовъ послѣ исчезновенія молочницы. Только вслучаѣ признаковъ общей порчи соковъ слѣдуетъ прибѣгнуть къ **Acidum muriaticum** или къ еще болѣе сильному средству — **Acidum sulphuricum 2.** Само собою разумѣется, что вмѣстѣ съ тѣмъ необходимы чрезвычайная опрятность и сообразованіе съ причинами, подавшими поводъ къ болѣзни. Для того чтобы груди кормилицы не заразились молочницей, нужно ихъ обмывать каждый разъ послѣ отнятія ребенка отъ груди. Если, не смотря на то, на нихъ появится молочница, то обмывать ихъ бурой (1 часть буры растворить въ 3 частяхъ воды).

Образованіе молочницы бываетъ часто симптомомъ болѣе серьезной изнурительной болѣзни и въ такомъ случаѣ служитъ дурнымъ предзнаменованіемъ. Лѣченіе сообразуется тогда съ главнымъ недугомъ. Противъ этого рода молочницы можно съ успѣхомъ употреблять *Acid. sulphur. 2.*

Противъ разсмѣрѣнныхъ нами послѣднихъ болѣзней (гнил. рта, молоч.) въ новѣйшее время стали рекомендовать слѣдующія средства: *Agave americana*, *Arum. triph.* (противъ самыхъ злокачественныхъ формъ), *Corn. circin.* (съ молочницей, у дѣтей). *Eupat. aromat.* (съ молочницей), *Hydrast.* (цынга съ большой слабостью), **Iris. vers.** (жженіе во рту и глоткѣ, причѣмъ иногда образуются нарывы), **Podophyll. pelt.**

67. Дурной запахъ изо рта,

halitus foetidus.

Зависеть отъ различныхъ причинъ. Если причина — гнилые зубы, то надо ихъ лѣчить внутренними и наружными средствами и пломбой предохранить отъ остатковъ пищи. Часто виноваты въ запахѣ гниющіе остатки пищи, поэтому необходимо содержать зубы въ чистотѣ и чистить ихъ веществами не острыми и не лѣкарственными, какъ напр. разжиженнымъ виннымъ спиртомъ или бѣлымъ гомеопатическимъ зубнымъ порошкомъ.

При недугахъ желудка, когда запахъ временный, зависящій отъ разстройства желудка — **Nux vom.** (запахъ по утрамъ), или **Puls.**; вслучаѣ продолжительнаго разстройства пищеваренія — **Carb. veget. 3.** (оказало мнѣ очень хорошія услуги), **Chin. 3.**, **Sulph. 3.** или **Sep. 3.**

При сифилитическихъ и золотушныхъ нарывахъ въ зѣвѣ и горлѣ: **Merc. sol. 3.**, **Aurum mur. 3.**

Послѣ злоупотребленія ртутью: **Aurum 3.**, **Jod. 3.**, **Nitri ac. 3.**

Примѣч. Точно также *Mang.* (пахнетъ какъ бы землей), *Kali carb.* (какъ бы старымъ сыромъ), *Petr.* (— чеснокомъ), *Herp.* (какъ при испорченномъ желудкѣ), — лѣкарства, которыми не слѣдуетъ пренебрегать.

68. Воспаленіе языка,

glossitis.

Воспаленіе языка или происходитъ самостоятельно, отъ ѣдкихъ или слишкомъ горячихъ веществъ, отъ укуса зубами и т. п.,

или же оно вызывается болѣзнями нѣба, зѣва, полости рта, дѣл-теритомъ и т. д.

Aconit. 2.: лихорадка, жаръ; колющая боль.

Arnica 2.: отъ механическихъ поврежденій, прищемленія, пораненія при жеваніи; при болѣе сильныхъ явленіяхъ отъ тѣхъ же причинъ — **Conium 3.**

Belladonna 2.: рожевидное или исходящее изъ зѣва воспаленіе.

Cantharis 3.: разрушеніе слизистой оболочки; много пузырьковъ; *жгучія* боли. — Нагноеніе.

Mercur. 3.: воспаленіе, распространяющееся болѣе вглубь, пораженіе слизистой оболочки; склонность къ нагноенію, образованію нарывовъ, кровотеченію.

Въ хроническихъ случаяхъ: **Sulphur 3.**

При остающейся затвердѣлости: *Aurum mur.* или *Jod.*

69. Опухоль языка, *tumor linguae.*

Arnica, Hepar, Merc., въ легкыхъ механическихъ или воспалительныхъ случаяхъ; *Con., Arsen., Mezer., Sulph. Thuja,* въ случаяхъ болѣе серьезныхъ, основанныхъ на порчѣ соковъ (ракъ и т. п.).

70. Нарывы на языкѣ, *ulcera linguae.*

Они происходятъ или отъ развитія въ желудкѣ кислотъ, или отъ катарра желудка, или отъ слишкомъ острыхъ зубовъ, или отъ старческой слабости, или, наконецъ, отъ такихъ же причинъ, какъ и гнилость рта. Важнѣе всѣхъ нарывы ракообразные. При коклюшѣ бываютъ нарывы подъ языкомъ, которые одни объясняютъ внутренними причинами, другіе укусами во время припадковъ. Лучшія средства противъ болѣе легкихъ формъ: **Merc.** (острая форма), **Mur. acid., Nitr. acid.** (хронически-воспалительная форма); противъ упорныхъ, основанныхъ на порчѣ соковъ случаевъ: **Arsen., Con., Silic.**

Сравнить: гнилость рта, молочница.

71. Параличъ или неповоротливость языка,
paralysis linguae.

Обнаруживается при жеваніи или разговорѣ и бываетъ большею частью симптомомъ паралича мозга, удара, рѣже — изолированного паралича самихъ нервовъ языка. Рекомендуемъ: **Arn.**, **Anac.**, **Arsen.**, **Caust.**, **Stram.** — Сравнить, кромѣ того, параличъ.

72. Слюнотеченіе,
salivatio или *ptyalismus.*

Лѣченіе различно, смотря по причинамъ и мѣсту, которое поражено недугомъ. При болѣзняхъ слизистой оболочки рта, зубовъ, слюнныхъ желѣзъ: **Bell.**, а въ болѣе серьезныхъ случаяхъ: **Merc.**; въ хроническихъ случаяхъ: **Sulph.** или **Alum.**; при недугахъ желудка, поджелудочной желѣзы: **Baryt. c.**, **Brom.** или **Jod.**, **Kali chlor.**, **Merc.**, **Natr. mur.**, **Sulphur. ac.**; послѣ злоупотребленія ртутью: **Jod.** и **Nitr. ac.** Въ соединеніи съ ревматизмомъ: **Colch.** Если причиною: крупъ, судороги въ глоткѣ, опухоль языка, страданія нервовъ, параличъ рта и глотки, то надо дѣйствовать противъ этихъ болѣзней.

Въ новѣйшее время рекомендуютъ противъ страданія поджелудочной желѣзы **Iris** и **Podoph.** Эти средства вызываютъ также слюнотеченіе.

73. Зубная боль,
odontalgia.

Смотря по различнымъ причинамъ, лежащимъ въ основаніи этой боли, лѣченіе бываетъ различно. А именно бываютъ:

- 1) Чисто нервная зубная боль, вслѣдствіе душевныхъ потрясеній, возбужденій разнаго рода, у истерическихъ особъ, во время мѣсячнаго очищенія, въ періодъ развитія.
- 2) Конгестивная или воспалительная зубная боль, вслѣдствіе прилива крови, отъ задержанія менструацій и геморроидальнаго истеченія, у беременныхъ, родильницъ,

кормящихъ грудью, въ томъ возрастѣ, когда прекращаются регулы, отъ спиртныхъ напитковъ, вслѣдствіе недуговъ нижней части живота и приливовъ крови къ головѣ. Воспалительная боль обусловливается большею частью поражениемъ надкостной плевы зубовъ и т. п.

- 3) Ревматическая или ломотная зубная боль; первая обнаруживается болѣе въ деснахъ, мускулахъ и нервахъ; ломотная имѣетъ мѣстопробываніемъ надкостную плеву (періостъ) зубнаго корня или кости челюстей и бываетъ самую упорную.
- 4) Зубныя боли, основывающіяся на органическомъ измѣненіи (особенно на болѣзняхъ костей, костоѣдѣ [при гнилыхъ зубахъ]).

При болѣе точномъ изслѣдованіи причинъ боли и сопровождающихъ ее обстоятельствъ яснѣе обрисовуется:

- 1) Характеръ ея. Кромѣ того, при выборѣ лѣкарства надо обращать вниманіе на:
- 2) Родъ боли;
- 3) Состояніе зуба, десенъ, щекъ;
- 4) Вліяніе тепла и холода, ѣды и питья, покоя и движенія, комнатнаго и открытаго воздуха, прикосновенія къ зубу, времени дня;
- 5) Сопровождающіе боль симптомы: безпокойство, лихорадку, головную боль и т. д.

Изъ числа многихъ средствъ противъ зубной боли, благодаря которымъ гомеопатія приобрѣла себѣ такое множество друзей, всего чаще употребляются: **Bell., Bryon., Cham., Merc., Nux vom., Puls., Rhus tox.** Для большинства острыхъ случаевъ ихъ будетъ достаточно; въ хроническихъ же нужны другія лѣкарства; иногда, по роду боли, также и въ острыхъ случаяхъ.

Смотря по характеру надо употреблять преимущественно:

- 1) при чисто нервной зубной боли: **Nux vom., Rhus**, рѣже *Ignat., Spigel.*;
- 2) при конгестивной: **Bellad.**, затѣмъ **Bryon., Cham., Chin., Merc., Nux vom., Puls.**; — при воспалительной:

Bellad., Merc.; а въ хроническихъ случаяхъ такого рода: **Sulph.;**

- 3) при ревматической и ломотной зубной боли: **Bryon., Cham., Merc., Nux vom., Puls., Rhus., Spigel., Sulph.;**
— также: *Magn. carb., Staphys.;*
- 4) при каріозной (отъ гнилыхъ зубовъ): **Ars., Merc., Bryon., China, Magn. carb., Staphys., Sulph.**

Надо имѣть въ виду еще слѣдующія указанія:

Родъ боли: біеніе — преимущественно **Bellad., Chin., Sulph.;** давленіе — **Bryon., Nux vom.;** потягиваніе и ломъ — **Cham., Rhus.;** схватывающая и рожущая боль — **Ignat.;** подергиваніе — **Merc., Spigel.;** сверленіе — **Magn. carb., Mezer.;** колюще — **Puls.;** ѣдкая боль — **Staphysagr.**

При поражениі десенъ: **Bellad., Merc., Staphys., Nux vom., Puls., Rhus.**

При опухоли щекъ: **Bellad., Cham., Merc., Nux vom., Puls., Staphys.**

При расшатавшихся зубахъ: **Bryon., Merc., Nux vom., Rhus.;** — когда зубы кажутся слишкомъ длинными: **Bryon.**

Когда хуже утромъ: **Nux vom.;** — вечеромъ: **Bellad., Merc., Puls., Rhus., Sulph.;** — ночью: **Bellad., Cham. Merc., Puls., Rhus., Staphys., Sulph.**

Когда хуже отъ постельной теплоты: **Cham., Magn. carb., Merc., Puls., Spig.;**

отъ теплоты вообще: **Cham., Magn. carb.;**

отъ холоднаго воздуха: **Nux vom.;**

отъ холоднаго питья (признакъ гнилыхъ зубовъ): **Bryon., Cham., Merc., Nux vom., Rhus tox., Spigel.;**

отъ теплаго питья и ѣды: **Bryon., Cham., Merc., Puls., Sulph.**

отъ ѣды вообще: **Bryon., Bellad., Cham., Magn. carb., Merc., Nux vom., Puls.;**

отъ умственныхъ занятій: **Nux vom., Bellad., Ign.;**

отъ кофе и спиртныхъ напитковъ: **Nux vom., Bellad., Cham., Merc.;**

отъ движенія: **Bryon.**, *Bell.*, *Chin.*, *Nux vom.*, *Spig.*;

отъ покоя (сидѣнія, лежанія): **Puls.**, **Rhus tox.**, *Ignat.*;

отъ ковырнанья въ зубахъ: **Puls.**;

отъ прикосновенія къ зубамъ: **Bryon.**, *Chin.* **Merc.**

Когда лучше отъ холоднаго воздуха, на открытомъ
воздухѣ: **Puls.**;

отъ холоднаго питья: **Bell.**, **Puls.**, *Bryon.*;

отъ тепла: **Rhus.**;

отъ ходьбы: **Puls.**, **Rhus.**;

отъ покоя: **Bryon.**, *Spigel.*, *Staph.*;

отъ сидѣнія въ постели: **Merc.**

отъ куренія табаку: *Merc.* *Spigel.*;

въ комнатѣ: *Nux vom.*, *Staphys.*;

отъ сна: *Nux vom.*, *Puls.*

отъ ѣды: *Rhodod.*

Теперь слѣдуетъ слѣдующія главные средства въ отдѣльности.

Belladonna — 3.

Коместивная и воспалительная зубная боль, тянущая, сильная, *роющая*, иногда сверлящая, *подергивающая*, *бьющая*, ночью хуже, *отъ холодной воды* и покоя *легче*. Съ приливомъ крови къ головѣ, биеніемъ жилъ, краснотой щекъ и *рожевидной опухолью*. Ознобъ и жаръ, жажда; воспаление десенъ. Хуже отъ ѣды, жеванія, движенія.

Bryonia — 2.

Органическая и ревматическая, рѣже *коместивная* и *воспалительная* причина. Тянущая боль, *подергиваніе*, ломъ, *стрѣльба*, *давленіе какъ-бы отъ зажиманія*, какъ будто къ об-

наженному нерву прикасается холодный воздухъ. Большой зубъ *кажется слишкомъ длиннымъ*. Направленіе боли какъ будто сверху внизъ. Отъ прикосновенія къ больному зубу боль часто переходитъ на другой. Боль ночью усиливается. Отъ холода большею частью лучше или, по крайней мѣрѣ, не хуже. Вишняя теплота рѣдко переносится больнымъ. Отъ комнатной теплоты, движенія, боль не всегда усиливается, отъ ѣды же и особенно *отъ жеванья* — *всегда* (характеристическій симптомъ). Лежаніе на больной сторонѣ облегчаетъ боль; лежаніе на здоровой сторонѣ *вызываетъ* боль или усиливаетъ ее.

Однѣ или нѣсколько зубовъ *инимы*; десны красны или блѣдно-красны, *опухли*, болятъ, какъ будто ссаднены. Иногда боль щекъ и десенъ преобладаетъ надъ зубною, и тогда полезно также:

Chamomilla — 2.

Главное средство при *ревматическомъ* и *конгестивномъ* характерѣ. *Давленіе*. Тянущая боль и колотье, скользящая боль и ной въ нервѣ, біеніе, большею частью въ одной сторонѣ, сильнѣйшее подергиваніе. *Ломъ* — трудно *опредѣлить* въ какомъ именно зубѣ — *простирающійся* до уха, *наступающій* *припадками*, особенно ночью. Отъ кофе хуже. *Холодное и теплое невыносимо*, особенно *теплымъ перинами*. *Щеки опухли* (или склонны къ тому), красны, горять; жажда; слюнотеченіе, *сильное безпокойство*, сильная раздражительность, слезливость, сварливость. — Особенно хорошо для женщинъ и дѣтей.

China — 2.

Конгестивный и *органическій* недугъ. Острая и хрон. зубная боль *бьющаго* свойства, съ приливомъ крови къ головѣ, особенно *когда она наступаетъ періодически*, въ *опредѣленные*

сроки. Врачъ можетъ замѣтить біеніе при изслѣдованіи. *Ночью* хуже. *Чувствительность* къ *прикосновенію*, *открытому воздуху* и *сквозному вѣтру*. Теплое переносится лучше холоднаго. Кофе не имѣетъ никакого вліянія на боль. *Наружное тепло облучаетъ*. *Отъ горизонтальнаго положенія* хуже.

Magnesia carbonica — 3.

Каріозная (при гнилыхъ зубахъ) боль, съ воспаленіемъ надкостной плевы или безъ него. *Ночью сверлящая* боль, ломъ, подергиваніе, боль какъ бы отъ нарыва, *невыносимая во время покоя и лежанія въ постели*. Съ опухолью щекъ и десенъ. (Часто когда *Merc.* не помогаетъ).

Mercurius — 3.

Каріозная, ревматическая, конгестивная, воспалительная *зубная* боль, съ *подергиваніемъ* и *ломомъ* во многихъ зубахъ, особенно въ *корняхъ*; сильное колотье. *Подергиваніе*, похожее на пульсацію. Боль — какъ будто бы въ *больной зубъ* проникаетъ что-нибудь очень теплое или холодное. Также *сверлящая* боль (боль иногда быстро *измѣняется*). *Ночью* хуже, *днемъ* боль однообразна. *Холодное*

не слишкомъ усиливаетъ боль, но во всякомъ случаѣ не выносятся пациентомъ. Отъ тепла хуже. *Отъ открытаго, холоднаго воздуха, сквознаго вѣтра, простуды, пды* также хуже. Наружное тепло иногда на минуту облегчаетъ боль, а потомъ усиливаетъ ее. *Постоянная потребность мнять положеніе. Зубы болшею частью шимы* (этотъ признакъ не всегда необходимъ). *Десны опухли*, чувствительны, блѣдно- или темно-краснаго цвѣта, покрыты нарывами, разрыхлены, легко источаютъ кровь, причеиъ зубы шатаются. *Сильное смонотеченіе*. Ночью безпокойство и *потъ безъ облегченія*, опухоль щеки съ лихорадкою, опухоль желѣзъ. (Сравнительно съ другими средствами помогаетъ чаще всего).

Nux vomica — 3.

Конестивная, ревматическая или нервная зубная боль; подериваніе, давленіе съ стрѣльбою, боль начинается съ этого или кончается этимъ, ломъ съ подериваніемъ, сверлящая и роящая боль отъ зубовъ до ушей, лицевыхъ костей, головы; бѣненіе въ тактъ съ пульсомъ. Во всякое время дня, *особенно рано утромъ*, иногда только ночью. Теплое питье не имѣетъ на боль

никакого вліянія. Отъ умственнаго напряженія, *кофе, спиртныхъ напитковъ* хуже. *Характеристично, что боль особенно усиливается отъ вдыханія холоднаго воздуха*. — Наружная теплота, покой облегчаютъ. Десны опухли; иногда нѣтъ. При холерическомъ темпераментѣ, для любителей кофе и вина, ведущихъ сидячій образъ жизни, страдающихъ геморроемъ. (Притомъ запоръ.)

Pulsatilla — 2.

Конестивная, ревматическая, рѣже нервная зубная боль. Стрѣльба. Стрѣльба съ сверленіемъ; ломъ, бѣненіе, подериваніе, какъ будто зубной нервъ то натягиваютъ, то отпускаютъ. Боль распространяется на цѣлую половину верхней или нижней челюсти, и никогда нельзя указать на опредѣленный зубъ. Хуже *вечеромъ и ночью*, отъ комнатной и постельной теплоты, теплой пищи и питья, *коваряннія въ зубахъ. Лучше отъ холодной воды*, укуса и сна. Характеристическій симптомъ: *лежи на открытомъ воздухѣ*, усиленіе боли при возвращеніи въ комнату. Притомъ: *полусторонняя головная боль, стрѣльба въ ушахъ*, боль и блѣдность лица, *ознобъ*. (Болшею частью

безъ опухоли щекъ.) При замедленіи регулъ въ періодъ возмужанія, при дѣвичьей немочи, беременности. У блѣдныхъ, слезливыхъ особъ.

Rhus — 2.

Главнымъ образомъ *ревматическая* и, рѣже, *нервная* зубная боль. *Тянущая, давящая* боль, *ломъ, подергиваніе*, сопровождаемое колотьемъ, рѣдко одно только колотье въ зубахъ и въ лицѣ. *Ощущеніе ссадинъ*, рѣжущее, ѣдкое, какъ бы отъ соли; роющая и скребущая боль. Чувство, будто расшатываются зубы. Дѣйствительное удлинненіе зубовъ. Слюнотеченіе. Отъ теплаго и холоднаго часто бываетъ хуже. Вечеромъ и ночью боль всегда сильнѣе. Характеристическіе признаки: *наружная теплота облегчаетъ*, по крайней мѣрѣ, переносится (только не постельное тепло), между тѣмъ какъ *покой усиливаетъ* боль. Только подергиваніе останавливается отъ наложенія на больную щеку холодной руки. Отъ движенія легче, по крайней мѣрѣ, въ стоячемъ положеніи легче, чѣмъ въ лежачемъ. Какъ при здоровыхъ, такъ и при гнилыхъ зубахъ. (Если зубы здоровы, то *Rhus* часто помогаетъ,

когда *Nix vom.* оказывается недостаточнымъ).

Spigelia — 2.

Нервная или *ревматическая* зубная боль. Болитъ не одинъ зубъ, а нѣсколько, преимущественно передніе. *Тянущая боль, ломъ, подергиваніе*, молниеобразная боль или биеніе до верхней челюсти и *лица*, болѣе днемъ, *непосредственно послѣ ѣды*. Отъ холодной воды, сильной жары, ѣды, воздуха хуже. Отъ покоя и теплоты средней температуры легче. Зубы гнилы. (Сверхъ того *лицная боль*, сердцебиеніе, судороги истерическаго характера, ознобъ.)

Staphysagria — 2.

Преимущественно при *гнилыхъ* зубахъ, рѣже противъ *нервной* и *ревматической* зубной боли. *Ѣдкая, тянущая*, похожая на *ломъ* боль, усиливающаяся отъ *прикосновенія*. Отъ холоднаго, жеванія и особенно *когда въ зубы попадаетъ пища* (боль немедленно), *отъ воздуха*. Теплота облегчаетъ. Боль даже до корней. Зубы *поны*, *заостряются, крошатся, чернѣютъ*. Десны *чувствительны, опухли*; съ узлами, *легко источаютъ кровь*, съ разнаго рода наростами. (Боль исходитъ болѣе изъ гнилыхъ зубовъ, распространяется до уха; легкое

прикосновеніе усиливаетъ боль, а сильное давленіе иногда облегчаетъ ее.)

Sulphur — 3.

Органическія, ревматическія, ломотная или коместивныя причины, частое повтореніе припадковъ. *Рветъ, колетъ, бьетъ, сверлитъ, тянетъ*, преимущественно вечеромъ и ночью. Отъ

тепла, жеванія, открытаго воздуха, холода хуже. Зубы *тилы*, тупы, какъ бы слишкомъ длинны, распатались. Десны источаютъ кровь, *опухаютъ*, становятся губчатыми, чувствительными. Челюсть болитъ. (Съ хроническимъ приливомъ крови къ головѣ, страданіями нижней части живота и лица.)

Примѣчаніе. Такъ какъ при разнообразіи зубныхъ болей этихъ лѣкарствъ не всегда достаточно, то я хочу здѣсь указать еще нѣкоторые другія:

- 1) При *нервныхъ* зубныхъ боляхъ, кромѣ **Ignat.**, когда боль періодически схватываетъ и роетъ, какъ будто бы зубы вмѣстѣ съ ихъ нервами разрушаются и растираются: **Platina** (бьющая и роющая боль), **Opium**, **Phosphor.**
- 2) При *коместивной* зубной боли: **Acon.** (при всеобщемъ лихорадочномъ возбужденіи); **Nitr. ac.** (часто возвращающіяся зубныя боли, съ сверленіемъ и біеніемъ, опухолью десенъ, признаками хроническаго воспаления); **Sepia** (въ соединеніи съ мигренью, разстройствомъ менструацій, ломотью, біеніемъ; колотье, приливы крови, ночью хуже, точно также отъ движенія рта, отъ всего холоднаго, отъ открытаго воздуха, при входѣ со двора въ комнату; когда зубы быстро гниютъ).
- 3) При *ревматической* и *ломотной* зубной боли: **Colchic.** (колетъ, рветъ, щемитъ; расслабленіе суставовъ челюстей; отъ жеванія боль увеличивается); **Rhodod.** (боль въ весеннее и осеннее время, всегда возвращается при восточномъ вѣтрѣ; сверленіе какъ бы винтомъ, съ стрѣльбой до ушей); **Sabina** (стукъ во всей головѣ, какъ будто что-то вышираетъ зубъ); **Silic.** (ломитъ, тянетъ, подергиваетъ, сверлитъ).
- 4) При *тилыхъ* зубахъ: **Arsen.** (боль, доводящая до отчаянія и заставляющая бѣгать взадъ и впередъ, сердцебіеніе,

по ночамъ, особенно тотчасъ послѣ того, какъ ляжешь спать, или передъ полуночью, расшатывать зубъ — больно, лежанье на больной сторонѣ усиливаетъ боль, тепло облегчаетъ ее; щека не опухаетъ!); **Mezer.** (сильный зудъ, колотье, *непродическое сверленіе*, ознобъ, горячая голова, сильное безпокойство, дурное расположеніе духа, чрезмѣрная чувствительность внѣшнихъ частей головы, тянущая и колющая боль, простирающаяся до лицевыхъ костей и висковъ); **Silie.** (противъ страданія челюстей).

Послѣ зубныхъ операцій, при боли, опухоли и т. п., хорошимъ внутреннимъ и наружнымъ средствомъ служить *Arnica*.

При ревматической и нервной боляхъ помогаетъ также *магнетизмъ*, когда сильно рветъ, колеть, жаръ припадками, кажется, что зубы выдергиваются, тянущая, давящая, роющая боль, зудъ; опухоль щеки, ознобъ, чрезмѣрное раздраженіе нервовъ; когда отъ прикосновенія, ѣды и отъ тепла хуже, а отъ открытаго воздуха лучше. Иногда онъ помогаетъ и въ другихъ родахъ боли.

Отъ *зубной боли во время беременности* помогаютъ, смотря по указаннымъ выше симптомамъ: **Bellad., Bryon., Mez., Puls.,** а при частомъ возобновленіи боли: **Sepia.**

Противъ зубной боли во время кормленія ребенка грудью полезны: *Bellad., Calc. c., Chin., Merc., Nux vom., Sep., Sulph.*

Во время *регуль*: *Cham., Calc. c., Puls., Sep.* и др.

Новѣйшія средства: противъ ревмат. и нервной зубной боли — *Gelsem.*, дѣйствующее въ ревмат. случаяхъ подобно *Merc.*; *Phytol.* — при головной боли и колотѣ въ верхней челюсти; на открытомъ воздухѣ: *Rum. crisp.*

Пріемъ. Не надо давать лѣкарствъ часто и въ большихъ дозахъ, къ чему располагаетъ иногда сила боли. Даже въ острыхъ случаяхъ большею частью слѣдуетъ давать лѣкарство черезъ 2—3 часа.

74. Зубная больница дѣтей, трудное прорѣзываніе зубовъ, *dentitio difficilis.*

Многіе недуги дѣтей совершенно ошибочно приписываются прорѣзыванію зубовъ. Полагая, что прорѣзываніе зубовъ требуетъ

времени и вызывает болѣзни, которыхъ, по законамъ природы и вслѣдствіе невозможности устранить причины ихъ, остановить нельзя, предоставляютъ иногда разнымъ мѣстнымъ и общимъ болѣзнямъ развиться до опасныхъ размѣровъ, какъ напр. воспаленію легкихъ, болѣзни мозга, размягченію желудка, катарру желудка и кишекъ, сухоткѣ желѣзъ и т. п. Съ другой стороны справедливо и то, что при прорѣзываніи зубовъ нормальные процессы переходятъ въ болѣзненные, такъ что ротъ, зубы, десны, челюсти, начинаютъ болѣть, а также и другіе органы, по закону сочувствія и вслѣдствіе возбужденія, сопряженнаго съ отложеніемъ костянаго вещества. Гомеопатія и въ настоящемъ случаѣ, какъ вообще при лѣченіи всѣхъ дѣтскихъ болѣзней, является въ самомъ блестящемъ свѣтѣ. Надо принимать въ соображеніе:

- 1) Зубную боль. Здѣсь особенно полезны: **Cham. 3.** (каждый часъ по 2 капли), при сильномъ безпокойствѣ, возбужденномъ состояніи съ крикомъ, особенно ночью; **Merc. sol. 3.** (каждые 3—4 часа), когда десны воспалены, ротъ очень горячъ, сухъ, или при слюпотеченіи, скрежетѣ и т. п. Если недугъ принимаетъ хроническій характеръ и прорѣзываніе зубовъ затягивается по причинѣ золотушнаго сложенія, то помогаетъ **Calc. c. 3.** (утромъ и вечеромъ). — См., кромѣ того, зубную боль.
- 2) Судорожное возбужденіе нервной системы въ соединеніи съ бессонницей: **Cham. 3.** или, еще лучше, **Coffea. 2.** (1—2 раза въ день); при легкомъ подергиваніи, пугливости: **Ignat. 3.**, въ болѣе серьезныхъ случаяхъ: **Opium. 3.**; при настоящихъ конвульсіяхъ, столбнякѣ: **Zinc. 2.** (3—2 часа, по приему на кончикѣ ножика) или даже **Mosch.** (1 разжиж., отъ 2 до 3 кап. черезъ 2 часа). (Сравни. судороги.) (Надо обратить вниманіе на то, не происходятъ ли нервное возбужденіе и его послѣдствія [безпокойство, судороги и т. п.] отъ волненія крови, отъ прилива крови къ мозгу и т. д., ибо въ такомъ случаѣ сюда относится слѣдующее):
- 3) Приливъ крови, особенно къ мозгу, а также всѣ лихорадочныя явленія быстро устраняются посредствомъ **Acon. 2.**, **Bell. 3.**; первое болѣе при лихорадкѣ, катар-

рѣ, кашлѣ, дыханіи со вздохами, позывѣ къ мочѣ, отсутствіи аппетита, безпокойствѣ, быстромъ пульсѣ, сухомъ жарѣ или коченѣннн окончностей; послѣднее — когда преобладаетъ приливъ крови къ мозгу, при біеніи головныхъ жилъ, жарѣ въ лицѣ, дрожи, конвульсіяхъ, разширеніи зрачковъ, неподвижности взгляда, векакиваніи во снѣ. Оба средства (черезъ 3—2 часа по 3 капли) иногда дѣйствуютъ истинно волшебнымъ образомъ и устраняютъ недуги въ самое короткое время.

- 4) Болѣзненное состояніе кишечнаго канала, съ образованіемъ кислотъ и поносомъ, устраняется посредствомъ **Cham. 3.** (съ коликами), **Ipec. 3.** (со рвотою), **Merc. 5.** или 3. растир. (зеленыя, слизистыя испражненія), **Puls. 3.** (желтыя, какъ бы рубленныя), **Rheum. 2.** (кислаго запаха, бѣлыя, слизистыя испражненія), — въ хроническихъ случаяхъ: **Calc. acet. 5.—3.** (при образованіи кислотъ, вѣтрахъ), **Phosph. ac. 2.** (невольное испражненіе, безъ боли, съ бѣлымъ каломъ), **Veratr. 3.** (разслабляющій поносъ, съ рѣзью, рвотою, холодѣніемъ ногъ), даже **Arsen. 6.,** когда притомъ истощеніе и глубокое разстройство питанія (напр. при хроническомъ воспаленіи кишекъ, нарывахъ, изнуреніи). Сравни золотуху, поносъ и изнурительныя болѣзни.
- 5) Симпатическое (сопровождающее) страданіе кадыка, развѣтлений дыхательнаго горла и проч., обнаруживающееся одышкой: **Ipec. 2.,** въ болѣе серіозныхъ случаяхъ: **Samb. 3** (см. одышку); съ кашлемъ: **Acon. 2.** (лихорадка), **Merc. 3.** (воспалительный кашель), **Spong. 2.** (со свистомъ, крупозный, исходящій болѣе изъ кадыка и дыхательнаго горла); **Bryon. 2.** (кашель сухой, съ охрипlostью, потрясающій, исходящій изъ бронхій, легкихъ), **Cham. 2.** (судорожн. кашель), **Hep. sulph. 3.** (мокротный), **Tart. stib. 2.** (хрипѣніе). Сличить кашель.

Примѣч. Само собою разумѣется, что при этомъ страданіи надо давать лѣкарства только въ случаѣ необходимости и не болѣе какъ по приему черезъ каждыя 3—2 часа.

6. Болѣзни зѣва.

75. Воспаленіе горла,
angina faucium, uvularis, tonsillaris, pharyngea.

Мы различаемъ:

- 1) смотря по пораженной части: воспаленіе неба, и зѣва, язычка, миндалевидныхъ желѣзъ, верхней части гортани. Отъ этого надо отличать воспаленіе и припуханіе внѣшнихъ шейныхъ желѣзъ, которое также случается вслѣдствіе простуды;
- 2) смотря по характеру: простое катарральное (острое и хроническое), воспалительное, съ образованіемъ гноя и безъ него, которое чаще всего поражаетъ миндалевидныя желѣзы, крупозное (крупъ, съ выпотѣніемъ въ зѣвѣ и во рту пленочекъ, похожихъ на сливки или сырѣ). Эпидемическое или зараженное антоновымъ огнемъ воспаленіе горла, связанное со всеобщей порчею крови и въ высшей степени заразительное (дифтеритъ), мы рассматриваемъ, какъ совершенно особенный видъ болѣзни, въ слѣдующей статьѣ.

Общіе симптомы: краснота, опуханіе, покрытіе горла слоемъ слизи, усиленное отдѣленіе слизи и слюны во рту, затрудненіе при глотаніи, разговорѣ и дыханіи, застой крови въ головѣ, различныя болѣзненные ощущенія. Эти недуги часто находятся въ связи съ расстройствомъ желудка, болѣзнями нижней части живота, въ особенности же съ геморроемъ или золотухой, сифилисомъ, и бывають большею частью слѣдствіемъ простуды.

Болѣе подробное описаніе симптомовъ см. при отдѣльныхъ лѣкарствахъ.

Вотъ главныя средства: **Bell., Merc.;** — *Hep. sulph.* Вообще надо замѣтить, что въ началѣ воспаленія горла особенно хороша *Belladonna*; — при разившемся воспаленіи: **Bell., Merc.;** — при нагноеніи и нарывахъ: **Merc.,** а послѣ: **Hepar. s.** или **Sulph.** — Въ хроническихъ или часто повторяющихся случаяхъ: **Baryt., Sulph.**

Лѣченіе. Вотъ симптомы для отдѣльныхъ средствъ при обыкновенномъ воспаленіи горла:

Aconitum — 2.

Полезно только въ началѣ, для устраненія очень сильной лихорадки; почти не дѣйствуетъ противъ мѣстныхъ недуговъ, изъ которыхъ оно излѣчиваетъ только катарральные. Употребляется преимущественно при переходѣ ревматизма на горло, отчего происходитъ точно такіе же симптомы въ горлѣ, хотя и нѣтъ воспаления. Также при усложненіи болѣзни насморкомъ и катаррами гортани и дыхательнаго горла. Совѣтуемъ не останавливаться долго на этомъ средствѣ и перейти къ одному изъ слѣдующихъ.

Baryta carb. — 3.

Болѣе при *хронической* формѣ, при *твердой* опухоли миндалевидныхъ желѣзъ, незначительномъ *припуханіи желѣзъ зѣва*, *легкомъ отдѣленіи слизи*. Ощущеніе ссадинъ, колотье, сухость, давленіе при глотаніи, какъ будто въ горлѣ деревяшка, или какъ будто тамъ много слизи; постоянная жажда.

Belladonna — 2.

Главное средство при *катарральной*, болѣе *рожевидной* и

воспалительной формѣ. Не слишкомъ сильная *краснота нѣба и зѣва*, колющая, жгучая, рыхлая опухоль; *боль при глотаніи, тошнота*, стягиваніе, побужденіе глотать (при пустомъ рту), сухость во рту; опухоль горла, отъ которой больному кажется, что у него въ горлѣ деревяшка, *боль доходитъ до ушей*. Особенно при воспаленіи нѣба и миндалевидныхъ желѣзъ; въ послѣднемъ случаѣ только тогда, когда еще можно предотвратить нагноеніе; поэтому, главнымъ образомъ, въ началѣ.

Hepar sulphuris — 3.

Когда послѣ *Merc.* нарывъ не разрѣшился, есть еще *склонность къ нагноенію*, и въ особенноти если образуется множество маленькихъ нарывовъ одинъ подлѣ другаго, вслѣдствіе чего затягивается выздоровленіе; для способствованія нагноенію, особенно *желѣзъ*; при *воспалительной* и *крупозной* формахъ, когда жгучая и колющая боль, слюнотеченіе, и имѣются симптомы, обозначенные при *Merc.*

Ignatia — 2.

Въ болѣе легкихъ случаяхъ медлительнаго характера безъ

нагноенія, причемъ внутренняя опухоль горла съ ощущеніемъ боли, будто отъ ранъ, при глотаніи, или *колотье* въ горлѣ, когда не глотаешь; при глотаніи чувствуется приятствіе, какъ будто бы отъ косточки. Когда не глотаешь, кажется, что въ горлѣ торчитъ деревяшка.

Lachesis — 6.

При *антоновомъ оянь* или при сильномъ *воспаленіи*. Небо и язычекъ очень опухли, сильное побужденіе къ глотанію, много го слюны во рту, *слизь въ горлѣ*; судороги при питьѣ, *стягиваніе до удушія*. Стѣсненіе дыханія. Отъ прикосновенія боль усиливается. Сѣрая блѣдность лица, симптомы, указывающіе на пораженіе мозга.

Mercurius — 3.

Главное средство при *воспалительной* и *крупозной* формѣ и при *воспаленіи миндалевидныхъ желъзъ*, когда *урожаетъ нагноеніе*. Внутреннія части не только въ сильной степени *красны*, но и сильно *опухли*; говорить и глотать затруднительно. Колотье съ давленіемъ или безъ него. Много слюны и слизи. Характеристическіе симптомы: *наклонность къ нагноенію, жел-*

тыя или *бѣлыя точки на миндалевидныхъ желъзахъ* или даже *нарывъ*; давленіе къ уху, дурной запахъ изо рта (который *воспаленъ* и въ *нарывахъ*), сильное *безпокойство*, потъ безъ облегченія. (Часто бываетъ достаточно одного этого средства, если употреблять его *неослабно*.)

Nux vomica — 3.

Мѣстопробываніе недуга болѣе въ *язычкѣ, зъвъ, глоткѣ* и *гортани*, нежели въ желъзахъ. Не *воспаленіе*, а скорѣе болѣе легкое *катарральное пораженіе*, особенно *царапающая* и *скребущая* боль, ощущеніе *ссадинъ, ощущеніе деревянки въ горлѣ, давящая* боль. Хуже *утромъ* и на *воздухѣ*.

Phosphor. — 3.

Болѣе въ *хроническихъ* формахъ. *Жженіе*, боль какъ отъ *раны*, *скребленіе*, давленіе, ощущеніе *ссадинъ*, *щекотаніе*, *сухость*. Отхаркиваніе *слизью*. Кислая мокрота, *охрипость*.

Sulphur — 3.

Весьма полезно какъ въ *острой*, такъ и въ *хронической* формѣ. Послѣ *Merc.*, когда оно не помогаетъ, особенно когда

не наступает ни разрѣшеніе, ни нагноеніе, словомъ, когда нѣтъ ничего рѣшительнаго, ходъ болѣзни медленъ, давящая боль въ горлѣ, какъ бы отъ деревяшки,

внутренняя опухоль. Колотье, щекотанье, стягиваніе. У венерическихъ людей; почему краснота пораженныхъ частей имѣеть синеватый отливъ.

Примѣчаніе. Въ послѣднее время стали очень хвалить **Apis. З.** въ сильно-воспалительныхъ, крупозныхъ и соединенныхъ съ антоновымъ огнемъ формахъ, хотя оно больше помогаетъ противъ рожевидной формы, гдѣ впрочемъ обыкновенно достаточно бываетъ *Bell.*

Противъ хроническаго *затвердѣнія и увеличенія* миндалевидныхъ желѣзъ рекомендуемъ **Brom. З.**, а въ случаяхъ болѣе серьезныхъ или слишкомъ закоренѣлыхъ **Jod. З.** и **Baryt. З.** Последнее средство лучше для болѣе продолжительнаго употребленія золотушнымъ въ дѣтскомъ и юношескомъ возрастѣ.

Если воспаленіе горла (зѣва, язычка или миндалевидныхъ желѣзъ) часто повторяется (особенно у золотушныхъ), и если при этомъ бываютъ опухоли воспалительнаго характера, ощущается боль какъ будто отъ ссадинъ и раночекъ, колотье, суженіе, если образуются нарывы, накопляется слизь, существуетъ усиленное отдѣленіе слюны или сухость, ощущается потребность глотать или затрудненіе при глотаніи, то помогаетъ, при продолжительномъ употребленіи въ рѣдкихъ пріемахъ, **Calc. carb. З.** или **Calc. jodat. З.**

Противъ *ревматическаго* воспаленія горла съ ощущеніемъ сухости, хрипоты, даже въ болѣе глубокихъ частяхъ горла, или съ опухолью внѣшнихъ частей горла, мы рекомендуемъ *Bryon. З.*, а въ случаѣ колотья, синеватой красноты и катарра желудка — *Puls. З.*

При слюнотеченіи, особенно послѣ употребленія ртути: *Nitr. ac. З.*

При *антоновомъ огнѣ*, когда есть пузыри съ свѣтлой жидкостью, темная или синеватая краснота горла, зловоніе, жжение и давленіе: *Arsen. З.*

Вспомогательными средствами служатъ: полосканіе горла (серьезное излишнее!), выжатые холодные компрессы, при ро-

жевидномъ воспаленіи безъ нагноенія, а въ случаѣ нагноенія — влажные, теплые припарки изъ льняной муки.

Противъ воспаления горла въ послѣднее время стали рекомендовать: *Arum triphyll.* (?), *Hydrast.* (при образовании нарывовъ и при хроническихъ и сифилитическихъ воспаленияхъ горла), **Phytol.** (когда въ глоткѣ видны маленькіе узелки и опухшія желѣзы, катарральная жаба, сухость, при глотаніи кажется, что въ горлѣ желѣзный шарикъ, тошнота, невозможность глотать горячее); *Sanguin.* (съ нарывами, особенно при воспаленіи зѣва). — Противъ воспаления миндалевидныхъ желѣзъ: *Gels.*, *Phytol.*, *Sanguin.*, *Podoph.*

Приемы въ этой болѣзни должны быстро слѣдовать одинъ за другимъ, черезъ 2—1 часъ.

76. Дифтеритъ, гангренозная жаба, *diphtheritis.*

Дифтеритъ, показывавшійся въ легкихъ формахъ уже въ прежнія столѣтія, появляется или эпидемически, или въ видѣ отдѣльныхъ случаевъ, то самостоятельно, то какъ спутникъ другихъ болѣзней, особенно скарлатины. На красной, опухшей слизистой оболочкѣ образуются маленькія точки или бѣловатыя, бѣловато-желтыя, желтоватыя, похожія на приставшіе кусочки творога, пятна, которыя отдѣляются, причемъ подъ слизистой оболочкой начинается нагноеніе и образуются струнья. Слизистая оболочка тогда легко источаетъ кровь. Если не воспослѣдуетъ излѣченія, то образуется антоновъ огонь съ зловоніемъ изо рта, пятна принимаютъ синеvато-черный цвѣтъ, ткань распадается на гнойные доскутки. Болѣзнь эта бываетъ большею частью въ зѣвѣ на миндалевидныхъ желѣзахъ, язычкѣ, на задней стѣнкѣ зѣва или глотки, и въ поздыхъ. Она любитъ переходить въ желудокъ и, что всего опаснѣе, на кадыкъ и дыхательное горло. Точно также можетъ быть поражена дифтеритомъ слизистая оболочка половыхъ частей у дѣвушекъ и женщинъ и соединительная оболочка глазныхъ вѣкъ. Въ легкихъ случаяхъ бываютъ также лихорадочные припадки, легкая головная боль, жжение и затрудненіе при глотаніи, котораго, впрочемъ, можетъ и не

быть, бѣлыя пятна, которыя мало по малу покрываются струпьями, черезъ 2—3 дня отдѣляются и образуютъ нарывы, легко источающіе кровь. Черезъ 4—8 дней лѣченіе кончается. Въ видѣ исключенія бываетъ болѣе сильная лихорадка, которая однако исчезаетъ съ наступленіемъ мѣстныхъ явленій. Въ серьезныхъ случаяхъ пятна больше, пленки образуются попеременно въ разныхъ мѣстахъ, общее отравленіе крови, рвота, головная боль, бредъ, судорожные припадки, больной гнуситъ, принятая пища, вслѣдствіе паралича служащихъ для глотанія органовъ, возвращается черезъ ротъ и носъ, зловоніе изо рта, опухоль шейныхъ желѣзъ, содержащая бѣлковину моча. При дифтеритѣ въ носу изъ носу течетъ кровь, отдѣляется гнойное сывороточное вещество, содержащее пленки, изъ ушей течетъ гной, глаза также гноятся. Самое опасное, по, къ сожалѣнію, обыкновенное развитіе болѣзни заключается въ томъ, что она распространяется на дыхательныя пути, причемъ появляется сухой, похожій на лай кашель, и обнаруживаются симптомы крупа (послѣдній однако представляетъ пластическій процессъ, между тѣмъ какъ дифтеритъ — разрушительный). Въ этомъ случаѣ (иногда очень скоро, а иногда черезъ нѣсколько дней) наступаетъ смерть отъ суженія гортанной щели, кадыка и т. д. Припадки озноба, желтый цвѣтъ кожи и утомленность суть болѣею частью признаки наступающаго разложенія и отравленія крови. Послѣдствіями этой болѣзни бываютъ — сильное малокровіе и параличи. Послѣдніе, смотря по пораженному мѣсту, обнаруживаются въ разныхъ видахъ: больной не можетъ глотать, гнуситъ, затрудняется говорить, страдаетъ дальновзоркостью (онъ не узнаетъ предметовъ вблизи), въ глазахъ у него двоится или рябитъ; пропадаетъ голосъ, теряется способность кашлить и выплевывать мокроту; поражается параличемъ мочевого пузыря, прямая кишка; затрудняется дыханіе, движеніе руками и ногами, больной шатается при ходьбѣ, теряется способность работать, обнаруживается психическое расстройство. Во всѣхъ этихъ видахъ бываетъ самая разнообразная градація. Но въ большинствѣ случаевъ эти виды паралича излѣчимы.

Что касается до лѣченія *дифтерита*, то рекомендуемое аллопатами прижиганіе ляписомъ, іодовой тинктурой или тинктурой

соленокислаго желѣза — совершенно лишнее мученіе, такъ какъ оно не уничтожаетъ причину болѣзни — отравленіе крови, не предохраняетъ отъ новыхъ отложений, не проникаетъ въ дыхательное горло, насыщаетъ тѣло черезъ раны вредными веществами, противодѣйствуетъ гомеопатическимъ средствамъ и, вообще, совершенно излишне при нашемъ лѣченіи. Гораздо рациональнѣе полосканіе, вдыханіе или вырскиваніе (посредствомъ пульверизатора) известковой воды, растворяющей пленки. Для уничтоженія зловонія изо рта и удаленія пленокъ лучше всего употреблять безразличныя полоскательныя средства, какъ напр. разведенный винный спиртъ, настой чаю, или же полоскать, если можно, тѣми средствами, которыя принимаешь внутрь, какъ напр. *Ac. mur.*, *Merc. sublimat.* Принимать внутрь и прикладывать снаружи ледъ — очень полезно. Внутреннее лѣченіе начинается обыкновенно съ *Merc.*, — въ легкихъ случаяхъ *Merc. solub.*, а въ болѣе серьезныхъ *Merc. sublimat.* При сильной лихорадкѣ и возбужденномъ состояніи: *Acid. muriat. 1.*, внутрь и наружно. При болѣе сильной степени, соединенной съ слабостью и одновременной порчей крови: *Acid. nitr. 2.* При переходѣ на кадыкъ (охрипость, кашель) и послѣ: *Brom. 2.* или *Kali bromat.*, внутрь, по нѣскольку грановъ 1—2 раст. (также наружно; вдуть, какъ совѣтуетъ Мейергофъ, посредствомъ стеклянной трубки порошокъ 1 раст. въ зѣвъ), а также *Kali bichrom. 2.* Главнымъ средствомъ противъ сильной степени *dyspnoea*, когда чрезвычайная утомленность, слабый пульсъ, симптомы разложенія, антоновъ огонь — *Merc. cyanat. 6.* — 3. Это средство до сихъ поръ наиболѣе хвалили, но, кромѣ того, также (не въ такой степени) *Arsen. 5.* или *Kreos. 5.* Для лѣченія послѣдствій этой болѣзни — *China*. Противъ паралича я съ успѣхомъ употреблялъ *Nux vom.* и электричество. Кромѣ того, достойны вниманія: *Phosphor.*, *Arg. nitr.*, противъ паралича (ст. 45). Вообще эта болѣзнь уже достаточно изслѣдована, чтобы убѣдиться и здѣсь въ преимуществахъ гомеопатическаго лѣченія.

Въ заключеніе приведу новѣйшія средства противъ дифтерита. *Gelsemin.* — когда замѣчаются симптомы начинающагося паралича зрѣнія (дальнозоркость, въ глазахъ двоится, предметы являются въ обратномъ видѣ) и мѣстами обнаруживается параличъ

или нечувствительность; *Baptis.* — стѣсненіе дыханія до удушья отъ приливовъ къ легкимъ, а также противъ нарывовъ; *Hydrast.* — подобно *Merc. iodat.*; *Phytol.* — сильная головная боль, боль въ спиѣхъ, членахъ, слабость, обморокъ, головокруженіе; дается также въ тѣхъ случаяхъ, когда дифтеритъ переходитъ на дыхательныя пути.

77. Воспаленіе пищепріемнаго горла, *oesophagitis.*

Эта болѣзнь случается рѣдко; характеризуется она затрудненіемъ при глотаніи, жаждой, давленіемъ въ горлѣ или въ груди, или подъ ложечкой, или между плечами, передъ позвоночнымъ столбомъ, или позади грудной кости, тошнотою и, наконецъ, одышкою; отъ ѣды хуже, такъ что больной начинаетъ давиться, является рвота, удушье. Происходитъ она или отъ наружныхъ поврежденій (когда въ горло попадаетъ кость и т. п.), или отъ употребленія водки и острой пищи, или отъ распространенія воспаленія рта и зѣва на горло. Иногда описываемая болѣзнь происходитъ отъ внутренней порчи соковъ. Рекомендуемъ: **Acon. 2., Bellad. 2., Merc. 3.** Въ хроническихъ случаяхъ: *Ars. 6., Euphorb. 3., Mezer. 3., Petrol. 5.,* а также *Rhus 5.* Противъ поврежденій постороннимъ тѣломъ — **Arnica 2.,** а противъ обжоговъ — **Cantharid. 3.**

Новѣйшія средства: *Gelsem.* и *Iris. vers.*

в. Болѣзни желудка и кишечнаго канала.

(78. — 81.) Желудочные (гастрическіе) недуги.

Мы включаемъ сюда:

Катарръ желудка въ его нелихорадочной, а также хронической и лихорадочной формахъ (гастрическая лихорадка), (ст. 78);

Слабость пищеваренія, симптомы отсутствія аппетита, тошноты, рвоты, вслѣдствіе простуды, порчи желудка, душевныхъ потрясеній и проч. (ст. 78, 80);

Образованіе кислотъ въ желудкѣ и изжогу (ст. 79);

Вѣтры, такъ какъ они часто (хотя только мнимо) являются самостоятельной формой болѣзни (ст. 81).

Симптомовъ болѣе глубокихъ органическихъ недуговъ мы будемъ касаться только слегка.

78. Катарръ желудка, также: испорченный желудокъ, гастрическое состояніе, *status gastricus*; *catarrhus gastricus*; гастрическая лихорадка, *febris gastrica*; ослизненіе желудка, *status pituitosus*; слабость желудка, *dyspepsia*.

Сущность того состоянія, которое называется гастрическимъ и которое происходитъ всего чаще отъ порчи желудка, заключается въ катарръ слизистой оболочки желудка; въ этомъ состояніи, въ большей части случаевъ, принимаетъ участіе и кишечный каналъ, по крайней мѣрѣ, верхняя половина его.

- 1) Гастрическое состояніе, также острый желудочный катарръ, происходитъ или отъ общей болѣзни (простуды, лихорадки, недуговъ нижней части живота), или отъ другаго желудочнаго недуга (нарывъ, ракъ и т. д.), или отъ распространенія какого-нибудь недуга сосѣднихъ частей (рта, гортани, кишекъ), или, наконецъ, отъ попавшихъ въ желудокъ постороннихъ веществъ. (Поэтому сюда же относится и испорченный желудокъ.) Эти вещества, такъ наз. гастрическіе нечистоты, могутъ быть вредны безусловно или относительно. Относительно вредными называются вещества, которые одними организмами выносятся, а другими нѣтъ; таковы: жиръ, жесткое мясо, зерна, производящія вытры овощи, плоды, кислая пища, слоенныя печенія, случайно проглоченная нерастворимая земля или камешекъ и т. д. Гастрическое состояніе бываетъ также слѣдствіемъ отвращенія къ чему-либо, слѣдствіемъ отравленія. Не мѣнѣе значительнымъ поводомъ къ описываемому недугу можетъ служить дѣйствительное переполненіе желудка пищей. Только въ 2 послѣднихъ случаяхъ (въ особенности, когда пища дѣйствуетъ только своей массой) иногда необходимо бы-

ваетъ рвотное. Впрочемъ, и здѣсь часто бывають случаи, когда гомеопатическія средства, если только переполненіе желудка не чрезмерно, дѣйствуютъ динамически. Симптомы остраго катарра желудка (гастрическаго состоянія) суть: давленіе въ желудкѣ, особенно послѣ ѣды, отсутствіе аппетита, отвращеніе къ пищѣ, тошнота, рвота, отрыжка, дурной вкусъ во рту (кислый, горькій, прогорклый), дурной запахъ изо рта, поносъ или запоръ, вѣтры, печистый языкъ (бѣлый, желтоватый); притомъ: дурное расположеніе духа, вялость, чувство разбитости, боль и жаръ въ головѣ, безпокойный сонъ, ознобъ, холодныя руки и ноги, нерасположеніе къ мысленію.

Лучшими средствами здѣсь служатъ: **Ipecac. 2.** (тошнота, рвота), **Puls. 2.**; смотря по обстоятельствамъ также: *Antimon. crud.*, *Bryon.*, *China*, *Nux vom.*, *Sepia.*, *Sulph.*

- 2) Гастрическая лихорадка (лихорадочный желудочный катарръ) или сопровождается другіе виды лихорадки (особенно тифъ, воспаленія, назожныя сыпи), такъ какъ при лихорадкѣ дѣло рѣдко обходится безъ участія кишечнаго канала, — или имѣетъ характеръ самостоятельный, причемъ катарръ желудка вызываетъ лихорадочныя симптомы. Такимъ образомъ, къ симптомамъ, обозначеннымъ въ предъидущемъ (1.) параграфѣ, присоединяются еще: краснота краевъ языка, жажда, сухость губъ, чувствительность въ сторонѣ желудка, жаръ и ознобъ, ускоренный пульсъ, бредъ. (То, что прежде называлось гастрически-нервной лихорадкой, есть не что иное какъ тифъ.)

Здѣсь надо прежде всего устранить лихорадку. Это всего чаще и лучше удается посредствомъ **Acon.**; когда имѣется приливъ крови къ головѣ: **Bellad.**; при сильномъ безпокойствѣ, чувствительности въ сторонѣ желудка, потѣ безъ облегченія, и когда *Acon.* и *Bellad.* не помогли: **Merc.**; если на первомъ планѣ первое возбужденіе, слабость, бредъ: **Rhus** (см. тифъ) или **Phosph. ac.** (см. ниже), иногда **Arsen.** (см. тифъ). Кромѣ того, служатъ

средствами противъ гастрической лихорадки: **Bryon., Ipec., Puls.,** также *Antim. crud.,* и еще чаще *Tart. emet., Nuc vom.;* — при выздоровляваніи: *China.*

- 3) Хроническое ослизненіе или хроническій катарръ желудка обнаруживаетъ всѣ симптомы остраго — въ упорномъ и труднолѣчимомъ видѣ, причемъ особенно рѣзко выдаются: пученіе желудка, давленіе въ немъ послѣ пищеваженія, вѣтры, отрыжка, рѣдкое испражненіе, кислоты въ желудкѣ, изжога. Этотъ недугъ часто находится въ связи съ геморроемъ, ломотою и недугами печени, селезенки, сердца, легкихъ, и особенно часто встрѣчается у сильно курящихъ и у пьяницъ.

Мы лѣчимъ его всего удачнѣе посредствомъ: **Nuc vom., Sulph., Chin., — Lyc., Natr. mur., Puls., Sep.,** — также: **Carb. veg., Calc. carb.** (см. ниже, въ особен. статью 79: кислоты въ желудкѣ).

- 4) Слабость желудка есть склонность его къ порчѣ и обнаруживается или чувствительностью къ извѣстнымъ кушаньямъ, или такимъ состояніемъ, что пища даже въ маломъ количествѣ трудно варится. Она бываетъ или нервнаго свойства (у особъ слабаго сложенія, истерическихъ, страдающихъ ипохондрією, малокровіемъ, дѣвичьею немочью, пожилыхъ), или развивается отъ душевныхъ потрясеній, особенно отъ печали, или послѣ трудныхъ болѣзней, или же, наконецъ, послѣ излишествъ относительно спиртныхъ напитковъ, кофе, лѣкарствъ, куренія табаку, послѣ излишней шнуровки, ночнаго бдѣнія, безпорядочнаго, сидячаго образа жизни.

Здѣсь полезны всего болѣе: **Chin., Puls., Phosph. ac., Sulph.** Страдающимъ дѣвичьей немочью: **Ferrum;** золотушнымъ: **Calc. carb.;** послѣ душевныхъ потрясеній: **Ignat.** (См. также примѣчаніе въ концѣ этой статьи.)

Подробности заключаются въ слѣдующемъ:

Aconitum — 2.

Хорошо только въ началѣ
гастрической лихорадки, причемъ

оно однако дѣйствуетъ успѣшно также противъ катарра желудка, произошедшаго отъ не-

решоленія желудка, и особенно послѣ порчи желудка отъ сластей, кислаго, простуды, послѣ испуга и досады, при рвотѣ слизью и кровью; но во всякомъ случаѣ оно не настоящее желудочное средство.

Antimonium crudum — 2.

Главное средство при *желудочномъ катаррѣ*, послѣ пресыщенія, при разстройствѣ желудка, причѣмъ *отсутствіе аппетита*, рвота пищею, отвращеніе къ ѣдѣ, языкъ *блѣдъ*, отрыжка послѣ ѣды, жажда, *чувство полноты въ желудкѣ*, щемленіе и давленіе, запахъ изо рта, зловонные вѣтры съ коликой, не сильный поносъ (съ испражненіемъ непереваренной пищи), головная боль во лбу, расслабленность.

Bryonia — 2.

При лихорадочномъ, а также и не лихорадочномъ *желудочномъ катаррѣ*, особенно когда притомъ *желчные припадки*, и когда поводомъ послужила невоздержность въ пищѣ, *простуда* или *досада*. Ротъ сухъ, языкъ *желтъ*, *тошнота безъ рвоты*, рвота *желчью* или пищею и кровью; щиплющая боль въ желудкѣ, со *вздутостью* живота, запоромъ *горькой отрыжкой*, от-

сутствіемъ аппетита; *давленіе въ желудкѣ*, ощущеніе раздутости, *колотье въ боку* и *при дыханіи*, *головная боль во лбу*, жаръ и ознобъ, особенно вечеромъ, утомленность и дурное расположеніе духа. Особенно полезно при порчѣ желудка *пучащей пищею*, *молокомъ*, *плодами*, и когда притомъ ощущается *давленіе въ желудкѣ* и *отрыжка*. (См. также *желчные недуги*.)

China — 2.

Слабость желудка, или наступающее послѣ его *переполненія* и порчи *чувство сытости*, *давленіе* и *полнота* въ желудкѣ; равнодушіе и отвращеніе къ пищѣ и питью, *вздутость* живота; постоянная *отрышка*, *изжога*, рвота непереваренною пищею; языкъ покрытъ желтой или *блѣлой слизью*; *апатія*; страсть къ кислому и пикантному; вѣтры, запоръ или поносъ; *летучій жаръ* съ ознобомъ, темная моча; *всобщая слабость*, желтый цвѣтъ лица, меланхолія.

Tricusuana — 2.

Главное средство при *лихорадочномъ* и *не лихорадочномъ катаррѣ*, когда преобладаютъ *рвота*, *тошнота* или поносъ, болѣе послѣ *простуды*, чѣмъ послѣ *досады*; при *переполненіи*

желудка, когда языкъ бѣль или желтъ; вкусъ прѣсный, вяжущій, совершенное отвращеніе къ пищѣ и табаку, отсутствіе жажды; *рвота* непереваренною пищею, или водою, слизью, зеленой и желтой желчью; *поносъ* (даже *кровоавый*) съ рвзью, чаще ознобъ, чѣмъ жаръ.

Natrum muriaticum — 3.

Хроническое и *острое ослизненіе желудка*, особенно *порча* его чѣмъ-либо кислымъ, хлѣбомъ жиромъ, молокомъ. Отвращеніе къ означеннымъ яствамъ, *отсутствіе аппетита*, сильный голодь, жажда, отрыжка, *изжога*. Вкусъ соленый, кислый, горькій, прѣсный, гнилой, тошнота, рвота слизью, водою, пищей. *Давленіе въ желудкѣ* и *подъ ложечкой*, опухоль тамъ же; *стягиваніе*, полнота, схватываніе, *біеніе* подъ ложечкой, стѣсненіе дыханія.

Nux vomica — 3.

Катарръ желудка послѣ *спиртныхъ напитковъ*, кофе, простуды, *невоздержности въ пицѣ*, досады, съ сухостью во рту безъ жажды, языкъ бѣлый, бурый или желтый, во рту слизь; *изжога*; кислый или горькій вкусъ во рту, горькая отрыжка, рвота пи-

щею, особенно послѣ ѣды, *накопленіе слюны* во рту, побужденіе къ глотанію; отвращеніе къ молоку, *давленіе въ желудкѣ до спины*, *втры*, *запоръ* или *незначительное, тупое, судорожное испражненіе*, съ давленіемъ въ *головѣ*, *миренью*, тяжестью въ членахъ, дурнымъ расположеніемъ духа. По утрамъ хуже. Полезно преимущественно *особамъ*, ведущимъ сидячій образъ жизни, страдающимъ *геморроемъ*, лицамъ *холерическимъ*. Также при *беременности*.

Phosphori acidum — 2.

Катарръ желудка лихорадочный или *хроническій*, особенно съ ослизненіемъ и съ нервнымъ характеромъ. Послѣ *подавляющихъ душевныхъ потрясеній*, причемъ *безпокойство*, потъ, *чрезвычайная слабость*. Лихорадка *неправильна*, ознобъ и жаръ попеременно, чувство разбитости въ мозгу, давящая боль въ *маковкѣ*; блѣдность лица, томные, грязно-бѣлые глаза, апатія; жажда; языкъ покрытъ *слизью*, *живучее давленіе подъ ложечкой*, усиливающееся отъ прикосновенія. *Вздутость около пупка*, *поносы съ слизистыми, сѣро-бѣлыми испражненіями*, бредъ.

Pulsatilla — 2.

Главное средство при *мисорадочномъ* и не *мисорадочномъ* катаррѣ, особенно послѣ *порчи желудка жиромъ* (свинымъ или гусинымъ), *плодами, холодною пищею* (мороженымъ), причѣмъ *ознобъ, совершенное отсутствіе аппетита* и жажды, отвращеніе къ теплomu, къ мясу, *хлѣбу, молоку, табаку*; языкъ *блѣдъ, клеекъ, густо покрытъ слизью или желтъ, сѣръ, слизистъ*; вкусъ во рту горькій, *жирный, слизистый*; во рту *слизь, желчная или кислая отрыжка, давленіе въ желудкѣ* (пища какъ бы не *переваривается*), *вѣтры, бурчаніе въ животѣ* и колотье подъ *ложечкой, поносъ съ водянистыми, слизистыми, желтоватыми испраженіями*, особенно *ночью*; тревожный сонъ. Лихорадка, передъ *полуночью съ ознобомъ*. Особенно хорошо при *слезливости, женщинамъ, дѣтямъ, венознымъ, страдающимъ дѣвичей немочью* особамъ.

Sepia — 3.

Особенно хорошо при (*хроническомъ* или не *лихорадочномъ*) катаррѣ, при *настоящемъ ослизненіи, когда недугъ находится въ связи съ геморроемъ или истерикой, причѣмъ отсутствіе аппетита* или ашпетить къ

страннымъ, пикантнымъ блюдамъ. Чувство *пустоты въ желудкѣ; отвращеніе къ хлѣбу и молоку*; развитіе *кислотъ въ желудкѣ, изжога, особенно ночью, которую можно уничтожить твердою пищею; слабость пищеваженія*. Вкусъ во рту *кислый, горькій, прѣсный, вяжущій, напоминающій навозъ, соленый; отрыжка кислая, горькая, отрывающаяся гнилыми яйцами; тошнота послѣ ѣды* (особенно во время *беременности*), *рвота. Давленіе, зудъ, колотье, біеніе подъ ложечкой, съ жаромъ и тяжестью въ головѣ, полустронная головная боль, вздутость живота, боль въ спинѣ*. Хорошо особамъ *ипохондрическимъ, истерическимъ, противъ геморроя болѣе нервнаго характера*.

Sulphur — 3.

Дѣйствуетъ въ случаяхъ, *подобныхъ описаннымъ при Nux vom.*, только *радикальнѣе*, а потому дается тогда, когда *Nux vom.* не помогаетъ, когда *геморрой* обнаруживается *шишками, кровотеченіемъ*; когда *составъ крови имѣетъ вліяніе на пищеваженіе*, когда *симптомы нижней части живота* (запоръ и т. п.) преобладаютъ надъ *симптомами желудка*; при *хронической слабости пищеваженія*, когда *сли-*

зистая оболочка сильно пораже-
на, причѣмъ сильная боль (вслѣд-
ствіе прилива крови къ желудку),
въ особенности *давленіе*, *полно-*
та и т. п.; при *мишаяхъ* и т. п.
сыпяхъ; послѣ злоупотребленія
ртутью, слабительными сред-
ствами. Золотушнымъ особамъ.

Примѣчаніе. Эти принадки усложняются иногда *желчными* недугами. Здѣсь, кромѣ упомянутого выше **Bryon.**, особенно полезны: **Cham.**, **Coloc.**, **Digit.** (См. желчныя недуги.)

Въ болѣе серьезныхъ случаяхъ упорнаго хроническаго катарра желудка главными средствами служатъ **Lycop.** (особенно если страдаютъ притомъ селезенка печень или почки) и **Arsen.** (при исхудалости и сильной боли подъ ложечкой). Для страдающихъ дѣвичьей немочью, съ развитіемъ кислотъ въ желудкѣ, хорошо **Calc. carb.**

Если причиною желудочнаго катарра — *органическія болѣзни желудка*, какъ напр. нарывы, размягченіе, затвердѣніе, то слѣдуетъ прибѣгнуть къ **Ars.**, **Kreos.** и **Con.**

Противъ *слабости пищеваренія*, особенно у женщинъ и дѣтей, совершенно справедливо хвалятъ **Nux mosch.** Истерическимъ особамъ особенно полезно **Ignat.**; послѣ огорченія: **Staph.**

Надобно еще принимать во вниманіе, *отъ чего* испортился желудокъ; если отъ питья *холодной воды*: **Cham.**, **Chin.**, **Nux vom.**, **Puls.**; — отъ *молока*: **Ipec.**, **Bryon.**, **Calc.**, **Nux vom.**, **Sulph.**; — отъ *мяса*: **Puls.**, **Sulph.**; — отъ *жира*: **Natr. mur.**, **Puls.**, **Serp.**, **Sulph.**; — отъ *водки*: **Nux vom.**, **Op.**; — отъ *вина*: **Nux vom.**, **Carb. v.**; — отъ *кофе*: **Nux vom.**; — отъ *крѣпкаго чаю*: **Chin.**, **Coff.**; — отъ *табаку*: **Nux vom.**, **Coccc.**, **Veratr.**

Ведущимъ *сидячій образъ жизни* я особенно рекомендую: **Bryon.**, **Nux vom.**, **Calc.**, **Lyc.**, **Serp.**, **Sulph.**; при *умственномъ напряженіи*: **Nux vom.**, **Calc.**, **Sulph.**; послѣ *продолжительнаго бдѣнія*: **Nux vom.**, **Carb. v.**, **Puls.**; послѣ *разслабляющей* потери соковъ: **Chin.**, **Ferr.**; послѣ *половой невоздержности* преимущественно: **Phosph. ac.**, **Staphys**, **Sepia.**

Приведемъ въ заключеніе нѣкоторыя новѣйшія средства противъ гастрическихъ страданій. Противъ катарра желудка: **Hydrast.**; въ острыхъ случаяхъ, съ тупою болью въ желудкѣ, при ощущеніи слабости въ верхней части живота, развитіи кислотъ,

запорѣ; подобное же дѣйствіе имѣютъ: *Euphorb. coroll.*, *Iris. v.*, *Podoph.*, *Rum.*, *Sang.* — Противъ слабости желудка: *Asclep.*, рвота слизью (дурное пищевареніе); *Cauloph.* (судороги); *Helon.* (страданіе матки, отсутствіе аппетита, отрыжка, судороги желудка, приливы съ болью); *Hydrast.* (хроническое состояніе слабости, кислоты; дѣйствуетъ подобно *Nux*, *Puls.*, *Sulph.*), *Iris*; *Leptandr.* (судороги желудка, страданіе печени); *Lobel.* (невареніе желудка, съ одышкою); **Phytol.** (сильная рвота), **Podoph.** — (дается также дѣтямъ, при сильномъ раздраженіи желудка, рвотѣ желчью, дѣйствуетъ подобно *Nux*, *Puls.*, *Arsen.*), **Rumex cr.**, *Sanguin.* (рвота, тошнота).

Противъ рвоты особенно хвалятъ: *Eupat perf.*, *Ir.*, *Sanguin.*; при беременности: *Euphorb. coroll.*

Что касается до *пріемовъ*, то во всякомъ случаѣ здѣсь полезны сильныя дозы (3.—2. дѣлен.) черезъ 4—3 часа. Въ хроническихъ случаяхъ, особенно при лѣченіи слабости желудка, достаточно одного пріема черезъ 2—3 дня; но при хроническомъ катарѣ надо давать, по крайней мѣрѣ, ежедневно по пріему.

Сличить кромѣ того: *кровотеченія* (относительно рвоты кровью), *судороги желудка*, *колики*, *поносъ*, *холерина*, *запоръ*, *имсты*, *желчныя недуги*.

79. Развитіе кислотъ въ желудкѣ, *acor*; изжога, *pyrosis*.

Если они происходятъ отъ употребленія кислой пищи, сладкаго пирожнаго, молока, или бывають слѣдствіемъ порчи желудка, то помогаютъ приведенныя выше при *порчѣ желудка* средства, особенно **Bryon.**, **Прес.**, **Puls.**, или *Natr. mur.*, *Sepia*, *Sulph.*, — тѣмъ болѣе, что эти явленія обнаруживаются въ такихъ случаяхъ не самостоятельно, а въ связи съ другими симптомами, характеризующими болѣзнь желудка. — Если развитіе кислотъ есть симптомъ хроническаго *осмизненія желудка*, то надо лѣчить послѣднее. Развитіе кислотъ бываетъ иногда признакомъ *ломоты*, *геморроя*, *каменной болѣзни*, *золотухи* и преобладанія кислыхъ элементовъ въ крови, отчего происходятъ кислый вкусъ во рту, кислый запахъ дыханія, кислые потъ и моча, кислая рвота, кислыя испраженія (какъ бываетъ у дѣтей), колики. Въ этихъ случаяхъ, гдѣ кислота слу-

жить преобладающимъ симптомомъ, надо давать **Calc. carb.** — 2. (хроническое ослизненіе, съ образованіемъ въ желудкѣ кислотъ, особенно у особъ золотушныхъ, страдающихъ дѣвичьей немощью, съ изжогой, слюнотеченіемъ; отвращеніе къ мясной пищѣ и всему вареному; глисты; страшный голодь; чувствительность желудка; поносъ съ испражненіями, которыя пахнутъ кислымъ); или **Sulph. acid.** — 3. (особенно при хроническомъ развитіи кислотъ, кисло-пахучей рвотѣ и поносахъ [также у дѣтей]; при рвотѣ водою). При недугахъ нижней части живота, ломотѣ, каменной болѣзни, самымъ радикальнымъ средствомъ служить **Sulph.**; напѣтивно помогаетъ во всѣхъ случаяхъ **Magnes. carb.** 1—2. — Подъ изжогою разумѣютъ жгучее ощущеніе, распространяющееся изъ желудка въ пицеприемное горло и въ ротъ и происходящее большею частью отъ развитія въ желудкѣ кислотъ. Если она не устраняется средствами, уничтожающими кислоты, и является болѣе въ формѣ болѣзненного ощущенія, то мы рекомендуемъ **Carb. veg.** 3. или **Phosph.** 5. (Ср. судороги желудка.)

80. Рвота,
vomitus.

Случается:

- 1) послѣ *отравленія, переполненія желудка, порчи его.* Въ этомъ случаѣ, при легкой степени, она часто ведетъ къ излѣченію, и при отравленіяхъ ей даже надо содѣйствовать (теплой водою, механическимъ раздраженіемъ зѣва и т. п.). При высшей степени рвоты, когда она можетъ быть вредна, даютъ **Ipec.** или **Nux vom.** (рѣже **Tart. emet.**);
- 2) При *хроническомъ катаррѣ желудка, органическихъ болѣзняхъ желудка* (нарывы, ракъ). Здѣсь надо лѣчить основную недугъ;
- 3) При *пораженіи мозга* (потрясеніе головы, мигрень). Здѣсь она бываетъ только побочнымъ явленіемъ;
- 4) При *катаррахъ органовъ груди и нижней части живота* (печени, селезенки, поджелудочной желѣзы, мочевыхъ и половыхъ органовъ, брюшины). Здѣсь также надо обра-

тить болѣе вниманія на главный недугъ, чѣмъ на этотъ симптомъ;

- 5) При *ущемленныхъ прыжахъ, переплетеніи кишекъ, запоръ* она прекращается только съ устраненіемъ этихъ препятствій кишечному движенію. **Nux vom.** часто помогаетъ въ этихъ случаяхъ;
- 6) Наконецъ, рвота бываетъ чисто нервнаго характера, какъ напр. при судорогахъ желудка, слабости его, малокровіи, глистахъ (см. лѣченіе этихъ болѣзней), или отъ качки, ѣзды, чувства отвращенія; во время беременности; послѣ душевныхъ потрясеній.

Вообще, когда рвота — главный симптомъ, то при порчѣ желудка первымъ средствомъ служить **Ipec. 2.** (см. выше катарръ желудка), потомъ:

Tart. emet. 3., при катаррѣ желудка съ отсутствіемъ аппетита, тошнотою и рвотою слизью и кровью, отрыжкою (гнилою), сѣрымъ языкомъ. При лихорадкѣ съ сонливостію, просовидной сызью, рвотою, желчными (буро-желтыми) испражненіями, сопровождаемыми сильной рѣзью. Боль въ желудкѣ, какъ будто отъ переполненія, съ тоской, давленіемъ въ желудкѣ, сильнымъ изнеможеніемъ; — или

Veratr. 2., при горькой или кислой рвотѣ, или (въ болѣе слабой степени) при тошнотѣ одновременно съ поносомъ, при параличеобразной слабости, холодѣніи оконечностей, обморокѣ, блѣдности лица, общемъ ознобѣ, потомъ жарѣ (*холерина* или *холерные* припадки, см. эти болѣзни);

послѣ пьянства: **Nux vom. 3.**;

послѣ душевныхъ потрясеній, послѣ печали и предшествовавшаго испуга, причемъ тошнота, рвота нищею, бѣлый языкъ, чувство пустоты и слабости въ желудкѣ, чувство полноты въ кишкахъ, отрыжка нищею и питьемъ:

Ignat. 2.;

послѣ испуга (если рвота воспослѣдовала немедленно): **Opium. 3.**

послѣ досады: **Cham. 2.**;

при пораженіи мозга, послѣ потрясенія его: **Arn. 2.**;

при мигрени: **Nux vom. 5. — 3.**;

пьяницамъ: **Nux vom. 2.**; въ хроническихъ случаяхъ: *Ars. 5.*, *Carb. veg. 3.*; послѣ куренія табаку: **Nux vom. 3.**, **Verat. 2.**;

при глистахъ: **Spigel. 2.**; при слабости желудка: **China. 2.** — **1.**;

при рвотѣ послѣ кашля: **Ipec., Tart. em., Verat. 2.**; послѣ бѣзды, качки: **Coccul. 2.**

во время беременности: **Ipecac., Nux vom. 2.**; — въ упорныхъ случаяхъ: **Kreosot. 5.**

При рвотѣ слизью помогаютъ въ особенности: **Ipecac., Tart. emet.**;—при рвотѣ пищею: **Ipecac., Verat.**; — при рвотѣ желчью: **Ipecac., Cham., Veratr.**; — при кислой рвотѣ: **Calc., Magn. carb., Sulph. acid.**; — при рвотѣ темною, похожею на шоколадъ массою: **Arsen., Plumb., Veratr.** Кривая рвота: см. кровотеченія. Рвота водою: см. судороги желудка.

Рвота новорожденныхъ часто устраняется измѣненіемъ пици кормилицы, а также весьма скоро посредствомъ **Ipecac.** Въ упорныхъ случаяхъ помогаетъ *Veratr.*, особенно когда притомъ поносъ. Если этого и другихъ побочныхъ симптомовъ нѣтъ, и ребенокъ главнымъ образомъ не выноситъ молока, то помогаетъ *Aethusa cynap.* Въ органическихъ случаяхъ (см. размягченіе желудка): **Kreosot.** или *Arsen.* Рвота у новорожденныхъ послѣ кашля съ обильнымъ изверженіемъ слизи устраняется посредствомъ **Ipecac.** или, вѣрнѣе всего, посредствомъ **Tart. emet.**

Противъ отвращенія къ разнаго рода предметамъ весьма дѣйствительнымъ средствомъ служитъ **Ipecac.**

Прихоти беременныхъ устраняются часто посредствомъ **Platina.**

81. ВѢТРЫ, *flatulentia.*

Отъ чрезмѣрнаго развитія газовъ въ желудкѣ и кишечномъ каналѣ брюшныя покровы расширяются, и возникаютъ различныя припадки, какъ напр. боль въ животѣ, колики, колотье въ груди, затрудненное дыханіе, боль подъ ложечкой, сердцебіеніе, давленіе на печень, головная боль, боль въ спинѣ; подергиваніе, судоро-

ги, обмороки, головокруженіе, дурное расположеніе духа, симптомы истерики и ипохондрии. Иногда при этой болѣзни, если выходъ газовъ внизу задерживается (или если входное отверстіе желудка расслабло), возникаетъ сильная отрыжка или испусканіе газовъ ртомъ.

Расположеніе къ вѣтрамъ возникаетъ послѣ слишкомъ обильной ѣды, послѣ употребленія въ пищу пучащихъ кушаній (лука, овощей, плодовъ, капусты, пива), или бываетъ при слабости желудка, ипохондрии, геморроѣ; у нервныхъ особъ — въ видѣ судорожнаго сжатія кишекъ съ нѣкоторымъ пученіемъ ихъ, или въ видѣ расслабленія кишекъ, (причемъ стѣнки кишекъ не могутъ достаточно сильно сжиматься); наконецъ, сказанный недугъ бываетъ при дѣйствительномъ разширеніи желудка или кишекъ. При развитіи въ желудкѣ кислотъ, особенно въ первые годы жизни, легко присоединяются вѣтры.

Всего важнѣе въ этомъ случаѣ правильная діета и содѣйствіе выводу вѣтровъ движеніемъ. Если виною вѣтровъ невареніе желудка, то рекомендую **Puls. 2.**, а при вѣтрахъ послѣ пучащихъ кушаній, съ чувствомъ полноты и жара въ верхней части желудка, особенно ночью — **Chin. 2.** (см. катарръ желудка).

При вздутости живота съ запоромъ, отрыжкой, при нечистотѣ языка и головной боли: **Bryon. 3.**

При давленіи въ желудкѣ, съ головою и спиною болью, геморроемъ, мрачнымъ настроеніемъ духа: **Nux vom. 3.**

Въ хроническихъ случаяхъ этого рода, глубоко вкоренившихся, когда завалы печени, колики, кислоты въ желудкѣ: **Sulph. 3.**

Если развитіе кислотъ соединено съ ослизеніемъ желудка: **Calc. carb. 3.**, или **Magn. carb. 2.**

При кислотѣ съ изжогой, при пученіи живота послѣ ѣды и особенно по ночамъ, при недугахъ живота у страдающихъ геморроемъ и ипохондриями, съ жаромъ и стѣсненіемъ дыханія, дается **Carb. veg. 3.;**

Сердцебиеніе, вздутость живота, биеніе подъ ложечкой: **Natr. mur. 3. — 5.**

При судорожныхъ вѣтрахъ главнымъ средствомъ служитъ **Nux vom. 2.**, у истерическихъ особъ: **Asa 2.**, при параличобразныхъ состояніяхъ: **Phosph. 5.** или **Veratr. 3.**

Въ органическихъ случаяхъ непременно поможетъ **Sulph. 3.**

Подающія поводъ къ столь многимъ недугамъ вѣтры у дѣтей часто весьма скоро устраняются діетою, какъ напр. перемѣною молока, пици кормилицы и т. д., а также посредствомъ **Cham.** (при ночномъ безнокойствѣ), *Puls.* (при поносѣ съ желтыми испражненіями), *Rheum* (кислыя, бѣловатыя испражненія). Если дѣти притомъ много кричатъ: *Jalap.* Въ случаѣ запора: *Nux vom.* При сильномъ первомъ возбужденіи: *Coffea.*

Примѣч. При сильныхъ припадкахъ и въ острыхъ случаяхъ надо давать приемы черезъ 2—3 часа, а въ хроническихъ рѣже; для радикальнаго излѣченія часто приходится давать лѣкарства не чаще какъ черезъ 2—3 дня.

82. Желудочныя боли, *gastrodynia*, или судороги желудка, *gastralgia* или *cardialgia*.

Этотъ, иногда скоро проходящій, иногда же продолжительный недугъ, бываетъ различнаго характера, смотря по свойству боли, по связи его съ другими симптомами, наконецъ, по мѣсту его пребыванія и исходной точкѣ. Такимъ образомъ судороги желудка бываютъ:

- 1) чисто нервнаго характера и имѣютъ мѣстопробываніемъ спинной мозгъ или нервы живота. Послѣдніе могутъ или заболѣть самостоятельно, какъ напр. у истерическихъ особъ, послѣ душевныхъ потрясеній, при дѣвичьей немочи, ревматизмѣ и т. д., или прійти въ болѣзненное раздраженіе вслѣдствіе сочувствія къ другимъ пораженнымъ частямъ, какъ то къ печени (желчная колика), къ почкамъ, къ маткѣ и т. д.;
- 2) конгестивныя, зависящія отъ прилива крови, полнокровія нижней части живота, геморроя, расстройства мѣсячнаго очищенія, употребленія кофе и спиртныхъ напитковъ, отъ сидячаго образа жизни, отъ прилива крови къ печени и селезенкѣ;
- 3) органическія, зависящія отъ болѣзней слизистой оболочки желудка, какъ напримѣръ, отъ желудочнаго катарра (послѣ расстройства пищеваренія), медлительнаго вос-

паленія желудка (см. ниже), отъ ранъ или нарывовъ въ желудкѣ, отъ туберкулъ, рака, проглоченныхъ постороннихъ тѣлъ, отъ отравы и т. д.

Послѣднія формы естественно суть самыя тяжкія.

При выборѣ лѣкарствъ надо обращать особенное вниманіе на то, въ какомъ мѣстѣ страданіе и откуда оно исходитъ, а затѣмъ — на самую боль и на характеръ судорогъ. Надо имѣть въ виду:

- 1) при чисто нервныхъ судорогахъ желудка: **Bismuth., Cham., Cocc., Ignat.;**
- 2) при судорогахъ желудка отъ прилива крови: **Bellad., Nux vom., Carb. veg., Puls., Sepia., Sulph.;**
- 3) при органическихъ судорогахъ: **Argent. nitr., Arsen., Lycop., Phosph., Sulph., Conium.**

Изъ названныхъ средствъ *Arg. nitr., Con.* и *Phosph.* можно употреблять также противъ судорогъ желудка нервного характера, а *Calc. carb., Carb. veg., Lycop., Natr. mur.* и *Sulph.* — противъ конгестивныхъ и органическихъ. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ можно противъ судорогъ всѣхъ трехъ видовъ употреблять *Atropin., Bellad., China, Nux vom., Nitr. acid.* — Если принять во вниманіе особенные виды болѣзни, то при венозныхъ застояхъ особенно хорошо помогаютъ: *Bell., Carb. veg., Nitr. ac., Nux vom., Sep., Sulph.;* при малокровіи и дѣвичьей немочи: *Calc. c., Chin., Ferr., Natr. m., Puls., Sep.;* при желудочномъ катаррѣ: *Arsen., Bryon., Calc. c., Carb. v., Chin., Lyc., Nux vom., Puls., Sep., Sulph.;* при затвердѣлостяхъ и ракъ: *Arsen., Baryt., Con., Kreos., Lyc., Phosph., Plumb.;* при нарывахъ въ желудкѣ: *Arg. nitr., Arsen., Atropin., Kreos., Nitr. ac., Plumb.*

Подробности объяснены при слѣдующихъ отдѣльныхъ средствахъ:

Arsenicum — 3.

Болѣе при *органическомъ* измѣненіи; особенно въ *слизистой оболочкѣ* (нарывы). *Жуція* боли съ сильною тоской и безпокойствомъ, обморокъ, поносъ,

чрезвычайная слабость; блѣдность лица, чрезвычайная сухость рта и жажда, *боль какъ отъ нарыванія*, часто повторяющаяся, *рвота кровью* или темной массой.

Belladonna — 3.

*Приливъ крови. Схватыва-
ніе какъ бы рукою; давленіе не-
посредственно послѣ ѣды, напря-
женіе, принуждающее больного
нагибаться назадъ, вслѣдствіе
чего боль облегчается. Подъ
ложечкой вздуто, боль при при-
косновеніи. Боль припадками,
доводящая часто до обморока.
Жаръ въ головѣ и груди; жаж-
да, бессонница. (Женщинамъ,
дѣтямъ, чувствительнымъ осо-
бамъ).*

Bismuthum — 2.

Главное средство противъ
судорогъ желудка отъ *страда-
нія спинныхъ и желудочныхъ нер-
вовъ, отъ истерики.* Часто по-
могаетъ въ весьма упорныхъ
случаяхъ, когда ощущается да-
вленіе, тяжесть, чувство давле-
нія какъ бы отъ ширя на желуд-
къ, чувство недомоганія, соеди-
ненное съ *спинной болью*, соот-
вѣтствующей обыкновенно зад-
ней стѣнкѣ желудка, пищева-
реніе обыкновенно правильное;
изрѣдка также отсутствіе аппе-
тита, жажда, отрыжка, взду-
тость живота.

Bryonia — 2.

Не столько противъ настоя-
щихъ судорогъ, сколько противъ

вторичной боли въ желудкѣ
при другихъ страданіяхъ, от-
носящихся главнымъ образомъ
къ *слизистой оболочкѣ* желудка
(катарръ) или къ печени (раз-
стройство выдѣленія желчи).
Послѣ *досады, простуды, сидя-
чаго образа жизни*, порчи же-
лудка. *Давленіе* какъ бы отъ
камня, усиливающееся отъ дви-
женія, съ *колотьемъ* при ходь-
бѣ. *Опухоль желудка, облега-
ющая отъ отрыжки, желтый
языкъ, кислый или горькій вкусъ*
во рту, *запоръ*, головная боль
во лбу.

Carbo vegetabilis — 3.

Болезнь основывается глав-
нымъ образомъ на матеріаль-
ныхъ причинахъ, каковы стра-
даніе слизистой оболочки, *при-
ливъ крови*, преимущественно къ
нижней части живота, у лю-
дей *страдающихъ геморроемъ,
ученыхъ, ведущихъ сидячій об-
разъ жизни.* Употребляется, по-
добно *Nix vom.*, послѣ злоу-
потребленія *спиртными напит-
ками*, послѣ *переполненія же-
лудка* и т. д., при *жгучемъ да-
вленіи* съ тоскою, послѣ ѣды,
отъ *вѣтровъ* хуже. *Жаръ въ
нижней части живота, стѣсне-
ніе дыханія, развитіе кислотъ
въ желудкѣ, изжога, запоръ, тош-
нота.* Ночныя боли.

Chamomilla — 2.

Судорожная боль въ желудкѣ. (Больше противъ временныхъ припадковъ.) Послѣ душевныхъ потрясеній, особенно послѣ инва, досады: давленіе какъ бы отъ камня, съ стѣсненіемъ дыханія и одышкой; рѣзь, схватывающая и стягивающая боль, принуждающая больного корчиться; по ночамъ безпокойство. Притомъ поносъ, колики, первое сердцебиеніе, раздражительность нервовъ, сварливость. Кофе облегчаетъ припадки.

China — 2.

Употребляется только въ тѣхъ случаяхъ, когда предшествовали дѣвичья немочь, потеря соковъ и вообще всякаго рода расслабляющіе процессы, вызвавшіе слабость желудка и чувствительность нервовъ; поэтому: послѣ нды давленіе въ животъ, который при этомъ вздувается; отъ покоя хуже, отъ движенія лучше; чувство насыщенія послѣ принятія даже небольшого количества пищи; притомъ слабость пищеваренія и расстройство его, всеобщая слабость, особенно же лѣнность, шпихондрія, блѣдность, малокровіе.

Cocculus — 2.

Судорожная боль. У истерическихъ и слабыхъ особъ: да-

вящая, щемлящая, схватывающая, особенно стягивающая боль, тотчасъ послѣ ѣды, облегчается отъ выхода вѣтровъ; притомъ тошнота, головокруженіе, обмороки, стѣсненіе въ груди, запоръ, дурное расположеніе духа.

Ignatia — 2.

Нервная судороги желудка. Особенно полезно при судорогахъ послѣ печали и заботъ, когда притомъ — давленіе какъ бы отъ камня, особенно послѣ нды или ночью, ной, ощущение пустоты, голода, вмѣстѣ съ невозможностью принимать пищу; обморокъ, чувство слабости, дурное расположеніе духа.

Lycopodium — 3. раст., 5. разж.

Отличное средство противъ органической боли желудка, въ особенности когда она распространяется отъ слизистой оболочки (катарръ, затвердѣлости и т. п.). При этомъ давленіе, сжиманіе съ боковъ, роющая, ворочающая, схватывающая боль, толчки изъ желудка по направленію къ плоткѣ, вѣтры. Около пупка какъ будто что-то тянетъ, чувство полноты подъ ложечкой, съ щемлящей, давящей, схватывающей болью; головокруженіе, волненіе крови, запоръ, развитіе кислотъ въ желудкѣ,

тошнота, рвота, *стѣсненіе дыханія*, пораженіе печени.

Nux vomica — 3.

Главное средство противъ *нервныхъ* страданій и противъ послѣдствій отъ *застоя крови* въ желудкѣ и нижней части живота, у *страдающихъ геморроемъ*, *ипохондріею*, у ведущихъ кабинетную жизнь, у *пьющихъ много кофе* и у *цѣяницъ*. Симптомы: *давленіе, стягиваніе, натощакъ, утромъ*, усиливающееся послѣ *ѣды*; желудокъ какъ бы *сдавленъ котями*, отъ *кофе* особенно *хуже*; притомъ тошнота, опухоль подъ ложечкой, *скопленіе слюны*, гастрическое и желчное растройство, *рвота, втѣтры, запоръ*, давящая головная боль (во лбу).

Phosphor. — 3.

При нервной боли, но чаще при пораженіи слизистой оболочки; при хронической слабости желудка, медлительномъ воспаленіи, при *варывахъ*; вслѣдствіе этого: *жженіе*, особенно послѣ *ѣды* (тотчасъ), усиливающееся отъ *прикосновенія*, ходьбы. *Давленіе*, ощущение полноты или *схватывающая* боль, стѣсненіе дыханія, *ной*, *сверленіе* какъ бы *винтомъ*. Пища поднимается снова вверхъ, не можетъ прой-

ти, или рвота зеленоватой и черноватой массой. Холодный потъ, *слабость*, обмороки.

Pulsatilla — 2.

Болезнь бываетъ большею частью слѣдствіемъ *разстройства пищеваженія*. Потому это средство употребляется противъ судорогъ желудка только въ томъ случаѣ, если при этомъ *катарръ* или застой крови въ нижней части живота, и особенно когда остановилось *мѣсячное очищеніе*; поэтому очень полезно особамъ, *страдающимъ двѣвичьей немочью* и чувствительнымъ. Симптомы: *колотье*, съ *біеніемъ* и *напряженіемъ*; боль усиливается отъ ходьбы, *ѣды*, которая сначала, повидимому, *умѣряетъ* ее, отъ *питья*, вечеромъ. Притомъ тошнота, *языкъ нечистъ*, *поносъ*, *ознобъ*, слезливость. Тошноту желудокъ ухудшаетъ боль.

Sulphur — 2.

При хроническихъ *недугахъ слизистой оболочки* или *полнокровіи нижней части живота*, подобно *Nux, Carbo* и *Lycor.*, если эти средства не оказали нужной помощи. При *геморропъ*, опуханіи органовъ живота (печени, селезенки), *ломотѣ*, на-

<p>кожныхъ сыпяхъ, ипохондрии. Особамъ, ведущимъ кабинетную жизнь, <i>полнокровнымъ</i>. Симпто-</p>	<p>мы: <i>давленіе съ развитіемъ кислотъ</i> въ желудкѣ, изжога, отсутствіе аппетита, <i>запоръ</i>.</p>
--	--

Примѣч. Въ большинствѣ случаевъ этихъ средствъ бываетъ достаточно. Укажу еще на *Natr. mur.*, *Nitr. acid.*, **Kreos.**, а также на *Baryt.* 3., при поражении входнаго отверстия желудка (тогда послѣ ѣды боль усиливается). Отличнымъ средствомъ противъ нервной и еще болѣе противъ органической боли въ желудкѣ (особенно при затвердѣlostяхъ и т. п.) служить *Con.* 3., причѣмъ боль въ спинѣ, давленіе при ѣдѣ, чувство стягиванія съ ощущеніемъ холода, также въ спинѣ, щиплющая боль и боль какъ будто отъ ранъ; стѣсненіе дыханія, сердцебіеніе, опухоль подъ ложечкой.

Все зависитъ отъ правильнаго изслѣдованія мѣстопребыванія и происхожденія болѣзни и отъ точнаго различенія симптомовъ. Такъ напр. содѣтуютъ также *Argent. nitr.* 5. противъ нарывовъ желудка, противъ судорогъ желудка у женщинъ при слишкомъ раннихъ и обильныхъ регулахъ, причѣмъ колюще, щиплющая, потягивающая боль и ной, сильная раздражительность нервовъ, рвота водой и желчью. Недавно я убѣдился въ отличномъ, хотя и палліативномъ лишь (облегчающемъ) дѣйствіи *Atropin.* 3. — 5., даже при симптомахъ еще существующихъ или недавнихъ нарывовъ, заживаніе которыхъ, повидимому, еще причиняло боль. Признаки были тѣ же, какъ и описанные при *Bellad.*, только сильнѣе и упорнѣе, и усиливались во время пицеваренія.

Въ заключеніе приведемъ новѣйшія средства. *Caulophyll.* — когда боль связана съ раздраженіемъ матки; *Dioscor.* — дѣйствуетъ подобно *Nux.* при періодической боли и отрыжкѣ; *Gelsem.* — тяжесть, напряженіе, тупая боль, ощущеніе пустоты и слабости въ верхней части живота, ложный голодь, иногда и во время беременности; *Leptandr.* — сильная рѣзь съ тупой, мучительной болью ниже желудка, усиливающаяся отъ холоднаго питья и вставанія; быстрое испражненіе, котораго нельзя удержать.

Здѣсь надо остерегаться слишкомъ сильныхъ и частыхъ примомъ: нерѣдко недугъ отъ этого усиливается.

83. Воспаленіе желудка,

gastritis.

Въ полномъ своемъ развитіи оно едва ли подлежитъ лѣченію не-врача, потому что это — болѣзнь опасная. Вслѣдствіе этого мы здѣсь скажемъ только о самомъ необходимомъ, на случай отсутствія врача. Всѣ признаки желудочныхъ припадковъ, даже сильнѣйшія боли, жажда, рвота желчью, кровью и т. д., запоръ, лихорадка, не такъ вѣрны, какъ усиленіе боли отъ маѣйнаго прикосновенія, отъ пищи и питья, отъ движенія. Припадки воспаления очень схожи съ припадками отравленія, которое чаще всего бываетъ причиною воспаления желудка. Впрочемъ, злоупотребленіе спиртными напитками, острой пицею, рвотными и другими лѣкарствами, простуда, проглоченныя постороннія тѣла, распространеніе воспаления другихъ частей, какъ напр. брюшины, механическія поврежденія и даже нарывы въ желудкѣ могутъ также иногда вызвать эту болѣзнь. Самъ собою разумѣется, что для усиѣннаго лѣченія необходимо устранить причины, вызвавшія болѣзнь, какъ напр. ядъ, постороннія тѣла и т. п.

Aconitum — 2.

Въ началѣ: лихорадка, наружный жаръ; *колотье*, давленіе, жженіе, жажда; гастрическіе симптомы. Болѣе для особъ сангвиническихъ, крѣпкаго тѣлосложенія.

Arsenicum — 2.

Въ болѣе опасныхъ случаяхъ, причемъ *жженіе*, стягиваніе, рвущая боль въ желудкѣ, стѣсненіе дыханія, *сильная жажда*, жаръ, напряженіе, опухоль страаны желудка, весьма чувствительной къ прикосновенію; *небольшой, перемежающійся пульсъ*,

холодный потъ, обморокъ, икота, бредъ, тошнота, рвота послѣ каждаго приема пищи, даже послѣ жидкихъ веществъ, страшная тоска и безпокойство, запоръ, холодные члены при пылающемъ жарѣ въ верхней части тѣла, мертвенная блѣдность лица.

Belladonna — 2.

Въ тѣхъ же случаяхъ, какъ *Acon.* и *Ars.*, причемъ *схватываніе*, *роющая боль* въ желудкѣ, всхлищываніе; затрудненіе при глотаніи; бредъ, приливъ крови

къ верхнимъ частямъ гѣла. Для чувствительныхъ особъ, но только въ началѣ и въ легкихъ случаяхъ болѣзни.

Vryonia — 2.

Большею частью послѣ *Acop.*, когда лихорадка и воспаленіе уменьшились. *Давленіе, колотье, жженіе*; опухоль желудка; отрыжка, рвота, *запоръ*, кашель, *стѣсненіе дышанія*; жажда; сильное возбужденіе. Преимущественно для женщинъ и дѣтей.

Camphora — 2.

При сильнѣйшихъ *приступнахъ*, причемъ давящее *жженіе* и, вмѣстѣ съ тѣмъ, *холодъ* въ желудкѣ, боль отъ прикосновенія. Рвота желчью и кровью,

отрыжка, *холодный потъ*, жажда холодныя оконечности, тоска, чувство разбитости въ спинѣ, раздраженіе мозга.

Nitrum — 2.

Сильное давленіе, острое колотье, при жженіи съ чувствомъ холода. Страшный голодъ, небольшая жажда, икота, горькая отрыжка, быстрый и *жесткій* пульсъ.

Phosphor. — 3.

Рвзь, давящее жженіе, жгучій жаръ изъ желудка; *сильная жажда*, тоска, конвульсія, дрожь; холодныя оконечности, блѣдность губъ, слабый пульсъ, *упадокъ силъ*, судороги.

Примѣчаніе. Если остаются симптомы гастрическіе, то рекомендуемъ *Nux vom.* 3. Въ хроническихъ случаяхъ полезны *Arg., nitr.* 5., *Brom.* и *Jod.* 5., **Plumb.** 3. — *Sulphur* надо давать здѣсь съ осторожностью и въ рѣдкихъ приемахъ.

Новѣйшія средства: *Euphorb. coroll.*; — *Iris*: жженіе въ желудкѣ, рвота, поносъ, необыкновенная слабость; жженіе во рту, глоткѣ и пищепріемномъ горлѣ; — *Podoph.*: страшная боль отъ стягиванія при рвотѣ; кислоты, кислая отрыжка, сильная жажда, рвота, иногда кроваво-желчная; — *Rumex cr.*: колотье отъ желудка по направленію къ груди, чувство полноты, давленіе подъ ложечкой, поднимающееся до горла; спускающееся при глотаніи (безъ пищи); отрыжка, давленіе послѣ ѣды; — *Sanguin.*: ознобъ, жаръ, сухія и красныя губы и языкъ, сухость въ горлѣ, головная боль, тошнота, рвота съ сильнымъ жженіемъ въ желудкѣ и жаждою.

Въ острыхъ случаяхъ не слѣдуетъ шутить *приемами*. Но тутъ нужнѣе частое повтореніе, чѣмъ сильныя дозы, потому что

раздраженный желудокъ чувствителенъ и къ слабымъ приемамъ.— Слизистая, обволакивающая пища (слизистые супы, яичный бѣлокъ, молоко, отваръ овсяной крупы и т. п.), а также глотаніе льда маленькими кусочками, способствуютъ лѣченію.

84. Размягченіе желудка,

gastromalacia.

Эта болѣзнь, бывающая преимущественно у дѣтей, обнаруживается сначала, повидимому, въ весьма легкой формѣ рвоты и поноса (такъ называемая холера дѣтей). Если эти припадки не уступаютъ употребленнымъ противъ нихъ лѣкарствамъ (см. рвоту и поносъ), и наступаетъ истощеніе, то надо опасаться перехода къ размягченію желудка, въ особенности если имѣются слѣдующіе симптомы: неутолимая жажда, малый, быстрый пульсъ, холодная кожа, жаръ, вздутость и чувствительность въ странѣ желудка, рвота кислою, слизистою, желтою или бурюю жидкостью тотчасъ послѣ питья, поносы съ зелеными или желтоватыми, рублеными, смѣшанными съ стекловидною или желчною слизью или кусочками жира, зловонными, кисловатыми испражнениями, разбѣдающими задній проходъ; исхудалость, придающая пациенту видъ старческаго; дурное расположеніе духа, безпокойство, бессонница, постоянный хриплый стонъ, позднѣе судороги, сонливость, наконецъ, параличъ мозга или легкихъ. Причинами этой болѣзни бываютъ золотуха, особенно дурная пища и дурной уходъ за ребенкомъ, слишкомъ раннее отнятіе отъ груди, развитіе бугорковъ въ нижней части живота или предшествовавшія острия болѣзни, въ особенности холерина, воспаленіе мозга, ожирѣніе мозга, головная водянка.

У взрослыхъ болѣзнь эта бываетъ слѣдствіемъ *тифа*, родильной лихорадки, скоротечной чахотки и т. д.

Главнымъ средствомъ здѣсь служитъ **Kreosot. 5.** (черезъ 3—1 часъ по 2 капли), который, по нѣкоторымъ новѣйшимъ наблюденіямъ, пожалуй, слѣдуетъ предпочесть **Arsen. — Tart. emet. 2.** (по нѣскольку капель черезъ 4 часа) дается при рвотѣ; **Calc. acet. 3.** (по нѣскольку капель утромъ и вечеромъ), когда преобладаетъ поносъ; въ началѣ и въ концѣ болѣзни — **Phosph. ac. 3.** (черезъ

3—4 часа). Впрочемъ, болѣзнь эта до такой степени опасна, что лучше — какъ можно скорѣе призвать врача. Рекомендуемъ также *Argent. nitr.*, *Laches* и *Veratr.* Первое средство дѣйствуетъ болѣе на всю болѣзнь, между тѣмъ какъ послѣднія устраняють иногда рвоту и помогаютъ, по крайней мѣрѣ, паліативно.

Примѣчаніе. Въ послѣднее время нѣкоторые врачи стали высказывать мнѣніе, что размягченіе желудка есть не болѣе, какъ слѣдствіе разложенія трупа, т. е. является лишь по смерти больного. Очень можетъ быть, что размягченіе желудка часто является лишь въ трупѣ, если даже трупъ принадлежалъ человѣку, не страдавшему желудкомъ, но не подлежитъ сомнѣнію, что болѣзнь эта существуетъ и узнается по опредѣленнымъ симитомамъ и у людей живыхъ.

О прочихъ органическихъ болѣзняхъ желудка, каковы затвердѣніе, суженіе, ракъ, нарывы и т. д. (болѣзни эти, въ особенности же нарывы, не всегда можно отличить отъ судорогъ желудка), мы не говоримъ, по причинамъ, приведеннымъ въ предисловіи.

Рвота кровью, см. кровотеченія.

85. Воспаленіе нижней части живота, т. е. брюшины, *peritonitis*, или кишекъ, *enteritis*.

Не говоря о тонкихъ діагностическихъ различіяхъ, здѣсь существенно необходимо узнать, что поражено: брюшина, кишки или преимущественно слизистая оболочка кишекъ. Весьма часто разсматриваемыя нами болѣзни усложняются тѣмъ, что воспаленіе переходитъ съ одной изъ сосѣднихъ частей на другую. Необходимо также принять во вниманіе періодъ болѣзни (начало воспаленія, переходъ его къ выпотѣнію, антонову огню, нарыванію). Воспаленіе (особенно брюшины) обнаруживается сильной болью, то въ формѣ рѣзи, то въ формѣ жженія или схватыванія и т. п.,

усиливающейся отъ малѣйшаго прикосновенія (даже къ постельному бѣлью), движенія, кашля, чиханія. Кромѣ того, оно сопровождается жаромъ въ нижней части живота, безпокойствомъ, тоскливостью, сильной жаждой, ускореннымъ дыханіемъ, вздутостью живота, запоромъ (или, при воспаленіи слизистой оболочки кишекъ, поносомъ), отрыжкой, рвотой или тошнотой, лихорадкой. Пульсъ въ опасныхъ случаяхъ малый. Боль не всегда служитъ отличительнымъ признакомъ этихъ болѣзней отъ коликъ, кроваваго поноса и т. п., такъ какъ ея можетъ и не быть, въ особенности при воспаленіи слизистой оболочки кишекъ. Поэтому должно быть осторожнымъ!

Опаснѣе, во всякомъ случаѣ, воспаленіе брюшины, такъ какъ тутъ очень скоро образуется выпоть, которое изливается въ брюшную полость, гдѣ оно или остается нѣкоторое время безъ всякаго вліянія на окружающую среду, или причиняетъ переплетеніе кишекъ, чрезъ срастаніе или слипаніе кишечныхъ стѣнокъ; сверхъ того, онъ можетъ причинить антоновъ огонь, прободать кишечныя стѣнки, ввести въ кровь гной и причинить изнурительную лихорадку. Холодѣніе ногъ и спаденіе лица предвѣщаютъ печальный исходъ болѣзни.

Впрочемъ, надобно остерегаться, чтобы не смѣшать послѣдствій ущемленной грыжи съ воспаленіемъ нижней части живота, потому что тотъ и другой случай очень схожи.

Воспаленіе брюшины случается въ очень опасной формѣ у родильницъ. (См. родильную лихорадку.)

Aconitum — 2.

Въ началѣ воспаленія брюшины и кишекъ, у особъ весьма вѣрнаго сложенія; при этомъ быстрый, полный, жесткій пульсъ, красная моча, горячая кожа; сверхъ того, сильная лихорадка, жажда, боль въ брюшныхъ покровахъ отъ малѣйшаго прикосновенія, съ жаромъ въ нихъ. — *Колотье, ломъ, рѣзь, жженіе.*

Arsenicum — 3.

Одинаково хорошо противъ воспаленія кишекъ и воспаленія брюшины, при сильномъ развитіи болѣзни, когда (значительное) вытоптеніе съ упадкомъ силъ, холодѣніе конечностей, обмороки, кровавыя испраженія; когда опухоль имѣетъ склонность распространяться, угрожаетъ антоновъ огонь. Сверхъ

того, когда воспаленіе есть слѣдствие органическаго страданія желудка или кишечнаго канала.

Belladonna — 2.

Главное средство (котораго часто бываетъ достаточно) противъ *воспаленія брюшины*, когда боль летучая, рѣжущая, сверлящая, давящая, схватывающая, *роющая* какъ бы руками, стягивающая, наступающая *отдѣльными приступами* и *периодически усиливающаяся*; жажда, красный языкъ, горячая кожа, умѣренная лихорадка. Пульсъ *малъ, быстръ, мягокъ*. Отъ вѣтровъ боль возобновляется, равно какъ отъ *малѣйшаго прикосновенія*. Больной даже едва выносить одѣяло. Притомъ сильный жаръ, раздраженіе мозга, приливъ крови къ верхнимъ частямъ тѣла, тошнота, рвота, запоръ, затрудненное мочеиспусканіе.

Bryonia — 2.

Во 2 стадіи *воспаленія брюшины*, послѣ *Acon.* и *Bellad.*, когда еще остаются слѣды воспаления, особенно когда долженъ всосаться выпоть; боль *колощая, острая, мухо-давящая рѣжущая*, напрягающая. При-

томъ запоръ. Рѣже при воспаленіи кишекъ.

Mercurius — 2.

Главное средство при *воспаленіи кишекъ*, особенно когда поражена *слизистая оболочка*, и притомъ *рѣжущая* боль; часто боль отъ прикосновенія незначительна, сидитъ глубже и ощущается *при выходѣ испражненій и вѣтровъ*; позывъ на низъ; *испражненія кровависты, водянисто-слизисты, зелено-желчны*, съ кусочками *кишечной оболочки*, *примѣсь рвѣ* и жженіе. Бѣлый или бурый языкъ, сильная жажда, тугой животъ. Ознобъ съ *пѣтомъ* безъ облеченія. (Хорошо также при переходѣ кроваваго поноса въ воспаленіе.)

Phosphor. — 3.

Употребляется не такъ часто; противъ *воспаленія брюшины* и *кишекъ*. *Колощая* боль, какъ бы *стрѣлою* пронзающая животъ, или *жженіе*, *рвѣ* съ легкимъ позывомъ на низъ и ощущеніемъ холода или тепла. Бурчаніе въ желудкѣ, съ болью. Чрезвычайная слабость, холодныя оконечности. (Лѣкарство это надо выбирать съ большею осторожностью.)

Примѣчаніе. Въ опасныхъ случаяхъ воспаленія брюшины и кишекъ, при *жгучей*, рѣзущей боли, слизистыхъ испражненіяхъ и сильномъ *позывѣ къ мочеиспусканію*, особенно когда поражены внутреннія стѣнки мочевого пузыря: *Canthar.* 3. При хроническомъ воспаленіи: *Nitr. ac.*, *Plumb.*, *Sulph.* Только тутъ надо обращать вниманіе на болѣе отдаленныя причины и на усложненія болѣзни. *Nix vom.* можно давать по устраненіи воспаления, когда еще не исчезли давящія боли, запоръ, тошнота, рвота и т. д. — *Coloc.* полезно болѣе при пораженіи толстой кишки въ формѣ воспалительной *колики*, (см. слѣд. статью). — Важнымъ средствомъ, симптомы котораго однако еще не совсемъ опредѣлены, служитъ **Nitrum. 3.**, когда колетъ, тянетъ въ тонкой кишкѣ (около пупка), животъ вздуть, *ноги холодны какъ ледъ*. Кажется, оно особенно полезно особамъ слабаго сложенія.

Вмѣсто *Mercur. sol.*, если оно не помогаетъ, можно здѣсь съ гораздо большей пользой давать *Calomel* 2. раст., которое дѣйствуетъ глубже.

Если не удалось посредствомъ *Bryonia* устранить массы отвердѣлаго выпота послѣ воспаленія, и реакція слаба, то полезенъ **Sulphur.**

Предлагаемое въ новѣйшее время *Gelsem.* едва ли помогаетъ противъ разсмотрѣнныхъ нами двухъ болѣзней и во всякомъ случаѣ хуже нашихъ старыхъ средствъ. Стоитъ испытать дѣйствіе *Euphorb. coroll.* противъ воспаленія кишекъ. Противъ той же болѣзни дается *Iris*; въ хроническихъ и желчныхъ формахъ — *Leptandr.*, если притомъ запоръ — *Phytol.* Показанія о дѣйствіи *Nuph. lut.* при воспалительныхъ коликахъ весьма сомнительны.

Что касается до *пріемовъ*, то здѣсь нельзя шутить слишкомъ высокими разжиженіями; а потому надо строго сообразоваться съ вышеозначенными дозами и давать нѣкоторыя лѣкарства, какъ напр. *Acon.*, *Bellad.*, *Bryon.*, черезъ 2 часа. Важнымъ вспомогательнымъ средствомъ лѣченія служатъ теплыя припарки изъ львяной муки. Ни въ какомъ случаѣ не слѣдуетъ вызывать какими-либо средствами испражненія. Запоръ, по устраненіи воспаления, проходитъ самъ собою, и слабительныя, даже самыя легкія, чаще вредятъ, чѣмъ приносятъ пользу.

86. Боли въ животѣ, колики,

colica.

Тутъ надо прежде всего обратить вниманіе на особенности болей, а затѣмъ также на различныя ихъ причины. Боли живота могутъ быть:

- 1) первыя или судорожныя (истерическія, ипохондрическія, исходящія изъ кишекъ или перешедшія изъ желудка, почекъ, мошонки, матки, мочевого пузыря); главные средства — *Bell., Cham., Ver.*
- 2) конгестивныя, обусловливаемыя приливомъ крови (такъ называемыя кровяныя колики), бывающія при геморроѣ (геморроидальная колика); главные средства: *Bell., Cham., Nux vom., Puls.*
- 3) воспалительнаго характера, когда грозитъ переходъ въ настоящее воспаление; главные средства: *Acon., Merc.*
- 4) ревматическія и ломотныя; главное средство: *Coloc.*
- 5) органическія, происходящія отъ внутреннихъ болѣзней, какъ напр. отъ суженія кишекъ, нарывовъ на нихъ; главное средство: *Arsen.*
- 6) обусловливаемыя присутствіемъ постороннихъ тѣлъ, какъ напр. желчныхъ и кишечныхъ камней: *Bell., Bryon., Merc.*
- 7) обусловливаемыя разстройствомъ отдѣленія желчи, разстройствомъ пищеваренія, переполненіемъ желудка пищею, развитіемъ вѣтровъ: гастрическая, желчная и происходящая отъ вѣтровъ колика; *Bryon., Nux vom., Puls., Sulph.*
- 8) происходящія отъ глисть, глистная колика: *Mercur.*
- 9) свинцовая колика — особенный видъ болѣзни, встрѣчающійся у работниковъ, имѣющихъ дѣло со свинцомъ.

Въ большинствѣ случаевъ колика представляетъ раздраженіе симпатическаго нерва въ связи съ особеннымъ раздраженіемъ нервовъ чувствъ и движенія.

Болѣе точные признаки приведены при отдѣльныхъ средствахъ.

Aconitum — 2.

Воспалительные и ревматическіе симптомы. Послѣ простуды. Съ *лихорадкою, рвзью*, сильнымъ позывомъ къ мочѣ, сильной чувствительностью покрововъ живота; потягиваніе и ломъ въ членахъ. Сильное безпокойство тоска.

Arsenicum — 5.

При *воспалительныхъ или органическихъ* причинахъ. Сильная боль, *рвзь, жжение*, потягиваніе, ломъ, нои; *необыкновенная жажда*, рвота, поносъ или запоръ. *Сильная тоска*, отчаяніе. Чрезвычайная слабость. Блѣдное лицо, слабый пульсъ. Принадки преимущественно ночью.

Belladonna — 2.

Конкестивные, воспалительные, судорожные, ревматическіе симптомы. Особенно *геморроидальная и менструальная* колика. *Схватываніе какъ бы руками*, когтями, *ципящая боль*, потягиваніе, *рвзь*, заставляющая пациента корчиться, отчего ему становится легче, *сверленіе*, и все это отдѣльными приступами, *стягиваніе* отдѣльныхъ, вздувшихся въ видѣ опухолей, частей живота съ давленіемъ книзу; сильный позывъ къ мочѣ;

приливы крови къ головѣ, боль въ поясницѣ, судороги икръ.

Bryonia — 2.

Колика и вздутость живота отъ вѣтровъ; причемъ запоръ, *тугой животъ*, давящая боль послѣ ѣды, напр. плодовъ. Также послѣ простуды. Гастрическіе припадки, головная боль.

Chamomilla — 2.

Судорожная, желчная, также геморроидальная и менструальная колика. Особенно хорошо для *дѣтей, женщинъ, чувствительныхъ особъ*, когда ломъ, *потягиваніе, рвзь*, съ перерывами, сильнымъ безпокойствомъ. *Поносъ съ водянистыми, слизистыми, зеленоватыми испражнениями*. Рвота, причемъ кажется, что кишки какъ будто свертываются въ клубокъ. *Давленіе книзу*, къ поясницѣ, почкамъ, мочевому пузырю, маткѣ. *Развитіе вѣтровъ*, давленіе и напряженіе въ нижней части живота, въ желудкѣ, особенно послѣ ѣды.

Colocynthis — 2.

Главное средство противъ *воспалительныхъ, ревматическихъ и желчныхъ* коликъ, когда бываетъ *сильнѣйшая рвзь*, особенно около пупка, или *стягиваніе*,

схватываніе, колотье какъ бы *ножами*. Послѣ *досады*; притомъ: желчныя симптомы, вздутость живота, судороги икръ, ознобъ, сильное безпокойство, поносъ съ *изліяніемъ желчи*. Также въ томъ случаѣ, когда отъ кофе легче, больные стараются къ чему-нибудь прислониться, ложатся на животъ, когда во время приступовъ надавливаніе живота облегчаетъ боль, когда долго остается боль какъ бы отъ разбитости, и когда при каждомъ шагѣ ощущеніе, будто кишки висятъ на ниткѣ.

Mercurius — 3.

Ревматическая и воспалительная форма. Послѣ простуды; также при *глистной коликѣ*, сопровождаемой сверленіемъ, какъ бы винтомъ, *рѣзью*, *жжениемъ*, чувствительностью живота къ прикосновенію и тугостию его. Также при *колотьяхъ*, напряженіи. Тошнота; *поносъ съ зеленоватыми* или слизистыми испражненіями; слюнотеченіе. Ночные приступы. Потъ безъ облегченія, ляхорадка.

Nux vomica — 2.

Главное средство противъ *колики геморроидальной* и отъ *вѣтровъ*, происходящей отъ *запора*,

причемъ *давленіе* въ кишкахъ, какъ бы отъ камня, *стягиваніе*, *сжиманіе*, *рѣзь* съ давленіемъ, вздутостью подъ ложечкой, въ бокахъ. *Твердый, стянутый* животъ. Бурчаніе въ животѣ безъ отдѣленія вѣтровъ. Стѣсненіе дыханія; давленіе, *рѣзь*, колотье въ *поясницѣ*, *мочевомъ пузырьѣ*, *заднепроходной кишкѣ*, *промежности*; давленіе въ головѣ, чувство разбитости въ членахъ; *упромъ* *всѣ* *припадки* *усиливаются*. Если стоять, то страданія усиливаются, если же находиться въ покойномъ положеніи, сидѣть, лежать, корчиться, то они облегчаются.

Pulsatilla — 2.

Простуда или разстройство пищеваренія, *вѣтры*. Служить также главнымъ средствомъ противъ *менструальной колики* (такъ наз. кровавыя колики), бывающей при задержаніи регуль. *Колотье* или *цилющая*, *рвущая* боль, *рѣзь*, бурчаніе отъ вѣтровъ. Отсутствие аппетита; языкъ нечистъ, тошнота, *поносъ*. Головная боль, *біеніе* подъ ложечкой, со вздутостью въ этомъ мѣстѣ, блѣдность лица, ознобъ, слезливость; легче при ходьбѣ, хуже отъ лежанія, сидѣнія; приступы *бываютъ* *вечеромъ* *или* *ночью*.

Sulphur — 3.

Въ упорныхъ, часто повторяющихся случаяхъ, особенно геморроидальной колики. Симптомы, подобные означеннымъ при *Nix*, когда послѣднее не помогаетъ, животъ какъ будто въ ранахъ, судорожныя боли распространяются на грудь, нижнюю часть живота, половые органы, смѣняясь съ рѣзью и ко-

лотьемъ, и доходятъ до плечей и позвоночнаго столба.

Veratrum — 2.

Судорожная форма, колики отъ вѣтровъ, съ тошнотою, рвотою и поносомъ одновременно; щиплющая, сверлящая, стягивающая боль; притомъ тоска, холодный потъ, обморокъ, ознобъ, чрезвычайная слабость.

Примѣчаніе. Изъ этихъ средствъ чаще всего употребляются *Acon.*, *Bell.*, *Cham.*, *Coloc.* Кромѣ перечисленныхъ формъ болѣзни, существуютъ еще нѣкоторыя другія, имѣющія совершенно своеобразный характеръ; противъ нихъ можно указать еще другія лѣкарства, а именно:

при истерической и апохондрической коликѣ съ застоємъ крови въ животѣ и особенно въ печени и системѣ воротной вены — *Asa foet.* 3.

при коликѣ отъ вѣтровъ, у расслабленныхъ, когда животъ натянутъ какъ барабанъ, кишки стянуты, запоръ — *China* 3.

при коликѣ отъ отравленія свинцомъ, случающейся у лакировщиковъ, маляровъ, горшечниковъ и т. п., употребляющихъ при своихъ работахъ свинецъ — *Opium* 3.

при коликѣ отъ переполненія желудка, при упорномъ запорѣ — *Lycop.* 3.

при періодически возвращающихся сильнѣйшихъ боляхъ около пупка, съ запоромъ, причѣмъ животъ туго и покрытъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ узловатыми опухолями, чувство стягиванія кишекъ, боль и судороги, чувство паралича въ членахъ — *Plumb* 3.

Приведемъ новѣйшія средства. Противъ желчной колики: *Diosc.* (больной корчится отъ боли); противъ судорожной колики отъ вѣтровъ: *Gels.*; весной и осенью, слизь, желчныя испражнения, также противъ колики у дѣтей: *Iris*; противъ колики желчной и отъ вѣтровъ: *Leptandr.*; сверленіе, бурчаніе отъ вѣтровъ, рѣзь,

схватывающая боль, какъ передъ поносомъ: *Phytol.*; судороги, втягиваніе мускуловъ живота, или судорожное стягиваніе мускуловъ въ узлы, свинцовая колика: *Podoph.*; колика отъ вѣтровъ: *Xanthox.*

Сравни относительно воспалительной колики — *воспаленіе кишекъ* (происходящее часто отъ колики); относительно судорожной — *истерику* и *ипохондрію*; относительно конгестивной — *геморрой*, *недухи менструальные*; относительно ревматической — *ревматизмъ*; относительно желчной — *желчная болѣзнь*; относительно глистной — *глистные недуги*; относительно колики отъ вѣтровъ — *вѣтры*; наконецъ, относительно маточной колики (особенно во время мѣсячнаго очищенія или до начала его) — *разстройство менструацій*.

87. Поносъ простой, *diarrhoea*,

и

88. Кровавый поносъ, *dysenteria*.

87. Поносъ бываетъ только симптомомъ другой какойнибудь болѣзни. Онъ происходитъ большею частью отъ выпотѣнія водянистой жидкости въ кишечномъ каналѣ, которое обусловливается или состояніемъ самаго канала или какою-нибудь болѣе глубокой болѣзنیю. Поносъ, смотря по продолжительности, бываетъ скоротечный (острый) и медлительный (хроническій); по лежащимъ въ его основаніи причинамъ онъ бываетъ:

- 1) гастрическій, иначе — катарръ кишекъ, происходящій отъ несоблюденія діеты, отъ вредныхъ яствъ и напитков, или отъ переполненія желудка, особенно кислой пищею, отъ плодовъ, сильнодѣйствующихъ лѣкарствъ, отъ отравленія, отъ накопленія кала, отъ глиствъ;
- 2) катарральный и ревматическій, отъ простуды;
- 3) конгестивный, отъ прилива крови, отъ прорѣзыванія зубовъ у дѣтей;
- 4) воспалительный, происходящій отъ воспаленія слизистой оболочки кишечнаго канала;
- 5) нервный, происходящій отъ раздраженія двигательныхъ нервовъ кишекъ, какъ напр. послѣ душевныхъ потрясеній;

- 6) желчный, происходящій отъ изліянія желчи (можетъ быть, подобнымъ же образомъ дѣйствуетъ иногда и поджелудочная желѣза) и, наконецъ,
7) органической, обусловливаемый нарывами, утолщеніемъ слизистой оболочки, туберкулами и т. п.

Причинами поноса всего чаще бываютъ: простуда, невоздержанность въ пищѣ, душевныя потрясенія, глисты, прорѣзываніе зубовъ у дѣтей и всеобщая порча крови, какъ напр. при тифѣ, холерѣ, бугорчатой чахоткѣ, Брайтовой болѣзни, при страданіяхъ сердца или печени, англійской болѣзни, болѣзняхъ суставовъ, накожныхъ болѣзняхъ и въ послѣднихъ періодахъ изнурительныхъ болѣзней (см. эти послѣднія). Хроническій поносъ самъ по себѣ можетъ въ концѣ концовъ повлечь за собой смерть отъ истощенія.

Важнѣйшія средства противъ поноса суть:

При катаррѣ кишекъ послѣ невоздержности въ пищѣ: **Ipec., Puls., Veratr.**

Послѣ простуды: **Cham., Coloc., Dulc., Ipec., Merc., Puls.**

Послѣ душевныхъ потрясеній: **Cham., Coloc.**

При геморроидальныхъ припадкахъ, полнокровіи: **Merc., Nux vom., Sulph.**

При желчномъ состояніи: **Cham., Coloc.**

При воспалительныхъ и органическихъ страданіяхъ (нарывы и т. п.): **Arsen., Merc., Nitr. ac.**

При слабости, изнуреніи: **Arsen., China., Petrol., Phosph. acid.** — также **Ferr., Nitri ac., Phosph., Rhus, Secale corn.**

Для дѣтей особенно рекомендуемъ: **Cham.** (при прорѣзываніи зубовъ, при золотухѣ, когда рѣзь, вѣтры, по ночамъ безпокойство), **China** (когда разстроено пищевареніе, исхудалость, слабость), **Ipecac.** (послѣ невоздержности, простуды), **Rheum.** (кислая, бѣлая испражненія, съ рѣзью, жиленіемъ, безпокойствомъ), **Phosph. acid.** и **Veratr.** (слизистыя испражненія безъ боли; **Veratr.** особенно въ томъ случаѣ, когда есть рвота); — при прорѣзываніи зубовъ рекомендую я преимущественно: **Calc. acet. 2.** (когда поносъ хроническій и съ кисло-пахучими испражненіями), еще: **Phosph. ac.** (при водянистыхъ поносахъ), въ острыхъ случаяхъ: **Cham. 2.** (рѣзь) и **Merc. 3.**

(зеленыя испражненія); — при раздраженіи отъ глисть: **China, Merc.** (См. глисты.)

Беременнымъ всего лучше помогаютъ: *Ipecac.*, *Phosph. ac.*, *Veratr.*

88. Кровавый поносъ отличается отъ обыкновеннаго поноса тѣмъ, что имѣетъ своимъ мѣстопробываніемъ толстую кишку, между тѣмъ какъ обыкновенный поносъ исходитъ изъ тонкихъ кишекъ. Мы различаемъ виды болѣзни болѣе легкіе, катарральныя, встрѣчающіеся только отдѣльными случаями, и виды болѣе тяжкіе, эпидемическіе, приближающіеся къ *тифу* и порчѣ крови. Теченіе кроваваго поноса перваго вида довольно быстро: онъ появляется вдругъ, безъ предвѣстниковъ, въ сопровожденіи сильныхъ коликъ, послѣ которыхъ слѣдуетъ испражненіе мягкихъ и водянистыхъ веществъ при сильной натугѣ. Послѣ испражненія боль прекращается, но затѣмъ появляется снова въ формѣ давленія и щемленія, причѣмъ испражняется слизь бѣлаго или кроваваго цвѣта (поэтому — названіе: бѣлый или кровавый поносъ), по большей части безъ примѣси кала. При этомъ зудъ въ заднемъ проходѣ, весьма мучительная натуга, разстройство пищеваженія, доходящее до рвоты. У дѣтей испражненія часто зеленаго цвѣта, съ кровью, гноемъ, клочками слизистой оболочки кишекъ. При этомъ болѣе легкомъ видѣ выздоровленіе наступаетъ быстро, послѣ нѣсколькихъ часовъ. Теченіе эпидемическаго кроваваго поноса менѣе благопріятно. Онъ появляется большею частью осенью или позднимъ лѣтомъ и распространяетъ заразу черезъ отхожія мѣста и порчею воздуха. Онъ бываетъ чаще въ деревняхъ, нежели въ городахъ, и его слѣдуетъ приписать особенному яду (міазмы). Отъ этого поноса на слизистой оболочкѣ кишечнаго канала образуются продукты *дифтерита*, т. е. выпотѣніе съ расположеніемъ къ разрушенію отъ гноя или антонова огня (поэтому симптомы, какъ у *тифа* и гнилой горячки). Послѣ продолжительной слабости, послѣ разстройства пищеваженія, бессонницы и озноба, появляется поносъ съ коликой и натугою. Затѣмъ испражненіе прекращается; при сильной боли въ заднемъ проходѣ съ зудомъ и давленіемъ, какъ будто отъ какой-нибудь тяжести, отдѣляется небольшое количество слизи, кровавой слизи съ сѣрватою примѣсью непріятнаго запаха, или чистой крови. Боль и натуга усилива-

ются, такъ что больной едва сходить съ судна. Сначала незначительная лихорадка съ ознобомъ, съ ускореннымъ и малымъ пульсомъ, а послѣ горячая, сухая кожа, мучительная жажда, тошнота до рвоты, сильная утомленность, холодныя оконечности, сухой языкъ. Если лѣчение не удается, то начинаютъ отдѣляться куски слизистой оболочки, испражненіе прекращается или отдѣляется невольнo вслѣдствіе паралича кишекъ, вздувается животъ, и при бредѣ и сонливости наступаетъ смерть. Продолжительность болѣзни весьма различна; болѣзнь можетъ даже сдѣлаться хроническою.

Гомеопатическое лѣчение большею частью бываетъ удачно. Въ обыкновенныхъ случаяхъ кроваваго поноса и въ началѣ болѣе тяжелыхъ случаевъ лучшими средствами служатъ: **Coloc., Colch., Mercur. solub.** (при бѣломъ поносѣ), **Mercur. corros.** (при кровавомъ), **Nux vom., Rhus**, а въ болѣе тяжелыхъ случаяхъ: **Arsen., Chin., Phosph., Plumb.**

Такъ какъ обыкновенный и кровавый поносъ весьма часто переходятъ одинъ въ другой, то я счелъ нужнымъ говорить здѣсь о нихъ вмѣстѣ.

Arsenicum — 3.

Поносъ обыкновенный и кровавый. При чахоткѣ, слабости, воспалительныхъ и органическихъ, а также катарральныхъ и др. случаяхъ. Служитъ также главнымъ средствомъ при сухоткѣ у дѣтей, съ поносомъ. При кровавомъ поносѣ съ признаками гніенія, зловонной мочей, при угрожающемъ разложеніи; особенно хорошо, когда испражненія водянисты, слизисты, бѣловаты, зеленоваты или буроваты; когда припадки бываютъ ночью или подъ утро и сопровождаются истощеніемъ, сильной жа-

ждой, рвзью въ животъ, жженіемъ, отсутствіемъ аппетита, рвотою, сильнымъ изнуреніемъ, бессонницей, тоскою, блѣдностью лица, выпалыми глазами.

Calcarea carbonica и **Calc. acetica** — 2.

Хроническіе поносы съ развѣтвѣніемъ кислотъ въ желудкѣ, при прорываніи зубовъ у золотушныхъ дѣтей; большею частью безъ боли, съ слизистыми или зелеными испражненіями. Блѣдность, припуханіе желѣзъ живота, вздутое лицо. Дается дѣтямъ въ случаяхъ, подобныхъ

описаннымъ при *Ars.*, но нѣ- сколько полегче.)

Chamomilla — 2.

Поносъ отъ *прорыванія* зу- бовъ, простуды, душевныхъ по- трясеній, особенно послѣ досады и гнѣва; испражненія водянисты, слизисты, желчны, *желтоваты*, какъ рубленныя яйца, бѣловаты или зеленоваты, съ кислымъ за- пахомъ; *рвѣ*, *безпокойство*, от- сутствіе аппетита, гастрическіе и желчные припадки. Дѣти съ трудомъ успокаиваются, особен- но ночью.

China — 1.

При *поносахъ* съ *слабостью*. Поносы у чахоточныхъ и у ста- риковъ. При раздраженіи отъ глисть. Поносы у золотушныхъ особъ. Испражненія очень во- дянисты, буроваты или смѣша- ны съ *непереваренною* пищею, ночью или тотчасъ послѣ ѣды, безъ боли или съ давящими, су- дорожными, стягивающими бо- лями, бурчаніемъ въ животѣ, жженіемъ въ заднемъ проходѣ, голодомъ или отсутствіемъ ап- петита и жаждой, *исхуданіемъ*, *упадкомъ силъ*. Въ случаяхъ высшей степени слабости при кровавомъ поносѣ.

Colocynthis — 2.

Преимущественно при *кро- вавомъ поносѣ*, но также при

желчномъ поносѣ, вообще ког- да *рвѣ въ животѣ*, *принужда- ющая корчиться* и стонать, силь- ное безпокойство или щемленіе. Испражненіе кровавистой слизи, съ натугой, послѣ чего *боль об- легчается*. Зловонные вѣтры. Чувство полноты и давленіе въ животѣ со вздутостію его; жел- тый или бѣлый языкъ; ознобъ. Главными поводами служатъ *до- сада* и простуда.

Dulcamara — 2.

Ревматически-катарральный поносъ. Лѣтомъ, послѣ *просту- ды*; испражненія *жидки*, зеленова- ты, желтоваты, *слизисты*, ночью, съ коликами въ сторонѣ пупка и сильной жаждой, тошнотой и рвотой, утомленностью. Про- тивъ *осенняю кроваваго поноса*.

Ferrum — 2.

Подобно *China*, при *чрезвы- чайной слабости*. Дается *стра- дающимъ изнурительными боль- знями, дѣвичьей немочью, миста- ми*. Испражненія выходятъ лег- ко и безъ боли, послѣ *пды и питья*; они водянисты, состоятъ изъ непереваренной пищи, слу- чаются особенно *ночью*; притомъ блѣдность лица, истощеніе. Жи- вотъ туго и вздутъ, жажда, от- сутствіе аппетита. Хроническій катарръ желудка.

Trisacuanha — 2.

Острые поносы отъ невоздержности въ пищу, простуды и душевныхъ потрясеній; болѣе легкіе припадки кроваваго поноса осенью, съ желчными испражнениями. Испражнения водянисты, слизисты, желтоваты; тошнота, рвота, рѣзь въ животѣ, нечистый языкъ, отсутствіе аппетита, ознобъ или жаръ, жажда, сварливость, безпокойство или апатія. Особенно хорошо чувствительнымъ особамъ, женщинамъ и дѣтямъ.

Mercurius sol. или Mercur.**corr. — 3.**

При *ревматическихъ* и *воспалительныхъ* поносахъ, или при поносѣ отъ *прорыванія* зубовъ, *звистъ*. Главное средство при *кровавомъ* поносѣ, при *ночныхъ водянистыхъ, слизистыхъ, желтоватыхъ* и особенно *зеленоватыхъ* (какъ *шипнатъ*) испражненияхъ; или при испражненияхъ *кровавыхъ, кроваво-слизистыхъ* (въ этомъ случаѣ *Merc. corr.*), съ *натугой, жжениемъ* и *изъязвленіемъ* задняго прохода, *сильной коликой*. Жиленіе до и послѣ испражнения, затѣмъ *выходитъ* кровь, *тошнота, дрожь, холодный потъ, сильное безпокойство, лихорадка.*

Nux vomica — 2.

*Гастрическіе, желчные поносы; особенно хорошо для людей, страдающихъ геморроемъ, послѣ досады, простуды, душевныхъ потрясеній, при частыхъ незначительныхъ испражненияхъ, съ жиленіемъ и отдѣленіемъ кровавнистой слизи; давленіе въ заднемъ проходѣ, зудъ въ прямой кишкѣ, узлы въ заднемъ проходѣ, боль въ поясницѣ; жаръ и жажда; языкъ нечистъ, давленіе въ желудкѣ. Дурное расположеніе духа, ипохондрія. При этихъ симптомахъ Nux полезно и противъ кроваваго поноса, но болѣе въ *нелихорадочной, медлительной формѣ* его.*

Nitri acidum — 3.

Хроническіе поносы, большею частью при органическихъ разстройствахъ, рѣже при конгестивныхъ и катарральныхъ (гастрическихъ) недугахъ, причемъ испраженія кровавнисты, темныя, зеленовато-слизисты, прямая кишка покрыта нарывами (съ болью), истощеніе. Особенно полезно при поносахъ послѣ тифа, кроваваго поноса, людямъ страдающимъ геморроемъ, чахоткой.

Phosphor. — 3.

Хроническіе поносы. Испражнения отдѣляются произвольно,

безъ боли (рѣдко съ болью) и состоятъ изъ кала, или изъ кала съ желчью, со слѣдами крови. При этомъ изнуреніе и *истощеніе силъ*. Причины большею частью *органическія*, или истощеніе отъ потери соковъ, старости. Дается въ кровавомъ поносѣ, когда угрожаетъ параличъ кишекъ.

Phosphori acidum — 2.

Одно изъ главныхъ средствъ при *хроническѣхъ поносахъ*, но также при катаррѣ и прорѣзываніи зубовъ, когда: *водянистая, жидкія или слизистыя испражнения*, но, главнымъ образомъ, *невольныя и безъ боли*; при разслабленіи прямой кишки, общей слабости и исхудалости.

Pulsatilla — 2.

Катарръ *кишекъ*, послѣ *невоздержности въ пищу* или простуды. Испражнения *слизистыя, желчныя, водянистыя, бѣловатыя, желтыя*; похожи на кашицу, съ *желудочными* (гастрическими) *симптомами*, языкъ нечистъ, и т. д. *Поносъ особенно* является каждый разъ *послѣ ѣды и питья*, съ рѣзью, которая обыкновенно начинается *послѣ* испраженія

и особенно случается *по ночамъ*. Ознобъ.

Rhus — 3.

Катарральныя, *ревматическія, нервныя* причины. Хроническіе и острые случаи. *Поносы* простые и *кроваво-слизистыя*, съ *жжениемъ* и параличною слабостью прямой кишки, *жжение нѣскольکو* *утихаетъ послѣ* *каждаго испраженія*; тошнота, языкъ покрытъ слизью, отсутствіе аппетита, общая слабость, ревматическія боли. (Дается въ случаяхъ кроваваго поноса, подобныхъ описанному при *Coloc.*, но только безъ *рвзы*.)

Veratrum — 2.

Въ случаяхъ, похожихъ на *холеру*; со *рвотою*, коликою, *чрезвычайной слабостью*, гастрическими симптомами, *ознобомъ*, холоднымъ потомъ, *обмороками*. Особенно при *водянистыхъ испраженіяхъ*, отдѣляющихся незамѣтно, у женщинъ, дѣтей. Дается также въ поносахъ отъ прорѣзыванія зубовъ, если они безъ боли, и въ тѣхъ случаяхъ, въ которыхъ не вполнѣ помогло *Ipec.*

Примѣч. При *поносахъ*, кромѣ этихъ средствъ, употребляется еще множество другихъ, смотря по особенностямъ каж-

даго случая. Упомяну изъ нихъ только о наиболѣе достойныхъ вниманія:

Rheum 1. (ревень), особенно хорошо для дѣтей (см. выше стр. 273) и противъ продолжительнаго катарра кишекъ и желудка, съ отсутствіемъ аппетита, слабостью желудка.

Arnica 2., въ хроническихъ случаяхъ, при невольныхъ, гнойныхъ, большею частью *похожихъ на кашлицу* испражненіяхъ.

Bryon 3. Поносъ послѣ простуды, отъ невоздержности въ пищѣ, отъ *плодовъ*, щавеля, отъ досады, *мѣткихъ жаровъ*, съ коликами, *вздутостью живота*.

Gummi guttae 3., при застарѣломъ *разслабленіи* слизистой оболочки кишекъ.

Kreosot. 5., при размягченіи и нарываніи слизистой оболочки; темнобурья, *кровоянистая*, водянистая, зловонныя испражненія; весьма важное средство при *органическихъ* и *изнурительныхъ* болѣзняхъ.

Petrol. 5., въ хроническихъ и острыхъ случаяхъ, съ водянистыми (рѣже желтыми или слизистыми) испражненіями и съ *сильнымъ бурчаніемъ* въ животѣ. Оказывало мнѣ особенныя услуги при бугорчаткѣ и при изнурительныхъ болѣзняхъ, или послѣ *злоупотребленія слабительными средствами*, если дѣйствіе послѣднихъ слишкомъ продолжительно.

Secale cornutum. 2. Поносъ отъ *нервныхъ* причинъ, отъ пораженія спиннаго мозга, но также у слабыхъ, выкормленных рожкомъ дѣтей. При *параличномъ состояніи* кишекъ, при поносахъ съ водянистыми, желтыми, зелеными, быстро, съ силой, но *безъ боли* отдѣляющимися испражненіями; невольное испражненіе непереваренной пищи; по ночамъ рѣзь и бурчаніе въ животѣ.

Sulphur 3. Помогаетъ часто въ самыхъ упорныхъ случаяхъ *хроническаго простаго* или *кроваваго поноса*; при геморроидальномъ, *катарральномъ*, *ревматическомъ*, *приближающемся къ воспаленію* состояніи прямой кишки. Находится въ связи съ *ревматизмомъ*, *ломотою*, *разстройствомъ пищеваженія*; испражненія слизистыя, водянистыя, бѣловатыя, зеленоватыя, гнилыя, кровавыя, кислыя.

При кровавомъ поносѣ, особенно въ осеннее время, съ рѣзью, болѣзненнымъ позывомъ на низъ или къ мочѣ, со вздутостью живота, полезно также *Colch.* 2.

Въ послѣднее время стали предлагать множество новыхъ средствъ противъ разсмотрѣнныхъ нами въ этой статьѣ болѣзней; однако большая часть изъ нихъ довольно сомнительнаго свойства, такъ какъ нѣтъ опредѣленныхъ указаній для ихъ употребленія. Противъ поноса рекомендуютъ: *Apos. andr.* (желчный), *Baptis.* (подобно *Arsen*); *Corn. c.* (желчный, боль въ животѣ, натуга); *Cistus canad.* (хроническій); *Collins.* (у дѣтей, съ коликою, вѣтрами, судорогами); *Euphorb. coroll.* (водянистый поносъ, катарръ желудка, тошнота, рвота, безпокойство въ сторонѣ живота, слабый пульсъ, руки, ноги, а также кожа холодны, судороги); *Erigeron* (испражненія съ кровью); *Gelsem.* (нервный поносъ послѣ сильныхъ душевныхъ потрясеній, послѣ испуга и т. п.); *Hamam.* (?); *Iris* (жженіе въ прямой кишкѣ, зеленыя испражненія съ болью, особенно періодическія, по ночамъ, дѣйствуетъ подобно *Merc.*); *Leptandr.* (обильный, водянистый поносъ съ рѣзью, послѣ простуды отъ влажнаго холоднаго воздуха, подобно *Coloc.*); *Nuphar.* (? поносъ по утрамъ, безъ боли); *Phytol.* (геморрой); **Podoph.** (поносъ у дѣтей во время прорѣзыванія зубовъ, но также у взрослыхъ; колики; испражненія то зеленыя, то желтыя, то бѣловато-слизистыя, по утрамъ хуже); *Rumex* (катарръ кишекъ, по утрамъ); *Sanguin.* (?); *Trill.* (слизь, слизь съ кровью, хроническій поносъ); *Ver. vir* (дѣйствуетъ не такъ сильно, какъ *Ver. alb.*?); *Xanthox.* (? съ пученіемъ живота отъ вѣтровъ [тимпанитъ]).

Противъ кроваваго поноса, при тѣхъ же симптомахъ, даются тѣ же средства, а именно: *Apos. andr.*, *Bapt.*, *Cist.*, *Collins.*, *Corn. c.*, *Euph. c.*, *Erig.*, *Gels.*, **Ham.**, *Iris.*, *Lept.*, *Phyt.*, **Pod.**, *Trill.*, *Ver. vir.* Кромѣ того, хвалятъ очень *Myrica cerifera* противъ кроваваго поноса тифознаго характера.

Лѣкарства, въ случаѣ надобности, должно давать часто и въ усиленныхъ дозахъ. Въ хроническихъ случаяхъ рѣже, но не въ слишкомъ слабыхъ дозахъ.

Кровянистыя испражненія, кровотечение изъ прямой кишки, — см. кровотечения.

89. Холерина; европейская или спорадическая холера, *cholera*. Холера дѣтей, *cholera infantum*.

Поносъ и рвота суть важнѣйшіе симптомы холерины. Къ нимъ присоединяются: недуги пищеваренія, нечистота языка, жажда, давленіе въ желудкѣ, обмороки, судороги, особенно въ икрахъ, холоднѣе оконечностей, тоска и безпокойство, слабость.

Холерина чаще всего бываетъ дѣтмъ и въ переходные мѣсяцы, когда вслѣдствіе рѣзкихъ колебаній температуры, въ связи съ невоздержностью въ употребленіи пищи и плодовъ, бываетъ довольно значительное число случаевъ заболѣванія. Этой болѣзни обыкновенно подвержены дѣти, особенно въ то время, когда у нихъ прорѣзываются зубы, и особенно тѣ дѣти, которыя не вскармливались молокомъ матери или кормилицы, или которыя слишкомъ рано отняты отъ груди; иногда холерина бываетъ также слѣдствіемъ дурнаго молока, когда коровы получаютъ въ кормъ свѣжую весеннюю зелень или помой, а иногда она бываетъ отъ простуды. Эта очень опасная болѣзнь, влекущая за собой смерть иногда въ 12—24 часа, сопровождается слѣдующими явленіями: рвота и поносъ слѣдуютъ быстро другъ за другомъ, больной не принимаетъ пищи, испражняется до 40 разъ въ 24 часа, испражненія выходятъ стремительно, какъ изъ насоса, сначала еще содержать калъ, потомъ становятся все жиже и жиже и, наконецъ, принимаютъ видъ рисоваго отвара. То же совершается относительно рвоты. Лихорадки нѣтъ, но за то — холодная кожа, впалые глаза, синяя окраска слизистыхъ оболочекъ, жирныя части тѣла — какъ будто восковыя, мягки какъ тѣсто, быстрое худѣніе, втянутый животъ, неутолимая жажда, отсутствіе мочи, неровное дыханіе, сильное безпокойство, затѣмъ утомленность, дѣти отъ слабости не владѣютъ членами, наконецъ, сонливость, безпамятство, судороги и смерть. При поправленіи главные симптомы, а именно рвота и поносъ, скоро останавливаются, и вообще больной начинаетъ чувствовать себя лучше. Иногда состояніе становится медлитель-

нымъ, и тогда его легче осилить. Чаще всего болѣзнь эта случается въ концѣ лѣта.

Ipecacuanha — 2.

Чувство вялости въ желудкѣ, лихорадочная дрожь, исходящая изъ желудка и живота, тошнота, *слизистая, зеленая, желчная рвота, преобладающая надъ поносомъ. Водянистые* поносы съ *рвзью въ животъ*, судорогами въ икрахъ, языкъ желтъ и сухъ. Сильная жажда. Лицо блѣдное. Дыханіе быстрое, короткое. Безпокойство, общія судороги, холодныя руки и ноги, *потъ*. Хорошо для дѣтей, женщинъ, послѣ простуды, невожденности въ нищѣ, особенно лѣтомъ, въ болѣе легкихъ припадкахъ.

Phosphor. — 3.

Когда преобладаетъ *поносъ* съ сильной *рвзью, жженіемъ, бурчаніемъ* въ животѣ и при чрезвычайной слабости, или когда (послѣ *Ipec.* или *Veratr.*) рвота прошла, а поносъ остался съ означенными симптомами.

(Если остается поносъ безъ боли, то *Phosph. acidum.* 3.)

Veratrum — 2.

Безъ сомнѣнія главное средство при сильной холеринѣ, приближающейся къ холерѣ, когда сильная *рвота* и *поносъ одновременно*; когда притомъ сверленіе какъ бы винтомъ, *рвзъ, схватываніе, боль, чрезвычайно холодное тѣло, судороги въ икрахъ, чрезвычайная слабость.* Сверхъ того, *тоска, щемленіе, холодный потъ, обмороки.* Испражнения выходятъ внезапно, неволью, въ обилии, *водянисты, бѣловаты, безцвѣтны* или съ желтыми хлопьями. Языкъ нечистъ, холодень. Сильная жажда. Рвота бѣлыми, слизистыми, желтыми, зеленоватыми, желчными веществами. Лицо синеваатаго или землянаго цвѣта. Охрипость, судороги членовъ. Пульсъ дрожащій, малый (см. *холеру*).

Примѣчаніе. Въ началѣ, когда есть лихорадка, полезно предпослать одинъ или два приѣма *Aconit.*, отчего часто припадки прекращаются. При особеннаго рода *коликахъ* послѣ простуды и досады оказываютъ достаточную помощь *Chat.* (при давленіи и стѣсненіи подъ ложечкой) и *Coloc.* (когда желчное испражненіе, тошнота съ изверженіемъ слизи и чрезмѣрная *рвзъ въ животъ*).

Въ особенно опасныхъ случаяхъ, приближающихся къ холерѣ (см. холеру), съ упадкомъ силъ: *Arsenicum*. 3. Не безъ пользы также употребляютъ *Tabac*. 3. въ случаяхъ, описанныхъ при *Veratr*.

См. также слѣдующую статью.

Лѣкарство надо давать (большею частью 2 разжиженіе, рѣдко — выше) по нѣскольку капель, смотря по обстоятельствамъ, черезъ 2—1— $\frac{1}{2}$ часа.

90. Азіятская, или эпидемическая холера, *cholera epidemica*.

Отличается отъ обыкновенной холерины эпидемическимъ и болѣе опаснымъ характеромъ, сродствомъ съ тифомъ, чумой и т. п., и въ особенности признаками быстро наступающаго всеобщаго разложенія крови и истощенія жизненныхъ силъ. Но и эта болѣзнь обыкновенно имѣетъ своихъ предвѣстниковъ въ видѣ поносовъ, которые бывають болѣе или менѣе продолжительны; въ этой стадіи, при внимательномъ лѣченіи и соблюденіи строгой діеты, часто удается подавить болѣзнь, и только легкомысленное отношеніе къ этому состоянію неминуемо влечетъ за собою дальнѣйшія явленія, составляющія настоящіе симптомы холеры. Но бывають и такіе случаи, особенно въ началѣ эпидеміи, когда болѣзнь развивается съ быстротою молніи со всеѣми своими ужасами, послѣ чего непремѣнно слѣдуетъ смерть. Это такъ назыв. *cholera fondroyant*.

Вслѣдъ за рвотой и испражненіемъ жидкости, похожей на рисовый отваръ и содержащей въ себѣ какіе-то кусочки, быстро наступаютъ стѣсненіе дыханія, сильная тоска, задержаніе мочи, неутолимая жажда, стягиваніе внутренностей, синева лица, холоднѣніе кожи, морщины на кожѣ (которыя не сглаживаются), холодное какъ ледъ дыханіе, малый нитеобразный пульсъ, спаденіе живота и лица, хриплый и беззвучный голосъ, судороги икръ и всеобщій упадокъ силъ.

Если болѣзнь принимаетъ хорошій оборотъ, если вмѣсто *stadium algidum* (ознобъ) наступаетъ *stadium reactionis*, то прежде всего отдѣляется обильное количество мочи, и выступаетъ обильный потъ. Отъ количества мочи и пота и отъ ихъ своевре-

менного появления зависить вопросъ о томъ, будетъ ли больной спасенъ или погибнетъ онъ при явленіяхъ тифознаго характера, обусловливаемыхъ, главнымъ образомъ, задержаніемъ мочи. Наконецъ, есть еще одинъ видъ холеры, который настолько же опасенъ, но въ которомъ нѣтъ самаго характеристическаго симптома, а именно обильнаго испражненія вещества, похожаго на рисовый отваръ; но за то послѣ смерти кишки оказываются наполненными этой жидкостью. Это такъ назыв. *cholera sicca* — сухая холера.

Изъ безчисленнаго множества средствъ, рекомендуемыхъ противъ описываемой болѣзни, мы приведемъ только наиболѣе испытанныя. Въ началѣ болѣзни и въ легкихъ случаяхъ: **Veratr.**; противъ судорожной формы: **Camph.**, **Cupr.** и **Sec.**; а при остановкѣ пульса, при безжизненности и разложеніи крови: **Carb. veg.** и **Hydroc. acid.**

Camphora — 1.

Послѣ *Cuprum* главное средство при *судорожной* формѣ, причемъ синяя и *холодная какъ ледъ* кожа. Нерѣдко испражненій нѣтъ. За то тоска, столбнякъ, судороги челюстей, холодный языкъ и такое же дыханіе, быстрый упадокъ силъ; боли въ икрахъ.

Carbo vegetabilis — 2.

При сильной степени болѣзни, отсутствіи пульса и дыханія, параличъ, *жаръ съ чрезвычайной слабостью*, приливъ крови къ *груди* и *головѣ*, тоскѣ, сонливости, краснотѣ и потѣніи щекъ, клейкомъ потѣ. Больной *близокъ къ смерти*.

Cuprum — 2.

Главное средство при *судорожной* формѣ, при *конвульсивныхъ движеніяхъ мускуловъ и членовъ*. Притомъ сильное безпокойство; судорожная колика со рвотой или безъ нея; рвота эта сопровождается стягиваніемъ груди. Давленіе въ желудкѣ; слышное со стороны бурчаніе въ животѣ. Задержаніе мочи. Синевя кожи.

Hydrocyanicum acidum — 2.

Въ отчаянныхъ случаяхъ, когда безжизненность, *разложеніе крови, едва слышный голосъ, малый, едва замѣтный пульсъ*. Ощущеніе чрезвычайнаго холода, конвульсія; сильная икота, угрожающій параличъ легкихъ и сердца.

Secale cornutum — 2.

Когда рвота прекратилась, въ испражненіяхъ еще нѣтъ желчи; — при *парамичеобразномъ состояніи кишечнаго канала* съ невольнымъ испражненіемъ буроватаго, клочковатаго вещества. Сильное истощеніе, ощущеніе чрезвычайнаго холода, бѣлый языкъ; головокруженіе, тоска, судороги икръ, бурчаніе въ животѣ; *convulsii*.

Veratrum — 1.

Главное средство въ началѣ холеры и при слабой ея степени, при *сильной рвотѣ и поносѣ*, чрезвычайной тоскѣ, ощущеніи *холода*, холодномъ потѣ, спаломъ лицѣ. Коляки, судороги въ икрахъ, задержаніе мочи. Морщины на кожѣ не сглаживаются; кожа имѣетъ снѣій цвѣтъ.

Примѣчаніе. Изъ множества лѣкарствъ, рекомендуемыхъ противъ этой болѣзни, слѣдуетъ здѣсь еще указать на *Arsen.*, когда сильная боль въ животѣ и желудкѣ, тошнота, частыя, но не обильныя испражненія кроваваго цвѣта, тоска, стѣсненіе дыханія, неутолимая жажда, общая слабость. Кромѣ того больше всего рекомендуютъ: *Argent. nitr.*, *Asa*, *Cicuta vir.*, *Iatrophia curcas*, *Phosph.* и *Tabac.* — *Sulphur* рекомендуется какъ предохранительное средство. Нѣкоторые, по примѣру Ганеманна, совѣтуютъ также носить на груди *мѣдныя пластинки*.

Въ новѣйшее время стали также давать: *Euphorb. cor.* (дѣйствуетъ какъ *Veratr.*), когда имѣются гастрическіе симптомы, рвота и т. п., обмороки, судороги кишекъ, ощущеніе приближенія смерти, желаніе умереть, сильный холодъ; *Diosc.*, водянистый поносъ; *Iris*, сильная боль около пупка, жженіе въ заднемъ проходѣ, періодическое ухудшеніе состоянія по ночамъ; **Podophyll.**, водянистыя, клочковатыя испражненія, судороги мускуловъ и живота, истощеніе; — помогаетъ также противъ холеры дѣтей, при вонючихъ испражненіяхъ; *Veratr. vir.*, *Xanthox.* — Противъ холеры дѣтей даются, кромѣ уже приведеннаго *Podoph.*, еще — *Corn. c.*, *Euphorb. cor.*, *Lept.*

Само собою разумѣется, что здѣсь приемы должны быть *сильныя и частыя* (по крайней мѣрѣ, черезъ 2 часа). Лѣченіемъ именно этой болѣзни гомеопатія чрезвычайно славится.

91. Запоръ,

obstructio.

Нѣтъ явленія, противъ котораго боролись бы съ такимъ жесточеніемъ, какъ противъ запора. Аллопатія долгое время поддерживала мнѣніе, что запоръ весьма вреденъ. Видимому дѣйствию слабительныхъ предоставлено было упрочить вѣру въ могущество врачебныхъ предписаній. Между тѣмъ, въ весьма многихъ случаяхъ запоръ бываетъ даже благодѣтеленъ, какъ, напримѣръ, послѣ родовъ, при воспаленіи нижней части живота, при ревматизмѣ мускуловъ и суставовъ, переломѣ костей, при брюшныхъ нарывахъ; во многихъ другихъ случаяхъ, какъ напр. при тифѣ, онъ не вреденъ, а иногда (напр. при сильномъ потѣннн) вполне естественъ. Притомъ многія особы не имѣютъ нужды испражняться каждый день, такъ что ни въ острыхъ, ни въ хроническихъ случаяхъ не слѣдуетъ тотчасъ принимать мѣръ противъ запора. Только въ томъ случаѣ, когда это состояніе причиняетъ другіе недуги, какъ напр. разстройство пищеваренія, приливъ крови и т. п., или усиливаетъ уже существующія болѣзни, необходимо его устранить и притомъ съ помощью лѣкарствъ, если только удаленія причинъ запора (какъ напр. трудно-варимая, прѣсная, горячительная пища, вино, душевныя потрясенія, произвольное задержаніе испражнений, недостатокъ въ движеніи, сидячій образъ жизни, усиленныя умственныя занятія, ремесла, стягивающее животь платье, злоупотребленіе вяжущими, слабительными и потогонными средствами) недостаточно, или если не помогутъ смягчительные клистиры (при дѣйствительномъ накопленіи массы кала) изъ льнянаго масла, теплой воды, отвара льняной муки или овсяной крупы, или изъ смѣси молока и патоки, или изъ холодной воды, или, если они не помогутъ, непродолжительныя холодныя сидячія ванны (при слабости мускуловъ, запирающихъ задній проходъ, приводящихъ въ движеніе кишки). Этнхъ средствъ бываетъ достаточно даже въ большей части крайнихъ случаевъ, гдѣ требуется быстрое очищеніе желудка; они дѣйствуютъ гораздо лучше, чѣмъ извѣстное касторовое масло, горькая вода, слабительныя кашки, александрійскій листъ и т. п. Гомеопатія рекомендуетъ

въ этомъ случаѣ: *Bryon.*, *Nux vom.*, *Opium*. (Сравни — что сказано ниже.)

При лѣченіи хроническаго или вошедшаго въ обыкновеніе запора, надо помнить, что онъ есть только симптомъ другаго, болѣе глубокаго недуга. Поэтому-то при лѣченіи и необходимо обратить вниманіе на главную причину. Этимъ основнымъ недугомъ могутъ быть: судороги или параличъ кишекъ, сухость отъ недостатка слизи или желчи, катарръ, опухоль и воспаленіе или расслабленіе мускуловъ кишекъ и живота, механическія препятствія отъ накопленія массы кала или отъ присутствія постороннихъ тѣлъ, органическія измѣненія (суженіе, расширеніе, сращеніе, перешлетеніе, искривленіе, надломъ, сдавливаніе кишекъ опухолями въ нижней части живота). Когда причиною запора бываетъ недостаточное образованіе кала (у людей постыающихся, изнуренныхъ) или механическое препятствіе отъ накопившагося кала, то о внутреннихъ средствахъ и думать нечего.

Наиболѣе употребительныя средства суть:

Bryonia — 2.

Главное средство въ острыхъ случаяхъ, лѣтомъ, послѣ плодовъ. При *гастрическомъ* состояніи, съ приливомъ крови къ головѣ и груди и съ одышкой. При недостаточномъ отдѣленіи желчи; при ревматизмѣ, болѣзняхъ печени. При сидячемъ образѣ жизни, холерическомъ temperamentѣ.

Mercurius — 3.

Острый запоръ, послѣ *поносовъ*, *простуды*, *гастрическаго* состоянія; при *воспалительныхъ* и *органическихъ* недугахъ. При тщетномъ позывѣ на низъ, при свернувшемся въ комочки или,

по временамъ, жидкомъ калѣ, съ рвѣзью въ животѣ.

Natrum muriaticum — 2.

Въ упорныхъ случаяхъ чрезвычайной *бездѣятельности* кишекъ, *безъ позыва* на низъ.

Nux vomica — 3.

Острые и хроническіе случаи, при *желудочномъ катаррѣ*, *ипохондріи*, *расположеніи къ геморрою*, *сидячемъ образѣ жизни*, послѣ *стола* и *употребленія спиртныхъ напитковъ*. Судорожное чувство въ заднемъ проходѣ, который какъ будто запертъ, слишкомъ узокъ, съ частымъ, напраснымъ позывомъ на низъ или

отдѣленіемъ небольшихъ кусочковъ кала. Притомъ отсутствіе аппетита, животъ натянута, давленіе въ желудкѣ, стѣсненіе дыханія, нерасположеніе къ работѣ и размысленію, жаръ въ головѣ, бессонница.

Opium — 3.

Болѣе въ острыхъ случаяхъ. При *судорожномъ задержаніи* кала, особенно когда притомъ *нѣтъ позыва* на нвзъ. Съ приливомъ крови къ головѣ и лицу, давленіемъ въ желудкѣ, отсутствіемъ аппетита. Послѣ *разслабленія*, или при параличѣ заднепроходной кишки; послѣ продолжительнаго поноса; при сидячемъ образѣ жизни; также при запорѣ у особъ крѣпкихъ и тучныхъ, у стариковъ, у беременныхъ женщинъ, у грудныхъ младенцевъ; при *отравленіи свинцомъ*; при ущемленныхъ грыжахъ.

Platina — 3.

Большею частью въ хроническихъ случаяхъ *судорожнаго задержанія* или *суженія кишечнаго канала*; несмотря ни на какое жиденіе, отдѣляются только небольшіе кусочки кала, съ позывомъ и зудомъ въ заднемъ проходѣ; притомъ холодѣніе и

чувство слабости въ животѣ. Въ животѣ какъ будто все стянуто, съ давленіемъ, вѣтрами, напраснымъ позывомъ къ отрыжкѣ. Людямъ, ведущимъ кабинетную жизнь, родильницамъ, послѣ отравленія свинцомъ, во время путешествія; или когда запоръ — въ связи съ разстройствомъ регулъ.

Plumbum — 3.

Дѣйствуетъ подобно *Platina*, но употребляется больше въ органическихъ случаяхъ, когда *упорный запоръ*, сильная рѣзь, *стягиваніе живота*, суженіе задняго прохода; калъ покрытъ слизью, твердъ, въ видѣ шариковъ или на подобіе бараньяго кала. Слизь и желчи не отдѣляется. (Подобнымъ же образомъ дѣйствуетъ *Abumen*.)

Pulsatilla — 2.

Въ острыхъ случаяхъ. При недѣятельности желудка послѣ невоздержности въ пищѣ, употребленія слабительныхъ, причеиъ выходитъ много *вѣтровъ*, языкъ нечистъ, желудочный катарръ. При симптомахъ, подобныхъ означеннымъ при *Nix vom.*, но болѣе людямъ тихимъ, флегматичнымъ, женщинамъ. При ознобѣ.

Sulphur — 1.

При симптомахъ, подобныхъ означеннымъ при *Nux vom.*, но преимущественно въ *упорныхъ* случаяхъ, при органическомъ разстройствѣ, когда запоръ и ипохондрія имѣють въ основаніи дѣйствительнее засореніе и застой въ

органахъ нижней части живота, особенно въ печени и воротной венѣ. (Въ этомъ случаѣ разжиженіе (2-е) дѣйствуетъ иногда лучше растирація.) Сравнить, что сказано ниже при **Lycopodium**, которое родственно этому средству, но дѣйствуетъ иногда лучше его.

Примѣчаніе. Иногда всѣхъ этихъ средствъ бываетъ недостаточно, тогда къ нимъ присоединяются еще слѣдующія: противъ *судорожнаго* задержанія испражнений (какъ **Platina**): *Veratr.*, *Zinc.*; при *паралитической* формѣ (**Opium**): *Phosph.*, *Rhus*, *Secale*; при *матеріальныхъ* причинахъ (**Sulphur**, **Nux vom.**, **Natr. mur.**): преимущественно **Lycor 2.**, которое весьма полезно при завалахъ нижней части живота, геморроѣ, матеріальномъ разстройствѣ желудка и кишечнаго канала, въ особенности при хроническомъ катаррѣ этихъ органовъ, или при болѣзняхъ печени, селезенки, почекъ, мочевого пузыря, матки, при ломотѣ и т. д. Въ *подходящихъ* случаяхъ средство это оказывало мнѣ наибольшія услуги послѣ *Nuxv.*

Надо тщательно изслѣдовать различныя причины запора и потомъ, сообразно съ ними, выбирать лѣкарства. Во всякомъ случаѣ, гомеопатія помогаетъ въ хроническихъ случаяхъ болѣе, чѣмъ аллопатія съ своими слабительными.

Противъ запора у *беременныхъ* рекомендуемъ: *Bryon.*, *Nux vom.* *Новорожденнымъ* и вообще *дѣтямъ* полезны: *Bryon.*, *Merc.*, *Lycor.*, если только не достаточно одной діеты (кормить не слишкомъ жирнымъ молокомъ и не слишкомъ густою кашкою).

Какъ палліативное, наиболѣе безвредное и вѣрное средство противъ вошедшихъ въ обыкновеніе запоровъ можно рекомендовать холодныя клистиры, повторяемые, смотря по надобности.

Хорошихъ новыхъ средствъ пока нѣтъ, ибо тѣ, которыя рекомендуются въ послѣднее время, далеко не удовлетворительны. Предлагають слѣдующія средства: *Aesc. hippoe.* (чувство сухости въ заднемъ проходѣ, геморрой съ болью и незначительнымъ кро-

вотеченіемъ, боль и чувство онѣмѣнія въ поясницѣ, усиливающіяся при вставаніи); *Apos. a.* (отъ задержанной желчи, какъ при желтухѣ); **Collins.** (упорный, вошедшій въ обыкновеніе запоръ, геморрой); *Gels.* (отъ расслабленія мускуловъ вслѣдствіе судорожнаго стягиванія); *Hamam.* (отъ недостаточнаго выдѣленія слизи); *Hydrost.* (головная боль, колики, припадки обморока, жаръ въ кишкахъ, послѣ испражненія боль въ заднемъ проходѣ, продолжающаяся нѣсколько часовъ); *Phytol.* (хроническій запоръ съ стрѣляющею болью отъ задняго прохода къ кишкамъ); *Podoph.* (затрудненное испражненіе, выпаденіе задней кишки, частое мочеиспусканіе, слабость въ спинѣ).

Что касается до *пріемовъ*, то въ острыхъ случаяхъ не нужно спѣшить повтореніемъ ихъ, и не должны они быть также слишкомъ сильны. Каждое средство требуетъ опредѣленнаго времени для того, чтобы оказать свое дѣйствіе. Въ хроническихъ случаяхъ надо еще болѣе держаться этихъ правилъ. Здѣсь достаточно бываетъ 1-го пріема въ день (по высшей мѣрѣ), и только въ рѣдкихъ случаяхъ дается лѣкарство въ день по нѣскольку разъ. Сила пріема должна сообразоваться съ индивидуальными свойствами больнаго. Опытъ показалъ, что въ особенности *Nux.*, *Lycop.*, *Sulph.*, помогаютъ въ этихъ случаяхъ также въ болѣе высокихъ дѣленіяхъ. Обыкновенно здѣсь удовлетворяетъ 5. — 2. разжиж. Если послѣднее разжиженіе не поможетъ, то и отъ болѣе сильнаго пріема нельзя ждать помощи, особенно въ хроническихъ случаяхъ.

92. Животные паразиты. А. Глисты, глистные болѣзни, *helminthiasis*; Б. Трихины, трихинная болѣзнь, *trichiniasis*.

А. Въ большей части случаевъ причиною глистныхъ недуговъ бываютъ не глисты, а болѣзненное состояніе органовъ нижней части живота, особенно пищеваренія, вслѣдствіе чего встрѣчающіяся весьма часто у дѣтей и взрослыхъ людей глисты приводятся въ ненормальное раздраженіе. Впрочемъ, на столько же часто дѣйствуетъ механически одна многочисленность глистовъ (какъ напр. при мелкихъ глистахъ [аскаридахъ]) или величина ихъ

(какъ напр. при солитерѣ и круглыхъ глистахъ). Поэтому не всегда приходится выгонять глисть, что, впрочемъ, и не всегда удается, и на что не всегда хватаетъ времени, потому что помощь бываетъ иногда нужна безотлагательно. Часто болѣзненные симптомы исчезаютъ, лишь только прекратится болѣзненное возбужденіе всего организма, и тогда часто глисты выходятъ сами собою или вслѣдствіе противоглистныхъ средствъ (см. ниже), если только организмъ уже подготовленъ къ принятію этихъ средствъ.

Что причиною недуга суть дѣйствительно глисты, можно, конечно, съ достовѣрностью сказать въ томъ случаѣ, когда выходятъ глисты, но также и тогда, когда страданіе ухудшается отъ голода и нѣкоторыхъ родовъ пищи, какъ напр. отъ сладкаго, плодовъ, моркови, лука, хрѣна, огурцовъ, щавеля, салата, шампанскаго, когда притомъ зудъ въ носу, заднепроходной кишкѣ или — вслѣдствіе передвиженія глисть (особенно при мелкихъ глистахъ) — во влагалищѣ, гдѣ они иногда вызываютъ воспаленіе и бѣли и щекотаніемъ доводятъ больную до онанизма.

Кромѣ того, существуютъ слѣдующіе признаки: а) относительно пищеваренія: сильный голодъ, тошнота, рвота водою и пищею, странности аппетита, отрыжка, накопленіе слюны во рту, зловонное дыханіе (кисловатаго запаха), неправильное испражненіе (поносъ, запоръ или отдѣленіе слизи), рѣзь и боли въ животѣ, сверлящая боль около пупка, натуга при испражненіи, вслѣдствіе закрытія заднепроходнаго отверстія; б) относительно наружнаго вида: большой худъ, у него лицо то блѣдно, то красно, синія кольца вокругъ глазъ, косоглазость, расширеніе зрачковъ; в) относительно нервовъ: вздрагиваніе во снѣ, вскрикиваніе, скрежетъ зубовъ, страшные сны, судороги (подергиванія), припадки лунатизма, головокруженіе, шумъ въ ушахъ, головная боль (мигрень), судорожный кашель, заиканіе, недуги сердца, обмороки, перемѣнчивое, капризное настроеніе духа. — Аскариды возбуждаютъ главнымъ образомъ нервные припадки, зудъ и сильный позывъ на мочу; круглыя глисты — недуги пищеваренія, какъ-то рвоту и т. п., колики, страданіе мозга и, въ рѣдкихъ случаяхъ, желтуху; солитеръ — чувство движенія въ животѣ, головокруженіе, недуги сердца, обмороки, судороги, сильный голодъ, скопленіе слюны во

рту, тошноту, которая прекращается отъ питательной пищи, особенно отъ хлѣба.

Главными средствами противъ мелкихъ глисть служатъ:

Cina, — а также *Ferr.*, *Ignat.*, *Marum v.*, *Merc.*

противъ круглыхъ глисть: **Spigelia**, — также *Calc.*, *Chin.*, *Cin.*, *Merc.*, *Sabad.*

противъ солитера: **Filix mas.**, — также *Sabad.*, *Sulph.*, *Stann.*
(См. примѣчаніе.)

Aconitum — 2.

При аскаридахъ и круглыхъ глистахъ. *Лихорадочное возбужденіе*, безпокойство, сильный зудъ, гастрическое состояніе, особенно припадки ночью, *комки*, со рвотою, тугое или слизистое испражненіе.

Belladonna — 3.

Сильное *раздраженіе нервовъ* съ *лихорадкой*, жажда, пугливость, *приливъ крови*, склонность къ судорогамъ, подергиваніе, пораженіе мозга.

Calcarea carbonica — 3.

Главное средство когда въ основаніи лежитъ *золотуха*, и существуетъ хроническая *наклонность* къ глистнымъ недугамъ. При дурномъ питаніи тѣла, блѣдности лица, большомъ животѣ, катаррахъ желудка и кишекъ, поносахъ, английской болѣзни.

China — 2.

При *круглыхъ глистахъ* у особъ слабаго сложенія. Силь-

ная лихорадка въ *периодическихъ* припадкахъ и съ потомъ, или лихорадка *слабая*, медлительная, изнурительная. Равнодушіе къ пище и питью, ной подъ ложечкой, изжога, вздутость живота, кисло-слизистая рвота, ночной поносъ. Полезно также *помочь выхода глисть*, чтобы *предотвратить повтореніе недуга*.

Cina — 2.

Болѣе противъ послѣдствій отъ *мелкихъ глисть*, но также противъ *круглыхъ глисть*, когда *симптомы раздраженія мозга*, какъ-то: ознобъ по вечерамъ, малый, жесткій, частый пульсъ, ночное безпокойство, *бессонница* со *вздрачиваніемъ*, страшные сны; легкіе лихорадочные припадки съ бредомъ, головокруженіе, дурное расположеніе духа; *измѣничивый цвѣтъ лица*, но болѣе блѣдный, круги около глазъ, расширеніе зрачковъ; *зудъ въ носу и заднемъ проходѣ*; языкъ покрытъ слизью, *сильный голодъ*, от-

рыжка водой, колика, съ запоромъ, большимъ животомъ; обильное отдѣленіе мочи, свѣтлая или похожая на сыворотку моча; испусканіе мочи въ постели.

Ferrum — 1.

Противъ мелкихъ глисть. Для исправленія пищеваренія. Рвота, накопленіе слюны во рту; *недухи слизистыхъ оболочекъ, исхуданіе, наружный видъ напоминаетъ блѣдную немочь.*

Filix mas (тинк. или экстр.).

Противъ солитера и недуговъ, зависящихъ отъ него. (Сравн. примѣч.)

Ignatia — 2.

Главное средство противъ *зуда въ заднемъ проходѣ*, производимаго мелкими глистами, противъ выпаденія прямой кишки и судорогъ отъ этого.

Mercur. sol. — 3.

При всякаго рода глистахъ, при позывѣ на низъ и жиленія; *слизистыя, красноватая, разтѣдающія испраженія, жажда,*

Примѣч. Другія противуглистные средства суть: *Asar.*, *Allium sat.* (чеснокъ), *Stannum*. Последнее палліативнымъ образомъ устраняетъ припадки отъ солитера. Для изгнанія солитера рекомендуются: *Arg. nitr.*, *Supr.*, но они не такъ вѣрны, какъ

рызь въ животѣ, отсутствіе аппетита, отвращеніе къ сладкому, слизь въ горлѣ и во рту. Земляной цвѣтъ лица. Припадки ночью хуже.

Sabadilla — 1.

Солитеръ и круглыя глисты, *рвота глистами*, тошнота, побужденіе ко рвотѣ, какъ бы отъ засѣвнаго въ горлѣ посторонняго тѣла; *жгучая, сверлящая боль въ нижней части живота, внапѣтый животъ, желудокъ какъ бы изъязвленъ, притомъ ознобъ, чувствительность къ холоду.*

Spigelia — 2.

Главное средство противъ *крулящихъ глисть* и обусловливаемыхъ ими симптомовъ *нижней части живота*, каковы: *цуплющая боль въ животѣ* или сверленіе около пупка, *ознобъ, поносъ, сильный голодъ, жажда.* Тошнота по утрамъ, позывъ ко рвотѣ; *зудъ въ носу, сердцебиеніе, тоска, блѣдность лица, головная боль, невольное испусканіе мочи въ постели.* Зрачки расширены. Послѣ обѣда хуже.

Punica granat. (гранатный корень), *Koussou* или *Fil. mas.* Что и этими средствами не всегда достигается цѣль, видно между прочимъ изъ того, что постоянно появляются новыя средства противъ глисть, какъ напр. *Kamala* и т. п.

Чтобъ удостовѣриться въ присутствіи глисть, даютъ отваръ моркови или немного кислаго бѣлаго вина, селедки, сардинокъ, луку (картофельный салатъ), послѣ чего глисты, особенно мелкія, часто выходятъ.

Выгонять глисть необходимо только въ томъ случаѣ, если выше приведенныя средства не успокаиваютъ организма (лучшихъ результатовъ отъ этихъ средствъ и ожидать нельзя), и припадки постоянно повторяются, что преимущественно бываетъ тогда, когда паразитовъ много, и они большихъ размѣровъ. Противъ мелкихъ глисть употребляютъ, вслѣдствіе ихъ пребыванія въ задне-проходной кишкѣ, холодные клистиры или клистиры изъ уксуса (1 часть уксуса на 2 части теплой воды) или, что еще лучше, клистиры изъ отвара чеснока въ молокѣ (1 луковицу на $\frac{1}{2}$ штофа молока); этотъ отваръ можно принимать также внутрь. Клистиры, дѣйствующіе сильнѣе, какъ напр. клистиры изъ ѣдкой ртути (*Mercur. subl.*) или скипидара, требуютъ величайшей осторожности и бываютъ опасны. Для изгнанія круглой глисты хорошо цытварное сѣмя въ формѣ порошка или, что еще лучше, *сантонинъ*, по 1 грану (въ формѣ лепешки) 1 или 2 раза въ день. Противъ солитера этого средства не достаточно и необходимо прибѣгнуть къ выше приведеннымъ средствамъ, безъ особеннаго подготовительнаго лѣченія. Въ этомъ случаѣ однако необходимо обратиться за совѣтомъ ко врачу. Одному помогаетъ одно средство, другому — другое. Многіе стали отказываться отъ *Koussou*, такъ какъ оно недостаточно вѣрно изгоняетъ головку глисты. Авторъ этой книги съ величайшимъ успѣхомъ употребляетъ *Filix mas.*, которое даетъ ему возможность втеченіе немногихъ часовъ, при помощи двухъ приемовъ по столовой ложкѣ, совершенно изгнать солитера. Такъ какъ лѣченіе основывается въ этомъ случаѣ на *умерщвленіи паразита*, то приемы должны быть большіе ($\frac{1}{2}$ золотн. *Extr. Fil. mar. aeth.* растворить въ двухъ золотникахъ крѣпк. вин. спирта и затѣмъ прибавить, понемногу, 6 золотниковъ воды).

Противъ *судорогъ* полезны, кромѣ упомянутыхъ выше средствъ, въ легкихъ случаяхъ: *Cham.*, *Cicut. vir.*, *Valeriana*, а въ болѣе трудныхъ: **Zincum**.

Часто при *гастрическомъ состояніи* достаточно *Ipec.*, *Puls*.

Не слѣдуетъ слишкомъ поспѣшно заключать о существованіи солитера или другихъ глисть, такъ какъ и другія состоянія желудка и кишекъ, а въ особенности судороги желудка, сопровождаются подобными явленіями.

Въ новѣйшее время стали давать противъ лихорадки отъ глисть — *Euphorb. cor.*, а для изгнанія мелкихъ глисть, круглыхъ и солитера — *Gels.* (2 разж., или клистирь изъ слабаго раствора тинктуры въ водѣ).

Для устраненія расположенія къ глистнымъ недугамъ надо давать лѣкарство въ рѣдкихъ, но не слишкомъ слабыхъ *приемахъ*, а при сильныхъ приступахъ и *приемы* должны быть сильнѣе и повторяться чаще. — Конечно, надо также заботиться о соотвѣтственной діетѣ. Въ особенности надо воздерживаться отъ всего сладкаго, хлѣба и мучныхъ блюдъ.

Б. Трихины.

Солитеры образуются у людей и животныхъ отъ свинины, заключающей въ себѣ угри (зародышъ ленточн. глисты свиньи); трихины переходятъ въ человѣческой организмъ также со свининой; подъ вліяніемъ желудочнаго сока они выходятъ изъ своихъ известковыхъ капсуль, растутъ и размножаются съ невѣроятною быстротою втеченіе 24 часовъ, расплзаются по всему организму, проникая при этомъ чрезъ ткани, и останавливаются въ мускулахъ (грудобрюшной преграды, кадыка, живота, груди и сочлененій). Находили трихины даже въ свиномъ салѣ (шпику). Затѣмъ является нѣчто въ родѣ ревматической боли, распухаютъ члены, какъ при водянкѣ; сверхъ того: рвота, поносъ, чувство разбитости, лихорадка, зловонный потъ, отсутствіе аппетита, катарръ желудка и кишекъ, причемъ языкъ сухъ и нечистъ; боль въ членахъ, которые трудно приводить въ движеніе, мускулы находятся въ напряженномъ состояніи и опухли, боль отъ прикосновенія и давленія; оконечности на половину согнуты, тѣло иногда даже совершенно неспособно къ движенію. Такъ какъ эта болѣзнь обнаруживается на подобіе тифа или рев-

матизма въ суставахъ, то можно предположить, что она существовала уже прежде, но не была извѣстна какъ самостоятельная болѣзнь.

Чтобы предотвратить трихинную болѣзнь, не слѣдуетъ ѣсть свинину, если она не выварена хорошенько или не прожарена, въ особенности должно воздерживаться отъ едва поджаренныхъ сосисекъ, колбасы съ чеснокомъ. Должно также остерегаться ветчины, такъ какъ сырая ветчина, въ особенности не хорошо прокопченая (или приготовленная посредствомъ древеснаго уксуса), также можетъ заключать въ себѣ трихины. Лучшее предохранительное средство есть изслѣдованіе мяса посредствомъ микроскопа.

Ни одна школа еще не имѣетъ вѣрнаго средства противъ трихинъ. Тотчасъ послѣ употребленія зараженной свинины необходимо принять рвотное или слабительное, чтобы изгнать паразитовъ какъ можно скорѣе.

Если эта болѣзнь обнаруживается въ видѣ ревматизма: **Bryon.**, **Rhus.**, **Lycop.**; если преобладаютъ гастрическіе симптомы: **Ipec.**, **Puls.**, — **Nux.** — При явленіяхъ, подобныхъ тифознымъ: **Acid. mur.** и **Acid. phosph.**, **Arsen.**, **Bryon.**, **Rhus.** — также **China.** — При сильныхъ опухоляхъ, какъ при водянкѣ: **Arsen.**, которое вообще заслуживаетъ наибольшаго вниманія.

93. Выпаденіе прямой кишки,

prolapsus ani.

Выпаденіе прямой кишки случается чаще всего въ періодъ времени отъ 1—3 года жизни, отъ катарра кишекъ, кроваваго поноса, полиповъ, каменной болѣзни, коклюша и общей слабости. Оно представляетъ заворотъ складокъ нижней слизистой оболочки съ выдвинувшимися мускулами, запирающими задній проходъ; все это представляетъ видъ кругловатой или цилиндрической блестящей опухоли, блѣдно-розоваго или темно-краснаго цвѣта, изъ которой легко сочится кровь, и въ серединѣ которой находится отверстіе; иногда (однако рѣже) случается вхожденіе заднепроходной кишки, причемъ выходитъ также наружу часть толстой кишки. Когда болѣзнь затягивается, можетъ образоваться воспаленіе, нагноеніе и даже антоновъ огонь.

Nux vomica — главное средство. Смотря по причинамъ, употребляются и другія средства, напр. **Merc.**, при глистахъ, вос-

палительныхъ недугахъ; *Sulph.*, при геморроѣ; *Calcar.*, при золотухѣ; *Arsen.*, при поносахъ, простомъ и кровавомъ; *Ruta*, при ослабленіи кишекъ; *Solan. tub.*, когда кишка то выпадаетъ, то опять входитъ, при ознобѣ во всемъ тѣлѣ. — Въ началѣ болѣзни у дѣтей, когда *Nux vom.* не дѣйствуетъ, помогаетъ иногда *Ignat.*, когда сильный позывъ на низъ съ запоромъ.

При склонности недуга къ повторенію, лѣченію способствуютъ холодныя омыванія, а у взрослыхъ холодныя сидячія ванны. Вышедшая наружу часть заднепроходной кишки приводится въ прежнее положеніе при помощи трипочки, обмокнутой въ холодной водѣ; въ случаѣ воспаленія прибѣгаютъ къ компрессамъ со льдомъ. Въ застарѣлыхъ случаяхъ часто остается только одно: удерживать кишку на своемъ мѣстѣ посредствомъ особаго аппарата (родъ шинки съ отверстіемъ и бандажемъ).

Касательно геморроидальнаго состоянія заднепроходной кишки см. геморрой.

Въ новѣйшее время стали предлагать **Podophyll.** — при обыкновенномъ и кровавомъ поносахъ, но и въ самостоятельныхъ случаяхъ.

г. Болѣзни селезенки и печени.

94. Воспаленіе селезенки, *splenitis*, колотье въ селезенкѣ и другія болѣзни селезенки.

Воспаленіе этого органа трудно бываетъ отличить отъ простаго его припуханія. Симптомы: боль (давленіе, колотье), усиливающаяся отъ прикосновенія, дыханія, кашля, чиханія, сидѣнія въ сгорбившемся положеніи, лежанія на лѣвомъ боку; жаръ и припуханіе лѣваго бока подъ ребрами, боль въ лѣвомъ плечѣ, лихорадка съ ознобомъ, икота, рвота кровью и другими веществами, разстройство пищеваренія, въ особенности кислый вкусъ во рту, отрыжка.

Arsenicum — 3.

Сильное жжение въ селезенкѣ, съ опухолью, возбуждающее тоску біеніе подъ ложечкой, по-

носъ, рвота черной массой, сухой жаръ, жажда, губы трескаются, земляной цвѣтъ лица, малый пульсъ, чрезвычайная сладость.

Belladonna — 2.

Въ началѣ болѣзни и при воспаленіи *поверхности*, причѣмъ колотье, приливъ крови къ горлу и лицу, жаръ, сильное возбужденіе.

Bryonia — 2.

Послѣ *Aconit.* и *Bell.*, для *разрушенія* экссудата (выпота) въ оболочкѣ селезенки, когда еще имѣются *колющія*, стрѣляющія или давящія боли, запоръ и гастрическіе симптомы, и когда отъ движенія хуже.

Примѣчаніе. Противъ **колотья въ селезенкѣ**, зависящей часто только отъ мускуловъ живота, лучшимъ средствомъ служить *Bryon.*, а когда причиною этого недуга вѣтры — *Puls.*

При **хроническомъ воспаленіи селезенки** очень полезны: *Brom.* 3., а также *China*, *Plumb.*, *Lycor.* и *Sulphur.*

Противъ **опухоли селезенки**, особенно послѣ перемежающейся лихорадки, главнымъ средствомъ служить **China 2.**, если больной не лѣчился ею прежде, а то — **Ferrum. 3.** (См. перемежающуюся лихорадку.) Въ закоренѣлыхъ случаяхъ опухоли селезенки, съ затвердѣніемъ, важнымъ средствомъ служить **Jod. 3.**

Въ послѣднее время убѣдились въ отличномъ дѣйствіи **Rhodoph.** какъ противъ воспаленія, такъ и увеличенія (хронич.) селезенки.

Эти болѣзни еще не изслѣдованы достаточно.

China — 2.

Въ медлительныхъ случаяхъ. При слабости, опухоли селезенки, рвотѣ кровью, причѣмъ перемежающаяся боль, колющая, давящая.

Nux vomica — 3.

Давленіе и чувство опуханія, колотье, судорожная боль въ лѣвомъ боку, чувство слабости, тошнота, кровавая рвота, давленіе въ желудкѣ, гастрическая нечистота языка. Холерическій темпераментъ. Расположеніе къ геморрою.

95. Болѣзни желчныхъ путей: желчное состояніе, *status biliosus*; желчная лихорадка, *febris biliosa*; желтуха, *icterus*; желчные камни, *cholclithiasis*; желчная колика, *colica biliosa*.

Вотъ описаніе недуговъ, заключающихся въ этомъ отдѣлѣ:

1) Такъ называемое желчное состояніе. Состояніе пищеваженія почти такое же, какъ при желудочномъ ка-

таррѣ, съ тою только разницею, что въ этомъ случаѣ происходитъ обильное изліяніе желчи въ желудокъ и кишечный каналъ; поэтому къ симптомамъ разстройства пищеваренія, каковы — отсутствіе аппетита, тошнота и т. п., присоединяются еще слѣдующіе: желтый языкъ, рвота желчью, желчные повосы, темная моча, горькій вкусъ во рту, склонность къ кислому, давленіе и чувство полноты въ странѣ печени, желтизна кожи. Лучшими средствами служатъ здѣсь: **Bryon., Digit., Merc., Nux vom., Sulph.** — также *Chamom., Pulsatilla.*

2) Желчная лихорадка. Между желчнымъ состояніемъ и желчной лихорадкой существуетъ такое же отношеніе, какъ между катарромъ желудка и гастрической лихорадкой. Дѣло въ томъ, что желчное состояніе, дѣйствуя на кровеносную и нервную системы, легко можетъ вызвать лихорадку. Эта-то лихорадка и называется желчною (она также можетъ, въ видѣ симптома или усложненія, сопровождать катарръ желудка или кишекъ и воспаленіе легкихъ). Здѣсь полезны: **Acon., Bryon., Merc.,** также *Cham., Puls.*; — въ болѣе сильныхъ случаяхъ: **Arsen.**

3) Желтуха. Если выдѣленіе желчи чрезъ желчный каналъ встрѣчаетъ препятствіе, такъ что желчь попадаетъ въ кровь, то возникаетъ желтуха. Такими препятствіями могутъ быть: воспаленіе печени и желчнаго канала (см. слѣд. статью), катарръ, засореніе канала (желчными камнями, слизью, кровью, глистами, опухолями въ полости живота, судорогами), органическія болѣзни печени и кишекъ. Симптомами перехода желчи въ кровь бываютъ: желтый, бурый, бронзовый, зеленоватый цвѣтъ кожи, глазъ, слизистыхъ оболочекъ, мочи; бѣлыя, похожія на глину, испраженія, признаки желчнаго разстройства пищеваренія, опуханіе подъ ложечкой и въ странѣ печени, меланхолія. Смотри по причинамъ болѣзни, здѣсь помогаютъ: **Acon., Bryon., Chin., Digit., Merc., Nux vom., Sulph.** — также: *Arsen., Coloc., Jod.* — При желтухѣ у новорожденныхъ полезны: **Merc.** или *Cham.*

4) Желчные камни. Эти жесткіе сгустки жира находятся въ желчномъ пузырьѣ или свободно, или на его стѣнкахъ, или проникаютъ въ желчный каналъ, воспаляютъ внутреннюю его оболочку, или раздражаютъ ее, и нерѣдко препятствуютъ выходу желчи. Они происходятъ по большей части отъ застоя желчи вслѣдствіе нездоровой пищи или сидячаго образа жизни, но также отъ наследственнаго расположенія; величиною они бывають иногда съ песчинку, а иногда въ орѣхъ, нерѣдко выходятъ вмѣстѣ съ каломъ и причиняютъ также чрезвычайно мучительную колику, въ формѣ весьма сильныхъ періодическихъ припадковъ, или постоянныя боли въ печени, желтуху, рвоту желчью, поносы. Вѣрное средство противъ желчныхъ камней гомеопатіи такъ же мало извѣстно, какъ и аллопатіи. Противъ припадковъ желчной колики полезны: **Bellad.** или, что еще лучше, **Atropin., Cham., Coloc., Merc.** или **Coccc., Sulph., Veratr.** — Но лучше всего **Arsen.**

Вотъ подробная характеристика для выбора средствъ:

Aconitum — 2.

Особенно при *мисорадочномъ* состояніи, *желчномъ катаррѣ*, *желтухѣ*, послѣ простуды, досады, гнѣва. Языкъ желтъ, горькій вкусъ, отрыжка, рвота горькими, зеленоватыми веществами; чувство напряженія въ печени, съ *воспалительной* болью; поносъ или запоръ, головная боль; сильная жажда, красная моча.

Arsenicum — 5.

Желчное состояніе съ лихорадкою или безъ нея, *желтуха*. Отъ злоупотребленія спиртными напитками. При *отравленіи хи-*

ной, іодомъ, ртутью. При *органическихъ недугахъ* печени. Желчная рвота съ поносомъ, коликой. Быстрый упадокъ силъ, сухой, *жгучій жаръ* и ознобъ, *неутолимая жажда*, *жженіе въ желудкѣ* и подъ ложечкой, *опухоль печени и селезенки*, вздутость живота, *органическіе недуги нижней части живота*, *водянка*.

Bryonia — 2.

Желчная состоянія *разнаго рода*, послѣ простуды, досады, порчи желудка, особенно лѣтомъ. Горькій вкусъ, бѣлый языкъ, от-

рыжка, тошнота, рвота желчью, особенно послѣ питья и ѣды, съ давленіемъ въ желудкѣ, опуханіемъ печени, запоромъ, давящей головою болью, сухостью, жаждой, ознобомъ, раздражительностью, давленіемъ, чувствомъ опуханія, колотьемъ въ печени при дыханіи. Цвѣтъ лица желтый; испраженія свѣтлаго цвѣта. Когда недугъ усложняется пораженіемъ легкихъ, подреберной плезы, ревматизмомъ.

Chamomilla — 2.

Желчные недуги съ лихорадкой или безъ нея; особенно желчная колика, желтуха, также у новорожденныхъ. Послѣ простуды, досады, порчи желудка. Языкъ покрытъ желчью, желчный вкусъ, рвота, поносъ съ коликой, развитіе кислотъ въ желудкѣ, отсутствіе аппетита; тоска и давленіе подъ ложечкой; испраженія похожи на рубленныя яйца, желтая моча, съ ключьями; жаръ, бессонница, сильное безпокойство.

China — 2.

Желтуха, особенно хроническая, послѣ досады, злоупотребленія ртутью и ромашкой, въ соединеніи съ недугами печени и селезенки конгестивнаго и ор-

ганическаго характера; послѣ перемежающейся лихорадки; послѣ потери соковъ, у пожилыхъ женщинъ при прекращеніи регулъ въ соединеніи съ водянкою. Чрезвычайная слабость, давленіе въ желудкѣ, желчная или слизистая рвота, отвращеніе ко всякой ѣдѣ, особенно же къ мясу, или сильный голодь, странныя прихоти; поносъ; обморокъ; напряженность нижней части живота; ознобъ; головная боль; головокруженіе; земляной цвѣтъ кожи; сухая кожа, бѣлыя или желто-зеленыя испраженія, похожія на глину, или запоръ и поносъ попеременно; сварливость.

Colocynthis — 3.

Желчные недуги съ лихорадкой или безъ нея; желтуха; особенно при желчной коликѣ послѣ малѣйшаго принятія пищи. Особенно послѣ гнѣва, досады, сдерживаемаго раздраженія. Съ бессонницею, сильнымъ жаромъ, сухостью, полнымъ пульсомъ, давящей головою болью во лбу, усиливающейся отъ лежанія, рвотой, чрезвычайно сильной рвзью въ животѣ (особенно характеристичный признакъ) и судорогами въ икрахъ, съ ознобомъ, ломомъ въ ногахъ, желчнымъ поносомъ.

Digitalis — 2.

Желчные недуги без лихорадки, особенно желтуха. Помогает больше против судорожных и конкестивных, нежели органических недугов печени. Желтизна, особенно глаз и нѣжных частей; отвращеніе къ пищѣ, кислоты въ желудкѣ, тошнота, горькій вкусъ, напрасный позывъ на рвоту, чувствительность и давленіе въ странѣ желудка и въ печени; животъ натянутъ, испраженія глинистыя, сѣрыя, выходящія съ трудомъ; мутная, густая, желто-бурая моча; ознобъ, медленный пульсъ, чувство слабости въ желудкѣ.

Jod. — 3.

Хроническіе недуги желчи съ органическими болезнями печени и нижней части живота, въ особенности отвердѣніе печени, ожирѣніе ея и т. п., изнурительная лихорадка, водянка. Противъ желчныхъ камней? Послѣ злоупотребленія ртутью. Кожа грязно-желтая или бурая, исхудалость, жажда; языкъ покрытъ густымъ слоемъ, тошнота, бѣлая испраженія, попеременно съ запоромъ; темная, желто-зеленая моча. — (Подобнымъ же образомъ дѣйствуетъ Brom.)

Mercurius — 2.

Лихорадочные недуги желчи, желтуха съ примесью крови, катарромъ, воспаленіемъ печени, желчныхъ путей. Желтуха у новорожденныхъ, колика отъ желчныхъ камней. Горькій вкусъ, рвота желчью, боль въ печени, желудкѣ, селезенкѣ, усиливающаяся ночью, притомъ безпокойство, темная, пахнущая гнилью моча, жажда, ознобъ, потъ, рвѣ въ животѣ, зеленыя испраженія (какъ пшинатъ), а также слизистыя, смѣшанныя съ кровью, съ причиняющимъ боль давленіемъ въ заднепроходной кишкѣ. — Послѣ злоупотребленія хиномомъ.

Nux vomica — 3.

Недуги желчи съ лихорадкою и безъ нея; при апохондріи, истерикѣ, геморроѣ, завалахъ печени, селезенки, послѣ гнѣва, досады, невоздержности въ пищѣ, спиртныхъ напитковъ, злоупотребленія ромашкой и кофе; вѣрное средство для людей, занимающихся умственнымъ трудомъ, вообще ведущихъ сидячій образъ жизни, причемъ бурый, покрытый слизью языкъ, кислоты, горькій вкусъ, отрыжка, тошнота, рвота желчью, давленіе и напряженность въ желудкѣ и въ бокахъ, запоръ съ позывомъ на

низ или незначительныя, твердыя или жидкія, слизистыя, водянистыя испражненія; зудъ и *узлы* въ заднемъ проходѣ, *боль въ поясницѣ*, вѣтры, бурчаніе, колики; головная боль во лбу, головокруженіе, жаръ въ лицѣ, красное, рѣже желтое лицо; жаръ съ ознобомъ. Разбитость, безпокойство, сварливость, утромъ хуже.

Pulsatilla — 2.

Конестивныя, ревматическія, катарральныя или гастрическія причины. Дается особамъ сварливымъ, чувствительнымъ. Также при хроническихъ, воспалительныхъ и катарральныхъ недугахъ желчныхъ путей, когда притомъ: отсутствіе аппетита, пища не переваривается, горькій вкусъ, рвота, *по ночамъ* зеленыя или бѣлыя испражненія, колика, ночное безпокойство, бѣненіе и колотье подъ ложечкой, ознобъ, отсутствіе жажды. — Хуже *ве-*

черомъ и до полуночи. — Страшные сны, слезливость. Сильный позывъ на мочу или задержаніе ея. Главное средство послѣ злоупотребленія ромашкой.

Sulphur — 3.

Желтуха, желчные камни.

Дается болѣе въ *хроническихъ формахъ*. При *конестивныхъ и органическихъ* причинахъ. Условія подобны означеннымъ при *Них vom.*, только тамъ причины менѣе матеріальны, и ходъ болѣзни скоротечнѣе. При золотухѣ, дискразіи (порчѣ соковъ), ревматизмѣ, ломотѣ.

Veratrum album — 2.

Судорожныя формы, съ обмороками, слабостью, коликами, съ желчною *рвотою* и съ желчнымъ *носомъ* или запоромъ, громкимъ бурчаніемъ въ животѣ, вѣтрами. *Тѣло холодно какъ ледь*. Тоскливое, ипохондрическое расположеніе духа.

Примѣчаніе. Вслѣдствіе близкаго родства болѣзни желчныхъ путей съ болѣзнями желудка и кишекъ см. также эти послѣднія болѣзни. Бываютъ случаи, гдѣ указанныя тамъ средства, именно: **Antim. cr.**, **Calc. c.**, **Ipec.**, **Lycop.**, **Magn. carb.** и **Sep.**, могутъ быть употреблены и въ болѣзняхъ желчныхъ путей. **Lycop.** въ особенности помогаетъ противъ весьма многихъ хроническихъ страданій печени, не сопряженныхъ съ чрезмѣрнымъ измѣненіемъ вещества печени, и противъ послѣдствій отъ такихъ страданій.

При органических недугах печени, съ желтухой или водянкой, лучшимъ средствомъ служить **Aurum. Ferrum** помогаетъ въ тѣхъ же случаяхъ, особенно при опуханіи печени, малокровіи, послѣ злоупотребленія хиной въ перемежающейся лихорадкѣ. Противъ хронической желтухи, съ полнокровіемъ нижней части живота, развитіемъ кислотъ въ желудкѣ, запоромъ, рекомендуемъ **Carb. veg.** Послѣ чрезмѣрнаго употребленія ртути даютъ **Acid. nitr.** или **Jod.**; **Acid. nitr.** дается также противъ хроническихъ конгестивныхъ страданій геморроидальнаго характера.

Противъ коликъ отъ желчныхъ камней помогаютъ теплыя и влажныя мучныя припарки и втираніе тинктуры *Belladonna* (въ формѣ мази или раствора въ спиртѣ). Какъ на средство, весьма часто дающее радикальное излѣченіе, должно прежде всего указать на Карлсбадскія воды; кромѣ того: Виши, Мариенбадъ, Киссингенъ, Тараспъ, Нейенаръ. Лѣченіе виноградомъ рекомендуется для удаленія желчныхъ камней.

Приведемъ новѣйшія средства. Противъ желчной лихорадки: *Aroc. a.* (рвота желчью, поносъ, — въ большомъ ходу на югѣ Америки); *Baptis.*; *Gelsem.* (рвота какой-то черной массой, а также черныя испраженія; противъ желтой лихорадки); *Leptandr.* (необыкновенная слабость, отсутствіе аппетита, запоръ или поносъ, черныя, вонючія испраженія, темная моча, горькій вкусъ во рту); **Podoph.** (раздражительность, раздраженіе кишекъ, боль).

Противъ желтухи: *Gels* (необыкновенная слабость, глинистыя испраженія); *Hydrast.* (сердцебіеніе, слабость, катарръ кишекъ); *Leptandr.* (см. симптомы, приведенные выше при желчной лихорадкѣ; сверхъ того — рвота желчью, боль въ печени, колотье, боль въ поперечной ободочной кишкѣ, темная моча и въ особенноти очень темныя, черныя испраженія); *Myrica* (тянущая боль въ спинѣ, тупая боль въ печени, отсутствіе аппетита, бѣлый или желтый языкъ, позывъ къ кислому, безсонница); **Podoph.** (усложненіе желчными камнями, воспаленіе печени и приливы къ ней, чувство полноты въ печени, запоръ попеременно съ поносомъ, или хроническій запоръ).

Противъ желчныхъ камней и колики отъ нихъ: **Podoph.**, которое содѣйствуетъ удаленію камней (большіе приемы).

96. Воспаленіе печени,

hepatitis.

Часть брюшины, покрывающая печень, воспаляется чаще, нежели самое вещество печени. Кроме того, воспаляются: желчный пузырь, желчные пути и развѣтвленія воротной вены. Последний недугъ можетъ разпознать только врачъ. Воспаленіе печени узнается по разнаго рода болямъ въ правомъ боку подъ груднымъ соскомъ, до подреберья, спереди и сзади (особенно давленіе или колотье), усиливающимся отъ дыханія, чиханія, кашля, глубокаго вдыханія, постукиванія, привосновенія; боль въ правомъ плечѣ; опуханіе стороны печени, желтуха или, по крайней мѣрѣ, желтоватый цвѣтъ лица, рвота, запоръ или поносъ; сильная лихорадка съ ознобомъ, отуманеніе или боль головы, мрачное расположеніе духа, тоска. Воспаленіе желчныхъ пузыря и путей бываетъ большею частью при желчныхъ камняхъ. — Воспаленіе печени легко можетъ быть смѣшано съ болѣзнями легкихъ. Оно легко ведетъ къ выпотѣнію, нагноенію, сращенію съ сосѣдними частями тѣла. Всего чаще причины его бываютъ или механическія, особенно давленіе (шнуровка у женщинъ), или ревматическія. Хроническое воспаленіе можетъ тянуться долго, не обнаруживая при этомъ особенно рѣзкихъ признаковъ; оно можетъ повлечь за собою вырожденіе тканей. Иногда оно само вызываетъ измѣненія тканей, а иногда оно обусловливается такими измѣненіями.

Лѣченіе:

Aconitum — 2.

Главное средство въ началѣ болѣзни, въ особенности когда поражена оболочка печени при сильной лихорадкѣ, сильномъ жгучемъ колотьи, жарѣ, опухоли печени; полный, ускоренный пульсъ. Притомъ затрудненное дыханіе, короткій, сухой кашель. Послѣ простуды, возбужденія,

разстройства желудка. Это средство надо давать нѣсколько дней сряду.

Arsenicum — 3.

Въ отчаянныхъ случаяхъ, когда угрожаетъ нагноеніе или антоновъ огонь, причемъ причиняющая боль опухоль, сильное жженіе, отдѣленіе черной

массы рвотою и низомъ; горячая кожа, чрезвычайная жажда, сильнѣйшая тоска.

Belladonna — 2.

При поверхностномъ воспаленіе (оболочки) печени, причеиъ схватывающія, колющія боли, усиливашяющіяся отъ малѣйшаго прикосновенія, движенія, дыханія, давленія и лежанія на больной сторонѣ; напряженность верхней части живота; почное безпокойство. Сверхъ того, приливъ крови къ голови, головокруженіе и т. п. Сухой кашель, стѣсненіе дыханія; вздохи, жажда, бессонница, слабая память, тошнота, причиняющая боль рвота, сильная лихорадка съ сильнымъ летучимъ жаромъ.

Bryonia — 2.

Когда поражена не одна оболочка, но и вещество (ткань) печени; когда при этомъ разстройство пищеваренія и отдѣленіе желчи, желтуха, запоръ, угрожаетъ нагноеніе. Преобладаютъ: давящая боль или ко-

лотье, усиливающіяся отъ малѣйшаго прикосновенія. Опухоль и напряженіе въ правомъ боку, усиливающіяся отъ дыханія, движенія. Полезно также при ревматически-воспалительномъ характерѣ и послѣ досады.

Mercurius (sol. или Calomel) — 2.

Во всякомъ случаѣ главное средство въ болѣе серьезныхъ случаяхъ воспаленія желчныхъ путей и самого вещества, при угрожающемъ нагноеніи, а потому: жгучій лихорадочный жаръ, смѣняющійся ознобомъ, жажда, потъ, безпокойство, давленіе во всей верхней части живота. Желтуха. Поносъ или запоръ.

Nux vomica — 2.

Принимается послѣ устраненія сильнаго воспаленія или при болѣе легкихъ, особенно ревматическихъ формахъ болѣзни, когда бывають: колотье, давленіе, бѣненіе; запоръ; множество желудочныхъ и желчныхъ симптомовъ, жажда, горькій вкусъ во рту; одышка; головная боль; стѣсненіе дыханія. Хуже утромъ.

Примѣч. Въ опасныхъ острыхъ случаяхъ, при тифозныхъ признакахъ и быстромъ упадкѣ силъ, можетъ помочь и Phosph. Въ хроническихъ случаяхъ помогаютъ: Brom. или Jod., China., Lycor., Magn. mur., Phosph., Sep. и Sulph. — Также Card. mar. и Chelidonium.

Въ новѣйшее время при различныхъ страданіяхъ печени стали принимать во вниманіе еще слѣдующія средства: *Bapt.* (дѣйствіе его еще не достаточно выяснилось), *Iris.* (подобно *Mercur.*), *Leptandr.* (острое воспаленіе, желтая атрофія съ бредомъ, вонючія, похожія на деготь испражненія, хроническое воспаленіе, увеличеніе, абсцессъ и др. органическіе недуги), *Phytol.* (въ хроническихъ случаяхъ; дѣйствуетъ на всѣ желѣзистые органы); — **Podoph.** (хроническое воспаленіе или приливъ, мускатная печень.

Само собою разумѣется, что тутъ нечего экономничать *пріемами* и повтореніемъ лѣкарствъ. Поэтому совѣтуемъ давать нисшія разжиженія по нѣскольку капель (2—3) или щепотокъ (1—2) черезъ 3—2 часа.

Діета должна быть самая строгая.

Органическихъ недуговъ печени, каковы: увеличеніе или отвердѣніе печени, изнуреніе, ракъ печени, ожирѣніе печени и т. п., мы здѣсь не касаемся, такъ какъ лѣченіе ихъ недоступно людямъ, не свѣдущимъ въ медицинѣ. Скажемъ только, что часто эти недуги, даже въ своихъ злокачественнѣйшихъ формахъ, какъ напр. ракъ, появляются и быстро развиваются совершенно незамѣтно, не обнаруживая даже характеристическаго симптома желтизны лица.

В. БОЛЕЗНИ МОЧЕВОЙ И ПОЛОВОЙ СИСТЕМЪ.

а. (97 — 107.) Болезни мочевыхъ путей.

Недуги, сюда относящіеся суть или:

- 1) Мѣстные болѣзни мочевыхъ органовъ: почекъ, мочевого пузыря, мочеточниковъ или мочевого канала, и притомъ — какъ матеріальныя ихъ измѣненія, такъ и болѣзненные ощущенія въ нихъ, — или
- 2) только обнаруживающіяся въ этихъ частяхъ болѣзни, въ дѣйствительности же зависяція а) отъ крови и ея дурнаго состава (при скарлатинѣ, кори, тифѣ, холерѣ, ломотѣ),

или б) отъ болѣзней нервной системы, особенно спиннаго мозга, какъ напр. при параличѣ мочеваго пузыря.

Что касается до отдѣльныхъ болѣзней, то мы различаемъ:

I. Смотри по мѣсту пребыванія:

1) Болѣзни почекъ:

- а) воспаленіе почекъ,
- б) органическія измѣненія ихъ,
- в) образованіе въ нихъ камней и послѣдствія этого;

2) Болѣзни мочеваго пузыря:

- а) воспаленіе мочеваго пузыря,
- б) катарръ его,
- в) судороги,
- г) параличъ,
- д) органическіе недуги,
- е) мочевые камни;

3) Болѣзни мочеточниковъ; онѣ большею частью совпадаютъ съ недугами 1 и 2 отдѣловъ.

4) Болѣзни мочеваго канала, какъ-то: слизетеченіе (трипперъ), суженіе и т. д.

II. Явленія, чаще всего сопровождающія эти болѣзни:

1) Затрудненіе при испусканіи мочи, т. е. моча выходитъ съ болью, каплями, иногда съ сильнымъ позывомъ и давленіемъ (мочерѣзь).

2) Задержаніе мочи, которое обусловливается извѣстнымъ состояніемъ почекъ, мочеточниковъ или пузыря, и бываетъ воспалительнаго, судорожнаго, органическаго характера, или зависитъ отъ механическихъ причинъ.

3) Недержаніе мочи, т. е. невозможность удерживать мочу, бываетъ большею частью слѣдствіемъ судорогъ, полнаго или неполнаго паралича, воспаленія, катарра, механическихъ причинъ.

Для лѣченія всего важнѣе знать:

III. Какого рода болѣзнь, т. е. какой она имѣетъ характеръ —

- 1) воспалительный,
- 2) катарральный,
- 3) нервный, судорожный,
- 4) органическій,

и чѣмъ, слѣдовательно, обуславливаются означенные выше припадки.

Руководясь выше приведенными точками зрѣнія, мы наиболѣе наглядно ознакомимся съ этою обширною областью.

А. (97—99.) Воспалительные вользни мочевыхъ органовъ.

97. Воспаленіе почекъ, *nephritis*; 98. Воспаленіе мочевого пузыря, *cystitis*; 99. Воспаленіе мочевого канала, *urethritis*.

Эти воспаленія отличаются необыкновенно сильною и продолжительною болью, которой мѣстопробываніе, смотря по пораженнымъ частямъ (при воспаленіи почекъ — въ срединѣ спины, спереди, въ той части, которая соотвѣтствуетъ странѣ пупка, въ сторону отъ позвоночнаго столба; при воспаленіи мочевого пузыря — въ нижней части живота), бываетъ различно. Отъ давленія, потрясенія, движенія, продолжительнаго стоянія, боль усиливается. Моча вытекаетъ въ маломъ количествѣ, бываетъ бурого, краснаго цвѣта, смѣшана съ кровью, бѣлковиной, гноемъ. При томъ бываютъ боли въ яшкахъ, голени, гастрическіе (желудочные) и нервные припадки, лихорадка.

Важнѣйшія средства суть:

Aconitum — 2.

Послѣ простуды, испуга, страха. Сильная *лихорадка*, *колотье* и *жженіе* въ сторонѣ почекъ и мочевого пузыря; послѣдній вздутъ и въ немъ ощущается боль. Сильный, частый и напрасный позывъ къ мочѣ, отдѣленіе незначительнаго количества красной, горячей мочи.

Belladonna — 2.

Колотье съ *жженіемъ* въ поясничныхъ позвонкахъ, доходящее до мочевого пузыря и це-

рідически усиливающеся; жаръ въ сторонѣ почекъ съ *рвжущими коликами*; отдѣляется въ маломъ количествѣ, съ болью, *горячая*, исходящая съ болью моча, причѣмъ сильный позывъ къ мочѣ, тоска, безпокойство, особенно ночью. Чувствительность въ сторонѣ мочевого пузыря, приливы крови къ головѣ и проч.

Cannabis — 2.

Воспаленія: почекъ, мочевого пузыря и канала, съ истеченіемъ слизи. *Потягивающая* боль, какъ

бы отъ *нарыва, отъ страны почекъ до таза*; глухое давленіе въ сторонѣ почекъ; *колики* вдоль мочеточниковъ по обѣ стороны паховъ. Давленіе на пузырь съ задержаніемъ мочи. Моча выходитъ каплями съ *жженіемъ*, и особенно — съ *рѣзью* въ мочевомъ каналѣ. Частая, свѣтлая, какъ вода, мутная или красноватая моча. Струя мочи дробится на нѣсколько частей.

Cantharides — 3.

Острое или хроническое *воспаленіе почекъ, мочевого пузыря и мочевого канала. Крoвая моча, мочерѣзъ, задержаніе мочи.* Притомъ лихорадка. Мучительная судорожная боль въ промежности и вдоль мочевого канала, доходящая до шудятъ, которыя сильно втннуты, жженіе въ головкѣ. Эрекции съ болью. Колотье, рѣзь, ломъ въ спинѣ и ляшкахъ, усиливающіеся отъ давленія и движенія. По временамъ боль въ почкахъ, пузырь чувствителенъ къ надавливанію, которое вызываетъ колотье, *жженіе* и чувство, будто тамъ ранки. *Сильный позывъ на мо-*

При хронически-воспалительномъ состояніи, но съ осторожностію, даются:

Sulphur — 3.

Страдающимъ ломотой, геморроемъ; послѣ чрезмѣрнаго

чу, которая вытекаетъ каплями, притомъ судороги мочевого пузыря, истеченіе крови; рѣзь, колотье и особенно жженіе передъ истеченіемъ мочи и послѣ него. Притомъ ознобъ, ледяной холодъ въ рукахъ и ногахъ, позывъ на низъ, рвота, тоска, сильная жажда, горячія и красныя щеки, малый пульсъ моча блѣдно-желтая, красная, смѣшанная съ кровью, слизью и пескомъ, искривленіе члена.

Mercurius — 2.

Воспалительное состояніе пузыря и почекъ, затрудненное испусканіе мочи, геморрой пузыря. Поражена не столько шейка мочевого пузыря, сколько *почки, самый пузырь и мочевой каналъ.* Слѣдствіе употребленія спиртныхъ напитковъ и простуды. Моча остра, ѣдка, темно-краснаго цвѣта, смѣшана съ кровью, мутна, съ бѣлымъ (какъ мука) осадкомъ или съ хлопьями, зловонна, выходитъ съ жженіемъ, по каплямъ, притомъ постоянный сильный позывъ на мочу, колотье, ощущение ссадинъ, потѣніе.

употребленія спиртныхъ напитковъ; кровавая моча, *задержаніе ея, трудное испусканіе мочи,*

съ сильнымъ позывомъ, жженіемъ, рѣзью, колотьемъ, особенно въ каналѣ. Слизетеченіе. Моча буро-краснаго цвѣта, темна, *крово-заво-слизиста*, бѣловата, весьма зловонна, съ мучнистымъ, розовато-краснымъ осадкомъ, который пристаесть ко дну горшка. Запоръ, иноходрія.

Therebinthina — 3.

Кровавая моча. Жгучая и потягивающая боль въ почкахъ,

судорожное *давленіе* въ мочевомъ пузырьѣ по направленію къ почкамъ, а отъ почекъ къ лямкамъ. Передъ мочеиспусканіемъ щемлящая боль и рѣзь въ мочевомъ пузырьѣ, облегчающаяся отъ ходьбы. Во время мочеиспусканія нестерпимое жженіе въ мочевомъ пузырьѣ и мочевомъ каналѣ. Моча красная, кровавая, слизистая, содержитъ бѣловину и частицы слизистой оболочки, густая.

Новѣйшія средства. 97. Противъ воспаления почекъ: *Erig., Ver. vir.* — 98. Противъ воспаления мочеваго пузыря: *Chimaphila umb., Erig., Hydrast., Veratr. vir.*

б. (100—101.) Катарральные болѣзни мочевыхъ органовъ.

100. Катарръ мочеваго пузыря, *catarrhus vesicae*. 101. Катарръ мочеваго канала, *catarrhus urethrae*.

Эти катарры находятся часто въ связи съ полнокровіемъ нижней части живота, геморроемъ или бываютъ слѣдствіемъ старости, половыхъ причинъ, при утолщеніи, затвердѣніи и другихъ матеріальныхъ недугахъ пузыря. Они имѣютъ характеръ всѣхъ катарровъ, т. е. граничатъ съ воспаленіемъ, въ различные періоды своего развитія обнаруживаютъ слизетеченіе, переходящее легко въ опухоль, затвердѣніе или расслабленіе слизистыхъ оболочекъ. Моча бываетъ смѣшана съ различными веществами, съ гноемъ и кровью; боли бываютъ весьма разнообразны. Нерѣдко случается при этомъ даже задержаніе мочи.

Если болѣзнь имѣетъ (особенно въ началѣ) воспалительный характеръ, то изъ вышеозначенныхъ средствъ рекомендуемъ преимущественно: **Cann., Canth., Merc., Sulph.** и *Tereb.* (первыя 3 средства полезны также въ первомъ періодѣ гонорреи [трипперъ]); при переходѣ отъ воспалительнаго къ катарральному характеру,

или при хроническомъ характерѣ болѣзни: **Nitr. acid.**; но при чисто катарральномъ характерѣ болѣзни преимущественно:

Calcarea carbonica — 3.

Такъ называемый слизистый геморрой мочеваго пузыря; у золотушныхъ. Послѣ чрезмѣрнаго употребленія спиртныхъ напитковъ. При развитіи кислотъ въ желудкѣ. У страдающихъ ломотою. Давленіе и потягиваніе въ сторонѣ почекъ. Обильное истеченіе зеленоватой, зловонной, даже кровавой мочи, отдѣленіе густой слизи, при жжении, рѣзи, блѣдности лица и боли будто отъ пораненія.

Dulcamara — 2.

Катарръ мочеваго пузыря. Слѣдствіе матеріальныхъ измѣненій пузыря, особенно послѣ простуды. Сильный позывъ на мочу и *мочеръза*. *Блѣлая какъ молоко*, густая, мутная, *слизистая моча* и жженіе въ мочевома каналѣ. Иногда невольное истеченіе мочи.

Lycoperidium — 3.

Одно изъ главныхъ средствъ въ *хроническихъ* (полувоспалительныхъ) *катаррахъ*, съ *мочеръзомъ*, *геморроема мочеваго пузыря*. Боль въ *почкахъ* и *мочеточникѣ*. Давленіе надъ лобковою костью. Сильный и на-

прасный позывъ на мочу, съ *рѣзью* въ мочевома пузырьѣ и головкѣ члена; стѣсненіе, зудъ, жженіе, чувство изъязвленія въ мочевома каналѣ. Моча выходитъ каплями, или обильное истеченіе мочи съ мѣловиднымъ осадкомъ; она бываетъ мутна, какъ бы смѣшана съ глиной, слизиста, молочнаго цвѣта, клочковата; содержитъ *маленькіе камешки и песокъ*. Притомъ гастрическіе (запоръ), катарральные, *геморроидальные*, *ломотные* недуги и лишай.

Nux vomica — 2.

Катарръ мочеваго пузыря, особенно послѣ подавленныхъ кровотеченій, *остатки воспаления* и послѣдствія злоупотребленія спиртными напитками. Особенно хорошо противъ *мочеръза* или *задержанія мочи при геморроидальныхъ и менструальныхъ страданіяхъ*, при болѣзни почекъ и при каменной болѣзни. *Давленіе*, *ломъ*, *жженіе*, *колотье*, *щиплющая боль* и *боль какъ бы отъ изъязвленія въ почкахъ*, въ мочеточникѣ и пузырьѣ. *Напряженіе и жаръ въ бедрахъ и сторонѣ почекъ*, усиливающіеся отъ сидѣнія, движенія, надавли-

ванія. *Чувство полноты и давленія* въ пузырьѣ. Причиняющій боль (особенно ночью) *позывъ* на мочу и отдѣленіе незначительнаго количества темно-красной, кровавой, смѣшанной съ пескомъ мочи, съ жженіемъ, стягиваніемъ и рвущими болями въ шейкѣ мочевыхъ пузыря и канала. *Судорожное служеніе мочевого канала*. Притомъ: колика, рвота, сильный позывъ на низъ, запоръ, потягиваніе въ яичкахъ и сѣмянныхъ канатикахъ.

Pulsatilla — 2.

Главное средство противъ *острого и хроническаго катарра* съ обильнымъ *истеченіемъ слизи*, жаромъ въ сторонѣ пузыря.

Примѣчаніе. Въ хроническихъ случаяхъ, близко подходящихъ къ воспаленію и потому сопряженныхъ съ болью, а также въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ можно предположить образованіе нарывовъ въ мочевомъ пузырьѣ, можно также рекомендовать **Arsen.**; если же эти самые случаи развиваются медленно и безъ боли, то **Нер. sulph.** Съ *Lycor.* сходны *Sep.* и *Sulph.* Противъ мочи, имѣющей видъ молока, когда слизь свертывается даже въ пузырьѣ — *Acid phosphor.* Противъ хроническаго катарра пузыря, съ испусканіемъ и безъ испусканія крови, съ успѣхомъ употребляется — *Uva ursi*, которое я давалъ также въ формѣ настоя (небольшая горсть травы на чайникъ средней величины, пить по двѣ чашки въ день). Подобное же дѣйствіе оказываетъ **Senega**, которое помогаетъ гораздо вѣрнѣе, чѣмъ прославленное *Petrosel.*, годное собственно только противъ слизетеченія изъ мочевого канала (трипнеръ).

Мочеръзь съ жженіемъ и *колотьемъ* въ шейкѣ мочевого пузыря, но особенно *частый позывъ* на мочу, а затѣмъ отдѣленіе *слизистой*, клейкой мочи. Притомъ: потягиваніе въ яичкахъ, лишкахъ, стягиваніе и рѣжущая боль въ поясницѣ и сторонѣ пупка; поносъ.

Uva ursi — 2.

Хроническій катарръ мочевого пузыря съ мочеръзомъ, кровавой мочей. *Позывъ на мочу* съ стягиваніемъ, затѣмъ испусканіе мочи полною струею или по каплямъ, съ примѣсью *слизи и крови*, съ *рѣжущимъ жженіемъ* въ мочевомъ каналѣ.

Новыя средства противъ катарра мочевого пузыря — *Collins.*, *Eurat. purp.*, а въ случаѣ жиденія при испусканіи мочи — *Chimaphila*.

в. (102—106.) Судорожные (нервные) болѣзни мочевыхъ органовъ.

102. Боль при испусканіи мочи, затрудненное испусканіе ея, *dysuria*; мочерѣзъ, *stranguria*.

Боль при испусканіи мочи — затрудненное испусканіе мочи — зависить большею частью отъ воспалительныхъ, катарральныхъ или органическихъ причинъ; рѣдко она бываетъ чисто судорожнаго свойства. Лѣченіе должно сообразоваться съ этими обстоятельствами. Мочерѣзъ, т. е. постоянный позывъ на мочу и боль при ея отдѣленіи, есть особый видъ этой болѣзни, который зависить главнымъ образомъ отъ свойствъ мочи (чрезмѣрное употребленіе мочегонныхъ средствъ, молодого пива и т. п.). Иногда необходимо бываетъ, оставивъ въ сторонѣ основной недугъ, думать только объ устраненіи этихъ болей. Если онѣ не воспалительнаго, а болѣе судорожнаго характера (см. средства въ статьѣ 101), то съ успѣхомъ дается — **Bell. 2.** (отрывистая, стягивающая, захватывающая боль), или **Hyosc. 2.** (при сильномъ позывѣ), оказывающее весьма рѣшительное дѣйствіе, или **Con. 2.** (слабая струя, моча выходитъ каплями; постоянный, особенно ночью, позывъ на мочу, съ давленіемъ на пузырь, жженіемъ въ пузырьѣ и мочевомъ каналѣ, щекотаніемъ, рѣзью, подергивающимъ колотьемъ въ мочевомъ каналѣ).

Новѣйшими средствами противъ боли при испусканіи мочи служатъ: а) при затрудненномъ мочеиспусканіи: въ случаѣ ревматизма или судорогъ — *Chimaph.*, *Collins.*, а въ случаѣ хроническаго воспаления — *Erig.*, *Senec.* (раздражительность мочевого пузыря, задержаніе мочи — дается также въ водянкѣ, — кровавая моча, неправильное положеніе матки, въ особенности у женщинъ и дѣтей); б) при мочерѣзѣ: **Apos. cann.** — лучшее мочегонное средство, при очевидной вялости отправления почекъ; *Eurat. purp.* — при хронической формѣ болѣзни, камняхъ, ломотѣ, ревматизмѣ, кровавой мочѣ, водянкѣ.

103. Боли и колика въ почкахъ,
nephralgia и *colica renalis*.

Особеннаго вниманія заслуживаютъ боли въ почкахъ, которыя бываютъ сопряжены съ образованіемъ песка и мочевыхъ камней. Онѣ очень часто при этомъ начинаются съ боку въ нижней части спины, направляются къ мочеточникамъ, въ полость живота и мочевого пузыря, къ яичкамъ, ящкамъ, усиливаются отъ горьчайшей пищи, ѣзды, верховой ѣзды, ходьбы, лежанія на спи-нѣ, и доходятъ иногда до почечной колики, отъ которой происходятъ: всхлипываніе, рвота, холодный потъ, обмороки. Противъ слабыхъ формъ этихъ болей главнымъ средствомъ служитъ **Lycop. 3.**, а когда особенно часто испускается моча, то **Puls. 2.** (см. характеристику въ стат. 100, 101), а противъ колики — **Colocynth. 2.**, при слѣдующихъ симптомахъ: полувоспалительная, коликообразная боль въ почкахъ, вдоль мочеточника до ящекъ; колотье, жженіе въ почкахъ и бедрахъ, заставляющія больнаго корчиться и періодически усиливающимся; сильный позывъ на мочу съ отдѣленіемъ въ незначительномъ количествѣ мутной, слизистой, дающей осадокъ, густой, студенистой мочи, похожей на свернувшійся бѣлокъ; рѣзъ при основаніи пузыря и въ животѣ, жженіе въ мочевомъ каналѣ; частое мочеиспусканіе. При преобладаніи судорожныхъ болей можно употребить **Bellad.**, а въ болѣе тяжелыхъ случаяхъ — **Opium**; напротивъ того, при воспалительномъ характерѣ болѣзни главнымъ средствомъ служитъ **Cantharis**.

104. Судороги мочевого пузыря,
spasmus vesicae.

Судороги мочевого пузыря, т. е. болѣзненное сжатіе мочевого пузыря, сопряженное съ сильнымъ позывомъ на мочу или задержаніемъ ея, часто происходятъ отъ воспалительныхъ, катарральныхъ, органическихъ, механическихъ причинъ (напр. засореніе пузыря сгустками крови или слизи), но бываютъ также чисто нервнаго свойства. — Если преобладаютъ признаки перваго рода, то даютъ **Canth.**, **Cann.**, **Tereb.**, а въ случаѣ сильнаго позыва — **Puls.** и т. д. (см. 100—102). Во второмъ случаѣ, когда страданіе чисто

нервного характера, употребляются: **Bell.**, **Nux vom.** (см. выше 100, 101), **Hyosc.**, **Op.**, **Phosph.**, а въ случаѣ ревматической причины — **Chamom.** или **Rhus.** Противъ судорогъ мочевого пузыря отъ мочевыхъ камней, говорятъ, превосходно дѣйствуетъ *Sassaparilla.*

Въ новѣйшее время стали также употреблять *Gelsemium.*

105. Задержаніе мочи, *ischuria.*

Моча или вовсе не отдѣляется (болѣзнь эта даже при не слишкомъ большой продолжительности причиняетъ смерть), или она отдѣляется въ маломъ количествѣ (вслѣдствіе болѣзни почекъ), или же она задерживается въ мочеточникахъ или въ мочевомъ пузырьѣ. Послѣдній случай бываетъ всего чаще. Но и здѣсь необходимо точно различать разные условія. Когда недугъ обусловливается воспалительными причинами, то надо лѣчить воспаленіе (см. выше 97—99. стат.), если — органическими (отвердѣніе, расширение, опухоль, сращеніе пузыря) или механическими (задержание мочи камнями, давленіе другихъ частей на мочевой пузырь, суженіе мочевого канала), то надо, по возможности, устранить эти явленія (при помощи хирургіи) или, по крайней мѣрѣ, палліативно содѣйствовать истеченію мочи посредствомъ катетера. Наконецъ, задержаніе мочи можетъ произойти отъ судорогъ (вслѣдствіе страданія головного и спинного мозга), и тутъ — при параличѣ пузыря — легко можетъ сдѣлаться полнымъ; въ крайнемъ случаѣ и здѣсь надо прибѣгнуть къ катетеру. — Главное средство противъ задержанія мочи съ воспалительными и судорожными симптомами — **Camphora. 2.** (наярасный позывъ; жженіе; истеченіе мочи тонкою струей; моча красна, мутна, съ затхлымъ запахомъ; желто-зеленая; съ густымъ осадкомъ). Затѣмъ слѣдуютъ **Bellad.** (періодическія боли) и **Digit. 2.** (при стягивающей боли въ мочевомъ пузырьѣ, давящемъ жженіи въ мочевомъ каналѣ). При чисто нервныхъ явленіяхъ полезны: **Hyosc. 2.**, **Nux vom. 3.** и особенно **Opium. 2.** Если задерживается отдѣленіе изъ почекъ, дать **Helleb.**, а въ болѣе серьезныхъ случаяхъ, при жженіи во время мочеиспусканія, при ночномъ позывѣ съ не-

выносимой тоской, при всеобщемъ лихорадочномъ (нервномъ) состояніи, которое указываетъ на опасность отравленія крови отъ перехода въ нее мочи, полезно **Arsenicum**.

У дѣтей часто бываетъ внезапное задержаніе мочи, заставляющее ихъ отъ боли кричать и не дающее имъ спать. Пузырь въ этомъ случаѣ надутъ; боли прекращаются, лишь только ребенокъ испуститъ мочу. Если болѣзнь эта произошла отъ простуды, если она сопряжена съ лихорадкою, катарромъ и прорѣзываніемъ зубовъ, и если припадки ея являются преимущественно по ночамъ, то помогаетъ **Acon. 2.**; если припадки отличаются болѣе нервнымъ характеромъ, то помогаетъ **Cham. 2.**; противъ хроническаго страданія дается **Camph. 3.**; если болѣзнь затягивается, причѣмъ сильный позывъ и отдѣленіе слизистой мочи — **Puls. 3.** Втираніе теплаго прованскаго масла и тепло-влажныя припарки изъ льняной муки на страну мочеваго пузыря даютъ немедленное облегченіе.

Примѣчаніе. Послѣдствія задержанія мочи бываютъ очень опасны: моча переходитъ въ кровь и отравляетъ ее (аммоніемія); вслѣдствіе этого начинаются самыя разнообразныя явленія: разстройство пищеваренія, въ особенности отсутствіе аппетита, тошнота, рвота, затѣмъ нервное разстройство тифознаго характера, слабоуміе, бредъ, сонливость, конвульси; наконецъ наступаетъ смерть. (Такъ называемая урэмія, т. е. кровавая моча.) Поэтому необходимо во время, посредствомъ катетера, дать мочѣ возможность выдѣлиться, даже и въ тѣхъ случаяхъ, когда по видимому выдѣляется достаточно мочи, но оказывается, что она все-таки задерживается, что легко узнать по тугости пузыря. Если принять во вниманіе количество выдѣляющейся мочи и тѣ изъ только что описанныхъ симптомовъ, которые имѣются при этомъ (въ особенности отвращеніе къ ѣдѣ), то можно посредствомъ своевременнаго, правильнаго, искусственнаго испусканія мочи сохранить жизнь еще на долгое время и предохранить больнаго отъ неминуемой, въ противномъ случаѣ, гибели.

106. Недержаніе мочи, *incontinentia urinae* или *enuresis*; невольное испусканіе мочи ночью; параличъ мочеваго пузыря, *paralysis vesicae*.

Этотъ временный или постоянный недугъ (при которомъ моча выходитъ иногда каплями, иногда струею, независимо отъ во-

ли пациента) бываетъ большею частью судорожнаго характера и обуславливается стягиваніемъ, раздраженіемъ, рѣже приливомъ, воспаленіемъ шейки мочеваго пузыря. Иногда же онъ зависитъ отъ чрезвычайной остроты мочи или отъ простаго рефлекса нервной дѣятельности на мускулы мочеваго пузыря. — Дѣти мочатся ночью въ постели или вслѣдствіе судорожнаго раздраженія мочевыхъ органовъ, или потому, что при глубокомъ снѣ и слабо дѣйствующей волѣ ничего не сдерживаетъ естественнаго позыва на мочу. На это также могутъ имѣть вліяніе онализмъ, глисты, горячительныя пища и питье. Это явленіе, обнаруживающееся въ дѣтскомъ возрастѣ, исчезаетъ въ зрѣлыя годы, хотя и сохраняется иногда довольно долго.

Недержание мочи достигаетъ высшей степени при слабости или расслабленіи сжимательнаго мускула мочеваго пузыря, которое можетъ дойти до неполнаго и полнаго паралича, въ особенности когда есть страданіе спиннаго и головного мозга. Впрочемъ, тутъ могутъ быть и ограниченныя, мѣстныя параличныя явленія. Само собою разумѣется, что и органическіе недостатки, особенно тѣ, при которыхъ мочеваго пузыря подвергается давленію (напр. при опухоляхъ въ животѣ и тазѣ), могутъ обуславливать собою недержание мочи.

Самыми дѣйствительными средствами противъ этого недуга служатъ: **Arnica** и **Phosphor.**; при высшей степени недуга: **Arsen.**, **Caust.**, **Zinc.**; при соединеніи съ болѣзнями спиннаго мозга: **Nux vom.**, и **Rhus.**; при мѣстныхъ органическихъ причинахъ: **Petrol.**

Дѣтей, которыя мочатся въ постели, я, помимо діететическихъ предписаній, касающихся образа жизни (спать на довольно жесткихъ матрацахъ, не употреблять по вечерамъ возбуждающихъ напитковъ, въ особенности соленаго), съ успѣхомъ лѣчилъ слѣдующими средствами: **Puls. 2.** (утромъ и вечеромъ по 2 капли), или, если это средство не помогало: **Sulph. 3.**, которое я давалъ втеченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ; при болѣе сильной степени слабости: **Phosph. 3.**, а также **Kreos. 6.** Другіе восхваляютъ также **Bell.**, **Nux vom.**, **Arg. nitr.** Если причиною — глисты, то **Cina** (аскариды) и **Spigel.** (круглыя глисты). Въ послѣднее время весьма рекомендуютъ **Plantago maj. 1.** Необходимо заставлять дѣтей втеченіе

для задерживать подольше мочу, чтобы мочевою пузырь приучался къ противодѣйствию напору мочи.

Противъ недержанія мочи у дѣтей въ новѣйшее время стали давать *Eurat. pur.*, противъ недержанія мочи отъ слабости или паралича сжимающихъ мускуловъ — *Gelsen.*; даютъ также *Podophyllum*.

г. Органическіе болѣзни.

107. Органическіе болѣзни мочевыхъ органовъ.

Почки могутъ также подвергаться органическимъ болѣзнямъ, причѣмъ въ нихъ могутъ образоваться бугорки, ракъ, ожирѣніе, глисты; также гранулезное (зернистое) перерожденіе (такъ называемая Брайтова болѣзнь, образованіе бѣлковины въ почкахъ), нагноеніе, маразмъ (сухотка). Мочевою пузырь можетъ подвергнуться утолщенію, расширенію, суженію, опуханію, нагноенію. Мочевою каналъ часто суживается послѣ слизетеченій (трипперъ) и неправильнаго ихъ лѣченія. Наконецъ, въ мочевыхъ органахъ могутъ образоваться песокъ и камни, которыя, попадая въ почки и мочеточники, вызываютъ различныя болѣзненные явленія. — Распознаваніе этихъ обстоятельствъ требуетъ чрезвычайнаго искусства, обширной хирургической опытности, знанія химіи и умѣнія обращаться съ микроскопомъ, а лѣченіе еще труднѣе потому, что, съ одной стороны, органы эти почти недоступны, съ другой — припадки часто незлѣчимы. Болѣе всего можно ожидать отъ лѣкарствъ пользы при бѣлковинномъ вырожденіи почекъ, которое всего чаще бываетъ причиною водянки. Въ этомъ случаѣ полезны **Bryon.** и **Colch.**, а когда водянка уже развилась: **Dig.**, **Helleb.**, и **Arsen.** (См. отдѣлъ 13.) Поэтому мы ограничимся здѣсь замѣчаніемъ, что при органическихъ недугахъ этихъ частей главнымъ образомъ употребляютъ: *Arsen.*, *Calc.*, *Lycop.*, *Merc.*, *Sulph.*

При мочевыхъ камняхъ иногда помогаютъ: *Bell.*, *Cann.*, *Lycop.*, *Petrol.*, *Sassapar.*, *Sulph.*, *Uva ursi*. Что касается до дѣйствія *Calc.*, *Natr. mur.*, *Petrol.*, *Silic.*, *Sulph.*, а именно, препятствуютъ ли они образованію камней или даже излѣчиваютъ радикально болѣзнь, — то это еще остается нерѣшеннымъ. Карлсбадъ

и Виши оказываютъ въ этомъ случаѣ несомнѣнную помощь. *Petroleum.* рекомендуютъ также противъ послѣдствій сѣуженія мочевого канала.

Нѣчто совершенно своеобразное, темное, еще почти неизвѣстное гомеопатической школѣ представляетъ такъ называем. Аддисонова болѣзнь. При ней кожа получаетъ бронзовый цвѣтъ, придающій больному видъ мулата, мускулы ослабѣваютъ, являются признаки катарра желудка и кишекъ (рвота и т. д.), малокровіе, боль въ пахахъ и болѣзненное измѣненіе прибавочныхъ почекъ (хроническаго, туберкулезнаго, сырнаго характера). Последнему обстоятельству большинство придаетъ особенный вѣсъ. Но такъ какъ очень часто послѣ смерти (обыкновенное слѣдствіе этой болѣзни) обнаруживались органическія измѣненія симпатическаго нерва, то изъ этого можно заключить съ нѣкоторою достовѣрностью, что пораженіе прибавочныхъ почекъ есть явленіе второстепенное. Лѣчить эту болѣзнь весьма трудно.

Что касается до причинъ, то при простудѣ полезны: *Acon.*, *Bell.*, *Dulc.*, *Merc.*, *Nux vom.*, *Puls.*, *Sulph.*; послѣ чрезмернаго употребленія спиртныхъ напитковъ: *Arsen.*, *Nux vom.*, *Sulph.*; послѣ душевныхъ потрясеній, испуга и т. п.: *Acon.*, *Bellad.*, *Hyosc.*, *Opium.*

Во время беременности особенно рекомендуемъ: *Con.*, *Nux vom.*; при задержаніи мочи: *Puls.*; при сильномъ позывѣ: *Sulph.*

Такъ какъ моча служитъ весьма важнымъ симптомомъ для распознаванія болѣзней мочевыхъ органовъ и крови, то выборъ лѣкарствъ весьма облегчается, когда принять во вниманіе слѣдующія обстоятельства:

- 1) *Количество* выделяющейся мочи. Если выделяется много мочи: *Acon.*, *Ars.*, *Puls.*, *Rhus.*, *Seneg.*, *Sulph.*; если — мало мочи: *Arn.*, *Bell.*, *Cann.*, *Canth.*, *Dig.*, *Dulc.*, *Hyosc.*, *Merc.*, *Nux vom.*, *Opium.*, *Phosph.*

- 2) *Цвѣтъ* мочи. При блѣдной, водянистой, безцвѣтной мочѣ: *Arn., Coloc., Con., Phosph., Puls., Rhus.*
 при темной, красной, насыщенной, огненнаго цвѣта мочѣ: *Acon., Arn., Bell., Canth., Dig., Merc., Phosph., Sulph.*
 при темно-красной: *Calc., Petrol.*
 при темно-бурой, буро-красной: *Acon., Arn., Ars., Bell., Bryon., Calc., Kreos., Merc., Nitr. ac., Petrol., Phosph., Puls., Sulph.*
 при черноватой: *Colch., Lycop.*
 при желтой: *Arn., Bell., Canth., Hyose.*
- 3) *Температуру.* При горячей мочѣ: *Acon., Ars., Bell., Canth., Colch., Dig., Merc., Nitr. ac., Nux vom.*
- 4) *Запахъ.* При запахѣ кисломъ: *Calc. c., Nitr. ac., Petrol.,*
 при гнилломъ или зловонномъ: *Ars., Calc., Dulc., Merc., Nitr. ac., Petrol., Phosph., Puls., Sulph.*
- 5) *Составъ, примѣси и осадокъ.* Когда моча содержитъ кровь — см. выше; когда она содержитъ гной (въ видѣ осадка или примѣси): *Cann., Canth., Lycop., Merc.;*
 бѣлковину: *Ars., Bryon., Merc.* (см. выше);
 если моча волокниста, съ ключьями и осадкомъ: *Cann., Canth., Merc., Nitr. ac., Senega;*
 съ густымъ, похожимъ на желе, осадкомъ: *Coloc., Puls.;*
 съ пескомъ и камешками: *Calc., Lycop, Natr. mur., Petrol., Sil.;*
 слизистая моча: *Ars., Canth., Col., Con., Dulc., Merc., Nitr. ac., Nux vom., Senega, Sulph.;*
 мучнистый, известковой осадокъ: *Colc., Merc. sol., Natr. mur., Sulph.;*
 красноватый, розовый, похожій на кирпичъ осадокъ: *Acon., Bell., Canth., Dulc., Lyc., Natr. mur., Phosph., Puls., Silicea.*

Въ новѣйшее время противъ каменной болѣзни стали рекомендовать *Eurat. purp.*

Кровавая моча, см. кровотеченія.

6. (108—120.) Половые болѣзни.

а. (108—114.) Половые болѣзни не заразительныя.

108. Истощеніе спиннаго мозга вслѣдствіе половыхъ излишествъ, *tabes dorsualis*.

Названная болѣзнь не принадлежитъ собственно къ этому отдѣлу, но такъ какъ она бываетъ ближайшимъ слѣдствіемъ естественнаго и неестественнаго возбужденія половыхъ органовъ, то мы считаемъ себя въ правѣ сказать здѣсь о ней еще нѣсколько словъ (ср. выше статью 19.). А потому замѣтимъ, что половыя излишества, и особенно онанизмъ, бываютъ самыми частыми причинами этой болѣзни. Мѣстные симптомы пораженія спиннаго мозга состоятъ въ разнообразныхъ, болѣе или менѣе сильныхъ ощущеніяхъ, особенно въ нижней части позвоночнаго столба. Это бываетъ глухая, потягивающая боль, заставляющая пациента часто мѣнять свое положеніе и уменьшающаяся, или совершенно прекращающаяся, при горизонтальномъ положеніи. Сначала она появляется только вскорѣ послѣ изверженія сѣмени, потомъ же мало по малу становится постоянною. Хроническое страданіе спиннаго мозга бываетъ различныхъ видовъ. Оно главнѣйшимъ образомъ выражается *болѣзненно-усиленною раздражительностью спиннаго мозга*. При этомъ иногда возникаетъ и его *разслабленіе* (параличъ).

Отъ *истощенія* отличаютъ *сухотку спиннаго мозга*, которая состоитъ въ высыханіи нижней части его. Слѣдствіемъ этого бываютъ чрезвычайный упадокъ силъ и болѣзни органовъ чувствъ, особенно зрѣнія, причѣмъ страдаютъ и умственныя способности, особенно память.

Лѣченіе:

Agaricus — 3.

Боль и чувство разбитости въ поясницѣ, слабость и чувство безсилія въ спинѣ, какъ будто она парализована, а также и въ нижнихъ оконечностяхъ; вообще слабость и безсиліе въ

цѣломъ организмѣ служатъ характеристическимъ признакомъ для выбора этого средства.

Belladonna — 3.

При сильной боли въ поясницѣ, боли въ членахъ, подоб-

ной ревматической, при сонливости, одурѣніи, припадкахъ головокруженія.

China — 3.

Полезно при слабости, соединенной съ раздраженіемъ и чрезвычайной чувствительностью всей нервной системы; при чрезвычайно сильныхъ боляхъ въ поясницѣ, которыя усиливаются отъ малѣйшаго прикосновенія.

Nux vomica — 3.

Боль въ поясницѣ, особенно въ нижней части ея, наклон-

ность къ запорамъ, чувство утомленія и тяжесть въ ногахъ, внезапная потеря силъ, чувство онѣмѣнія, колебанія и неустойчивость нижнихъ оконечностей. Ночной сонъ прерывистъ, частыя поллюціи, чрезвычайная раздражительность, припадки головокруженія.

Stramonium — 3.

Весьма дѣйствительно при сильныхъ поясничныхъ боляхъ, и при чрезвычайной чувствительности отдѣльныхъ позвонковъ, а также при головокруженіи.

Примѣчаніе. Холодное омываніе спины посредствомъ губки и растираніе какъ спины, такъ и оконечностей фланелью, а также питательная пища, прекрасно способствуютъ внутреннему дѣченію. — См. примѣчаніе къ статьѣ 110.

109. Непроизвольное изліяніе сѣмени (поллюціи), *pollutiones.*

Нормальное изліяніе сѣмени совершается при совокупленіи, когда мужской дѣтородный членъ бываетъ напряженъ, сладострастное чувство доходитъ до высшей степени, и различные мускулы конвульсивнымъ движеніемъ съ силою извергаютъ сѣмя.

Изліяніе сѣмени можетъ также послѣдовать безъ участія полового возбужденія, невольно и при сильномъ напряженіи члена. Это именно бываетъ по ночамъ, среда сладострастныхъ грезъ, у особъ ведущихъ воздержную жизнь въ половомъ отношеніи, но любящихъ хорошо поѣсть, страдающихъ ипохондрією, ведущихъ сидячій образъ жизни. Этого рода изліянія сѣмени вовсе не составляютъ болѣзненнаго явленія, лишь бы только они не стали повторяться слишкомъ часто. Онанисты часто вызываютъ у себя подобныя изліянія сѣмени и тѣмъ чрезвычайно расслабляютъ се-

бя. Такому же разслабленію подвергаются половые органы и тѣхъ лицъ, которые предаются половымъ наслажденіямъ до излишества. Разслабленіе это доходить до того, что даже малѣйшей причины бываетъ достаточно, чтобы вызвать нѣкоторое напряженіе члена и изліяніе сѣмени. — Наконецъ, слабость половыхъ органовъ можетъ дойти до того, что уже не нужно бываетъ никакихъ вѣдшихъ раздраженій для того, чтобы членъ отдѣлялъ сѣмя (или даже просто слізъ), безъ напряженія и безъ сладострастнаго чувства, даже и днемъ. Оно выходитъ при испусканіи мочи и отъ жилаго во время испраженія.

Для лѣченія рекомендуемъ слѣдующія средства:

При сильной раздражительности половыхъ органовъ: **Nux vom.**

3. и **Phosph. ac. 2.** Последнее особенно тогда, когда поллюціи еще не очень часты. Страдающіе недугами нижней части живота и ипохондрією должны сначала испробовать *Nux*, а потомъ уже, когда оно не поможетъ, *Phosph. ac.*

При меньшей степени раздражительности, или когда она уменьшится, полезно **Selen. 6.** и **Secale cornutum. 2.**

Лѣченіе должно заключиться **Chin. 3.**

Само собою разумѣется, что при этомъ надо соблюдать приличную діету. Надо употреблять легко-варимую, питательную пищу, и избѣгать веществъ, имѣющихъ особенное вліяніе на образованіе сѣмени (яицъ, икры, сельдерея и т. п.). Особенно надо отвыкнуть отъ ужина. Далѣе, нужно спать не на перинѣ, а на жесткомъ матрацѣ; лежать не на спинѣ, а на боку; вставать рано. Полезно также употребленіе холодныхъ сидячихъ ваннъ и обливанія половыхъ частей холодною водою.

110. Мужское безсиліе,

impotentia.

Истощеніе спиннаго мозга и поллюціи могутъ повлечь за собою *мужское безсиліе*, т. е. потерю способности къ соитію. Въ этомъ случаѣ членъ утрачиваетъ способность напрягаться, сѣменные пузырьки разслабляются и самое сѣмя теряетъ свою оплодотворяющую силу. Впрочемъ, мужское безсиліе можетъ наступить и безъ предварительнаго истощенія (маразма) спиннаго мозга.

Кромѣ вышеупомянутыхъ средствъ, полезныхъ по своему вліянію на спинной мозгъ, т. е. *Nux vom.*, *Secale cor.*, рекомендуемъ: **Agnus castus 3.**, **Caladium seguin. 6.**, **Lycop. 6.**, **Selen. 6.**, а также **Cannabis 3.** и **Con. 3.**

Здѣсь также полезны растираніе кожи сухой или мокрой щеткой, холодныя омыванія и проч. — *Tinct. Canthar.*, которую часто употребляютъ противъ безсилія, опасна, потому что, чрезвычайно возбуждая мочевые органы, она можетъ произвести въ нихъ сильнѣйшее воспаленіе.

Примѣчаніе. При всѣхъ описанныхъ въ трехъ послѣднихъ статьяхъ (108, 109, 110.) недугахъ, лѣченіе должно быть продолжительно. Лѣкарства всего лучше давать два раза въ день, по приему утромъ и вечеромъ.

111. Болѣзни яичекъ (мошонки):

Воспаленіе, *orchitis*, органическія и нервныя болѣзни яичекъ.

1) Воспаленіе яичекъ сопряжено съ глухой или рѣзкой болью, усиливающеюся отъ висячаго положенія яичекъ, давленія, движенія, съ опуханіемъ и отвердѣніемъ этихъ органовъ. Имъ часто захватываются сѣменные канатики, брюшина и наружная кожа. Всего чаще воспаленіе это возникаетъ отъ гонорреи (трипперъ), а также отъ простуды, перехода воспаленія съ околоушныхъ желѣзъ на яички.

Послѣ толчка, помятія, паденія, употребляютъ внутрь и наружно **Arnica**, а если послѣ этого останется опухоль:

Con. 3.

При сильной лихорадкѣ: сначала приема два **Acon. 2.**

Если воспаленіе имѣетъ рожевидный характеръ, сопряжено съ опухолью наружныхъ покрововъ: **Bellad. 3.**

Превосходнымъ средствомъ противъ воспаленій всякаго рода, послѣ простуды, особенно послѣ гонорреи, съ затвердѣніемъ яичекъ, служитъ **Clematis. 2.**, когда яички жестки, чувствительны къ прикосновенію, красны, опухли; при этомъ въ нихъ ощущается боль, какъ будто они ущемлены, разбиты, потягиваніе въ сѣ-

мяншихъ канатикахъ, въ пахахъ, въ верхней части лядвен и т. д.

Противъ болѣе сильной формы, особенно послѣ гонорреи, когда яички сильно опухли и имъ угрожаетъ нагноеніе, а также противъ воспаления отъ скрывшагося воспаления оболочушныхъ желѣзъ, лучше всего помогаетъ **Merc. solub. 2.** или **Merc. bijod. 3.**, утромъ и вечеромъ по щепоткѣ.

При медлительныхъ формахъ, послѣ гонорреи — **Aurum 3.** Если при этомъ щемящія, давящія боли съ частымъ тупымъ колотьемъ, доходящимъ до сѣмяннаго канатика, особенно у золотушныхъ особъ, то надо давать, смотря по силѣ припадковъ, **Brom.** или **Jod. 3.**

- 2) Опухоли, затвердѣнія и перерожденія яичекъ (мясистая опухоль) часто бываютъ слѣдствіемъ сифилиса, гонорреи, плохо излѣченнаго воспаления. Здѣсь мнѣ оказало особенныя услуги **Brom. 3.** (другіе даютъ *Aurum*, *Graph.*), а когда причиною недуга золотуха, и можно опасаться перехода его въ бугорки или ракъ: **Baryt. carb.**, **Conium.**
- 3) Противъ водяной грыжи яичка, т. е. водянки внутренней его кожицы, можно испытать **Graph.**, **Jod.** или **Sulph.** Впрочемъ, по большей части нужна бываетъ хирургическая помощь.
- 4) Противъ уменьшенія въ объемѣ и высыханія (маразма) яичекъ: **Jod.**
- 5) Противъ лишаевъ на мошонкѣ: **Aurum.**, **Graph.**, **Nitr. ac.**, **Petrol.**
- 6) Нервные боли въ яичкахъ съ потягиваніемъ въ сѣмянныхъ канатикахъ и съ судорожнымъ стягиваніемъ мошонки всего лучше устраняются посредствомъ **Nux vom.** или **Zinc.**

Противъ воспаления въ новѣйшее время стали давать *Ham.*, *Veratr. vir.* — *Phyt.* помогаетъ противъ воспаления, а также противъ органическихъ болѣзней яичекъ.

112. Воспаленіе матки, *metritis.*

Эта болѣзнь, послѣ воспаленія брюшины, чаще всего бываетъ причиной родильной лихорадки, и когда ею поражена внутренняя оболочка матки, производитъ пленчатые, сукровичные и злокачественныя выдѣленія изъ влагалища. Бываютъ также случаи, когда она поражаетъ самое вещество матки или же ту часть брюшины, которою покрыта матка. Боль бываетъ острая или глухая, сильнѣе въ странѣ лобковой кости, легко переходитъ на мочевой пузырь, заднепроходную кишку и всю брюшину, усиливается отъ прикосновенія и движенія. Матка опухаетъ, въ ней появляется жаръ; влагалище бываетъ воспалено, сухо. Сверхъ того затрудняется испусканіе мочи и появляются: запоръ, рвота, боль въ грудяхъ, яшккахъ, поясницѣ, ногахъ, нервныя припадки разнаго рода, лихорадка. Чѣмъ медлительнѣе воспаленіе, тѣмъ надо быть осторожнѣе и тѣмъ скорѣе надо обратиться къ помощи врача. Чаще всего причиною этого недуга бываетъ простуда (особенно во время мѣсячныхъ очищеній), выкидышъ, чрезмѣрное употребленіе кровогонныхъ, горячительныхъ или вяжущихъ лѣкарствъ противъ бѣлей и кровотеченій изъ матки, горячительная пища, толчки, паденіе и наружныя поврежденія, половыя излишества.

Лѣченіе:

Aconitum — 2.

Въ началѣ, при *сильной лихорадкѣ*, *сильной мѣстной боли*. Послѣ простуды, испуга; съ приливомъ молока къ грудямъ; при родильной лихорадкѣ. (Не слѣдуетъ слишкомъ долго останавливаться на этомъ средствѣ, если не воспослѣдуетъ облегченіе, а перейти къ одному изъ слѣдующихъ.)

Belladonna — 2.

Преимущественно когда поражена часть *брюшины*, покрывающая матку; *жгучее колотье*, тяжесть, потягиваніе и давленіе въ нижней части живота съ чувствомъ, какъ будто внутреннія половыя части *вытираетъ* наружу; поясница какъ бы разбита; *колотье* не допускающее ни *движенія*, ни *давленія*. Съ *прим-*

вомъ крови къ мозгу. Наклонность къ нервнымъ разстройствамъ. Во время *родильнаго периода*, при прекращеніи родильнаго очищенія, вмѣсто котораго отдѣляется сукровичная, зловонная жидкость, съ жженіемъ во влагалищѣ, болью въ мочевомъ пузырьѣ.

Bryonia — 2.

Особенно полезно, когда *воспаленіе проходитъ*, но еще остаются *давящія боли*, вздутость живота, запоръ. Полезно также при *родильной лихорадкѣ*, когда сильное безпокойство указываетъ на *переходъ къ нервному разстройству*.

China — 2.

При *медлительномъ* характерѣ *воспаленія*, когда оно обнаруживается *болѣе слабостью*; послѣ значительной потери крови, или при гнойномъ, зловонномъ истеченіи, при угрожаю-

щемъ гнилостномъ разложеніи и при упадкѣ силъ.

Mercurius — 2.

При признакахъ, подобныхъ означеннымъ при *Bellad.*, но когда *воспаленіе идетъ глубже* (когда имъ поражено самое *вещество* матки); когда упорная боль *въ одномъ мѣстѣ*, колющая, давящая и особенно *сверлящая*, когда притомъ лихорадка, ознобъ или частый нисколько не облегчающій потъ. (Служить главнымъ средствомъ въ опасныхъ формахъ болѣзни, когда *Acop.* и *Bell.* не помогаютъ).

Rhus — 2.

При гнилостныхъ явленіяхъ, сильномъ истощеніи, упадкѣ силъ. (Когда угрожаетъ *антоновъ огонь*, когда продолжается лихорадка и обнаруживаются разложеніе и гненіе, то *Rhus* замѣняется *Arsen.*)

Противъ выпаденія матки изъ новѣйшихъ средствъ рекомендуютъ: *Aletr.*, *Cimic.*, *Collins.*, *Helon.*, **Podoph.**

Объ органическихъ недугахъ матки, каковы ракъ, туберкулы, воловнистые наросты, водянки, неправильное положеніе матки, мы не будемъ здѣсь говорить, такъ какъ лѣченіе ихъ не подлежитъ людямъ, не знающимъ медицины, и уже самая діагноза предполагаетъ специальныя свѣдѣнія.

113. Менструальныя болѣзни, *menstruationis anomaliae.*

Разстройство регуль проявляется въ слѣдующихъ формахъ:

- 1) Отсутствие регуль, *amenorrhoea*.
- 2) Неправильности относительно повторенія, а именно: задержаніе — *retentio mensium*, или подавленіе — *suppressio mensium*; слишкомъ рѣдкія регулы — *menstruatio rara*, слишкомъ частыя — *m. frequens*.
- 3) Неправильности относительно количества и продолжительности, а именно: слишкомъ короткія регулы — *m. brevis*, слишкомъ продолжительныя — *m. longa*, слишкомъ незначительныя — *m. parca*, слишкомъ обильныя — *m. nimia, menorrhagia*.
- 4) Неправильности относительно качества, т. е. выдѣляемое вещество или слишкомъ водянисто, или слишкомъ темно.
- 5) Неправильности относительно явленій, сопровождающихъ регулы: затрудненіе и боль при отдѣленіи, *dysmenorrhoea*.

Поводы къ этимъ болѣзнямъ бываютъ или внѣшніе (простуда, невоздержность въ пищѣ, душевныя потрясенія, разгоряченіе и т. п.), или внутреннія (слабое сложеніе, худосочіе, малокровіе, приливъ крови, измѣненія въ тканяхъ, нервныя страданія).

1) Регулы могутъ отсутствовать при слѣдующихъ нормальныхъ обстоятельствахъ: а) когда они безъ болѣзненныхъ явленій наступаютъ у дѣвушекъ позднѣе обыкновеннаго, или б) въ старости; в) когда задерживаются вслѣдствіе болѣзней; г) когда они останавливаются внѣшними причинами. При а и б естественно нечего прибѣгать къ лѣченію. При в, если нѣтъ мѣстныхъ органическихъ недостатковъ, задерживающихъ выходъ регуль (почему необходимо акушерское изслѣдованіе), самыми обыкновенными причинами бываютъ: малокровіе, сгущеніе крови, полнокровіе нижней части живота. Чаще всего остановка регуль бываетъ слѣдствіемъ душевныхъ потрясеній (испуга, радости, гнѣва), простуды, вяжущей пищи (мороженаго, уксуса и другихъ кислотъ), кровоусканій, чрезмѣрнаго употребленія лѣкарствъ (осо-

бенно рвотныхъ и слабительныхъ) или, наконецъ, — слѣдствіемъ начинающихся серіозныхъ болѣзней. Эта остановка регулъ становится еще опаснѣе, когда застигаетъ регулы въ полномъ ихъ развитіи. Если регулы прекращаются во время хроническихъ болѣзней, какъ напр. при бугорчатой чахоткѣ, то это не что иное какъ экономія природы, и это обстоятельство не требуетъ лѣченія, хотя и служитъ дурнымъ признакомъ. Наконецъ, не надо забывать, что остановка регулъ бываетъ однимъ изъ слѣдствій беременности, и не употреблять въ этомъ случаѣ лѣкарствъ.

Если причину отсутствія регулъ — малокровіе, то принимаютъ;

Calcareo carbonica — 3.

Золотушное сложеніе; приливъ крови къ головѣ, кажущееся полнокровіе, сверлящая головная боль съ чувствомъ клокотанія, одурѣніе; головокруженіе, гастрическіе припадки, колика, боль въ поясницѣ, одышка, бѣли, тяжесть въ членахъ.

China — 2.

При дѣвичьей немочи, дурномъ качествѣ крови, разслабленіи мускуловъ и матки, нервной слабости; притомъ блѣдность лица, раздраженіе нервовъ, давленіе въ головѣ, дурное пищевареніе, бессонница, истощеніе.

Pulsatilla — 2.

Главное средство при *задержаніи, остановкѣ, подавленіи* регулъ, съ бѣлями, которыя сопровождаются истеченіемъ небольшого количества жидкости или *водянистой* крови, замѣняющей иногда бѣли; дѣвичья немочь, *малокровіе*, слезливость, ознобъ, позывъ на низъ и къ мочѣ, похожій на потуги; кажется, что внутреннія половыя части выпираетъ наружу; тяжесть въ нижней части живота, какъ бы отъ камня; холодѣніе и опуханіе ногъ; отсутствіе аппетита, тошнота, кислая или слизистая рвота, поносъ, блѣдность лица. Головокруженіе, стрѣляющая зубная боль, мигрень, сердцебиеніе.

При сильной степени дѣвичьей немочи употребляется также **Ferrum** (сравни малокровіе и дѣвичью немочь).

Когда общее состояніе здоровья поправилось, и только въ маткѣ еще ощущается нѣкоторая боль, не поддающаяся выше-

приведеннымъ средствамъ, то можно прибѣгнуть къ средствамъ, прямо вызывающимъ регулы, каковы: **Sabina, Graphit, Sulphur**, въ низкихъ дѣленіяхъ (2—1).

Если же причину отсутствія регулъ — сгущеніе крови въ нижней части живота, то даютъ:

Nux vomica — 3.

Головная боль, *гастрическіе* симптомы, запоръ, позывъ на низъ и къ мочѣ, тошнота, давленіе въ желудкѣ, *боль въ поясницѣ*, потягивающая боль и чувство утомленія, распространяющееся до ляшекъ, холерическій темпераментъ.

Sepia — 2.

При медленномъ появленіи подавленнаго очищенія, которое замѣняется или сопровождается бѣлками; геморрой съ истерикой и *ипохондріей*, чувство разбитости, *мирень*, зубная боль. Ознобъ и жаръ попеременно. Чувство разбитости въ членахъ, давленіе и колика въ животѣ, запоръ, отсутствіе аппетита, *хро-*

нической катарръ желудка и наклонность къ ослизненію вообще.

Sulphur — 3.

При замедленіи или отсутствіи регулъ, съ болью, истеченіемъ блѣдной или очень густой, черной крови; причѣмъ: развитіе кислотъ въ желудкѣ, изжога, давленіе въ желудкѣ, *гастрическіе* припадки разнаго рода, колики и сильный позывъ къ мочѣ, запоръ или поносъ, слизистыя испражненія, *геморроидальныя шишки*, *боль въ поясницѣ*; чувство утомленія въ ногахъ, головная боль, одышка, сердцебіеніе; *сыти*, слабость нервовъ, холерическій или *меланхолическій* темпераментъ.

Что касается до послѣдствій, происходящихъ отъ прекращенія очищеній, то лѣченіе ихъ должно сообразоваться съ симптомами (весьма разнообразными); при судорогахъ полезны: *Cupr.*, *Ignatia, Veratr., Plat.* (обморокъ съ ознобомъ, эзальтація съ возбужденіемъ похоти); при приливѣ крови: *Bellad., Bryon.* и т. д. См. также соотвѣтственныя статьи.

2) Повтореніе мѣсячнаго очищенія можетъ быть или а) слишкомъ рѣдкое (напр. черезъ 6—8 недѣль), или б) слиш-

комъ частое (напр. черезъ каждыя 2 недѣли). Если въ первомъ случаѣ причиною малокровіе, то главнымъ средствомъ служить **Puls.**, а при дѣйствительномъ недостаткѣ крови — **Fer-rum.**; когда причиною сгущеніе крови — **Sepia, Sulphur** (сравни что сказано выше). Случаи слишкомъ частаго повторенія регуль могутъ также обуславливаться причинами, которыя приведены въ слѣдующемъ параграфѣ. Лѣчение слѣдовательно то же, что при слишкомъ сильномъ менструальномъ истеченіи.

3) Относительно количества мѣсячнаго истеченія надо различать слѣдующіе случаи: а) истеченіе бываетъ или слишкомъ кратковременно (напр. 1, 2 дня), или б) слишкомъ продолжительно (напр. свыше 8 дней); или, при обыкновенной продолжительности (которая очень различна у различныхъ лицъ) регуль, отдѣляется в) слишкомъ мало, или г) слишкомъ много крови. Причины слишкомъ скуднаго истеченія бываютъ тѣ же, которыми обуславливается и задержаніе регуль. Слишкомъ сильное мѣсячное очищеніе, которое можетъ достигнуть опасныхъ размѣровъ (маточное кровотеченіе), происходитъ или отъ мѣстныхъ недуговъ половыхъ частей (ранняя половая зрѣлость, чрезмѣрное раздраженіе, приливъ крови къ маткѣ, ослабленіе тканей, воспаленіе и болѣзненное перерожденіе ихъ), или отъ болѣе общихъ причинъ (полнокровіе нижней части живота, геморрой, завалы печени, отъ сидячаго образа жизни, слишкомъ теплыхъ ваннъ, употребленія жаровень (въ простонародѣ), — а также отъ малокровія, разжиженія крови, нервности). Если недугъ зависить отъ мѣстныхъ причинъ, которыя можетъ опредѣлить только специалистъ (напр. полипы, утолщеніе матки и т. д.), то надо дѣйствовать противъ этихъ причинъ. Противъ слишкомъ сильнаго истеченія отъ полнокровія нижней части живота помогаютъ **Nux vom.**, а еще лучше — **Sepia, Sulph.** (см. выше 1.); отъ малокровія: **Calc. carb.**, въ болѣе серьезныхъ случаяхъ: **Ferr.** (при дѣвичьей немочи) и **China.** (истощеніе, нервная слабость). При нервной раздражительности, дурномъ расположеніи духа, возбужденности половой системы и мѣстной слабости матки главнымъ средствомъ служитъ **Platina** (характеристику см. ниже при 4.).

Если кровотечение достигло крайнихъ размѣровъ, то надо выбрать изъ: **China, Crocus, Kreosot., Sabina, Secale, Sulph. ac.** и др. средствъ, которыхъ точное описаніе см. въ ст. „кровоотеченія.“ Лѣченію должно содѣйствовать: кислымъ питьемъ (лимонадомъ и т. п.), льдомъ (внутри и наружно), горизонтальнымъ положеніемъ, покоемъ, строгою діетою и, въ крайнемъ случаѣ, впрыскиваемъ средствъ, останавливающихъ кровь. (Срв. выше кровотеченіе изъ матки, стр. 64 и слѣд.)

4) Качество выдѣляющейся крови большею частью зависитъ отъ вышеозначенныхъ обстоятельствъ и состоитъ въ связи съ остальными явленіями; такъ напр. при очищеніи скудномъ, продолжающемся слишкомъ короткое время, выдѣляющаяся кровь бываетъ водяниста. При частыхъ, сильныхъ, продолжительныхъ регулахъ она бываетъ черною. Если кровь водяниста отъ слабости сложенія, то слѣдуетъ дать **China**.

Ferrum полезно при дѣвичьей немочи, когда выдѣляется черная или свѣтлая, но весьма жидкая кровь, и притомъ головокруженіе, обморокъ, холодѣніе оконечностей, сильная краснота лица, полный и жесткій пульсъ; боли въ ляшкахъ, колика, похожая на потуги; кожа часто бываетъ вздутая, отекая; давленіе въ желудкѣ, запоръ; чрезвычайная всеобщая слабость.

Platina, напротивъ того, помогаетъ при слишкомъ сильныхъ или слишкомъ продолжительныхъ регулахъ, съ истеченіемъ черной, густой крови, у слабыхъ, истерическихъ особъ, когда притомъ тоска, плачь, уныніе, судороги разнаго рода, особенно колики съ сильнымъ позывомъ къ мочѣ, запоръ, давящая боль въ маткѣ; одышка, сердцебиеніе, бессоница. Если кровь черна, густа отъ полнокровія или геморроя, то полезно **Sulph.** — Когда кровь темна и гнилаго качества, притомъ поносъ, чрезвычайная слабость, а затѣмъ появляются бѣдкія бѣдкі: **Kreosot.**

Если кровь водяниста, слизиста и отдѣляется въ небольшомъ количествѣ, если регулы наступаютъ медленно и скоро прекращаются, то (особенно при малокровіи) оказываетъ рѣшительное дѣйствіе **Pulsat.**

При расположеніи къ ослизненію вообще, при полнокровіи нижней части живота, а также когда кровь почти безцвѣтна и похожа на бѣдкі: **Sepia**.

Если вмѣсто мѣсячнаго очищенія наступаютъ продолжительныя бѣли, то надо прибѣгнуть къ тѣмъ средствамъ, которыя указаны ниже въ статьѣ о бѣляхъ (слѣд. ст.).

Намъ остается рассмотреть

5) Болѣзненные явленія, сопровождающія регулы, каковы: мѣстные боли, колики, головная и поясничная боли, сердцебиеніе, рвота, обморокъ, даже помѣшательство. Причины и здѣсь бываютъ или мѣстные (неправильное положеніе матки, суженіе, засореніе канала, опухоли, перерожденія), или общія, а именно: полнокровіе нижней части живота, застой крови и склонность къ воспаленію слизистыхъ оболочекъ, или нервная раздражительность, слабость половыхъ частей,

Въ большей части случаевъ, когда причиною мѣстной боли бываетъ замедленное наступленіе очищенія, важнымъ средствомъ служитъ **Puls.**;

при давящихъ головныхъ боляхъ, кровотеченіи носомъ:
Bryon.;

при полнокровіи, съ приливомъ крови къ головѣ: сердцебиеніи, тоскѣ, коликахъ живота, сильномъ позывѣ къ мочѣ: **Bellad.**;

при потягиваніи въ сторону поясницы и лядвей, коликахъ, поносѣ, тошнотѣ, зѣваніи, обморокахъ, блѣдности лица, сильномъ безпокойствѣ и общей склонности организма къ судорогамъ: **Chamom.**;

при сильнѣйшихъ судорогахъ, особенно конвульсивнаго характера, при судорогахъ груди, при тошнотѣ, приливѣ крови къ головѣ: **Suprum**;

при разстройствѣ и боляхъ въ маткѣ, хронической истерикѣ, съ коликами и позывомъ къ мочѣ, слезливостью: **Plat.** (особенно когда кровь притомъ темнаго цвѣта);

при рѣзи въ животѣ, поносѣ съ тошнотою: **Ipec.**;

при геморроѣ, запорѣ, катаррѣ желудка, мигрени: **Sepia.**;

при истерическомъ обморокѣ съ ознобомъ, при стѣсненіи сердца и дыханія, при рвотѣ и поносѣ, возбу-

жденіи похоти, экзальтаціи, доходящей до помѣшательства: **Veratr.**

Мѣстныя причины требуютъ, конечно, особеннаго вниманія.

Новѣйшія средства употребляются при слѣдующихъ симптомахъ. 1) При отсутствіи или 2) прекращеніи регулъ: *Apos. c.* — у молодыхъ дѣвушекъ, со вздутостью живота, опуханіемъ ногъ; во время прекращенія регулъ въ старости; *Cimic.* — отсутствіе или прекращеніе регулъ вслѣдствіе простуды, съ ревматическою болью въ членахъ, лихорадкою, головной болью, судорогами матки; *Gels.* — при судорожномъ и конгестивномъ характерѣ; *Gossipium herbaceum* — при вялости матки; *Hamamelis* — когда вмѣсто регулъ является кровотеченіе носомъ или изъ желудка, съ запоромъ, расширеніемъ венъ на ногахъ; *Helon* — при слабости; *Polygonum punctatum* (весьма хвалятъ!); *Sanguin.* — при боли въ ляшкахъ и бедрѣ, слѣдующемъ затѣмъ пораженіи легкихъ; весьма хвалятъ также какъ средство противъ подавленія регулъ; — *Senecio*, прозванное женскимъ регуляторомъ, при подавленіи регулъ, съ раздражительностью, блуждающей болью въ спинѣ и плечахъ; *Xantoxyl.* (также весьма хвалятъ!)

3) При слишкомъ раннихъ регулахъ: *Aletr. farin.* (также при склонности къ выкидышу); *Cim.*

4) При слишкомъ сильныхъ регулахъ (*menorrhagia*): *Aletr. f.*, *Apos. a.* и *Apos. cann.*, *Baptis.* (?), *Cim.*, при темной крови, боли въ членахъ, боли въ спинѣ, простирающейся до ляшекъ и бедра, съ давленіемъ книзу, слезливостью, истерическими припадками — до судорогъ, болью въ глазахъ, головной болью; *Collins.* — при запорѣ и геморроѣ; *Eriger.* — при раздраженіи пузыря и прямой кишки; *Gels* — при почти не прекращающемся истеченіи крови, безъ боли (?); *Plyt.* — слишкомъ частыя и сильныя регулы, съ усиленнымъ отдѣленіемъ слюны, слезъ, желчи, мочи (?); *Senec.* (см. выше) — въ сильныхъ приѣмахъ, тинктурой, весьма полезно! *Trill.* — какъ *Sabina*.

5) Противъ регулъ, причиняющихъ боль: *Asclep.* (невралгическій, перемежающійся типъ, нѣчто въ родѣ потугъ, сильное давленіе книзу); *Cact. grandifl.* (страшная боль, заставляющая больную кричать, періодическая, большею частью по вечерамъ; мѣсячной крови немного; сдавливаніе около сердца какъ будто

железнымъ кольцомъ); *Caulloph.* (болѣзненное сокращеніе, раздражительность, приливъ къ маткѣ, незначительное истеченіе крови, истерическія судороги въ груди, кадыкѣ, мочевомъ пузырьѣ и прямой кишкѣ); *Cim.* и *Collins.*, какъ выше, при прекращеніи регуль (1); *Gelsem.* (судороги матки, невралгическій характеръ, иногда также симптомы конгестивнаго и воспалительнаго характера); *Ham.* (см. выше прекращеніе регуль; сильная боль въ бедрахъ, ляшкахъ, чувство полноты въ мозгу и кишкахъ, головная боль, сонливость, притупленіе чувствъ); *Helon.*, см. выше подавленіе регуль (1); *Phytol.* (при безплодіи); *Sanguin.* (боль въ затылкѣ и во лбу); *Senec.*, см. выше о подавленіи регуль; *Xanthox.* (весьма хваленое средство!)

Примѣчаніе. Для большей полноты необходимо еще слѣдить разныя статьи, каковы напр.: кровотеченія, полнокрое, дѣвичья немочь, истерика, судороги и т. п.

Самое *лѣченіе* надо начать еще до наступленія регуль, ибо лѣкарству необходимо время для проявленія дѣйствія. Я обыкновенно (особенно въ случаяхъ хроническихъ) заставляю принимать лѣкарства съ промежутками въ нѣсколько дней и только за 8—3 дня (смотря по обстоятельствамъ) до наступленія регуль даю лѣкарства чаще, напр. ежедневно по 1—2 раза. — Во время самыхъ регуль лѣкарства даются только въ крайнихъ случаяхъ, напр. когда кровотеченіе достигаетъ опасныхъ размѣровъ и т. п. Сила и повтореніе пріемовъ должны сообразоваться съ личными свойствами больныхъ и съ характеромъ болѣзни, смотря потому, острая ли она, или хроническая.

114. Бѣли,

leucorrhoea.

Подъ этою болѣзью разумѣютъ усиленное выдѣленіе жидкости изъ женскихъ дѣтородныхъ частей. Выдѣляющаяся жидкость кисла, если выходитъ изъ влагалища, и щелочна, если выходитъ изъ шейки матки; она бываетъ водяниста (во время беременности, при кровяныхъ наростахъ, полипахъ), слизиста (когда выдѣляется изъ влагалища или изъ матки); — въ послѣднемъ случаѣ она похожа на мыльную воду или стекловидна, гнойна (какъ при

трипперѣ, отъ заразы, или при сифилисѣ) и часто зловонна (не только при ракѣ, но и при болѣе продолжительномъ задержаніи жидкости).

Какъ ни проста, повидимому, эта болѣзненная форма, однако ея лѣчение очень трудно, такъ какъ мѣстопробываніе, причины, усложненія ея, а также основные недуги весьма разнообразны и устраняются съ трудомъ. Исходною точкою недуга бываютъ то матка, то влагалище, мочевоу каналъ или внѣшнія дѣтородныя части; бѣли бываютъ симптомомъ катарра, воспаленія, зараженія, нарыванія, порочнаго образованія частей, даже нервнаго раздраженія половыхъ органовъ. Бѣли нельзя считать болѣзнию, когда онѣ показываются не задолго до или послѣ мѣсячнаго очищенія, въ послѣродовой періодъ, при беременности. Но часто онѣ сопровождають половое раздраженіе, завалы нижней части живота, ожирѣніе желудка, малокровіе, дѣвичью немочь, золотуху, склонность къ катаррамъ, органическія болѣзни половыхъ частей (раны, дулленіе кожи, хроническое воспаленіе, нарывы на слизистой оболочкѣ, во влагалищѣ и маткѣ, полипы, изгибы матки, опухоли, ракъ, выпаденіе, пониженіе и др. измѣненія въ положеніи матки и влагалища); появляются бѣли также у совершенно здоровыхъ особъ отъ разслабляющей пици, излишней теплоты (отъ перинъ, платья, жаровень), долгаго сна, жирной и роскошной пици, танцевъ, онанизма, раздраженія воображенія, простуды, отъ глиствъ, въ особенности отъ аскаридовъ у дѣвочекъ.

Для лѣченія надо знать всѣ эти обстоятельства, а потому необходимо предварительное изслѣдованіе пораженныхъ частей опытнымъ лицомъ. Только послѣ такого изслѣдованія можно сдѣлать вѣрный выборъ лѣкарства (причемъ мы обращаемъ вниманіе на сомнительную пользу прижиганій, недавно вошедшихъ въ моду), при которомъ надо главнымъ образомъ сообразоваться съ основнымъ недугомъ. Во всякомъ случаѣ мы совѣтуемъ больной вооружиться терпѣніемъ, такъ какъ свойства болѣзни и носителя ея (слизистая оболочка) не всегда допускають скорое излѣченіе. Наиболѣе опасны сифилитическія бѣли, произошедшія отъ зараженія. Изъ множества предлагаемыхъ въ настоящемъ случаѣ средствъ практически дознана польза слѣдующихъ:

Alumina; истечение свѣтло-желтаго цвѣта, ѣдкое, слизистое, острое, изъязвляющее, жгучее, жидко-слизистое, бываетъ днемъ; исходитъ большею частью изъ матки.

Aurum muriaticum; бѣли свѣтло-желтаго цвѣта, по утрамъ вызываютъ зудъ; во влагалищѣ жжетъ, кусаетъ, необыкновенная чувствительность; выпаденіе и отвердѣніе матки, при хроническомъ воспаленіи и происходящемъ отсюда измѣненіи положенія матки.

Arsen.; истечение густое, желто-зеленое, острое, изъязвляющее. — Органическія пораженія, нарывы. Порча крови. Разслабленіе.

Calc. carb.; бѣлая, не ѣдкая слизь, съ зудомъ; жгучій зудъ; истечение порывистое, кроваво-водянистое; — лицо блѣдное, жаръ въ половыхъ частяхъ. — У золотушныхъ, больныхъ грудью, дѣвической немочью, катарромъ и органическими недугами. Передъ мѣсячнымъ очищеніемъ, которое или слишкомъ сильно, или показывается преждевременно. (Подобнымъ же образомъ дѣйствуетъ *Baryt. c.*)

Carbo an. и Carbo veg.; слизь *жгучая, ѣдкая*, густая, желтовато-бѣлая; зеленоватая; кровянистая. Нарывы, приливы крови, хроническія воспаленія, полнокровіе нижней части живота, пораженіе желудка и кишекъ, *дурное пищевареніе*.

China; истечение кровавое или кроваво-водянистое; при этомъ большею частью слабость; дурной составъ крови; судорожное сокращеніе и давленіе книзу, съ сильной болью.

Conium; при бѣляхъ изъ матки; судороги матки; по ночамъ боли, истерическіе припадки, при чрезмѣрной воздержности незамужнихъ особъ; опухоль и отвердѣніе желѣзъ; ракъ.

Ferrum; истечение ѣдкое, похожее на *воду съ молокомъ*. — Слабость, малокровіе, дѣвичья немочь.

Jod. (Kalium jodatatum); бѣли хроническія, *жидкія, ѣдкія*; подобно *Kreos.*, *Merc.* (особенно послѣ зараженія); выдѣляются изъ матки, при отвердѣніи маточнаго устья и увеличеніи матки.

Kreos.; истечение *млостное*, производящее пятна, какъ вода, въ которой мыто мясо, или желтое, желто-зеленое, *ѣдкое* и вызывающее зудъ. Выдѣляется, когда стоишь или идешь.

Разстройство регуль, нарывы, порча крови. (Подобно *Nitr. ac.*, *Sabina.*)

Lycop.; порывистое истечение, *желтоватаго, красноватаго* цвѣта; послѣ рѣжущей боли; при продолжительной сухости влагалища; — притомъ приливы къ нижней части живота и разстройство пищеваренія (рѣзь въ животѣ), ломота, геморрой, золотуха. Органическіе недуги половыхъ частей. Расположеніе къ *выкидышу*. (Подобнымъ же образомъ дѣйствуютъ **Graph.**, *Silic.*, *Thuja.*)

Mercur. sol.; истечение *тоиное*; *пѣкое*, блѣдно-желтое; сладковатаго запаха; *зеленоватое*, вызываетъ *по ночамъ жжение* и *зудъ* внутри и снаружи. Воспалительное состояніе половыхъ частей, опуханіе лимфатическихъ сосудовъ, *сифилисъ*. — Большею частью изъ влагалища. (Въ подобныхъ этому хроническихъ случаяхъ: **Nitr. ac.**)

Natr. mur.; истечение густое, содержитъ *много слизи*, бѣлое, прозрачное, разслабляющее; *пѣкое*; зеленоватое; выходитъ при ходьбѣ; съ зудомъ; — у страдающихъ дѣвичьей немочью, золотухою, недугами нижней части живота, пищеваренія, болязнями (опухоли) яичника или матки, разстройствомъ регуль. Желтизна лица, золотушный *видъ*, бесплодіе, боль въ маткѣ, нарывы, утолщеніе устья матки.

Puls.; истечение *молоковидное, безъ боли*, или *жидкое*, въ видѣ *пустой слизи*, подобной сливкамъ; выдѣляется преимущественно при лежаніи. Опуханіе половыхъ частей, разстройство регуль, дѣвичья немочь, печальное настроеніе. — Выходитъ большею частью изъ влагалища и имѣетъ характеръ катарральный. Въ болѣе легкихъ случаяхъ. При запоздавшихъ регулахъ.

Sepia; истечение обильное, густое, желтоватое, бываетъ только днемъ; истечение желтой воды изъ влагалища; истечение желто-зеленое; зеленовато-красноватое; молочнаго цвѣта; при полнокровіи нижней части живота, геморроѣ. Большею частью изъ влагалища и особенно катаррального свойства. (Послѣднее относится также къ *Stannum.*) Въ годы прекращенія регуль. Слабья регулы; сильная боль въ членахъ.

Sulph.; истечение разъѣдаетъ; подобно *разсолу*; желто-зеленое, похоее на *носовую слизь*; хроническое, особенно въ соединеніи съ недугами нижней части живота, геморроемъ, ломотой, дурнымъ составомъ крови. При этомъ сильный зудъ во влагалищѣ.

Кромѣ того, обращаю вниманіе на **Hep. sulph.** (въ хроническихъ случаяхъ, подобно *Mercur. въ острыхъ*), *Thuja* (если при томъ кондиомы), *Mezereum*, *Phosphor.*, а если затруднено мочеиспусканіе, то *Cann.* и *Canth.* Противъ бѣлей, выдѣляющихся вмѣстѣ съ мочою, даютъ **Silic.**

Новѣйшихъ средствъ такъ же много, какъ и старыхъ, но всѣ они еще требуютъ просмотра и болѣе точнаго опредѣленія. При выборѣ слѣдуетъ имѣть въ виду главн. образомъ слѣдующія: *Aesc. hippoc.* (боль въ ляшкахъ, запоръ, геморрой), *Aletr. far.* (слабость, потеря соковъ, послѣ продолжительныхъ болѣзней, и отъ недостаточнаго питанія), *Apos. andr.*; *Aral. racem.* (народное средство, при зловонномъ истеченіи и давленіи книзу), *Baptis.* (зловонное истеченіе, нарывъ во влагалищѣ и маткѣ, общая слабость), *Cauloph.* (слизистыя бѣли); *Cimic.* (при всѣхъ видахъ для наружнаго и внутренняго употребленія); *Collins.* (зудъ, запоръ, боли при регулахъ); *Gels.* (истечение бѣлаго цвѣта, боль въ поясницѣ); *Hamam.* (при слабости и истеченіи съ кровью); *Helon.* (слабость, малокровіе); *Hydrast.* (нарывы и язвы въ шейкѣ матки и во влагалищѣ); *Phyt.* (органическія причины); *Podoph.* (густая, прозрачная слизь, выпаденіе прямой кишки и матки, запоръ, давленіе книзу въ кишкахъ); *Sanguin.* (во время прекращенія регулъ въ старости); *Senec.* (противъ всѣхъ видовъ); *Trill.* (зловонныя бѣли, отъ слабости); *Xanthox.* (при отсутствіи мѣсячнаго очищенія).

Примѣчаніе. Если гдѣ слѣдуетъ держаться строгой діеты, то именно въ этой болѣзни; не слѣдуетъ употреблять кислаго, жирнаго, копченаго, соленаго; кожу должно держать въ теплѣ. Сидячія ванны, спрысцованія холодной водой, холодное обтираніе, способствуютъ лѣченію. Иногда требуются поясныя ванны въ 22° R — 16° R, затѣмъ холодное обтираніе, а лѣтомъ купаніе въ рѣкѣ. При острыхъ бѣляхъ прописываются, при извѣстныхъ обстоятельствахъ, также теплыя ванны. Сприсцованія помогаютъ своимъ мѣстнымъ дѣйствіемъ общему дѣйствію лѣкар-

ства. Для этого употребляют души особаго устройства съ жесткимъ ящикомъ и эластичной маточной трубой, которая восходящей струей смачиваетъ внутреннія части половыхъ органовъ. Спринцованія не должны быть холоднѣе 14° R. (20° — 14° R), такъ какъ при болѣе низкой температурѣ они легко причиняютъ затвердѣнія. Врачъ долженъ дать самыя точныя указанія относительно того, какъ спринцовать. Въ новѣйшее время стали при помощи особенныхъ инструментовъ вдвигать подходящіе гомеоп. порошки для непосредственнаго ихъ дѣйствія на органы. Этотъ способъ лѣченія давалъ хорошіе результаты.

в. (115—119.) Половые болѣзни вслѣдствіе зараженія.

О сифилитическомъ зараженіи вообще и о предохраненіи себя отъ него.

Мы знаемъ послѣдствія противоестественныхъ и чрезмѣрныхъ половыхъ наслажденій. Но есть еще формы половыхъ болѣзней, которыя могутъ быть получены чрезъ зараженіе при обыкновенномъ совокупленіи. Остерегаться такого зараженія есть дѣло высшей важности, потому что оно отравляетъ здоровье не только одного индивидуума, но и всего его потомства. Сифилитическое зараженіе передается въ большей части случаевъ чрезъ совокупленіе, рѣдко чрезъ поцѣлуй, чрезъ куреніе чужихъ трубокъ, посѣщеніе публичныхъ отхожихъ мѣстъ и т. п. Для предохраненія себя отъ сифилитическаго зараженія (лучшее средство остается и теперь одно: избѣгать общенія съ подозрительными женщинами) до сихъ поръ придумано два способа: или дѣлать зараженіе невозможнымъ или, когда оно уже произошло, сдѣлать его безвреднымъ. Для достиженія первой цѣли придуманы такъ называемые кондоны, которые однако вовсе не предохраняютъ, а для второй — обмываніе и очищеніе половыхъ частей послѣ совокупленія. Простая вода для этого недостаточна; всего лучше употреблять воду известковую или растворъ уксуснокислаго цинка въ водѣ. Но еще лучше (хотя и нельзя сказать: навѣрное) дѣйствуютъ растворы йодкаго кали или сулемы. При этомъ не слѣдуетъ терять времени: нужно тотчасъ-же послѣ совокупленія приняться за обмываніе.

Скажемъ о различныхъ формахъ, которыя принимаетъ сифились и о лѣченіи ихъ. Сифились бываетъ разнаго рода: 1) первичный, когда поражены половые органы и ближайшія сосѣднія съ ними части, — 2) вторичный, когда сифились показывается въ горлѣ, на кожѣ и поражаетъ кости. Мы опишемъ главнѣйшія изъ этихъ формъ и ихъ лѣченіе, насколько это необходимо для людей, не посвященныхъ въ медицину.

Прежде всего мы предлагаемъ посовѣтоваться съ *опытнымъ* врачомъ, особенно при опасныхъ формахъ сифилитическаго зараженія. Дѣта и правильный образъ жизни тутъ важнѣе, нежели во всякой другой болѣзни. А потому необходимы:

1. Чрезвычайная равномерность температуры. Доказано, что сифились проявляется слабѣе на югѣ, нежели у насъ на сѣверѣ, а здѣсь легче излѣчивается лѣтомъ, нежели зимою. Для успѣха лѣченія надо содѣйствовать потѣнью, для чего необходима равномерная, довольно высокая температура (зимою надо теплѣе одѣваться) и тщательное охраненіе себя отъ простуды. Воздухъ въ комнатахъ долженъ быть не только теплъ, но и чистъ.

2. Надо быть осторожнымъ относительно количества и качества пищи. Чѣмъ менѣе будетъ ѣсть больной, тѣмъ менѣе дастъ онъ силы своей болѣзни. Только очень слабымъ больнымъ необходимо питаться получше. Надо строго избѣгать всего кислаго, спиртнаго (за исключеніемъ развѣ слабаго пива), кофе, крѣпкаго чая, приностей. Нежирное мясо въ небольшомъ количествѣ, мучные и жидкіе мясные супы, не пучація живота овощи, молоко, пшеничный хлѣбъ, — вотъ все, что можно дозволить въ этомъ случаѣ.

3. Не менѣе важны *спокойствіе* и *чрезвычайная опрятность*. Было бы всего лучше, если бы больной совсѣмъ отказался отъ ходьбы; по крайней мѣрѣ, онъ долженъ ходить медленно, не разгорячать себя; ѣзда въ экипажахъ и верхомъ должна быть совершенно оставлена. Больныя мѣста надо обмывать губкой, смоченной теплымъ молокомъ или водою. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ полезны спринцованія изъ теплаго молока. На нарывы (язвинки) надо класть тряпочки или корню, смоченныя теплой водою и мѣнять ихъ по нѣскольку разъ въ день.

115. Гоноррея (перелой, трипперъ), *gonorrhoea*, *blennorrhoea urethrae virilis*.

(Припуханіе паховыхъ желѣзъ и воспалительная опухоль крайней плоти.)

Простѣйшею формою сифилитическаго зараженія бываетъ *гоноррея*, состоящая въ катаррально-воспалительномъ раздраженіи слизистой оболочки мочевого канала. Она появляется обыкновенно на 3—7 день послѣ зараженія чрезъ совокупленіе и начинается зудомъ въ отверстіи мочевого канала, сильнѣйшимъ позывомъ къ мочѣ и частыми ночными эрекціями. Черезъ 3—4 дня зудъ смѣняется болью по всей длинѣ мочевого канала и сильнымъ жженіемъ при испусканіи мочи. Отверстіе мочевого канала опухаетъ и краснѣетъ. вмѣстѣ съ тѣмъ начинается отдѣляться слизь, сначала полупрозрачная, похожая на яичный бѣлокъ, потомъ гнойная, желто-зеленая. Боль въ мочевомъ каналѣ усиливается, жжетъ, стрѣляетъ и простирается нерѣдко даже до паховой strany и мошонки. На 15 день боль обыкновенно уменьшается, эрекція являются рѣже, слизь становится гуще, выдѣляется въ меньшемъ количествѣ и, наконецъ, выдѣленіе ея совершенно прекращается. Иногда гоноррея принимаетъ въ высшей степени воспалительный характеръ; головка дѣтороднаго члена сильно краснѣетъ, опухаетъ, мочевой каналъ дѣлается необыкновенно чувствительнымъ, вмѣстѣ съ слизью выдѣляется кровь, испусканіе мочи затрудняется и соединено съ сильной болью, позывъ на мочу бываетъ порою невыносимъ. При этомъ иногда задержаніе мочи, судороги мочевого пузыря, воспалительное опуханіе всего члена, воспаление мошонки, припуханіе паховыхъ желѣзъ (бубоны), лихорадка, фимозисъ (незалуца) и парафимозисъ (удавка, т. е. крайняя плоть не можетъ болѣе закрывать головки).

Что касается до лѣченія, то при покоѣ и приличной діетѣ гоноррея уступаетъ нѣсколькимъ приемамъ *Tinct. Petroselini*. *Cannabis O* — главное средство, особенно въ первомъ періодѣ болѣзни (ежедневно 3—4 раза отъ 2 до 4 капель, въ водѣ). Если оно не поможетъ черезъ нѣсколько дней, и все еще остается жженіе

при испусканіи мочи, а также для прекращенія ночныхъ эрекцій — *Cantharis* ʒ., которое также надо давать въ частыхъ приѣмахъ (3 раза въ день по три капли).

Какъ промежуточное средство — *Acon.* ʒ., когда притомъ сильная лихорадка.

При опуханіи паховыхъ желѣзъ (бубоны) — *Mercur. sol.* ʒ.

При неудачномъ лѣченіи, а также у людей золотушныхъ, страдающихъ ломотою и т. п., простая гоноррея переходитъ въ *хроническую*. Тогда отдѣленіе слизи становится постояннымъ. Боль бываетъ значительно легче, и только при испусканіи мочи чувствуется легкое жженіе. Иногда испусканіе это затрудняется, и моча начинаетъ выходить каплями. Отъ малѣйшей невоздержности въ пищѣ или раздраженія члена истеченіе усиливается и можетъ тянуться цѣлые мѣсяцы и даже годы. При продолжительномъ существованіи гонорреи можетъ произойти суженіе мочевого канала, особенно внизу, близъ предстательной желѣзы.

При хронической гонорреѣ полезно **Sulph. 15.**, даѣе *Puls.* ʒ., *Thuja* и *Tussil. petas.* ʒ.; при затрудненномъ мочеиспусканіи: *Lycop.* При жгучей боли во время испусканія мочи: *Canth.* ʒ.

При острой и хронической гонорреяхъ полезно защищать мочовку посредствомъ суспензорія, безъ котораго она легко можетъ опухнуть.

Въ упорныхъ случаяхъ, въ особенности при вяломъ, хроническомъ трипперѣ, съ усилѣниемъ употребляются спринцованія изъ *Plumb. acet. O.* или *Zincum sulphuric. O.* Растворяютъ въ 4 унціяхъ воды 6 грановъ *Plumb. acet.* и прибавляютъ 20 капель *Opium O.* спринцуютъ, предварительно взболтнувъ жидкость, 3—4 раза въ день, удерживая эту жидкость каждый разъ въ каналѣ не менѣе 2—3 минутъ. Сильнѣе *Plumb. acet.* дѣйствуетъ *Zincum sulphur.*, а потому на 4 унціи воды и 20 капель опія берется лишь 4 грана этой соли. Въ то же время можно употреблять внутрь капли изъ 20 грановъ *Baryta mur.* на $\frac{1}{2}$ унціи воды; три раза въ день по 10 капель, въ водѣ. Самъ Ганеманнъ совѣтуетъ употреблять спринцованія при хроническомъ трипперѣ; но въ началѣ болѣзни они не только не приносятъ пользы, но даже вредятъ.

Гоноррея (перелой) головки члена. У мужчинъ, имѣющихъ очень длинную крайнюю плоть, послѣ зараженія, особенно если

они не слишкомъ опрятны, случается такъ называемая *гоноррея головки члена*. Впрочемъ, этотъ недугъ появляется иногда и безъ сифилитическаго зараженія, а именно у мужчинъ съ весьма раздражительной крайней плотью и страдающихъ геморроемъ, — вслѣдствіе тренія головки во время совокупленія о слишкомъ узкое влагалищѣ, далѣе вслѣдствіе совокупленія съ женщинами, которыя страдаютъ бѣлами, или у которыхъ уже наступили регулы. Точно также и онанизмъ можетъ служить причиною описываемой болѣзни. — При гонорреѣ этого рода головка опухаетъ, сильно краснѣетъ и покрывается гнойной слизью; на нѣкоторыхъ мѣстахъ выступаетъ сыпь, причиняющая сильную боль. При этомъ бываетъ невыносимый зудъ.

Для излѣченія этой гонорреи, произошедшей безъ зараженія, достаточно бываетъ нѣсколькихъ обмываній теплымъ молокомъ и накладыванія компрессовъ изъ смоченной также молокомъ корпии между крайнею плотью и головкѣй; эту корпию надо мѣнять 3—4 раза въ день. Если молоко не поможетъ, то его можно замѣнить известковой водой или слабымъ растворомъ сѣрноокислаго цинка. При сифилитическомъ зараженіи эти наружныя средства, за исключеніемъ молочныхъ обмываній и компрессовъ, не помогаютъ. Тутъ необходимы внутреннія средства, а именно:

Mercur. praec. rub. 2., по 2 грана (пріема 2 въ день, а потомъ три дня выждать), при сыпи только въ нѣкоторыхъ мѣстахъ головки и при выдѣленіи бѣлой слизи.

Cinnabaris 2., когда сыпь болѣе похожа на язвинки, покрываетъ большую часть головки и внутреннюю поверхность крайней плоти.

Thuja 2., когда выдѣляющаяся слизь гнойна, и пациентъ уже прежде употреблялъ много ртути.

Natr. mur. 6. и *Sulph.* 6., когда причиною недуга служитъ онанизмъ.

116. Шанкеръ,

ulcera syphilitica.

Эта форма сифилиса большею частью бываетъ опасна своими послѣдствіями. Шанкеръ бываетъ 3 видовъ:

а) *Простой шанкеръ*, появляющійся чаще всего на крайней плоти, на самомъ стволѣ или на мошонкѣ. Онъ начинается пузырькомъ, который наконецъ лопається, вслѣдствіе чего образуется овальная язва съ грязножелтымъ, жирнымъ дномъ. Боль при этомъ незначительна.

б) *Твердый, Гунтеровъ шанкеръ*. Развивается изъ перваго и чаще всего бываетъ на уздечкѣ. Нарывъ круглый, углубленный, грязнаго цвѣта, съ жирнымъ дномъ, съ жесткими краями. Послѣ его излѣченія остается иногда затвердѣлость, и поражается горло.

в) *Разъѣдающій шанкеръ*. Развивается большею частью изъ предъидущихъ формъ и отличается тѣмъ, что постоянно увеличивается въ объемѣ и разъѣдаетъ сосѣднія части.

Плоскость нарыва покрыта бѣло-сѣрой кожистой шелухой, которая отпадаетъ по частямъ. Иногда нарывъ бываетъ синеватаго цвѣта и покрывается корою, которая то сходитъ, то вновь образуется. Изъ нарыва отдѣляется гнойная, кровянистая, зловонная жидкость. Боль часто бываетъ чрезвычайно сильна и похожа на жжение и колотье.

Лѣченіе:

Mercur. sol. 2., при простомъ шанкерѣ, если больной не злоупотреблялъ ртутью прежде. Давать два раза въ день по 2 грана и, если не поможетъ черезъ 5—6 дней, то усилить дозы, т. е. давать перваго растиранія. Если же опять не поможетъ, — давать *Merc. praec. rub.* 2. (по 2—3 раза въ день), также въ сильныхъ дозахъ (по 2 грана). *Cinnab.* 2., при нарывахъ съ очень высокими, но мягкими краями.

Merc. praec. rub. 2. полезно также при Гунтеровомъ шанкерѣ (по три грана 2 раза въ день).

Hep. sulph. 3., а если не поможетъ — *Nitr. c.* 3., при твердомъ шанкерѣ, когда при этомъ показываются нарывы во рту и горлѣ.

Merc. jodat. 2., когда послѣ залѣченія шанкера остается затвердѣлость (три раза въ день по три грана, а вслѣдствіи порѣже).

Mercur. sublim. 2., при разъѣдающемъ шанкерѣ (по 1 грану 3 раза въ день), а если не поможетъ: *Merc. jodat.* 2.

Кромѣ того, надо накладывать на пораженные части компрессы изъ кории, обмокнутой въ теплой водѣ или, при разѣдающемъ шанкерѣ, въ слабомъ растворѣ сѣрноокислаго цинка. При двухъ первыхъ формахъ пища должна быть легкая, а при разѣдающемъ шанкерѣ, когда замѣчается въ больномъ большой упадокъ силъ — питательная, какъ-то: супы, немного жаркаго и даже винограднаго вина.

117. Бубоны,
bubones syphilitici.

Бубонами называютъ опухоли паховыхъ желѣзъ. Они опухаютъ обыкновенно на другую недѣлю послѣ появленія шанкера и обнаруживаются легкою болью въ желѣзахъ, которая доходитъ до ляшекъ и мѣшаетъ ходить. Опухоль постепенно увеличивается, и окружающая ее кожа сильно краснѣетъ. Бубонъ или разѣшается, или переходитъ въ нагноеніе. Кромѣ средствъ, означенныхъ при шанкерѣ, полезно *Carb. anim.* 3. — *Hepar. sulph.* 3. дается, когда бубонъ переходитъ въ нагноеніе, причемъ употребляются также теплые компрессы.

118. Фигообразныя шишки (кондиломы),
condilomata syphilitica.

Иногда сифилисъ проявляется въ формѣ такъ называемыхъ *фигообразныхъ шишекъ*, или кондиломовъ, т. е. въ видѣ мягкихъ отростковъ кожи, похожихъ на фиги; эти шишки выдѣляютъ особенную острую жидкость. Онѣ иногда сидятъ на кожѣ плоско, иногда же держатся на ней посредствомъ стебельковъ. Первый случай встрѣчается чаще. Большею частью онѣ образуются около задняго прохода, на промежности, лядвяхъ, дѣтородномъ членѣ, у женщинъ — при входѣ во влагалище. Онѣ обыкновенно бываютъ нечувствительны и только въ рѣдкихъ случаяхъ причиняютъ сильныя боли.

Главными средствами противъ нихъ служатъ: *Thuja* 2. (наружно 0.), при сидящихъ на плоскомъ основаніи шишкахъ, когда

притомъ гоноррея; *Nitri. ac.*, при шишкахъ со стебелькомъ. Если ни то, ни другое не поможетъ, — *Sabina*.

119. Вторичныя формы сифилиса (сифилитическое поражение кожи и костей), *syphilis secundaria*.

Фитообразныя шишки въ большей части случаевъ принадлежатъ ко вторичнымъ сифилитическимъ явленіямъ и указываютъ на отравленіе всего организма сифилитическимъ ядомъ. Кромѣ того, вторичный сифилисъ обнаруживается нарывами во рту и горлѣ, различными сынями, поражениемъ костей и особеннаго рода воспалениемъ глазъ. — Такъ какъ лѣченіе этихъ важныхъ болѣзней должно быть главнымъ образомъ предоставлено врачу, то я ограничусь здѣсь только самыми необходимыми замѣчаніями.

Сифилитическія сыти иногда бываютъ однимъ изъ первыхъ явленій вторичнаго сифилиса, а иногда появляются уже по прошествіи значительнаго промежутка времени. Онѣ очень разнообразны и принимаютъ видъ пятенъ, узелковъ, пузырей. Онѣ большею частью бываютъ мѣдно-краснаго цвѣта. Пятна чаще всего показываются въ горлѣ и на лицѣ (на лбу). Цвѣтъ ихъ подъ давленіемъ пальца на минуту пропадаетъ; состоятъ они изъ чешуекъ, похожихъ на отруби.

Узелки, также мѣдно-краснаго цвѣта, появляются, кромѣ лба, на плечахъ, спинѣ, животѣ и ногахъ, а заживши оставляютъ на кожѣ желто-фіолетовыя пятна, современемъ исчезающія.

Пузырчатая сыти состоятъ изъ большихъ пузырей, которые обыкновенно сидятъ въ одиночку и окружены буроватымъ вѣнчикомъ. Когда пузырь лопнетъ, на его мѣстѣ образуется толстая кора, подъ которой появляется болѣе плоскій нарывъ. Для лѣченія, кромѣ упомянутыхъ ртутныхъ препаратовъ, употребляется еще *Thuja, Nitri. ac., Hepar, Clematis, Staphis., Mezer.*

При вторичномъ сифилисѣ поражается слизистая оболочка миндалевидныхъ желѣзъ, глотки, нѣба, внутренней поверхности щекъ, губъ, языка и носа; на всѣхъ этихъ мѣстахъ появляется шанкеръ. Шанкеру въ горлѣ предшествуетъ иногда простая жаба. Пациенту трудно бываетъ глотать, онъ чувствуетъ жаръ и сухость въ горлѣ. Иногда къ этому присоединяется охриплость.

Горловой шанкеръ распространяется до самой полости носа и можетъ произвести какъ тамъ, такъ и въ костяхъ нѣба, страшныя опустошенія. Рубцы, которые остаются послѣ зажившихъ нарывовъ, причиняютъ большею частью потягивающія, невыносимыя боли, особенно при перемѣнахъ погоды.

Для различенія этихъ вторично-сифилитическихъ нарывовъ отъ подобныхъ имъ нарывовъ, происходящихъ вслѣдствіе злоупотребленія ртутью, служатъ слѣдующіе признаки: меркуріальные нарывы сидятъ обыкновенно на внутренней поверхности щекъ и на краяхъ языка; они быстро увеличиваются, имѣютъ молочно-бѣлое основаніе и не окружены краснымъ вѣнчикомъ. — При нихъ надо употреблять антидоты ртути, какъ-то: *Hepar sulph.*, *Nitri ac.* Вторично-сифилитическіе нарывы въ горлѣ лѣчатся сильными ртутными препаратами (**Merc. praes. g.**, **Merc. subl.** и **Merc. solub.**) въ довольно значительныхъ приѣмахъ. Вторичныя нагноенія сыпи лѣчатся посредствомъ: *Thuja*, *Mezer.*, *Iod.*, *Clematis*, *Sassaparilla*. (Послѣднее употребляется также въ видѣ декокта).

Пораженіе костей является позднѣе, по прошествіи мѣсяцевъ и даже годовъ послѣ первичнаго шанкера. Оно сначала даетъ себя знать потягивающими, сверлящими, похожими на ревматизмъ болями, которыя наступаютъ ночью въ постели и не даютъ больному покоя до утра, когда выступаетъ облегчающій потъ. Спустя болѣе или менѣе долгое время кости опухаютъ; на нихъ образуются частью жесткія, частью мягкія опухоли, и ихъ поражаетъ костоѣда. Всего чаще поражаемы бываютъ кости нѣба и носа. При ночныхъ сифилитическихъ боляхъ въ костяхъ употребляютъ: *Merc. sol.*, *Iod.* и *Kali jodat.*, *Mezer.*, *Mangan. acet.* При боли въ костяхъ отъ злоупотребленія ртутью: *Nitri ac.*, *Hep. sulph.*, *China*, *Sassap.*, *Arsen.* Противъ опуханія костей: *Silicea*, *Merc. sol.*, *Aur.*, *Iod.*, *Phosph. ac.* При костоѣдѣ: *Silic.*, *Aur.*, *Asa foet.* Противъ разрушенія носовыхъ костей костоѣдой специфическимъ средствомъ служить *Aurum mur.*

Ко вторичнымъ сифилитическимъ явленіямъ принадлежитъ также *сифилитическое воспаленіе глазъ*, которое большею частью бываетъ сопряжено съ сыпями. Оно имѣетъ весьма скоротечный ходъ и кончается обыкновенно совершенною потерей зрѣнія, если только болѣзнь не захватывается во время правильнымъ лѣчені-

емъ. Рекомендуютъ противъ этой болѣзни: *Acon.*, *Bell.*, *Cannab.*, *Merc. sol.* и *Nitri ac.*

в. Аномалія женской воспроизводительной сферы.

120. Женское безплодіе, *sterilitas.*

Безплодіе встрѣчается у женщинъ чаще, нежели у мужчинъ. Причины его могутъ быть *общія*, *мѣстныя* и *относительныя*.

Общими причинами бываютъ: болѣзни, невоздержная жизнь, слабость тѣлосложенія. Частными: болѣзни половыхъ органовъ и неправильности въ ихъ отправленияхъ (какъ-то задержка, ненормальности регуль и т. д.), несовершенное ихъ образование. Иногда причиною безплодія бываютъ сильныя бѣли. Относительными причинами мы называемъ тѣ, которыя возникаютъ изъ самыхъ условій безплоднаго брака. Таковы: антипатія между супругами, несообразность въ ихъ лѣтахъ, вкусахъ, темпераментахъ и т. д.

Что касается до природныхъ неправильностей въ организаціи, то они или бываютъ неизлѣчимы, или устраняются механически и хирургически; при различныхъ болѣзняхъ, бывающихъ причиною безплодія, мы рекомендуемъ слѣдующія средства: противъ хроническаго воспаленія яичника — **Cocculus** и **Ignat.**; противъ хроническихъ недуговъ матки — **Arsen.**, **Cocculus.**, **Nux vom.**, **Platina** и **Sepia**; противъ нимфоманіи: **Platin.**, **Sepia**, **Sulph.** Собственно противъ безплодія женщинъ рекомендуемъ: **Calc. carb.**, **Cannabis**, **Merc. viv.**, **Natr. mur.**, **Phosph.** и **Sulphur.**

ЧЕТВЕРТОЕ ОТДѢЛЕНІЕ.

БОЛѢЗНИ МУСКУЛЬНОЙ СИСТЕМЫ.

121. Болѣзни грудобрюшной преграды:

Воспаленіе, *diaphragmitis*; икота, *singultus*; параличъ, *paralysis diaphragmatis*.

1) Воспаленіе грудобрюшной преграды чаще всего переходитъ изъ плевры или изъ брюшины (при воспаленіи плевры, легкихъ, желудка, печени, селезенки и т. д.); оно вызывается ревматизмомъ, паденіемъ, ударомъ, пораненіемъ и обнаруживается преимущественно болью и стѣсненіемъ дыханія, чиханіемъ, кашлемъ, болью въ сторонѣ нижнихъ реберъ, надъ желудкомъ, или въ среднихъ спинныхъ позвонкахъ. Вслѣдствіе этого: короткое дыханіе, возможное только при прямомъ сидѣннн, чувство какъ будто грудь сдавлена обручами, икота, подергиваніе мускуловъ лица, симптомы воспаленія легкихъ, желудка (рвота), печени (желтуха).

Aconit., только въ началѣ, когда сильная лихорадка, затрудненное дыханіе, кашель, боль подъ ложечкой.

Bryonia., главное средство, особенно противъ опухоли. Когда притомъ воспалены сосѣдніе органы, особенно подреберная плева (плевра), печень.

Chamomilla, когда преобладають судорожныя явленія, подергиваніе, икота, рвота, безпокойство. — Послѣ простуды.

Colchicum, при ревматическихъ, болѣе хроническихъ формахъ. Послѣ простуды; давленіе, напрягающіи боли, періодически усиливающіяся.

Nux vomica, чувство давленія какъ бы тяжестью, сухой кашель; послѣ простуды.

Въ болѣе серьезныхъ случаяхъ болѣзни: **Mercur. sol.** или, при сильной тоскѣ, одышкѣ, упадкѣ силъ: **Ars.**

2) Икота, всхлипываніе. Это судорожное явленіе есть симптомъ другаго недуга (какъ напр. желудочнаго, истерическаго); оно устраняется, при стягивающей боли, судорогахъ желудка, послѣ простуды, посредствомъ **Coccul.**, а при истерикѣ — **Ignat.**

3) Параличъ грудобрюшной преграды трудно устранить. Онъ большею частью бываетъ слѣдствіемъ давленія сверху или снизу.

122. Воспаленіе поясничной мышцы,

psaitis.

Мы упоминаемъ объ этой болѣзни только потому, что пренебреженіе ею можетъ повлечь за собою опасныя послѣдствія. Ее можно смѣшать съ ревматизмомъ ляжки, сѣдалищной болью; но узнать ее можно потому, что она препятствуетъ свободному движенію верхней части лядвей и ходьбѣ, не даетъ положить больную ногу на здоровую и поэтому заставляетъ лежать такъ, что больная нога, сгибаясь, нѣсколько подается вверхъ. Недугъ этотъ сопровождается сильной болью и большею частью переходитъ въ нагноеніе и изнурительную лихорадку. Происходить онъ отъ простуды, болѣзней бедренной кости и внутренняго воспаленія таза.

Противъ этой болѣзни даютъ, смотря по обстоятельствамъ: **Acon., Bryon., Coloc., Merc., sol., Rhus, Sulph.** Противъ нагноенія: **Merc., Hep. sulph.**; противъ изнурительной лихорадки: **Arsen., China.**

Эта опасная по своимъ послѣдствіямъ и, въ болѣе сильной степени, часто неизлѣчимая болѣзнь должна подлежать лѣченію врача.

123. Прогрессивная атрофія мускуловъ,
atrophia muscularis progressiva.

Эта болѣзнь сопровождается ненормальнымъ образованіемъ жира, сухоткой мускульной системы и параличемъ, и представляетъ еще много загадочнаго. Нѣкоторые считаютъ ее болѣзнью мускуловъ со вторичнымъ пораженіемъ нервовъ, большинство же видитъ въ ней страданіе нервовъ, источникомъ котораго служатъ то периферическіе нервы, то передніе корешки спиннаго мозга, то самый спинной мозгъ, то симпатическій нервъ и его ганглии. При этомъ расходятся во мнѣніяхъ еще о томъ, есть ли это только динамическая или матеріальная болѣзнь нервовъ. Въ послѣднее время часто замѣчали ненормальное образованіе жира, размягченіе, сухотку и т. д., преимущественно симпатическаго нерва. Болѣзнь начинается обыкновенно съ нижней части руки (особенно правой), рѣже съ верхней части руки, съ плеча или лица, и распространяется затѣмъ постепенно, незамѣтно, безъ боли. Мускулы начинаютъ высыхать и ихъ двигательная функція постепенно и непрерывно уменьшается до паралича. Часто болѣзнь останавливается и ограничивается нѣсколькими отдѣльными частями впродолженіе годовъ. Но въ большинствѣ случаевъ она разростается, охватываетъ всѣ мускулы, даже мускулы, служащіе для глотанія и дыханія, и такимъ образомъ убиваетъ медленнымъ и мучительнымъ образомъ. Замѣчательно, что при этой болѣзни чувствительность мускуловъ и ихъ реакція противъ электричества сохраняется долѣе, нежели при другихъ видахъ паралича. Иногда помогали гимнастика и лѣченіе индуктивнымъ электричествомъ. Изъ гомеопатическихъ средствъ противъ этой болѣзни можно рекомендовать *Plumbum, Cuprum, Arsenic., Sulphur, Lachesis, Cauticum.*

О другихъ болѣзняхъ мускуловъ, какъ то о ревматизмѣ, параличѣ, см. соотвѣтственные статьи.

ПЯТОЕ ОТДѢЛЕНІЕ.

БОЛѢЗНИ КОЖИ.

НАКОЖНЫЯ СЫПИ.

А. ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЯ, ЛИХОРАДОЧНЫЯ СЫПИ.

Здѣсь надо обратить вниманіе главнымъ образомъ: 1) на ходъ болѣзни и 2) на видъ сыпи.

Что касается до хода, то различаютъ: а) стадію предвѣстниковъ и высыпанія, б) правильный ходъ развитія сыпи [постепенное усиленіе и ослабленіе], в) неправильный ходъ, когда бываетъ притомъ порча крови и нервная горячка, или когда сыпь переходитъ на внутренніе органы (мозгъ, легкія и т. д.), г) послѣдствія (послѣдующія болѣзни). При предвѣстникахъ и высыпаніи приходится большею частью лѣчить одну только лихорадку средствомъ: *Acet.*, *Bellad.* и т. д. При правильномъ ходѣ сыпи нѣтъ надобности въ лѣкарствахъ, если только не особенно сильны нѣкоторые симптомы, какъ напр. головная боль, катарръ желудка и др., которые въ такомъ случаѣ требуютъ соответственнаго имъ лѣченія. Нервная форма недуга излѣчивается средствами, упомянутыми при тифѣ; о переходѣ недуга на внутренніе органы, какъ напр. на мозгъ, легкія и т. д., см. при воспаленіи мозга, легкиихъ и т. д. Что касается до послѣдую-

щихъ болѣзней: водянки, опухоли желѣзъ, суставовъ и т. д., — см. также соотвѣтствующія статьи.

Различаютъ слѣдующіе виды сыпи:

а. (124 — 127.) Плоскія или пятнистыя сыпи.

124. Рожа, *erysipelas*.

Рожа обнаруживается краснотою кожи на болѣе или менѣе обширномъ пространствѣ. Эта краснота бываетъ однообразна, при нажиманіи пальцемъ пропадаетъ, но по отнятій его, появляется снова, начиная съ краевъ. Кожа напрягается, припухаетъ, разгорячается; въ ней чувствуется жгучая, напрягающая, рвущая боль. Рожа чаще всего появляется на лицѣ, на ногахъ и на половыхъ частяхъ, распространяется иногда дальше (на голову, слизистую оболочку носа, глазъ и ушей), нерѣдко быстро скрывается и тѣмъ обуславливаетъ опасныя внутренніе болѣзни, какъ напр. воспаленіе мозга и легкихъ. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ пораженная рожею кожа покрывается водяной опухолью или поднимается въ видѣ пузырей, откуда происходитъ и названіе пузырчатой рожи (наиболѣе опасная форма). Не такъ часто образуются настоящіе гнойные пузыри (пустулезная рожа). Рожа легко соединяется съ лихорадкой, желудочнымъ и кишечнымъ катаррами, желчными припадками, приливами крови къ головѣ. Рожа или разрѣшается (и тогда верхняя кожа начинаетъ дупиться), или переходитъ въ нагноеніе, антоновъ огонь, и легко оставляетъ послѣ себя утолщеніе кожи и клѣтчатки. У нѣкоторыхъ лицъ замѣчается склонность (которую трудно устранить) къ рецидивамъ этой болѣзни.

Причинами рожи бываютъ или внѣшнія вліянія на кожу (холодъ, жаръ, пораненіе, давленіе), или внутреннія, какъ напр. душевныя потрясенія (испугъ, чувство отвращенія, досада), неводержимость въ пищѣ, простуда. Нѣкоторыя яства, при необыкновенной воспримчивости (идіосинкрасія) отдѣльныхъ лицъ, также вызываютъ рожу (таковы: раки, рыба, земляника); кромѣ то-

го, нѣкоторые виды порчи крови (при тифѣ, отравленіи гноемъ, ранахъ) могутъ вызвать опасный видъ рожи.

При лѣченіи необходима прохладительная пища и строгая діета; надо избѣгать всего, что можетъ прервать сыпь, а потому нужно содержать больное мѣсто въ умѣренномъ теплѣ (накладывая на него полотняныя тряпочки, вату, мѣшечки съ отрубями, а при нагноеніи — тепловатые припарки изъ льняной муки), избѣгать холода, стягивающихъ и подсушающихъ пластырей и мазей. Аллопатическое рутинное лѣченіе рвотными и слабительными средствами нерѣдко оказывалось въ высшей степени вреднымъ.

Важнѣйшія средства суть: при гладкой рожѣ съ лихорадкою, приливомъ крови къ головѣ: **Bellad. 3.** (1—2 капли черезъ 2—3 часа); при пузырьчатой рожѣ: **Rhus. 3.** (такъ же); при гнойной рожѣ: **Merc. 3.** (черезъ 4 часа); при рожѣ, сопровождаемой антоновымъ огнемъ: **Arsen. 6.** (черезъ 3 часа). Въ послѣднее время стали хвалить *Apis. 3.* (также когда притомъ пораженъ мозгъ). Если притомъ катарръ желудка и желчные припадки, то послѣ *Bellad.* полезно *Bryon. 3.* Для устраненія склонности къ возвращенію болѣзни мнѣ случалось съ пользою давать **Graph.** или **Sulphur.** (въ рѣдкихъ приемахъ, черезъ кажд. 8 дней по 1 приему 3 растиранія). Въ этомъ случаѣ рекомендуютъ также *Camphora.*

Противъ рожи у новорожденныхъ, которая обыкновенно есть не что иное какъ воспаленіе жилъ, происходящее отъ отдѣленія пуповины и сообщающееся пупку и кожѣ живота въ формѣ рожи, употребляютъ *Arnica* въ тинктурѣ, смѣшивая ее половина на половину съ водою и накладывая въ видѣ компрессовъ; если это не поможетъ, то **Bellad.,** а при нагноеніи: **Merc. sol.**

Новѣйшія средства: *Euphorb. coroll., Gels* (пузырчатая рожа), *Hydr. can*

125. Скарлатина; скарлатинная лихорадка, *scarlatina.*

Эта большею частью эпидемическая и заразительная болѣзнь, соединенная съ лихорадкою и воспаленіемъ горла, обнаруживается или въ видѣ красной, малиновой, рожевидной, широко-распростра-

няющейся, гладкой воспалительной назоожной сыпи (гладкая скарлатина), или въ видѣ красныхъ, возвышенныхъ пузырьковъ или узелковъ, похожихъ на краспуху, на красноватой поверхности, или въ видѣ смѣшанной формы кори и скарлатины, когда господствуютъ обѣ эпидеміи; не такъ часто она сопровождается кровавыми пятнами, крапивной сыпью, пузырями. Она кончается дупленіемъ кожи.

Правильный ходъ скарлатины бываетъ слѣдующій:

Послѣ 3—4 дневнаго нездоровья, лихорадки, чувства утомленія, забытья, головной боли, кровотеченія изъ носу, затрудненія при глотаніи, рвоты, поноса, сильнаго позыва къ мочѣ, боли въ горлѣ, судорогъ и озноба, появляется сыпь, сначала на лицѣ, спинѣ, шеѣ и груди; потомъ она идетъ постепенно все дальше сверху внизъ, причемъ при появленіи ея усиливается (въ противоположность явленіямъ кори) лихорадка, припадки которой начинаютъ постепенно ослабѣвать только въ послѣдующіе дни. Иногда уже довольно рано показывается краснота въ видѣ мелкихъ точекъ на мягкомъ нѣбѣ. Гораздо рѣже скарлатина высыпаетъ внезапно, безъ предвѣстниковъ. Пятна, показывающіеся сначала на шеѣ и на верхней части груди, а затѣмъ на груди, на спинѣ и оконечностяхъ, большею частью сливаются, и рѣдко остаются между ними бѣлые промежутки, такъ что кожа становится похожею на мраморъ; при краснухѣ кожа между маленькими пупырышками бываетъ свѣтлѣе; краснота исчезаетъ отъ надавливанія пальцемъ, но затѣмъ появляется снова, начиная отъ периферіи по направленію къ центру; кожа при этомъ горяча, суха, натянута. Черезъ 3 дня жаръ, краснота и опуханіе уменьшаются, пятна блѣднѣютъ, желтѣютъ, возвышенія исчезаютъ. Одновременно съ наружнымъ воспаленіемъ бываетъ также воспалена слизистая оболочка въ особенности горла (поэтому трудно глотать) и рта, такъ что языкъ принимаетъ малиново-красный цвѣтъ. Ходъ этого послѣдняго воспаления или бываетъ одинаковъ съ ходомъ воспаления наружнаго, или медленнѣе. На шестой день послѣ высыпанія теченіе сыпи можно считать оконченнымъ. Черезъ 8 дней, иногда позднѣе, начинается дупиться кожа, т. е. верхняя кожица начинаетъ трескаться, принимаетъ грязный цвѣтъ и сходить мелкими чешуйками, похожими на отруби, пленочками, а затѣмъ клоч-

ками. Только через 6 недель можно съ увѣренностью считать оконченнымъ весь процессъ, такъ какъ кожа сходитъ нѣсколько разъ.

При такомъ ходѣ болѣзни, больной, при должной осторожности, можетъ совершенно спокойно обойтись безъ лѣкарствъ. Развѣ только для уменьшенія боли въ горлѣ и лихорадки можно дать ему **Bellad. 3.**, которое устраняетъ также приливы крови къ головѣ. Иные при настоящей скарлатинной сыпи предпочитаютъ *Acon.*

Но очень часто ходъ болѣзни уклоняется отъ нормы или усложняется, и тогда требуется другое лѣчение.

Воспаленіе горла часто достигаетъ опасной степени: появляются опуханіе, нагноеніе, антоновъ огонь. Тогда, если **Bellad.** (въ новѣйшее время вмѣсто *Bellad.* предлагаютъ **Apis. 3.**) не поможетъ, даютъ **Merc. sol. 3.** въ частыхъ приемахъ, а при замедленіи нагноенія: **Hep. sulph. 3.** Когда желѣзы жестки какъ камень: **Bar. carb. 3.**; при антоновомъ огнѣ: **Arsen. 6.** (Слѣди воспаленіе горла.)

Иногда воспаляется вся слизистая оболочка зѣва, причѣмъ, какъ при дифтеритѣ, начинаютъ отдѣляться пленки; отдѣленіе пленокъ распространяется также на полость рта, кадыкъ, пищеприемное горло, желудокъ. Здѣсь, въ началѣ, помогаетъ **Mur. acid. 2.**, а когда пораженъ мозгъ, пульсъ слабъ, и угрожаетъ антоновъ огонь — **Merc. cyanat. 6.** — Если крупозное воспаленіе простирается до глотки (кашель, хрипота, затрудненное дыханіе), тогда немедленно дать **Jod. 3.** (См. дифтеритъ).

При опуханіи подчелюстной или ушной желѣзы (вслѣдствіе чего легко происходитъ давленіе на мозгъ, такъ какъ отливу крови представляется препятствіе) полезно, въ легкихъ степеняхъ болѣзни, **Puls. 2.**; если воспалены желѣзы: **Bell. 3.**; если угрожаетъ нагноеніе: **Merc. sol. 3.**; если оно медленно наступаетъ: **Hepar. 3.**; если на долго остается затвердѣніе желѣзъ: **Silicea. 3.**

Вслучаѣ прилива крови въ мозгъ (вѣроятно, вслѣдствіе отравленія скарлатиннымъ ядомъ), надо быть очень осторожнымъ, такъ какъ въ этомъ случаѣ легко могутъ произойти воспаленіе, водянистое выпотѣніе въ мозгъ, судороги, параличъ мозга. При первомъ появленіи этихъ симптомовъ: **Bellad. 2.**; когда притомъ сонливость: **Opium. 3.**; если обнаруживаются симптомы давленія на

мозгъ (выпотѣніе): **Mercur. sol. 3.**, затѣмъ **Helleb. 2.**, въ болѣе опасныхъ случаяхъ: **Arsen. 5.**, а когда оно не поможетъ: **Sulph. 3.** (черезъ 4 часа); при судорогахъ: **Zinc. 2.** (3—2 часа), а при признакахъ паралича (безпамятство, неподвижность, невольныя испражнения): **Phosph. 2.** (Сравни, кромѣ того, воспаленіе мозга).

Воспаленіе плевры и околосердечной сумки встрѣчаются рѣже (см. эти статьи).

Гораздо чаще скарлатинный ядъ поражаетъ черезъ посредство крови нервы, приводя ихъ при этомъ въ возбужденное или безчувственное состояніе. Болѣзнь въ этомъ случаѣ принимаетъ видъ воспаленія въ мозгу или тифа. Это случается иногда передъ высыпаніемъ, иногда во время и послѣ него. При слабой степени простаго нервнаго возбужденія помогаетъ **Coffea. 2.** Въ случаѣ судорогъ, подергиванія: **Zinc. 2.** При внезапномъ исчезновеніи сыпи: **Ammon. carb. 2.**, а также **Camph. 2.** или **Phosph. 2.** При тифозныхъ явленіяхъ: **Arsen., Bryon., Muriat. ac., Phosph. ac., Rhus** (сличи тифъ). Если обнаруживается гнилостный характеръ соковъ (кровяныя пятна, кровотечения), лучшимъ средствомъ служить **Kreos. 5—3.**

Вслѣдствіе пораженія почекъ, воспаленія почекъ (острая Брайтова болѣзнь, бѣлковинное вырожденіе почекъ) выдѣляется иногда кровавая моча (сличи кровотечения), а еще чаще появляется въ періодъ лупленія кожи водянка, которая сначала показывается на щиколкахъ ногъ и въ лицѣ, а потомъ поражаетъ остальную кожу и наконецъ внутреннія полости (живота, груди). Здѣсь весьма помогаютъ: **Helleb. 3.**, а если черезъ нѣсколько дней не будетъ легче — **Arsen. 5—3.** Рѣже придется прибѣгать къ **Calc. carb.** (для золотушныхъ), **Lycop.** (особенно при брюшной водянкѣ), **Colch.** (оба при мутной, темной мочѣ), такъ какъ въ большинствѣ случаевъ достаточно бываетъ вышеприведенныхъ средствъ. При самой опасной формѣ, — грудной водянкѣ, слѣдуетъ лѣчить эту болѣзнь (срви. выше статью: водянка).

Иногда, во время эпидеміи, скарлатина появляется незамѣтно, безъ сыпи, въ видѣ своеобразной лихорадки и сильнаго воспаления горла. Впослѣдствіи лупленіе кожи обнаруживаетъ связь болѣзни съ скарлатиной. Тутъ надо быть особенно осторожнымъ.

Скарлатина можетъ имѣть слѣдующія послѣдствія: воспаленіе печени, опухоль миндалевидныхъ желѣзъ, нарывы въ носу, ушные болѣзни, водяной ракъ лица и половыхъ органовъ. Должно употреблять прохладительную пищу и держаться строжайшей діеты.

Надо опасаться излишней теплоты и кутанья, заботиться о чистотѣ и свѣжемъ воздухѣ (осторожно!), но въ то же время опасаться простуды, особенно въ періодъ лупленія; вставать съ постели можно не прежде какъ недѣли черезъ 3, а выходить на воздухъ — не прежде какъ черезъ 6. Теплыя ванны (пользоваться ими осторожно, не ранѣе какъ на 3-ей недѣли, а послѣ ванны сейчасъ же въ постель!) содѣйствуютъ лупленію. Втиранія растительнаго масла или разнаго рода жира, которыя нерѣдко были рекомендуемы для облегченія воспаления кожи, только грязнятъ её и мѣшаютъ испаринѣ. Гораздо лучше достигается тотъ же результатъ посредствомъ теплыхъ омовеній. Холодныхъ омовеній нельзя одобрить. Завертываніе въ выжатыя простыни, по методѣ Присница, а при пораженіи мозга и внезапномъ исчезновеніи сыпи, холодныя обливанія, укусныя омовенія и ванны, часто очень полезны, но должны быть производимы не иначе, какъ по совѣту и подъ наблюденіемъ врача.

Какъ предохранительное средство отъ скарлатины рекомендуютъ **Bellad.**, черезъ каждыя 3—4 дня по приему 3—5 разжиж. Если скарлатина появилась въ дому или въ сосѣдствѣ, то надо принимать это средство утромъ и вечеромъ.

Новѣйшія средства: *Ascl. syr.* (при головной боли), *Gels.* (состояніе слабости; по другимъ — раздраженіе, съ отравленіемъ мозга скарлатиннымъ ядомъ), *Ver. vir.* лучше *Aconit.* при раздраженіи артерій, а также противъ послѣдствій, когда сильна лихорадка.

Приемы въ этой опасной болѣзни не должны быть слишкомъ высокіе; 5—3 разжиженія суть самыя подходящія. Повторять приемы надо черезъ 3—4 часа, и только при крайней опасности (при судорогахъ, пораженіи мозга) черезъ 2—1 часъ.

126. Корь,

morbilli.

Послѣ катарральныхъ предвѣстниковъ (головная боль во лбу, кашель, насморкъ, воспаленіе вѣкъ съ катарральной лихорадкой, рѣже — ознобъ, бессонница, судороги и бредъ, рвота и поносъ), продолжающихся нѣсколько дней (3—14 дней), высыпаетъ сыпь кори. Она состоитъ изъ маленькихъ, напоминающихъ уголь блохи, круглыхъ, красноватыхъ пятнышекъ, никакъ не больше чечевичнаго зерна, съ маленькими узелками въ серединѣ, — имѣетъ большую часть эпидемическій и прилипчивый характеръ и высыпаетъ сначала на лицѣ, груди и шеѣ, а потомъ распространяется внизъ по всему тѣлу. Пятнышки являются группами, остающимися между собою пробѣлы; кожа бываетъ не такъ красна, какъ при скарлатинѣ; краснота пропадаетъ отъ давленія пальцемъ и потомъ появляется снова, начиная съ середины (при скарлатинѣ — начиная съ краевъ). При этомъ чиханіе, воспаленіе вѣкъ, боязнь свѣжаго воздуха, слезотеченіе, продолжительный, мучительный, сухой кашель, уменьшающійся по мѣрѣ развитія сыпи, крупъ, охрипость, бредъ. Сыпь держится на высшей точкѣ своего развитія втеченіе 3 дней, потомъ блѣднѣетъ, принимаетъ желтовато-красный, грязно-желтый цвѣтъ, исчезаетъ тѣмъ же порядкомъ, какимъ появлялась, при одновременномъ постепенномъ ослабленіи катарральныхъ явленій, лихорадки (причемъ является потъ), и въ большинствѣ случаевъ проходитъ на 6 день послѣ появленія. Лущеніе кожи продолжается иногда 8—12 дней; отлущившаяся кожа имѣетъ видъ отрубей или пыли, часто со-всѣмъ незамѣтной.

Корь весьма скоротечна, продолжается нерѣдко только два дня, но также легко скрывается и въ такомъ случаѣ оставляетъ послѣ себя опасныя болѣзни, какъ напр. опухоль желѣзь, болѣзни костей, жабу, воспаленіе груди, бугорки, одышку, болѣзни глазъ, истеченіе изъ ушей, водянку, судороги, параличъ и т. д.

Большинство этихъ послѣдствій можетъ быть также вызвано усложненіями кори, особенно когда она сопряжена съ воспаленіемъ бронхій, легкихъ, кадыка, плевры, съ дифтеритомъ, крова-

вымъ поносомъ, или, что бываетъ рѣже, когда она сопряжена съ воспаленіемъ почекъ и съ водянымъ ракомъ (нома).

Вообще говоря, этотъ родъ сыни имѣетъ характеръ доброкачественный и часто требуетъ только теплоты, діеты, которой держатся при лихорадкѣ, и, для того чтобы умѣрить лихорадку, нѣсколькихъ приемовъ **Acon. 2.**, а потомъ **Puls. 2.** Если притомъ пораженъ мозгъ, сильное воспаление глазъ, свѣтобоязнь, лихорадочный бредъ: **Bellad. 3.**

Если корь высыпаетъ при сильномъ нервномъ возбужденіи, которое затѣмъ еще остается въ видѣ нервнаго безпокойства, безсонницы, то помогаетъ **Coffea. 2.** Особеннаго вниманія заслуживаетъ поражение глазъ; когда слезотечение, острый насморкъ и свѣтобоязнь, то очень полезно **Euphras. 3;** при болѣе сильной степени воспаления — **Bellad. или Merc. sol. 3.** — Кашель можетъ тутъ легко перейти въ жабу; поэтому, если **Spong. 2.** не окажетъ скорой помощи противъ утомительнаго сухаго кашля, то слѣдуетъ дать **Jod. 3.;** а если при этомъ охриплость, то **Brom. 3.** Если кашель болѣе судорожный, сухой и усиливается ночью, дать **Nyosc. 3.** Если кашель сильно щекочетъ и долго продолжается, то **Phosphor. 2.** или **Op. 2.** При стѣсненіи въ груди, трудномъ дыханіи: **Ipec. 2.** При изверженіи красноватой слизи: **Puls. 2.** При катаррѣ желудка и кишокъ: **Bryon., Ipec.** или **Puls.,** смотря по обстоятельствамъ.

Корь можетъ повторяться. Кромѣ того, см. глазныя болѣзни, болѣзни мозга, кашель, гастрическіе недуги.

Особеннаго попеченія заслуживаютъ грудь (а потому надо безпрестанно изслѣдовать состояніе легкихъ и т. д.) и глаза, которыя надо тщательно защищать отъ свѣта. Надо также остерегаться слишкомъ ранняго оставленія постели и выхода на открытый воздухъ (не ранѣе 4-хъ недѣль).

Что касается до приемовъ, то тутъ надо руководиться тѣми же правилами, какъ и при скарлатинѣ.

127. Краснуха, *rubeolae.*

Ее трудно бываетъ отличить отъ кори. Она начинается, почти безъ предвѣстниковъ, горловой болью, насморкомъ и легкой

лихорадкой. Сыпь состоитъ изъ болѣе или менѣе крупныхъ угловатыхъ буро-красныхъ пятенъ (похожихъ цвѣтомъ на свеклу или кровавикъ [пятна кори — круглыя и розоватыя]), въ серединѣ которыхъ иногда находятся небольшіе пузырьки. Сыпь держится не болѣе 2-хъ сутокъ, потомъ блѣднѣетъ, послѣ чего изрѣдка начинается дупленіе кожи.

Такъ какъ ходъ болѣзни болѣею частью бываетъ доброкачественный, то достаточно содержать больнаго въ теплѣ. Только въ началѣ болѣзни можно дать **Aconitum.**, а противъ воспаления горла — **Belladonna.**

6. (128—130.) Пузырчатая и просовидная сыпи.

128. Поясная рожа,

zona или *zoster.*

Эта болѣзнь кожи, причиняющая весьма сильную боль и сопровождаемая сильнымъ жженіемъ и зудомъ, покрываетъ сыпью въ видѣ пояса одну половину тѣла, болѣею частью охватывая въ видѣ ленты пространство отъ спины до грудной кости. На рожевидно-воспаленной поверхности кожи образуются пузырьки, величиною съ горошину, собранные въ кучки и наполненные свѣтлою жидкостью. Эта послѣдняя на четвертый день становится мутна; пузырь лопається, засыхаетъ и оставляетъ струпу. Между тѣмъ показываются новые пузырьки, и это длится иногда недѣль двѣ. Боли могутъ послѣ этого продолжаться нѣсколько недѣль. Въ новѣйшее время эту болѣзнь стали считать страданіемъ нервовъ, а сыпь только послѣдствіемъ этого страданія.

Я нахожу, что здѣсь **Merc. sol.** дѣйствуетъ вѣрнѣе, нежели **Rhus.** Помогаетъ и **Arsenic.** Если сыпь часто возобновляется, полезно **Graphit.**

129. Собственно такъ называемая просовидная сыпь (красная, бѣлая), *miliaria.*

Эта сыпь появляется въ видѣ маленькихъ, полукруглыхъ пузырьковъ, величиною съ булавочную головку или просыаное зер-

но, то прозрачныхъ (кристалловидная просов. сынь), то молочнаго цвѣта (бѣлая просов. сынь), то съ красными краями (красная просов. сынь). Она высыпаетъ или послѣ чрезмѣрнаго пота (пото-
вая просов. сынь), или во время другихъ лихорадочныхъ болѣзней, особенно во время тифа, родильной лихорадки, остраго ревматизма суставовъ. Въ этомъ случаѣ она требуетъ особеннаго вниманія, потому что легко скрывается и поражаетъ внутренніе органы (сердце, легкія, мозгъ). Даже предшествующіе ей симптомы требуютъ иногда лѣченія, потому что могутъ быть болѣе или менѣе тягостны.

Если сыни предшествуютъ тоска, ознобъ, тошнота, обморокъ, то дать **Прес.**; *Valer.*, *Plat.* очень полезны при истерическихъ припадкахъ, конвульсіяхъ, судорожномъ смѣхѣ и плачѣ, а также въ послѣродовомъ періодѣ. *Rhus.* или *Arsen.*, смотря по обстоятельствамъ, при родильной лихорадкѣ и тифѣ; *Arsen.* и *Muriat. ac.* также при гнилостныхъ явленіяхъ и симптомахъ разложенія крови. — Просовидная сынь, произошедшая отъ излишней теплоты или неопытности и т. д., не требуетъ инаго лѣченія, кромѣ діеты.

130. Крапивная сынь,

urticaria.

Эта, большею частью доброкачественная сынь состоитъ изъ небольшихъ возвышеній кожи, расположенныхъ островками и полосами; внутри эти возвышенія содержатъ свѣтлую жидкость; снаружи они окружены краснымъ ободкомъ. Появляется эта сынь быстро, съ зудомъ, и скоро (большею частью черезъ день) пропадаетъ, или, при лихорадкѣ и легкомъ разстройствѣ пищеваренія, поддерживается отъ 7 до 9-ти дней, или, наконецъ, принимаетъ хроническій характеръ, то исчезая, то снова появляясь. Къ ней имѣютъ сильное расположеніе лица, отличающіяся чувствительностью, какъ напр. женщины и дѣти. У другихъ эта сынь вызывается извѣстною пищею, какъ напр. устрицами, раками, икрой, клубникой, грибами и т. п.

Противъ острой крапивной сыни рѣдко приходится принимать какіе-нибудь мѣры. Послѣ порчи желудка, отвращенія къ какой-нибудь пищѣ, помогаетъ *Puls.*, послѣ простуды — *Acon.*,

при лихорадкѣ — *Rhus.*, служащее въ этомъ случаѣ главнымъ средствомъ. Послѣ употребленія спиртныхъ напитковъ: *Nux vom.*; послѣ прикосновенія къ острымъ (ѣдкимъ) растеніямъ: *Bell.*, *Rhus tox.*, *Urtica.*; послѣ прикосновенія къ ядовитымъ животнымъ: *Arsen.* — Труднѣе лѣченіе хронической, часто возвращающейся крапивной сыпи. Въ этомъ случаѣ употребляются *Arsen.*, *Urtica.*, *Calc.*, *carb.*, *Copaiva*, *Sulph.*

в. (131—133.) Оспенная сыпь.

131. Настоящая оспа,

variola.

При правильномъ ходѣ оспы послѣ трехдневнаго нездоровья, съ ознобомъ, рвотою, головною болью, бредомъ, сонливостью, судорогами, обмороками, подергивающими болями въ членахъ, и особенно съ болью въ спинѣ и въ поясницѣ, появляется на четвертый день оспенная сыпь на покраснѣвшей, рожевидной кожѣ, сначала на лицѣ и головѣ, потомъ на груди и т. д., сперва въ видѣ точекъ, которыя потомъ переходятъ въ узелки и пустулы. — Такъ какъ при этомъ поражаются и внутреннія слизистыя оболочки, то къ главному недугу присоединяются: слезотеченіе, боль въ горлѣ, затрудненіе при глотаніи, опухоль языка, затрудненіе при испусканіи мочи. Лихорадка и высыпаніе продолжаются 3 дня. На шестой день отъ начала болѣзни развивается гнойная лихорадка, такъ какъ въ наполненныхъ жидкостью оспинахъ образуется гной, вслѣдствіе чего кожа пухнетъ еще сильнѣе, особенно на лицѣ. Въ срединѣ оспинъ замѣчается весьма характеристическое пупкообразное углубленіе. На 10-й день оспины принимаютъ мутный цвѣтъ, опухоль уменьшается, пустулы лопаются или подсыхаютъ, причемъ въ срединѣ ихъ образуется черная точка. Послѣ оспинъ остается заостренная корка струевей. Эти струи въ послѣдствіи спадаютъ и оставляютъ послѣ себя или бурокрасныя пятна, которыя съ теченіемъ времени блѣднѣютъ, или углубленія, называемыя рябинами. Прежде чѣмъ (черезъ потъ, осадокъ мочи, поносы) исчезнетъ лихорадка и сыпь, проходитъ нерѣдко шесть недель.

При неправильномъ ходѣ оспы легко появляется такъ называемая черная оспа: оспины сливаются въ нѣсколько выдающихся кровяныхъ узелковъ или пузырьковъ, между которыми образуются кровяныя пятна; вмѣстѣ съ этими пятнами, но иногда и безъ нихъ, обнаруживаются разложеніе крови, тифозные симптомы, кровотеченія, имѣющія послѣдствіемъ смерть или переходъ страданія на внутренніе органы, преимущественно на легкія, гортанную щель, мозгъ, такъ что надо быть въ высшей степени осторожнымъ, особенно при наступленіи гнойной лихорадки. Могутъ также появиться различныя послѣдующія болѣзни, какъ то: нервное разстройство, болѣзни глазъ, разложеніе крови, болѣзни желѣзъ и костей и т. п.

Для лѣченія надо соображаться съ слѣдующими указаніями:

До высыпанія: **Acon.**; при сильномъ нервномъ раздраженіи: **Coffea**; при приливѣ крови къ мозгу: **Bellad.** — Въ первой стадіи, при правильномъ ходѣ: **Acon.**; при недугахъ мозга: **Bellad.**; при болѣе высокой степени, съ холодной кожей и ознобомъ: **Camph.**; при нервныхъ припадкахъ: **Bryon., Rhus** (см. тифъ); при весьма воспаленныхъ и сильно гноящихся оспинахъ: **Merc. sol.**; при гнилостномъ состояніи, или такъ наз. черной оспѣ: **Mur. ac., Kreosot.**; при сильномъ катаррѣ: **Bryon., Merc. sol.**; когда притомъ стѣсненіе въ груди, слизистый хрипъ: **Tart. stib.** — Противъ слюнотеченія: **Merc. sol.**; противъ поноса: **China.**

Новѣйшія средства противъ оспы: *Cim., Hydrast.* (предохраняетъ отъ ябинъ?), *Iris, Sarracenia purp. (?)*, *Ver. vir.*

Примѣч. Лѣченіе прочихъ симптомовъ должно сообразоваться съ предписаніями для той формы болѣзни, къ которой они принадлежать.

Строгая діета. Легкая и прохладительная пища.

Въ послѣднее время стали рекомендовать для предохраненія отъ ябинъ смазываніе оспенныхъ волдырей *коллодіемъ*.

Для сокращенія и облегченія болѣзни рекомендуютъ упомянутое нѣсколько выше *Sarracenia purpurea*, но нѣкоторые утверждаютъ, что средство это бесполезно.

132. Вариолоиды (легкая форма настоящей оспы),
varioloides.

Такъ называютъ болѣе легкой и слабый видъ оспы. Болѣзнь эта встрѣчается у людей, которые уже прежде имѣли настоящую оспу, или которымъ привита оспа. Общія явленія болѣзни слабѣе, нежели при оспѣ настоящей; особенно важно то, что нѣтъ гнойной лихорадки. Впрочемъ, вариолоиды могутъ за собою повлечь столь же опасныя недуги, какъ и оспа, а потому надо быть во всякомъ случаѣ весьма осторожнымъ.

Если вообще лѣченіе необходимо, то въ большинствѣ случаевъ достаточно бываетъ **Acon.**, **Vergon.** и т. п.

133. Вѣтреная оспа,
varicellae.

Сыпь эта появляется почти безъ всякихъ предвѣстниковъ. Она сопровождается легкой лихорадкой (впрочемъ не всегда) и катарральными явленіями; высыпаетъ неправильно и неодновременно на спинѣ, рукахъ или ногахъ, рѣдко на лицѣ, и сначала имѣетъ видъ плоскихъ пятнышекъ. Пятнышки эти уже черезъ 24 или 48 часовъ обращаются въ пузырьки или пустулы, которые въ серединѣ не имѣютъ углубленій, уже на 3-ій день темнѣютъ и затѣмъ быстро подсыхаютъ. Иногда даже пузырьковъ этихъ вовсе не образуется (отсюда названіе вѣтреной оспы). Черезъ нѣсколько дней образуется тонкій листообразный струпу, который скоро отдѣляется, такъ что часто весь ходъ болѣзни совершается въ теченіе 8 дней. Рябинъ не бываетъ. Есть врачи, которые не причисляютъ этой сыпи къ видамъ оспы.

Здѣсь, какъ видитъ читатель, рѣдко бываетъ нужно лѣченіе; развѣ только противъ лихорадки можно дать **Aconitum**.

Б. ХРОНИЧЕСКІЯ, НЕЛИХОРАДОЧНЫЯ СЫПИ.

Хотя эти сыпи чаще всего бываютъ только слѣдствіемъ болѣе важныхъ болѣзней, какъ напр. золотухи, сифилиса и другихъ видовъ порчи крови, однако иногда онѣ имѣютъ до такой степе-

ни самостоятельный характеръ, что требуютъ особеннаго лѣченія. Для выбора лѣкарства надо принимать въ соображеніе многія обстоятельства: родъ боли, цвѣтъ, протяженіе, форму группировки сыпи, мѣста, гдѣ она обнаруживается и особенно ея наружный видъ (напр. узелки, пузыри, пустулы); въ большей части случаевъ всѣ эти обстоятельства состоятъ въ (еще недостаточно изслѣдованной) связи съ основнымъ недугомъ. Выборъ средствъ очень труденъ даже для опытнаго врача, съ одной стороны вслѣдствіе обилія средствъ, существующихъ противъ этой болѣзни, а съ другой — вслѣдствіе того, что очень не легко распознать отличительные признаки. Главныя средства противъ этого рода сыпей суть:

Antim. cr., Arsen., Aurum., Baryta. c., Calc. c., Carb. veg., China, Clem., Con., Dulc., Graph., Hep. sulph., Jod. (Kalium jod.), Kali carb., Lycop., Magn. carb., Merc. sol., Mezer., Nitri ac., Oleand., Phosph., Rhus tox., Sassap., Sepia, Silic., Sulph., Thuja, Viola tric.

При выборѣ средствъ можно руководиться: 1) ощущениями —
Когда сыпь производитъ зудъ:

Antim. cr., Arsen., Merc. sol., Nitr. ac., Rhus, Sulph. — Также: **Clem., Mez., Oleand., Staph.**

При ѣдкой боли: **Bryon., Euphr., Phosph. ac., Sulph.** — Также: **Calc. carb., Lycop., Natr. mur.**

при жженіи: **Arsen., Bellad., Merc. sol., Sulph.** — Также **Carb. veg.**
при покальваніи: **Acon., Bellad., Bryon., Con., Merc. Nitri ac., Sulph.**

2) тѣмъ, сухая ли сыпь, или мокнущая. Въ послѣднемъ случаѣ, когда это бываетъ согласно съ остальными симптомами, надо давать: **Calc. carb., Graph., Hepar, Merc. sol., Nitri ac., Rhus, Viola tricolor.**

Что же касается до вида, то мы различаемъ:

a. (134—138.) Пятнистыя сыпи, *maculae*

134. Веснушки, *ephelis.*

Болѣзненный осадокъ красильнаго вещества (пигментъ). Онъ большею частью устраняются наружными средствами (лимоннымъ

сокомъ, слабой соляной кислотой, омываніемъ сывороткой и т. п.; сулему употреблять опасно). Впрочемъ, совѣтуютъ также принимать внутрь: *Nitri acid.*, *Graph.*, *Lyc.*, *Phosph.*, *Sulph.*, *Veratr.* и др. Но вообще говоря, наружныя средства надежнѣе, если только вообще въ этомъ случаѣ возможно успѣшное лѣченіе. Гиришь сводить желтыя веснушки слабымъ растворомъ хлорной воды (1 часть на 2 части дистил. воды), которымъ онъ ихъ смачиваетъ посредствомъ полотняныхъ тряпочекъ, утромъ и вечеромъ втеченіе 8 — 14 дней. Темныя веснушки онъ обмазываетъ на ночь, съ помощью кисточки, слабымъ растворомъ хлорной извести (1: 10—20) или сѣрной тинктурой, или той и другой жидкостью попеременно.

135. Печеночныя пятна,

chloasma или *pityriasis versicolor*.

Представляютъ множество коричневыхъ чешуекъ, обусловливаемыхъ извѣстнаго рода плѣсенью (грибками). Мало по малу образуются пятна большого размѣра съ коричневыми краями. Они очень часто встрѣчаются у людей, страдающихъ бугорчаткой, и у беременныхъ женщинъ. Связь съ страданіями печени ничѣмъ не доказана. Какъ внутреннія средства рекомендуютъ: *Lycop.*, *Nitri acid.*, *Sepia*, *Sulph.* Для наружнаго употребленія можно посоветовать омыванія растворомъ соды или сѣрныя ванны. Сильное обтираніе освобождаетъ отъ зуда. — Противъ желтыхъ пятенъ у беременныхъ даютъ *Sepia*.

136. Отрубевидный лишай,

herpes furfuraceus.

Вещество въ родѣ отрубей, сходящее маленькими чешуйками, особенно на головѣ: *Calc. c.*, *Phosph.*, *Arsen.*, *Lycop.*

137. Кровяныя пятна (Верлгофова болѣзнь), *purpura haemorrhagica* (также *peliosis rheumatica*).

Въ большинствѣ случаевъ — внутренняя болѣзнь, сопровождающая особенно цингу (и ревматическія болѣзни). Главныя

средства — *Arnica*, *Arsen.*, *Kreos.*, *Phosph.*, *Sulph. acid.*; также *Secale*.

Новѣйшее средство — *Hamam.*

Сюда же принадлежатъ:

138. Опрѣлость, ссадина, *intertrigo.*

Сходятъ верхняя кожаца. На обнажившемся такимъ образомъ мѣстѣ темно-краснаго цвѣта выдѣляется клейкая, часто зловонная жидкость, пачкающая бѣлье. У взрослыхъ эта болѣзнь находится въ связи съ геморроемъ, а у дѣтей съ разстройствомъ желудка и отдѣленія мочи.

Иногда она зависитъ также отъ ожирѣнія ляшекъ и происходящаго отсюда тренія или отъ порчи крови (*сифилисъ*). Когда наружныя средства (*Arnica*, присыпка картофельной мукой или рисовой пудрой, намазываніе *коллодія*, *цинковой мази*) не помогаютъ, такъ что можно предположить, что болѣзнь внутренняя: *Hepar*, *Merc. sol.*, а въ случаѣ хроническаго характера: *Sass.*, *Silic.* — Противъ трещинъ на губахъ давать: *Arnica*, наружно и внутрь, *Merc. sol.*, *Mezer.*; на грудныхъ соскахъ: *Arnica* (наружно; сосокъ всегда обмывать передъ тѣмъ какъ кормить дитя), *Graph.*, *Sulph.* — Противъ опрѣлости у новорожденныхъ: *Lycop.*; если притомъ нагноеніе: *Merc.*, а если не поможетъ и это: *Hepar sulph.* Если причина чисто внѣшняя, то достаточно присыпки картофельной мукой.

6. (139.) Чешуйчатая сыпь, *psoriasis.*

Болѣе или менѣе большія, возвышающіяся и сухія пятна краснаго или красно-бураго цвѣта, на которыхъ отдѣляются тонкія блестящія чешуйки въ видѣ кружковъ и звѣздочекъ. Сыпь разрастается въ округности. Чаще всего она сифилитическаго характера. Если расчесать, то сыпь часто мокнетъ, или изъ нея начинаетъ сочиться кровь.

Лучшими внутренними средствами противъ этой упорной формы можно считать:

Ars., Aurum, Calc. carb., Led., Petrol., Phosph., Phosph. ac., Sulph., Tellur. — Когда основание сифилитическое и меркуриальное: **Merc.** и **Nitri ac.**

Новѣйшія средства: *Apos. cann., Nuph. lut., Phyt. dec.*

в. (140—145.) Узловатая сыпь, *papulae.*

Эти узелки суть частицы вздувшейся кожи, величиной от булавочной головки до просянаго зерна, различной твердости и различнаго цвѣта. Въ большинствѣ случаевъ причиною служитъ воспаленіе сальныхъ желѣзокъ кожи, которое оканчивается дупленіемъ, или разрѣшается, или твердѣетъ, или переходитъ въ пузыри и пузырьки (см. ниже).

Здѣсь изъ большого числа рекомендуемыхъ средствъ заслуживаютъ вниманія слѣдующія:

Antim. cr., Arsen., Dulc., Graph., Hepar., Merc. sol., Nitri ac., Oleand., Sassap., Sulph., Thuja, а также *Calc. carb., Carb. veg., Caust., Con., Mezer., Phosph. acid., Sepia.*

Въ частности мы различаемъ:

а. Сухіе узелки.

Именно:

140. Сыпь у дѣтей, сопровождающая прорѣзываніе зубовъ,
strophulus.

Эта болѣзнь часто бываетъ послѣдствіемъ дурной пищи, раздраженія кожи или катарра кишекъ. Сыпь состоитъ изъ не слишкомъ красныхъ узелковъ, которые сидятъ отдѣльно одинъ отъ другаго, въ большинствѣ случаевъ покрываютъ животъ и ноги, быстро исчезаютъ, но часто снова появляются. Она не требуетъ особеннаго лѣченія.

141. Лишай, узловатый лишай,

lichen.

Воспаленные, красноватые узелки на болѣе темной поверхности кожи. Они дупятся въ формѣ отрубей, не мокнутъ и производятъ

зудъ или жженіе. Иногда они ясно очерчены, имѣютъ видъ кружка или полукруга; иногда воспаленіе идетъ вглубь, отъ чесанія образуются на кожѣ складки или трещины, затвердѣнія, ранки, маленькіе нарывы и струнья; это — болѣе опасная форма. Противъ простой формы помогаетъ **Mercur. sol.** или **Staphys.**; противъ зуда, особенно въ случаѣ хроническаго характера и вообще при болѣе сильной степени болѣзни (такъ назыв. *lichen agrius*), кромѣ названныхъ средствъ, даются: **Rhus, Ars., Con., Graph., Lye., Nitr. ac., Stront., Sulph.**

142. Зудящая сыпь,

prurigo.

Часто сыпь находится подъ кожею, такъ что послѣ чесанія лишь появляются узелки или темная корка отъ изліянія крови, главнымъ образомъ на голеняхъ и на шеѣ. Главное средство — **Sulph.** (см. выше стр. 368 о зудѣ при сыпяхъ). Но иногда, какъ напр. при геморроѣ, судорожномъ раздраженіи кожи, не смотря на зудъ, наружу не высыпаетъ ничего. Въ послѣднихъ случаяхъ полезнѣе всего **Ignatia** (особенно когда ощущается летучее колотье, похожее на укусы блохъ). Если зудъ появляется при раздѣваніи: **Nux vom.** или **Arsen.**; въ постели: **Merc. sol.** При зудѣ въ заднемъ проходѣ (см. геморрой): **Graph., Lycop., Ignat., Phosph., Sulph.** (когда причиною не глисты, противъ которыхъ средства смотри въ своемъ мѣстѣ). — Зудъ мошонки: **Sulph.; Petrol., Nitr. ac.,** половыхъ частей: **Plat., Sulphur. Carb. veg.**

Новѣйшія средства: *Apos. andr., Collins.*

β. Гноящиеся узелки.

143. Угри,

acne.

Они обуславливаются болѣзненнымъ выдѣленіемъ сала въ сальныхъ желѣзкахъ кожи, которое твердѣетъ на поверхности, закупоривая желѣзки какъ бы пробкой. Эти желѣзки воспаляются также, образуютъ пустулы, струнья или твердые узелки. Они по-

являются во время мѣсячнаго очищенія, отъ онанизма, сифилиса, отъ несоблюденія діеты (послѣ употребленія спиртныхъ напитковъ, жирной пищи), отъ раздраженія кожи (отъ дурнаго мыла, разгоряченія и т. п.). Поэтому при лѣченіи необходимо имѣть въ виду эти условія.

Противъ простыхъ угрей: **Antim. cr.**, **Natr. mur.**, **Staphys.**, **Sulph.**; противъ угрей съ точечками: **Nitr. ac.**, **Sepia**, **Sulph.**

144. Красноватая (мѣдная) сыпь, преимущ. на носу, *acne* или *gutta rosacea*.

Сыпь эта состоитъ изъ узелковъ съ пустулами или безъ оныхъ, пречемъ — переполненіе венъ. Появляется она на носу, а потомъ распространяется на щеки и лобъ. Сначала показывается краснота съ расширеніемъ венъ, затѣмъ узелки, которые гноятся или разрастаются, не гноясь. Кожа становится бугристой, толстой, изъ узелковъ дѣлаются шишки; иногда кожа трескается, на ней образуются небольшіе нарывы. **Arsen.**, **Carb. anim** (у пьяницъ), **Sulph.**, **Thuja**, или *Aurum*, *Phosph. acid.* Болѣзнь эта очень упорна.

145. Кровяные чирья,

furunculi.

Они образуются отъ раздраженія и выпотѣнія въ желѣзкахъ кожи, выпоть поражаетъ сосѣдную клетчатку и превращаетъ желѣзу въ нѣчто въ родѣ пробки, которая, наконецъ, при лихорадкѣ и съ болью выходитъ наружу (гнойный стержень). Часто повторяющіяся кровяныя чирья указываютъ на порчу крови отъ дурной пищи или отъ другихъ, болѣе глубокихъ причинъ. Такъ напр. они часто бывають признаками сахарнаго мочеизнуренія.

Arnica (маленькіе, но многочисленныя чирья), **Arsen.** (съ наклонностію къ антонову огню), **Bellad.** (съ рожевиднымъ воспаленіемъ), **Kali carb.** (частое повтореніе съ образованіемъ кислотъ) **Hepar sulph.** и **Merc. sol.**, (наклонность къ нагноенію; скоротечный ходъ и воспаленіе при *Merc.*, медленный при *Hep. sulph.*), **Sulph.** (частое возвращеніе сыпи, геморрой, порча соковъ). — Кромѣ то-

го: *Lycop.*, *Natr. mur.*, *Nitri ac.*, *Silic.*, *Staphys.*, *Thuja* — въ хроническихъ случаяхъ.

Часто удается предупредить нагноеніе посредствомъ выжатыхъ компрессовъ Присница. Если нагноеніе нельзя остановить, то необходимо способствовать полному созрѣванію посредствомъ млечительныхъ припарокъ (теплые, влажные припарки изъ льняной муки), чтобы кровь вновь не приняла въ себя гной, вслѣдствіе чего поддерживалась бы болѣзнь. Часто приходится вскрывать чирья. Остающаяся послѣ этого затвердѣлость лучше всего уступаетъ діахильному пластырю, который разрѣшаетъ также маленькія чирья или содѣйствуетъ ихъ нагноенію. Совершенно иного характера — карбункулъ, который очень легко переходитъ въ антоновъ огонь.

г. (146—151.) Пузырчатая сыпь, *vesiculae*.

Здѣсь надо выбирать изъ:

Antim. cr., *Arsen.*, *Graph.*, *Hepar.*, *Merc. sol.*, *Oleand.*, *Rhus.*, *Sulph.*, *Thuja*. Иногда помогаютъ также *Clematis*, *Mezereum*, *Phosphor.*, *Sepia*.

Вотъ болѣе точныя опредѣленія:

146. Являющіеся группами изолированные пузырьки, *phlyctaenae*.

Лихорадочная сыпь съ молоковиднымъ содержаніемъ и тонкимъ струпомъ. Главныя средства: *Arsen.*, *Merc. sol.*, *Oleander*, *Ranuncul.*, *Rhus*, *Sepia*, *Thuja*.

147. Лишайные пузырьки,

eczema.

Этотъ видъ кожной сыпи встрѣчается чаще всѣхъ. На воспаленной поверхности кожи являются пузырьки, которые сначала мокнутъ, а потомъ образуютъ струнья. Отъ чесанія, раздраженія посредствомъ платья или отъ внутреннихъ причинъ сыпь продолжаетъ выдѣлять выпотъ, мокнуть, производить зудъ и

распространяться на сосѣднія части. Въ большинствѣ случаевъ она усложняется гнойною коркою (см. ст. 152.), причемъ изъ пузырьковъ или подлѣ нихъ образуются гноящіеся пустулы; это особенно бываетъ на части головы, покрытой волосами.

Отличными средствами служатъ **Mercur. sol.** или **Rhus**, а въ хроническихъ случаяхъ: **Arsen.**, **Clem.**, **Mezer.**, **Phosphor**, **Ran. bulb.** Но дѣйствительно блестящіе успѣхи въ этой упорной болѣзни я видѣлъ только отъ продолжительнаго употребленія **Hepar sulph. 3.**

148. Кольцевидный лишай, *herpes circinnatus* или *iris*.

Пузырекъ или пузырь, наполненный кровью, окружаютъ въ видѣ вѣнчика пузырьки меньшаго размѣра (*iris*); иногда бываетъ одинъ только вѣнчикъ безъ средняго пузырька. Они появляются сначала на рукѣ и ногѣ и родственны поясной рожѣ (128).

Sepia, Sulph. — На крайней плоти: **Hepar sulph., Merc. (praec. rub.), Nitri acid., Petrol.**

149. Чесотка,
scabies.

Бываетъ слѣдствіемъ заразы чесоточными клещами (*), образующими ходы, подлѣ которыхъ появляются узелки съ мелкимъ пузырькомъ на концѣ. Узелки эти иногда также лопаются, переходятъ въ пустулы и образуютъ струшья. Поэтому чесотка требуетъ большею частью только наружнаго лѣченія ваннами изъ чернаго мыла и т. п. омываніями, сѣрными мазями и другими средствами, умерщвляющими акарусовъ, какова напр. мазь изъ жира и порошка персидской ромашки. Такъ какъ отъ чесанія или раздраженія кожи подлѣ первоначальной сыпи появляются сверхъ того узелки, лишайные пузырьки (147), пустулы, которые слѣдуетъ считать самостоятельную болѣзнию кожи, то полезно давать также **Sulph.** внутрь. — Противъ

(*) Микроскопическія насѣкомыя (*acarus scabiei*).

ложной чесотки, съ крупными пузырями: **Мерс.** или, при болѣе медленномъ ходѣ болѣзни, **Лусор.**

Новѣйшія средства: *Phyt.* (противусыпное средство при всѣхъ хроническихъ сыпяхъ), *Rumex* (рекомендуется также аллопатами).

150. Пузырчатая воспалительная сыпь,

petiphigus.

На красной поверхности величиною съ чечевичное зерно поднимается при зудѣ и жженіи тугой пузырь, наполненный прозрачнымъ веществомъ, который, лопнувъ, оставляетъ мокнущую язву. Все теченіе болѣзни продолжается 14 дней; если появляются новые пузыри, то болѣзнь дѣлается хроническою. Очень часто эта сыпь имѣетъ сифилитическій характеръ, особенно у новорожденныхъ и у грудныхъ дѣтей. **Hepar sulph.** и **Rhus** въ этомъ случаѣ наиболѣе подходящія средства.

151. Кровяные пузырьки,

bullae.

Arsen., Secale, Sulph.

д. (152.) Пустулезная сыпь, *pustulae.*

152. Гнойная корка,

impetigo.

Изъ маленькихъ пузырьковъ, величиною не болѣе какъ съ горошину, наполненныхъ мутнымъ гнойнымъ веществомъ, образуются, послѣ того какъ они лопнутъ, желтоватые, зеленоватые или буроватые струнья, подъ которыми продолжается процессъ нагноенія, или по отпаденіи которыхъ остается красноватый рубецъ. Они бываютъ большею частью на покрытой волосами части головы, на лицѣ и на нижнихъ оконечностяхъ. Противъ нихъ употребляютъ: **Arsen., Graph., Jod.** (*Kalium jodatatum*), **Merc. sol., Nitr.**

ae., *Rhus*, *Sulph.*, *Viol. tricolor.*, а также *Calc. carb.*, *Con.*, *Mez.*, *Phosph.*, *Sep.*, *Staphys.*

Сюда же относятся слѣдующія назожныя болѣзни, появляющіяся на различныхъ частяхъ тѣла въ формѣ пузырьковъ, пустулъ, чешуекъ.

153. Молочная корка,

crusta lactea.

Эта болѣзнь часто очень упорна, поражаетъ большую часть грудныхъ младенцевъ, появляется сначала на лицѣ и потомъ распространяется на волосную кожу головы и оконечности. Въ большинствѣ случаевъ она находится въ связи съ образованіемъ кислотъ и золотухой. Самая сыпь состоитъ изъ маленькихъ, сначала сидящихъ особнякомъ, потомъ сливающихся пустулъ, которыя, допнувъ, изливаютъ желтоватую, густую жидкость, и при высыханіи образуютъ желтый или желто-бурый струпь или корку (цвѣтомъ похожую на пригорѣлое молоко). По спаденіи корки остается красная, тонкая, мокнущая кожа, которая или заживаетъ или вновь образуетъ струпья. Нерѣдко воспаляются притомъ вѣки, слизистая оболочка носа, слуховой проходъ; желѣзы и даже все лице опухаютъ, и больной ребенокъ получаетъ страшно безобразный видъ. При лѣченіи надо руководиться слѣдующими соображеніями:

Главные средства: *Calc. carb.*, *Rhus.*, въ особенности же *Hepar sulph.*, если поверхность мокнетъ; но при извѣстныхъ условіяхъ, если болѣзнь упорствуетъ, должно имѣть въ виду еще слѣдующія лѣкарства: *Arsen.* (при остромъ отдѣленіи, зудѣ, когда лучше отъ тепла; при истощеніи), *Dulc.* (сухая сыпь), *Graph.* (разъѣдающая корка), *Ledum* (сухія пупырышки; промежуточное средство), *Merc. sol.* (воспаленіе, лишай на ушахъ, съ истеченіемъ изъ послѣднихъ, парша), *Phosph. acid.* (скупенные пупырышки), *Sassap.* (воспаленное основаніе; кожа трескается при отдѣленіи отъ нея коры, на открытомъ воздухѣ). *Staph.*, *Viola tric.*, — если выше-

приведенныя средства не помогутъ. — Для отвращенія рецидива и для устраненія причины болѣзни лучшимъ, радикальнымъ средствомъ остается (послѣ прекращенія воспаления) **Calc. carb.** Само собою разумѣется, что при лѣченіи не слѣдуетъ упускать изъ виду діеты.

154. Парша, *tinea capitis.*

Наука различаетъ а) ложную паршу: 1) отрубевидная парша (принадлежитъ къ отрубевиднымъ лишаямъ, см. ст. 136.), 2) чешуйчатая (принад. къ чешуйчатымъ сыпямъ, см. ст. 139), 3) мокнущая парша (принадл. къ формѣ лишайныхъ пузырьковъ, ст. 147), 4) мокнущая или слизистая парша (принадл. къ молочной коркѣ, ст. 153.), 5) зернистая парша (къ пустуламъ, ст. 152); и б) настоящую паршу: 1) клейкая парша (*tinea fovosa*), причемъ образуются сѣрно-желтые, порошоквидные грибки въ волосныхъ луковицахъ и сальныхъ желѣзкахъ, грибки эти скопляются въ большія клейкія массы (корку), разрушаютъ волосы, раздѣдаютъ кожу, весьма легко распространяются и заразительны. При этомъ очень легко выдергивать волосы. 2) такъ наз. брѣющая или стригущая парша; и здѣсь образуется грибная масса, разрушающая волосы и дѣлающая голову похожею на потертую тюленью кожу (этотъ родъ парши на сѣверѣ встрѣчается рѣдко). Волосы понемногу сами обламываются. 3) плѣшивая парша: волосы выпадаютъ, не будучи подавляемы ни струньями, ни чешуйками, вслѣдствіе грибковъ, которые недавно только были открыты; послѣ этой болѣзни остается неизлѣчимая плѣшь; волосы теряютъ лоскъ, но ихъ не легко выдергивать и сами они не обламываются. При лѣченіи достаточно руководиться слѣдующими соображеніями.

Въ легкихъ формахъ достаточно дать: **Her. sulph., Oleander, Rhus.** При злокачественной, заразительной, гнойной паршѣ: **Antim. cr., Arsen., Baryt. acet. и Baryt. carb., Dulc., Graph., Rhus, Sulph.; Dulc.** полезно при вялости мускуловъ, блѣдности лица и одновременномъ опуханіи другихъ желѣзъ. **Oleander** — при чешуйчатой и мокнущей паршѣ съ одновременнымъ пораженіемъ желѣзъ нижней части живота, при зу-

дящихъ пупырышкахъ и ѣдкой боли ночью. **Нер. sulph. 3.** — при одновременномъ высыпаніи на лицѣ и затылкѣ, золотушномъ воспаленіи глазъ и при мокнущей паршѣ (ст. 147.), когда на воспаленной поверхности являются пузырьки, которые начинаютъ гноиться и образуютъ толстую желтую корку. Когда сыпь не слишкомъ распространилась, то часто тутъ достаточно бываетъ *Rhus*, 3.; **Arsen.** подходит болѣе тогда, когда выдѣляющееся вещество сукровично и зловонно. — Впрочемъ, надо главнымъ образомъ обращать вниманіе на форму (отрубевидная, пузырьчатая, чешуйчатая и т. д. парша) и принимать въ соображеніе сдѣланныя выше, при описаніи этихъ формъ, указанія.

Поэтому въ нѣкоторыхъ случаяхъ приходится прибѣгать къ **Graph., Lycop., Staph.** При лѣченіи необходимо соблюдать чистоту, омывать, размягчать корку посредствомъ масла изъ какао, свѣжаго коровьяго масла безъ соли, посредствомъ разнаго рода нѣжныхъ растительныхъ маселъ и даже посредствомъ теплыхъ припарокъ изъ льняной муки. При мокнущей паршѣ, у которой послѣ засыхаетъ корка (ст. 147 и 152), отличные результаты получаются отъ внутренняго лѣченія, безъ употребленія какихъ-либо наружныхъ средствъ. При этомъ во всякомъ случаѣ необходимо остричь волосы.

Противъ настоящей парши (б. 1, 2, 3), по причинѣ присутствія грибковъ, рекомендуютъ только наружное лѣченіе: дѣлать омыванія растворомъ **камфоры, сулемы, карболовой кислоты**, которыя уничтожаютъ грибки.

Новѣйшее средство: *Phyt.*

Хотя для лѣченія болѣзней кожи вполне достаточно сравнительно старыхъ средствъ, но мы все-таки упоминали и о новѣйшихъ. Противъ кожныхъ сыпей вообще, хроническихъ и острыхъ, укажемъ теперь еще на *Hydrast., Iris.*

(155—165.) Наросты и новообразованія.

155. Зобъ,

struma.

Это — опухоль щитовидной желѣзы. Противъ нея особенно полезны: когда опухоль уже жестка, огрубѣла — **Brom.** (дѣй-

ствуетъ мягче, чѣмъ *Jod.* и вѣрише, чѣмъ *Spong.*, — также въ видѣ мази: не болѣе 1 скрупула 1 разжиженія на $\frac{1}{2}$ унціи жира, или $\frac{1}{2}$ драхмы 1-го разж. на 4 унціи виннаго спирта, каждый разъ втирать по $\frac{1}{2}$ чайной ложки); кромѣ того — **Calc. carb.** (особенно дѣтямъ); также **Conium.** (внутри и наружно).

156. Мѣшетчатая опухоль,

lyria или *tumor folliculosus.*

Задержаніе жира въ сальныхъ желѣзахъ или въ выводныхъ протокахъ.

Главное средство: **Calc. c.** Кромѣ того: *Sulph.*, *Baryt. c.*, *Graph.*, *Silic.*

157. Сальная (стеариновая) опухоль,

steatoma.

Твердая опухоль, состоящая изъ различныхъ пластовъ и содержащая бѣловатое, болѣе или менѣе твердое вещество, похожее на сало.

Главное средство: **Baryta carb.**

158. Бѣлая опухоль колѣна,

tumor albus.

Это — болѣе или менѣе эластичный выпоть, обуславливаемый въ большинствѣ случаевъ ревматизмомъ и золотухой и исходящій изъ твердыхъ или мягкихъ частей колѣна.

Brom., **Jod.** (оба средства также наружно), **Silicea**, **Sulph.**; рѣже **Calc. c.** (*Sabina*, когда особенно поражена кость).

159. Полипы,

polypus.

Неправильные наросты, появляющіеся на поверхности слизистыхъ оболочекъ, то мягкіе (слизистые, пузырьчатые полипы), то твердые (мясистые, волокнистые). Они бываютъ въ носу, въ горлѣ, на челюстяхъ, въ маткѣ, во влагалищѣ, въ мочевомъ пу-

зырь, въ прямой кишкѣ. Противъ слизистыхъ даютъ: **Calc. c., Merc. sol., Sulph., Teucr.** (въ формѣ порошка, наружно). Твердые: **Calc. c., Staphys., Sulph., Thuja.** Можетъ быть помогаютъ также *Aurum, Con., Graph., Lycop.* — О полипѣ въ носу см. выше стр. 180. Въ маткѣ они обыкновенно вызываютъ опасное кровотечение и поэтому должны быть оттуда устраняемы посредствомъ операции.

Новѣйшее средство — *Sanguin.* (внутри и наружно).

160. Костные наросты на головѣ,

exostoses.

Эти наросты берутъ свое начало у надкостницы или у самой кости. Они бывають послѣдствіемъ или наружнаго поврежденія (давленія, удара и т. п.), или порчи соковъ отъ дототы, золотухи, сифилиса, злоупотребленія ртутью (послѣднее — самая обыкновенная причина). Средства противъ нихъ: **Aurum, Jod., Merc. sol., Silic., Sulph.**; рѣже: *Asa, Calc. c., Mez., Phosph.* Противъ возникшихъ отъ злоупотребленія ртутью: **Aurum mur. n., Jod., Mez.** Противъ сифилитическихъ: **Jod., Merc. sol.**

161. Наросты на сухожильяхъ (поверхъ кости),

ganglion.

Круглая, мало по малу распространяющаяся опухоль близъ суставовъ и мышечнаго влагалища, величиною не болѣе какъ въ голубиное яйцо, съ толстыми стѣнками, въ которыхъ заключается вещество, похожее на студень, а иногда и болѣе твердое. Она вызывается обыкновенно чрезмѣрнымъ напряженіемъ, напр. при фортошанной игрѣ, давленіемъ и т. ц.

Можно испробовать **Silicea.** Наружное лѣченіе — хирургическое.

162. Бородавки,

verrucae.

Наружное смачиваніе тинктурами *Veratrum* или *Thuja.* Прижиганіе *янисомъ*, а чтобы скорѣе достигнуть цѣли: *поджимъ кали*

или *хлористамъ цинкомъ*. Внутрь: **Varyta c., Calc. c., Lycor., Magn. carb., Silic.** и др. Часто бородавки появляются и исчезаютъ въ большомъ количествѣ безъ всякой видимой причины.

Новѣйшимъ средствомъ противъ бородавокъ служить **Sanguin.**

163. Ознобленіе, отмороженіе,

perniones.

Наружное омываніе **арниковой** тинктурой, *горное масло* (красящ.), *цинковая* и *свинцовая* мази помогаютъ только временно. При первомъ появленіи ознобинъ помогаетъ втираніе снѣга, а когда болѣзнь затянулась, то купаніе рукъ и ногъ въ отварѣ дубовой коры. Когда кожа трескается, *арниковая* тинктура помогаетъ превосходно. Смазываніе *коллодіемъ* помогаетъ только при поверхностныхъ трещинахъ. Изъ внутреннихъ лѣкарствъ помогаютъ: *Agar., Nitri ac., Petrol., Phosph., Sulphur.* При воспалительныхъ, причиняющихъ сильную боль ознобинахъ: **Merc. sol., Nitri ac., Sulph.** При сине-красныхъ и опухшихъ: **Arnica, Puls.**

164. Мозоли,

clavi.

Противъ боли, когда они воспалены: *Nitri ac., Petr., Silic., Sulph., Thuja* и др. Говорятъ (!) также, что эти средства излѣчиваютъ (?) радикально. Наружное дѣженіе смягчительными мазями (особенно садовымъ воскомъ), ножными ваннами, срѣзываніемъ — вѣриѣ.

165. Родимья пятна,

naevi.

Рекомендуютъ: *Calc. c., Carb. veg., Graph., Sulph. ac.* Но дѣйствительность этихъ и другихъ средствъ еще недостаточно опредѣлена опытомъ.

ШЕШТОЕ ОТДѢЛЕНІЕ.

Лѣченіе нѣкоторыхъ наружныхъ и хирургическихъ болѣзней.

Гомеопатія принадлежитъ та честь, что она и здѣсь произвела реформу, такъ какъ съ одной стороны она указала нѣкоторыя специфическія средства, которыя могутъ быть употреблены съ пользою при наружномъ лѣченіи, а съ другой выяснила, что эти болѣзненные явленія могутъ быть лѣчимы также внутренними средствами, и что они, слѣдовательно, никакъ не исключительно наружныя болѣзни. Такимъ образомъ и въ этой области гомеопатіею доказано единство организма и проложена дорога къ болѣе разумнымъ воззрѣніямъ, благодаря которымъ многія тягостныя операціи стали излишними.

Раны, механическія поврежденія.

166. Раны,

vulnera.

Самымъ дѣйствительнымъ средствомъ служить здѣсь **Arnica**. Его употребляютъ (наружно) тинктурою или, когда поврежденіе болѣе поверхностно, или кожа очень чувствительна — пополамъ съ водою или спиртомъ (напр. на столовую ложку воды столовую ложку *Arnica*); этой смѣсью смачиваютъ полотняныя тряпочки и накладываютъ ихъ на пораненную часть. Тряпочки эти смачиваются каждый разъ, какъ только они высохнутъ. Это средство особенно полезно противъ ранъ, произошедшихъ отъ толчка, ущемленія, паденія, а для предупрежденія вреднаго влія-

нія ихъ на весь организмъ, его можно также давать и внутрь (*Arnica*. 2., черезъ 2—3 часа отъ 1-й до 3-хъ капель); далѣе оно полезно при поврежденіи органическихъ тканей отъ удара, укола, выстрѣла, укуса, разрыва, вывиха, при поврежденіяхъ, произошедшихъ отъ надорванія (живота), при подтекахъ крови, опухоляхъ, краснотѣ, если при этомъ до нѣкоторой степени нарушено кровообращеніе. Въ случаѣ нагноенія *Arnica* уже не годится. Въ этомъ случаѣ надо попробовать средства, означенныя ниже при нагноеніи (ст. 168.). *Arnica* (внутри и наружно) полезна также послѣ слѣдующихъ операцій: вправленіе суставовъ и костей, вырваніе зубовъ и т. п.

Conium — 2., полезно противъ послѣдствій давленія и толчка, когда притомъ утолщеніе, затвердѣніе клетчатой ткани, особенно въ области желѣзъ.

При переломѣ, давленіи, поврежденіи костей **Symphytum** — отличное средство для скорого излѣченія; при открытыхъ ранахъ и нарывахъ съ подтекомъ крови, воспаленіемъ, кровянистымъ или водянистымъ изпяніемъ въ клетчатку, лихорадкой: **Calendula off.** Оба эти средства могутъ быть употреблены внутри и наружно (подобно *Arn.*, въ чистомъ видѣ или пополамъ съ водой). — Въ тѣхъ же случаяхъ, въ которыхъ употребляется *Arnica*, только въ болѣе легкихъ, очень полезно наружное лѣченіе посредствомъ *Helianthus*.

Изъ ранъ заслуживаютъ вниманія слѣдующія особенныя ихъ формы: раны отъ укуса ядовитыхъ животныхъ: **Arsen.**, **Bel-lad.** (внутри). — Пролежни: **Arnica**; при наклонности къ антонову огню: **Arsen.**, **China**. — Раны отъ отмороженія: **Arnica** или также **верасинъ**, втирать по нѣскольку разъ въ день. — При ожогахъ когда онѣ сильны, т. е. когда образовался пузырь, кромѣ обертыванія ватой, полезно употребленіе внутри **Acon.** или **Arsen.** (при сильномъ жженіи); въ легкихъ случаяхъ очень благотворно наружное употребленіе виннаго **спирта** или **Tinct. urticae ur.** (тинктура изъ крапивы-жгучки) въ формѣ компрессовъ (какъ выше при *Arnica*), 10 капель на 8 золотниковъ спирта.

Что касается до пораженныхъ частей, то при ранахъ костей и надкостной пленки полезны: **Calend.**, **Ruta.** (на су-

ставахъ, особенно рукъ и ногъ), **Symphit.**; — въ суставной оболочкѣ: **Arnica, Bryon., Rhus, Ruta**; — при ранахъ на желѣзахъ: **Bellad., Conium, Jod., Merc. sol.**; послѣднее преимущественно въ томъ случаѣ, когда повреждено самое вещество органа и рана, слѣдовательно, глубока.

Кромѣ того, заслуживаютъ также вниманія нѣкоторыя обстоятельства и сопровождающія явленія. Такъ при сильномъ кровотеченіи: **Arnica, Sulph. ac.**, а въ случаѣ сильной слабости **China**; при слишкомъ сильномъ нагноеніи: **China, Plumb.**; при образованіи фистуль: **Silicea** (см. ниже 170); при нарываніи: (см. ниже нарывы 169); при антоновомъ огнѣ: **Arsen., China** (см. ниже ст. 172). Воспалительное состояніе смежныхъ частей: **Bellad., Merc. sol.** Опухоль: **Bell.**, а по устраненіи воспаления: **Bryon.** — Лихорадка, сопровождающая пораненіе, устраняется посредствомъ **Acon., Arnica.**; когда притомъ первыя симптомы: **Bryon., Rhus.** О судорогахъ отъ ранъ см. выше при судорогахъ.

167. Подкожное кровоизліяніе, *sugillationes.*

Лучшими средствами въ этомъ случаѣ служатъ: **Arnica** (внутри и наружно), а при болѣе сильной степени **Sulph. ac.** При ослабленіи сосудовъ, малокровіи — **Ferrum**; если притомъ чрезвычайная слабость — **China**; при первыхъ явленіяхъ съ упадкомъ силъ и лихорадкой: **Arsen.** или, въ болѣе серьезныхъ случаяхъ, **Carb. veg.**

168. Нагноеніе, *suppurationes*; абсцессы, *abscessus*; (погто- ѣда, *pararitium*).

При нагноеніи на открытыхъ мѣстахъ, кромѣ наружной опрятности (коршія, омыванія), не нужно ничего. Только при сильномъ воспаленіи въ смежныхъ частяхъ или въ глубинѣ: **Merc. sol.**; когда нагноеніе въ означенныхъ частяхъ идетъ медленно: **Hepar. sulph.** Когда выдѣляется слишкомъ много гноя: **China, Plumb.** Если же выдѣляющаяся матерія злокачественна, то смотря по

различнымъ лежащимъ въ основаніи недугамъ, каковы малокровіе, золотуха, сифились, ломота и т. д., надо давать: **Aurum** или **Merc. sol.** (сифились), **Calc. carb.** (золотуха), **Silic.** (ломота), **Kresot.** (гнилостное свойство крови), **China** и **Ferrum** (слабость, малокровіе), **Hepar.** (при чрезвычайной недѣятельности и разслабленіи тканей), **Phosph.** и **Rhus** (при недостаткѣ реакціи), **Arsen.** (при склонности къ злокачественному нагноенію и гніенію). — Такъ какъ эти явленія указываютъ уже на образованіе нарывовъ, то см. слѣд. статью (169).

Нагноенію въ закрытыхъ полостяхъ (абсцессы) должно содѣйствовать теплыми и влажными припарками (катаплазмами) изъ льнянаго сѣмени, овсяной муки, отвара перловыхъ крупъ и т. п., и употребленіемъ внутрь **Bellad.** (наружная краснота, жаръ, напряженіе), **Hepar.** (для ускоренія нагноенія), **Merc. sol.** (при напряженной опухоли и затвердѣній ткани). При хроническихъ абсцессахъ полезны для разрѣшенія: **Hepar**, **Jod.** или, при совершенномъ отсутствіи реакціи, **Sulph.** При переходѣ въ антоновъ огонь: **Arsen.** (см. ниже антоновъ огонь).

Особеннаго вниманія заслуживаетъ ноготѣда, встрѣчающаяся очень часто. Здѣсь также полезнѣе всего **Hepar**, а когда воспаленіе идетъ глубже — **Merc. sol.** Притомъ надо употреблять смягчательныя припарки и мыльные ванны для всей руки, которыя надо часто повторять. При частомъ возвращеніи этихъ нарывовъ — **Sulph.** Если ими поражены волокнистыя (фиброзныя) части и сухожилья: **Mezer.**, а если кость — **Silic.** Последнее часто случается, когда не былъ своевременно проколотъ нарывъ для отдѣленія гноя, а потому здѣсь надо во время обращаться къ хирургической помощи.

Лучшимъ средствомъ для предупрежденія нагноенія въ послѣднее время считается обмазываніе разведенной азотной кислотой.

169. Нарывы (язвы),

ulcera.

Они или служатъ исходомъ процесса злокачественнаго нагноенія, или появляются какъ симптомы болѣе глубокихъ болѣзней и порчи соковъ. Одною наружнаго лѣченія (опрытности,

раздражающихъ мазей, какъ напр. дигестивной мази, перувианскаго базъзама, и прижиганій, для того чтобъ сдѣлать отдѣленіе доброкачественнымъ) здѣсь не всегда бываетъ достаточно; необходимо внутреннее лѣченіе основнаго педуга, какъ-то: ломоты, золотухи и т. д., почему и надо сличить соотвѣтственные статьи.

Всего чаще встрѣчаются ломотные нарывы (главн. средства: **Silicea, Sulph.**); соединенные съ сыпями, такъ называемые лишайные нарывы (**Calc. carb., Graph., Lycop., Merc. sol., Rhus, Sulph.** и друг. указанные при сыпяхъ средства); золотушные (**Aurum, Calc. carb., Graph., Hepar, Lycop., Sulph.**; см. золотуху); меркуриальные, послѣ злоупотребленія ртутью (**Aurum, Jod., Nitri ac., Sassap.**); динготные (**Arsen., Carbo an. и Carb. veg., Kreos., Mur. ac.**).

При костоѣдѣ: **Calc. phosph., Phosph. ac.**, а также *Asa* и *Merc. sol.* Самая упорная форма нарывовъ есть такъ наз. венозная, т. е. та, при которой бываетъ расширеніе венъ (**Arsen., Carbo veg., Sulph.**, также *Hamamelis*).

Вообще для устраненія неправильностей, какъ-то жесткости краевъ, дикаго мяса, наростовъ, дурнаго цвѣта выдѣленій, служать: **Arsen., Aur., Calc. carb., Carbo., Graph., Silicea**, или *Hepar, Jod, Merc. sol., Sulph.* и *Thuja*.

Относительно случающагося при этомъ кровотеченія и антонова огня см. выше раны (166) и ниже антоновъ огонь (172).

Приведемъ нѣсколько новѣйшихъ средствъ. Вообще противъ нарывовъ рекомендуютъ: *Bapt., Hydrast., Sanguin.*; противъ нарывовъ во рту: тѣже средства и *Phytol.*; противъ нарывовъ въ зѣвѣ: *Sanguin.*; противъ нарывовъ на ногахъ: *Hydrast. Phyt.*; противъ нарывовъ въ желудкѣ: *Sanguin.*; противъ нарывовъ въ мочевомъ пузырьѣ: *Eupat. purpur., Hydrast.*; тѣ же средства даются противъ нарывовъ въ кишкахъ; противъ нарывовъ въ маточномъ устьѣ: *Bapt., Helon., Phytalacca.*

170. Фистулы,

fistulae.

Фистулы представляютъ противоположные отверстія, черезъ которыя изливаются жидкости изъ какой-нибудь полости

или канала наружу или въ другую полость. Эти уклоненія, зависящія иногда отъ болѣе глубокихъ причинъ, и во всякомъ случаѣ затрудняющія излѣченія ранъ и абсцессовъ, всего вѣрнѣе устраняются помощью **Silicea** или **Sulph.** Часто не остается ничего, кромѣ хирургической помощи, раздражающихъ вырскивающихъ, прижиганій, надрывовъ.

171. Затвердлости,
indurationes.

Мы говоримъ здѣсь главнымъ образомъ о тѣхъ затвердлостяхъ, которыя остаются послѣ ранъ и наружныхъ поврежденій. Главными средствами для разрѣшенія ихъ служатъ: **Baryta, Calc. carb., Con., Jod., Silic., Sulphur.**

172. Антоновъ огонь,
gangraena или *sphacelus.*

Главное средство при всѣхъ формахъ его: **China**, а когда онъ достигаетъ высшей степени, при порчѣ соковъ, общимъ упадкѣ силъ: **Arsen.**; кромѣ того: **Carb. veg., Rhus, Mur. ac., Sec.** — Антоновъ огонь у стариковъ, т. е. постепенная омертвѣше отъ старческой слабости, можетъ быть (?), временно задерживается посредствомъ **Secale.**

173. Вывихъ (разрывъ сочлененій),
luxatio.

И здѣсь, кромѣ хирургической помощи, полезно **Arnica**, которая умѣряетъ воспаленіе и опухоль. Если, не смотря на исправленіе, останутся нѣкоторыя послѣдствія, какъ напр. опухоль, затрудненіе при движеніи, то полезны: **Bryonia** (боль при движеніи), **Rhus** (боль при спокойномъ состояніи), **Ruta** (боль въ суставахъ) и **Sulph.** (при длительномъ теченіи).

174. Надрывъ отъ подъема тяжестей, чрезмѣрное растяженіе мускуловъ, *nimiae intentiones musculorum.*

Здѣсь (по устраненіи опухоли, воспаленія, кровяныхъ подтековъ посредствомъ **Arnica**) **Rhus** служитъ главнымъ средствомъ,

а потомъ *Sil.*, *Sulph.*, когда послѣдствія принимаютъ характеръ хроническій.

175. Повихъ (растяженіе сочлененій),
subluxatio.

Этотъ недугъ и его нерѣдко продолжительныя послѣдствія устраняются (послѣ уничтоженія воспалительной боли, опухоли и т. п. посредствомъ *Arnica*) всего лучше помощію *Bryonia*. При болѣе глубокомъ вліяніи повиха на суставы: *Ruta*, а на мускулы: *Cicut.*, *Con.*, *Puls.*

176. Грыжи,
herniae.

Онѣ удерживаются посредствомъ приспособленныхъ къ этой цѣли бандажей, которые можно снимать только ночью и во время лежанія на спинѣ. При ущемленной грыжѣ, въ случаѣ воспаления, помогаетъ иногда прикладываніе льда, внутрь *Acon.*; при судорожномъ защемленіи: теплыя ванны, *Nux vom.* или *Opium*, а при холодномъ потѣ и рвотѣ: *Veratr.* Въ подобныхъ случаяхъ средства должно давать часто и въ сильныхъ пріемахъ. Въ послѣднее время противъ ущемленія во многихъ случаяхъ стали съ успѣхомъ употреблять *хлороформъ*. Если эти средства не устраняютъ скоро возникшія отъ ущемленія мѣстныя и общія явленія, причемъ опытная рука непременно должна попробовать вправить грыжу, то по причинѣ угрожающей смерти, надо посѣпить операцией. Здѣсь потеря нѣсколькихъ часовъ можетъ быть невознагражима, а потому больной не долженъ полагаться въ такихъ случаяхъ на самого себя; напротивъ того, онъ долженъ какъ можно скорѣе обращаться къ хирургу.

Въ послѣднее время противъ защемленныхъ грыжъ стали рекомендовать *Gelsem.*, какъ средство, далеко превосходящее *Chloroform*, *Opium* и *Lobelia* (?).

ПРИЛОЖЕНІЕ.

Характеристика гомеопатических лѣ- карствъ

И Л И

очеркъ дѣйствія наиболѣе употребительныхъ и новѣйшихъ гомеопатическихъ медикаментовъ.

Aconitum Napellus.

Борець. Растеніе, принадлежащее къ семейству *Лютиковыхъ* (*Ranunculaceae*, *Jussieu*).

Настоящее противувоспалительное средство (*antiphlogisticum*) гомеопатической школы. Оно заслуживаетъ особеннаго вниманія, когда въ острыхъ или хроническихъ, лихорадочныхъ или нелихорадочныхъ болѣзняхъ являются: *колющая или постоянная боль, сосредоточенная на весьма маломъ пространствѣ; болѣзненная чувствительность тѣла (особенно пораженныхъ частей) въ прикосновенію; нестерпимыя страданія, доводящая больного до неистовства и отчаянія; сильное возбужденіе нервной и кровеносной системъ, или большая слабость и обмороки; сухой, жгучій жаръ въ кожѣ и опухшихъ частяхъ*¹; жгучая, красная, воспалительная сыпь; *общій сухой жаръ, съ жаждою, короткимъ дыханіемъ, полнымъ, твердымъ и быстрымъ пульсомъ, краснотою лица и щекъ, когда больной хочетъ раскрыться, но какъ только немного раскроется, тотъ*

часть чувствуетъ дрожь, или когда больной ощущаетъ содроганіе и дрожь попеременно; *сильная тоска и уныніе, слезливость*; страхъ предъ смертію и ожиданіе ея въ опредѣленный день; чуткое и робкое настроеніе духа; *бредъ ночью*; частые припадки головокруженія съ обморокомъ при вставаніи, или съ туманомъ въ глазахъ; чувство какъ бы колебанія мозга; *приливъ крови къ головь, съ внутреннимъ жаромъ и краснотою лица*; тошнота и чувство тяжести въ мозгу; бьющая головная боль или давленіе въ мозгу, отчего больной теряетъ сознаніе; чувство боли въ темени, какъ будто пациента дерутъ за волосы; болѣзненное воспаленіе глазъ; твердая красная опухоль вѣкъ и свѣтобоязнь; расширеніе зрачковъ; сильная чуткость слуха и обонянія; кровотеченіе носомъ; *одутловатость и сильная краснота лица*, или блѣдность его при вставаніи съ постели; сухія растрескавшіяся губы; потѣніе той стороны лица, на которой лежитъ больной; сухость рта; воспаленіе рта и зѣва съ покальваніемъ, темною краснотою и жженіемъ; отвращеніе къ пищѣ или *жгучая, неутолимая жажда*; *горькій вкусъ во рту*; ощущеніе какъ будто всѣ кушанья (и даже напитки) сухи; рвота слизью, кровью, глистами; ощущеніе давленія подъ ложечкою какъ бы отъ камня, также подъ ребрами и въ сторонѣ печени; *вздутый*, какъ бы наполненный вѣтрами животъ, или какъ будто водянка живота; *сильная чувствительность живота къ прикосновенію*; *скудное жидкое испражненіе* съ натугою; *красная, ярко-красная, огненная*, весьма жидкая моча или совершенное задержаніе мочи; *обильныя менструаціи*; *короткое, быстрое, тоскливое дыханіе*, особенно при стоячемъ положеніи и во время сна; припадки удушья и *затрудненіе дыханія*, одышка; *короткій и сухой кашель*, съ отдѣленіемъ кровавой слизи или чистой крови; *колотье въ груди*, преимущественно *въ одной сторонѣ*, при дыханіи, кашлѣ и движеніи; *сердцебиеніе и тоскливое ощущеніе въ груди*. (Патогенетически изслѣдовалъ Ганеманнъ.)

Actaea spicata.

Воронецъ. Растеніе семейства *Лютиковыхъ* (Ranunculaceae).

Боль преимущественно терзающая, дергающая, усиливающаяся отъ душевныхъ потрясеній и послѣ всякаго напряженія силъ, утромъ и

на открытомъ воздухѣ. Слабость безъ видимой причины. Бѣшеніе во всемъ тѣлѣ, въ особенности около печени. Потеря сознанія. Бредъ. Рекомендуютъ противъ личной боли съ колотьемъ и дерганіемъ, противъ воспаления печени и почечныхъ камней.

Aesculus glabra.

Капитанъ гладкій. Дерево Сѣверной Америки семейства *Капитановыхъ* (Hippocastaneae).

Противъ головной боли гастрическаго и конгестивнаго характера. При параличѣ нижнихъ оконечностей. Головокруженіе отъ гастрическихъ причинъ. Противъ морской болѣзни.

Aesculus hippocastanum.

Капитанъ дикій. Дерево семейства *Капитановыхъ* (Hippocastaneae).

Рекомендуютъ противъ геморроя съ чувствомъ сухости въ прямой кишкѣ. Геморрой съ сильной болью, небольшимъ кровотеченіемъ, болью въ крестцѣ. При параличѣ верхнихъ оконечностей. Запоръ съ чувствомъ сухости въ заднемъ проходѣ, болью и чувствомъ опѣменія въ крестцѣ, хуже при вставаніи послѣ сидѣнія. Бѣли съ болью въ яшкахъ, запоромъ и геморроемъ.

Aethusa Cynarium.

Знояха, кокорышъ. Растеніе семейства *Зонтичныхъ* (Umbelliferae).

Противъ рвоты у новорожденныхъ, если желудокъ не перевариваетъ молока, и если при этомъ нѣтъ поноса; худоба дѣтей, золотушное воспаление глазъ, желтоватое истеченіе изъ уха. Опухоль шейныхъ желѣзъ въ формѣ четокъ. Опухоль подмышечныхъ желѣзъ, сыпь вокругъ суставовъ. Лишай, легко отдѣляющіе кровь.

Agaricus muscarius.*(Amanita rubescens.)*Мухоморъ, семейства *Грибовъ* (Fungi, *Jussieu*).

Употребляется съ большею или меньшею пользою: при конвульсіяхъ и дрожаніи членовъ, надучей болѣзни, слабости и утомленіи послѣ совокупленія, при просовидной сыпи, ознобленіи (принимается внутрь), боли въ костяхъ нижней части лишки, а также при личной и зубной боляхъ. При слабости глазъ (постоянно видны мухъ, *mouches volantes*), противъ чувствительности обонянія и обмановъ его; боль въ поясницѣ какъ отъ вывиха. Впрочемъ, дѣйствіе этого средства до сихъ поръ еще недостаточно изслѣдовано. (Патогенетически изслѣдовалъ Ганеманъ.)

Agave americana.

Агава американская, столѣтнее дерево. Растеніе семейства *Бромелиевыхъ* (Bromeliaceae).

Рекомендуютъ противъ воспаленія рта.

Agnus castus.

Прутнякъ, Авраамово дерево, дикій перецъ. Раст. (*Vitex Agnus castus*) семейства *Губоцвѣтныхъ* (Labiatae, *Jus.*)

Объ этомъ средствѣ мы также знаемъ мало удовлетворительнаго. До сихъ поръ оно съ пользою употреблялось противъ *половаго безсилія, хронической гонорреи*, преимущественно когда притомъ незначительная половая похоть; также при безплодіи, *задержаніи реуль*, недостаткѣ молока у родильницъ и при родильной лихорадкѣ, при нарывахъ въ полости рта и на деснахъ; при опуханіи и *затвердѣніи селезенки*, водянкѣ живота, поврежденіяхъ и ссадинахъ въ заднемъ проходѣ; при опухоли и затвердѣніи шлѣтъ; при бѣляхъ, вывихахъ, ломотныхъ *отложеніяхъ въ суставахъ*, остромъ ревматизмѣ сочлененій и ихъ припуханіи. Про-

тивъ чрезмѣрной чувствительности обонянія и обмановъ его. (Патогенетически изслѣдовалъ Штапфъ.)

Aletris farinosa.

Алетрисъ мучнистый. Растеніе семейства *Лилейныхъ* (Liliaceae).

Противъ выпаденія матки; при преждевременныхъ регулахъ (также при склонности къ выкидышу); при бѣляхъ отъ слабости, потери соковъ, продолжительныхъ болѣзней, дурнаго питанія. Воспаленіе мозга съ приливами крови къ головѣ, одуреніемъ.

Allium sativum.

Чеснокъ. Луковица растенія семейства *Асфоделевыхъ* (Asphodelaceae).

Отъ глисть, хронической слабости пищеваренія у пожилыхъ людей вслѣдствіе невоздержности въ пищѣ; воспаленіе зѣва отъ тѣхъ же причинъ. Охрипость, хроническій катарръ дыхательныхъ вѣтвей съ обильнымъ отдѣленіемъ мокроты; ревматическая бедренная боль, затвердѣніе сосковъ у кормилицъ, сахарное мочеизнуреніе (*diabetes*).

Alumen crudum.

Alumen kalico-sulphuricum. Квасцы. Химическій препаратъ.

Кровотеченіе носомъ, отсутствіе обонянія вслѣдствіе катара, нарывы въ носу, легко источающіе кровь и быстро распространяющіеся, носъ при этомъ залегъ, изъ него сочится кровь, лишаи (внутри — 3 растир., наружно — мелкій порошокъ 0), хроническое слюнотеченіе.

Alumina.

Глиноземъ. Окись металла глинія (алюминія). Фармацевтическій препаратъ.

Довольно схоже съ *Calc. carb.*, *Merc. sol.*, и *Silic.*, а также съ *Cham.* и *Ign.* Можетъ быть съ пользою употреблено при слѣдующихъ

припадкахъ: ощущеніе *стягиванія въ разныхъ органахъ*; чувство увеличенія разныхъ частей; чувство *нарыванія въ слизистыхъ оболочкахъ*; возобновленіе и усиленіе страданій послѣ обѣда; большая слабость при ходьбѣ и разговорѣ; судорожный смѣхъ; *накожная сыпь съ зудомъ по вечерамъ*; *мокнущіе лишай и струпья на головѣ*; возвращеніе *накожныхъ болѣзней* во время новолунія и полнолунія; кожа трескается; *наводящія тоску, ужасныя сновидѣнія*; ознобъ и дрожь, преимущественно по вечерамъ; *мрачное расположеніе духа, съ плачемъ, стонами и мрачнымъ видомъ лица*; тупость и неспособность къ умственнымъ занятіямъ; колющая, бьющая или *сжимающая головная боль*, съ побужденіемъ ко рвотѣ; *чрезмѣрный зудъ при лушеніи кожицы на той части головы, которая покрыта волосами*; *обильное отдѣленіе слезы изъ глазъ, со слезами днемъ и накопленіемъ гноя ночью, при двойной косогазности*; когда по вечерамъ уши краснѣютъ и горятъ; *гноетеченіе изъ ушей*; *обильное отдѣленіе слезы изъ носа съ изъязвленіемъ, неоточивостью ноздрей* и краснотой носа; *отдѣленіе желто-зеленой, густой, похожей на гной массы изъ носа*; плохое обоняніе; *сильная склонность къ насморку*; чувство тяжести и напряженіе кожи въ лицѣ, какъ бы отъ высыханія на ней *личнаго бѣлка*; сыпь съ зудомъ, *кровяные чирья и мокнущіе лишай на лицѣ*; *зубная боль, усиливающаяся отъ жеванія, съ ощущеніемъ шаткости или удлинненія зубовъ*; опуханіе, кровотеченіе и изъязвленіе десенъ; *обиліе слюны съ постояннымъ отдѣленіемъ слезы во рту и горлѣ*; *затрудненіе при глотаніи, какъ бы отъ паралича глотки или отъ судорожнаго суженія пищепріемнаго гортана*; ненормальный аппетитъ; вредныя послѣдствія отъ *ѣды картофеля*; сильная склонность къ *отрыжкѣ (кислой) и изжогѣ*; колики и рѣзь въ животѣ, уменьшающіяся отъ *прикладыванія къ нему нагрѣтой фланели*; сильное давленіе и биеніе въ *брюшномъ кольцѣ*; *затрудненное испраженіе, отъ недѣятельности кишечнаго канала*; *слизистый поносъ*; зудъ въ *заднемъ проходѣ* и истеченіе крови изъ *геморроидальныхъ шишекъ*; боль въ *почкахъ*; обильная, свѣтлая моча; усиленіе *половой похоти, съ частыми поллюціями и сладострастными грезами*; скудные, блѣдные *регулы*; *слизистыя, острыя бѣли, производящія извинки*; *короткій, сухой кашель, съ стѣсненіемъ дыханія, частая охриплость, преимущественно вечеромъ*; одышка и

удуше, какъ бы отъ того что стянута грудь; неправильное сердцебиеніе. (Патоген. изслѣд. Ганеманнъ.)

Aluminium metallicum.

Глини (алюминій). Металлъ.

Это средство вошло въ употребленіе не очень давно. Въ своемъ дѣйстви оно совершенно соотвѣтствуетъ *Aluminium oxyd.* (Алюмина), но только сильнѣе (питесивнѣе) послѣдняго. Дается противъ душевнаго разстройства у женщинъ, противъ слабости глазъ, *tabes dorsualis vera* (истинной сухотки спиннаго мозга), сыпей на оконечностяхъ, хроническаго катарра развѣтлений дыхательнаго горла (бронхій), менструальныхъ недуговъ, прекращенія регуль, со вздутостью нижней части живота и сильнымъ позывомъ на низъ; — противъ паралича нижнихъ оконечностей и ревматизма спинныхъ мускуловъ. (Патоген. изслѣд. Д-ра фонъ Бѣннингсаузенъ и Лоренцъ.)

Ambra grisea.

Сѣрая амбра. Животное вещество, получаемое изъ кишекъ старыхъ кашалотовъ (*physeter macrocephalus, плесунъ*).

Употребляется противъ истерии, ипохондрии, бѣлей, судорожнаго кашля, характеризуемаго постояннымъ покашливаніемъ, зудомъ въ горлѣ и изверженіемъ густой слизи; противъ нервной слабости, нервной головной боли у стариковъ, упадка духовныхъ силъ, потери памяти.

Ammonium carbonicum.

Углекислый аммоніакъ (амміакъ). Химическій препаратъ.

Весьма сходно съ *Bellad.* и *Laches.* Полезно при болѣзняхъ женщинъ, молодыхъ людей и дѣтей, особенно при слѣдующихъ явленіяхъ: боли колющія, раздрающія и происходящія какъ бы отъ изъязвленія, уменьшаются отъ постельнаго тепла; боль въ сочлененіяхъ какъ бы отъ вывиха, или ощущеніе напряженія какъ

бы отъ сокращенія мускуловъ; недуги поражаютъ болѣе правую сторону тѣла, преимущественно вечеромъ и на открытомъ воздухѣ; *сильная чувствительность къ холодному и свѣжему воздуху*, съ сильнымъ страданіемъ отъ него; слабость членовъ, усталость и утомленіе, особенно послѣ разговора, даже если лишь слушалъ разговоръ постороннихъ; жгучая сыпь; красныя, гнойныя узлы, *просовидная сыпь и скарлатинная краснота кожи*; веснушки, наросты на костяхъ, опрѣлости на нѣкоторыхъ частяхъ; сонливость днемъ, но засыпаетъ больной не скоро; безпокойный сонъ съ ужасными видѣніями смерти и мертвецовъ; вечерній ознобъ; печальное, унылое, слезливое расположеніе духа и тоска, какъ будто послѣ совершенія какого-нибудь преступленія; душевное волненіе и отвращеніе къ жизни; чрезвычайная забывчивость, разсѣянность, причемъ у больного при занятіяхъ и во время разговоровъ встрѣчаются часто описки и обмолвки; головокруженіе по утрамъ, преимущественно при чтеніи; головная боль съ тошнотой; *чувство полноты и сильного давленія во лбу, причемъ черепъ какъ будто готовъ лопнуть*; стукъ и колотье въ головѣ, ощущеніе, какъ будто мозгъ слишкомъ рыхлъ; чувство холода или жара въ глазахъ и отвращеніе къ свѣту; сильное слезотеченіе и накопленіе въ глазахъ гноя въ теченіе ночи; тугость на ухо съ зудомъ и нагноеніемъ въ ушахъ, залеганіе носа, насморкъ съ отдѣленіемъ жгучей, водянистой влаги; *блѣдность и страдальческое выраженіе лица*; гнойныя сыпи, кровавыя чирья; *сыпь на лицѣ, съ зудомъ и припуханіемъ шейныхъ желѣзъ*; лишайная сыпь вокругъ рта; тресканіе губъ и изъязвленіе угловъ рта; *боль какъ бы отъ изъязвленія въ корняхъ зубовъ* или чувство колотья и дерганія въ зубахъ, *преимущественно при кусаніи и жеваніи*, боли эти чаще случаются во время менструацій или вечеромъ; разрыхленіе и выпаденіе зубовъ; боль какъ отъ изъязвленія и нарывы во рту и на языкѣ; обильное истеченіе слюны и водянистой влаги изо рта; пациентъ жалуется на боль и садненіе въ горлѣ, или ему кажется, что у него тамъ постороннее тѣло; сильная жажда, до утоленія которой больной не можетъ ѣсть; слабость пищеваренія и сильный аппетитъ къ сахару; изжога и кислая отрыжка; чувство давленія въ желудкѣ и тошнота, особенно послѣ ѣды; ощущеніе холода или жара въ желудкѣ; судорожное стягиваніе въ животѣ съ

тошнотою и накопленіемъ во рту водянистой влаги; склонность къ запору; запоръ съ твердыми испражнениями; зудъ и кровоточивыя геморроидальныя шишки въ заднемъ проходѣ; невольное мочениспусканіе въ постели; моча даетъ песочный осадокъ; постоянное напряженіе полового члена; частыя поллюціи и ощущение давленія въ яичкахъ; опухоль, зудъ и жженіе въ женскихъ дѣтородныхъ органахъ; ѣдкая, темная, даже черная кровь при менструаціяхъ; слишкомъ ранніе или слишкомъ обильные регулы, сопровождаемые зубной болью, болью въ поясницѣ и животѣ; чрезмѣрная охриплость и потеря голоса; *сухой, ночной кашель*, какъ бы отъ попавшей въ горло пыли или отъ щекотанія перомъ; тяжесть въ груди, какъ бы отъ прилива крови; одышка, съ сердцебіеніемъ и затрудненіемъ идти въ гору; сильное стѣсненіе дыханія. — Кромѣ того, *Ammon. carb.* употребляется еще при слѣдующихъ симптомахъ: ломота въ костяхъ черепа; конгестивная (отъ прилива крови) головная боль; продолжительный насморкъ; ячмени на вѣкахъ; близорукость; воспаленіе околоушныхъ желѣзъ; лишай на лицѣ; изъязвленіе слизистой оболочки носа; цинга; хроническая слабость пищеваренія; спазмы въ животѣ; рвота кровью; боль въ печени, геморроидальныя недуги; боль въ яичкахъ; болѣзненные менструаціи; женское безплодіе; *припадки удушья*; водянка груди; зобъ; подагра; боль какъ бы отъ вывиха; судороги; воспаленіе горла или другихъ частей организма; золотушные недуги; англійская болѣзнь; краснуха; *скарлатина*; мучивыя лишай; бородавки; нервная горячка (тифъ) и т. п. (Патоген. изсл. Ганеманнъ.)

Ammonium muriaticum.

Нашатырь. Водохлорнокислый аммоніакъ (хлористый аммоній).
Химическій препаратъ.

Дѣйствіе этого средства еще не достаточно изслѣдовано, но во всякомъ случаѣ оно приноситъ пользу при слѣдующихъ симптомахъ: *боли какъ бы отъ изъязвленія*; чувство напряженія, какъ бы отъ сокращенія сухожилій; *подериваніе въ членахъ, особенно въ пальцахъ рукъ и ногъ*, съ бьющею болью, какъ бы отъ на-

рыванія; волненіе крови и тоска; краснуховидная сыпь; узловатые пузырьки отъ чесанія, которое вызываютъ жженіе и послѣ переходятъ въ струнья; меланхолія и тоска съ склонностью къ слезамъ; чувство полноты въ головѣ; жженіе въ глазахъ, преимущественно наступающее въ сумерки и исчезающее при свѣтѣ; летучія искры и пятна передъ глазами; насморкъ съ изъязвленіемъ поздрей и истеченіемъ густой, желтой слизи изъ носа; чрезвычайная блѣдность лица; сыпь съ зудомъ и лишай на лицѣ; трещины и гнойные пузырьки на губахъ; нарывы въ углахъ рта; чувство бѣнія въ миндалевидныхъ желѣзахъ; сильная жажда и икота; ощущеніе жара, поднимающагося отъ желудка къ горлу; колотье въ сторонѣ селезенки, преимущественно по утрамъ, съ стѣсненіемъ дыханія; *припуханіе въ сторонѣ лобковой кости, гдѣ отъ прикосновеніи является боль какъ-бы отъ нарыванія*; запоръ съ отдѣленіемъ твердаго кала, похожаго на бараній; боль въ заднемъ проходѣ какъ бы отъ нарыванія и истеченіе изъ него крови; слишкомъ раннія регулы съ болью въ животѣ и поясницѣ; бѣли слизистыя, бѣловатыя или кофейнаго цвѣта; сильный и сухой кашель; одышка, особенно при сильномъ движеніи рукъ, нагибаніи тѣла и т. д. (Патоген. изсл. Ганеманнъ.)

Anacardium orientale.

Слоновая вошь. Сѣмена растенія (*Semecarpus Anacardium*) сем. *Терпентиновыхъ* (Terebinthaceae, по другимъ Anacardiaceae).

Симптомы, указывающіе на это средство, суть: давленіе, какъ будто отъ засѣвшаго въ горлѣ посторонняго тѣла, или какъ бы дерганіе со щемленіемъ; страданія возникаютъ во время тѣды; усталость, чрезвычайная слабость; дрожаніе членовъ, преимущественно послѣ небольшихъ прогулокъ иѣшкомъ; параличъ; сильная чувствительность къ холодному и сквозному вѣтру и сильное расположеніе къ простудѣ; кожа нечувствительна къ виѣшнимъ возбуждающимъ вліяніямъ; сновидѣнія, наводящія тоску: больной видитъ пожары, страшныя болѣзни и мертвецовъ; *тяжелое, гипохондрическое настроеніе духа, робость* и страхъ предъ несчастіями и опасностями; упадокъ нравственныхъ силъ, жестокость и

безчеловѣчіе; смѣхъ при серіозныхъ и серіозность при смѣшныхъ явленіяхъ; заблужденіе фантазіи и сильная склонность къ глубокому изслѣдованію; слабость памяти и разсудка; больному кажется, что голова готова лопнуть отъ малѣйшаго размышленія; слабость слуха и обонянія; чрезвычайная блѣдность лица; глаза впалы и обведены синими кругами; около рта кожа жестка и какъ бы покрыта лишаями; дурной запахъ изо рта и гнилой вкусъ; плохое пищевареніе и слабость желудка, жаръ въ лицѣ, шпихондрическое настроеніе духа и сонливость послѣ обѣда; сильное половое влеченіе съ обильнымъ отдѣленіемъ простатической влаги; приступы сильнаго кашля, похожаго на коклюшь, особенно ночью, съ приливомъ крови къ головѣ. (Патоген. изсл. Ганеманнъ.)

Antimonium crudum.

(*Antim. sulphuratum.*)

Самородная сурьма. Минераль. (Это вещество для гомеопатическаго употребленія готовятъ химическимъ способомъ.)

Употребляется при слѣдующихъ симптомахъ: страданія усиливаются отъ теплоты, отъ солнечнаго жара и послѣ обѣда; тучность или худоба; водяныя опухоли; *инойные волдыри, волдыри какъ при ложной оспь; желваки и волдыри, подобныя тѣмъ, какіе бывають отъ укушенія насѣкомыми*; пятна и точки кофейнаго цвѣта на разныхъ мѣстахъ кожи; роговидные наросты; красныя, горячія опухоли; сильная сонливость, спячка; перемежающійся черезъ день потъ по ночамъ и утрамъ; любовныя или печальныя мечты съ усиленною чувствительностію и побужденіемъ къ самоубійству; головная боль послѣ купанья, съ слабостію въ членахъ; глаза и вѣки воспалены и красны; трещины на поздрахъ и въ углахъ рта; гнойная, съ желтыми струпьями, сыпь на щекахъ и подбородкѣ; веснушки на лицѣ; боль въ гнилыхъ зубахъ и истеченіе изъ нихъ крови; обильное отдѣленіе слюны; соленый вкусъ слюны; сильная жажда; *потеря аппетита и отрыжка, разнаго рода идіосинкразіи, тошнота и рвота* слизью и желчью; чувство *давленія въ животѣ отъ переполненія ея*; продолжительныя желудочныя спазмы; жженіе подъ ложечкой, приводящее

больнаго въ отчаяніе и побуждающее его утопиться; сильное пученіе живота, преимущественно послѣ обѣда; твердая испражненія съ натугою; истеченіе изъ задняго прохода желтовато-бѣлой слизи; частое обильное мочеиспусканіе, причѣмъ моча даетъ слизистый осадокъ; красныя мочевыя кристаллы; усиленное половое влеченіе съ частыми напряженіями мужскаго члена и поллюціями; хрипота и утрата голоса, преимущественно въ теплѣ; принадлежности сильнаго удущья; кашель съ жженіемъ въ груди, какъ бы огнемъ. (Патоген. изслѣд. Ганеманнъ.)

Apis mellifica.

(*Apisinum*, *Apis virus*.)

Спиртовая вытяжка изъ пчелы, насѣкомаго изъ семейства *Перепончатокрылыхъ* (*Hymenoptera*, *Cuvier*).

Употребляется при слѣдующихъ симптомахъ: апатія (равнодушіе); уныніе; волненіе; страхъ; боязнь смерти; раздражительность; сварливость; душевное и тѣлесное раздраженіе; легкомысліе; неумѣренный смѣхъ. — Бредъ съ жаромъ и сыпью на головѣ и съ приливомъ къ ней крови; больной не можетъ остановить мысли на одномъ какомъ-нибудь предметѣ; головокруженіе при стоячемъ, сидячемъ и лежащемъ положеніяхъ, причѣмъ глаза сомкнуты, тошнота, головная боль, чиханіе; неопредѣленное чувство стѣсненія, особенно надъ глазами; чувство полноты въ головѣ; объемъ ея кажется увеличеннымъ; тяжесть, давленіе, сжиманіе головы, особенно при перемѣнѣ сидячаго или лежачаго положенія на стоячее; въ теплой комнатѣ хуже; отъ нажиманія легче. Острая, колющая боль въ вискахъ; — головную кожу тянуть, напрягаетъ; головная кожа чувствительна; въ ней жгучее покалываніе и зудъ; выпаденіе волосъ. — Свѣтъ раздражаетъ глаза при головной боли; глаза красны; зрѣніе слабо, глаза блуждаютъ; мельканіе въ глазахъ; подергиваніе лѣваго глазнаго яблока, преимущественно ночью; тяжесть вѣкъ и глазъ, полнота, давленіе; стрѣляющая боль, сверленіе и колотье въ глазномъ яблокѣ; жженіе, краснота и рѣзь въ глазахъ; колющій зудъ въ глазахъ и вѣкахъ; слезотеченіе съ ночнымъ безпокойствомъ, — при головной боли, чувствительности къ свѣту, краснотѣ и жженіи въ гла-

захъ; слипаніе, опуханіе вѣкъ; отекъ и рожевидная опухоль около глазъ. — Чувствительность къ шуму; колотье и жженіе въ ушахъ; напряженіе около нихъ. — Чиханье съ тяжестью во лбу и головокруженіемъ; насморкъ съ чувствомъ опухоли въ носу; съ сухостью въ немъ и жженіемъ въ губахъ; зудъ, боль, опухоль, краснота носа. — Блѣдность лица; жгучее колотье въ немъ; ощущеніе полноты, жара; краснота, багровый цвѣтъ лица. Напряженіе, опухоль и краснота лица; чувство пощипыванія; боль въ зубахъ, простирающаяся до десенъ, верхней части головы и т. д.; боль въ губахъ; онѣ кажутся ущемленными; трещины и опуханіе губъ; напряженіе, жженіе въ лицѣ; выворачиваніе, отвислость и опуханіе губъ. — Челюсти смыкаются съ подергиваніемъ; держащая боль въ лѣвыхъ верхнихъ зубахъ; зубная боль, распространяющаяся до верхней части головы. — Языкъ, особенно по краямъ, какъ бы обожженъ. На краяхъ (особенно лѣвомъ) пузырьки, причемъ языкъ жжетъ, саднитъ, покалываетъ; сухость, огненная краснота, жгучее колотье и опуханіе языка; поносъ съ нечистойю языка; во рту, зѣвъ и горлѣ сухо; они какъ бы обварены кипяткомъ; слюнотеченіе, слюна вязка, пѣниста; охрипелость, отхаркиваніе по утрамъ; въ зѣвъ и горлѣ: давленіе какъ бы отъ посторонняго тѣла, колющій зудъ, стягиваніе, затрудненіе при глотаніи; горло саднитъ, причемъ слюна вязка; при глотаніи горло жжетъ, саднитъ, колетъ; краснота, опуханіе, садненіе миндалевидныхъ желѣзъ. — Отсутствіе аппетита; отсутствіе жажды, причемъ водянка, сухость въ горлѣ, жаръ; жажда, желаніе пить холодную воду, упадокъ силъ. — Отрыжка пищею, когда напьешься воды; тошнота съ головокруженіемъ, обморокомъ, упадкомъ силъ, рвотою, головою болью, опуханіемъ головы, болью въ желудкѣ и поносомъ. Давленіе и стягиваніе въ желудкѣ, покалываніе, какъ бы иглою; чувство садненія и жженія; чрезвычайная чувствительность. — Внутренности подъ ребрами какъ бы раздавлены, особенно въ лѣвой сторонѣ; жженіе тамъ же, съ болью, идущею вверхъ; біеніе и сверлящая боль надъ лѣвымъ бедромъ; при отрыжкѣ лучше; бурчаніе въ животѣ; чувство тошноты; рѣзь въ животѣ утромъ, съ позывомъ на низъ; тяжесть, болѣзненное давленіе, сильная сдавливающая боль, стягиваніе въ животѣ; боль въ нижней части живота при ходь-

бѣ; сильная боль при лежаніи; легче при сидѣніи; жженіе въ животѣ; внутреннее садненіе и наружная чувствительность, даже къ прикосновенію одѣяла; животъ шарообразенъ, вздутъ, чувствителенъ, причѣмъ ноги опухли и моча недостаточна. — Ощущеніе, какое бываетъ при поносѣ; натуга, гнетеніе; — испражненія мягкія, желтаго цвѣта; зеленовато-желтыя, водянистыя, слизистыя, особенно по утрамъ; зловонныя испражненія и затѣмъ натуга съ кровью; истеченіе слизи съ болью, какъ будто бы кишки были раздавлены; задній проходъ кажется заткнутымъ, жаръ и біеніе въ прямой кишкѣ; — какъ бы электрическій ударъ въ прямую кишку передъ позывомъ на низъ; при поносѣ проходъ саднитъ; нестерпимый зудъ съ опухолью; колющая, сверлящая боль въ геморроидальныхъ шишкахъ; опуханіе задняго прохода, изъ котораго сочится кровь. — Моча задерживается или выходитъ въ маломъ количествѣ и съ болью; частый позывъ на мочу; обильная моча днемъ и ночью; мочи мало и она темнаго цвѣта; жженіе и садненіе въ мочевомъ каналѣ; безпокойное чувство въ сѣменныхъ канатикахъ; боль въ яичникахъ какъ бы отъ потугъ, чувствительность; рѣзь, сначала въ лѣвой, потомъ въ правой сторонѣ, тянетъ, колетъ, гнететъ книзу; гнетеніе книзу въ маткѣ, какъ при регулахъ; опуханіе срамныхъ губъ; регулы на нѣсколько дней задерживаются, потомъ снова являются, попеременно нѣсколько разъ; маточное кровотеченіе съ отхожденіемъ плода. — Охриплость съ чувствительностью гортани; терпкость и сухость въ горлѣ; кашель и щекотаніе въ горлѣ, въ нижней части его, вечеромъ, передъ полуночью, послѣ сна или лежанія; припадки проходятъ съ выдѣленіемъ мокроты. — Дыханіе медленное, стѣсненное, со стягиваніемъ горла; ускоренное, особенно при движеніи, восхожденіи на лѣстницу, при ходьбѣ; съ чувствомъ разбитости подъ ребрами; съ жаромъ и головной болью; съ сонливостью; чувство какъ будто дыханіе останавливается; въ тепломъ воздухѣ дышать трудно; чувство полноты въ груди заставляетъ пациента садиться; давленіе въ верхней части груди; боль въ лѣвой сторонѣ груди, подлѣ грудной кости; *въ груди*: острая боль; колотье, особенно въ лѣвой сторонѣ; садненіе, чувство разбитости, особенно около ложныхъ реберъ и въ лѣвой сторонѣ; холодъ и жаръ; боль въ сторонѣ сердца, колющая,

стѣсняющая дыханіе; пульсъ скорый, полный, сильный; твердый малый, быстрый. — Потягиваніе съ болью въ затылкѣ, слѣва, отъ плеча въ голову; колотье справа или при движеніи головы въ эту сторону; боль въ спинѣ, подъ лопатками, усиливающаяся при движеніи; поясница туга. — Потягивающая боль отъ плечъ до рукъ, концевъ пальцевъ; жженіе и колотье въ рукахъ; краснота, жаръ, опухоль, синева, холодъ; зудъ, жженіе и трещины на рукахъ; ногти какъ бы отстають. — Слабость и садненіе въ лѣвомъ бедрѣ; потягиваніе отъ ляшекъ до кончиковъ пальцевъ; чувство разбитости въ мягкихъ частяхъ; — боль около колѣна; жгучая, стрѣляющая опухоль; колотье въ лѣвой щиколкѣ и въ пальцахъ ногъ; жженіе въ ступняхъ и пальцахъ; опуханіе ногъ; пальцы на ногахъ, кажется, слишкомъ велики; по вечерамъ въ ногахъ тяжесть, неподвижность, болѣзненное опуханіе, зудъ, какъ будто онѣ отморожены. Зудящія опухоли на суставахъ. — Чрезвычайная чувствительность мясистыхъ частей къ прикосновенію; общая раздражительность и безпокойство; слабость и дрожаніе тѣла; сильное изнуреніе тѣла; изнеможеніе, какъ бы послѣ трудной работы, особенно въ сплнѣ, причемъ кружится голова; обмороки съ блѣдностью, холодѣніемъ, рвотой и поносомъ. Чувствительность къ прикосновенію, особенно живота. Зѣвота и сонливость; вздрагиваніе во снѣ; частое пробужденіе; лицо натянuto, покалываніе въ кожѣ, жгучая боль подъ лѣвыми ребрами и другія страданія препятствуютъ сну; безпокойный сонъ и постоянныя сновидѣнія; больному снятся заботы, труды, дальнія путешествія, летаніе по воздуху; метаніе, особенно подъ утро; сонъ не подкрѣпляетъ; продолжительный утренній сонъ. — Дрожь послѣ обѣда (въ 3—4 часа); отъ тепла хуже; затѣмъ жаръ и кашель; ознобъ при малѣйшемъ движеніи, вечеромъ, причемъ головная боль, жаръ въ лицѣ и рукахъ; сильный ознобъ съ крапивной сынью, послѣ жара; чувство жара во всемъ тѣлѣ, особенно въ груди и желудкѣ; жаръ съ краснотой кожи, вечеромъ и ночью, съ волненіемъ, головной болью, поносомъ, опухольями и кашлемъ; жженіе въ рукахъ и ногахъ; по временамъ сухость кожи смѣняется потѣніемъ. — Сильный зудъ кожи, какъ бы отъ укула иглами, особенно послѣ движенія; зудъ на незначительныхъ частяхъ поверхности тѣла, препятствующій пациенту спать; зудъ

кожи жгучій, колющій, раздражающій, выводящій изъ терпѣнія; колющія боли и опухоль; блѣднокрасная опухоль съ красными полосами вдоль членовъ; блѣднорозовая, похожая на отекъ, опухоль, безпрестанно разрастающаяся; плоскія (красныя и бѣлыя) опухоли съ жгучею и колющею болью; крапивная сыпь, красныя пятна, маленькія бѣлыя пятна съ красной каймою; блѣдныя пузыри; весьма болѣзненная опухоль; багряныя, болѣзненные, твердыя пятна; водянистая опухоль на тѣлѣ, рукахъ и ногахъ; животъ опухъ; жгучія, стрѣляющія боли во всѣхъ частяхъ, съ сыпью и безъ нея; садненіе подъ ребрами; напряженіе кожи на затылкѣ, головѣ и плечахъ. Въ теплотѣ, особенно въ запертой комнатѣ, хуже; отъ холодной воды боль, опухоль и жженіе облегчаются; отъ лежанія страданія усиливаются, а отъ сидѣнія уменьшаются; ходьба и движеніе вообще облегчаютъ. Вечеромъ: головокруженіе, головная, глазная и зубная боли, рѣзь въ животѣ; охриплость, кашель, ознобъ и жаръ. Ночью: страданія глазъ и груди; утромъ: безпокойство, ознобъ, головная боль, накопленіе слези во рту, рѣзь въ животѣ, позывъ на низъ.

Такимъ образомъ *Apis* употребляется при слѣдующихъ болѣзняхъ: разнаго рода манія, преимущественно происходящія отъ полового возбужденія у женщинъ. Головная водянка у дѣтей и апоплексія у взрослыхъ. — Головная боль; невралгія головы; нервная и гастрическая мигрень; лысаны; внутреннее и внѣшнее, ревматическое и лмотное воспаленіе глазъ; *iritis* (воспал. радужной оболочки); *corneitis* (воспал. роговой оболочки); слѣпота, потемнѣніе роговой оболочки; рубцы, возвышенія на роговой оболочкѣ, отекъ глазнаго яблока; слезная фистула; невралгія губъ, языка и десенъ; отекъ лица; рожа на лицѣ, преимущественно блѣднокрасная, на одной сторонѣ, на подбородкѣ, нижней челюсти и шеѣ; воспаленіе пѣба, рта, зѣва и горла, рожистое или крапивное; нарывы въ горлѣ; желудочная боль; воспаленіе живота, подреберной плевры, селезенки; водянка живота; хроническій (особенно желчный, рожистый) поносъ; геморрой; воспаленіе мочевого пузыря; Брайтова болѣзнь; мочеизнуреніе, задержаніе мочи, мочерѣзь; гоноррея, страданія яичниковъ: боли, опухоль, гипертрофія (чрезмѣрное увеличеніе объема), водянка; гипертрофія матки; водянка этого органа; разстройство

менструацій; опухоль, невралгія дѣтородныхъ губъ; угрожающій выкидышъ; кровотеченіе изъ матки; ракъ груди; отекъ гортани; водянка груди; водянка околосердечной сумки; воспаленіе под-реберной плевы; ревматизмъ, ломота; ломотныя опухоли; отекъ членовъ; опухоль колѣна; подагра; опухоли; лишай; крапивная сыпь; вереды; скарлатина; корь; ногтоѣда; истерика и истерическія судороги; раны, ссадины, рожа отъ ранъ. (Патоген. изсл. Д-ръ Герингъ въ Филадельфіи.)

Arosunum androsemifolium.

Мухоловка. Растеніе семейства *Кутровыхъ* (Аросунае).

Рекомендуютъ противъ чешуйчатыхъ сыпей, желчнаго поноса; въ южныхъ штатахъ Сѣверной Америки употребляется противъ желчной лихорадки со рвотою желчью и поносомъ; ломота въ правомъ плечѣ и правой ногѣ, въ пальцахъ ногъ, со рвотою желчью и поносомъ; катарральная лихорадка съ сухимъ кашлемъ ночью и изверженіемъ небольшого количества мокроты, стѣсненіе въ груди; ревматическая, желчная, конгестивная, нервная головная боль, мигрень; слишкомъ обильныя регулы; ревматизмъ невралгическаго характера, кровавый поносъ, запоръ отъ задержанія желчи, водянка вслѣдствіе пораженія печени. Бѣли.

Arosunum cannabinum.

Индѣйская конопля. Растеніе Сѣверной Америки семейства *Кутровыхъ* (Аросунае).

При золотушномъ и гнойномъ воспаленіи глазъ, чешуйчатыхъ сыпяхъ, кровотеченіи изъ матки послѣ прекращенія регулъ въ старости, при задержаніи регулъ у молодыхъ дѣвушекъ, со взду-тостью живота, при мочерѣзѣ съ явнымъ упадкомъ дѣятельности почекъ; служить лучшимъ мочегоннымъ средствомъ; противъ охриплости, при легкомъ мокротномъ кашлѣ, противъ водянки (нѣсколько капель эссенціи на одинъ приѣмъ), особенно противъ головной водянки.

Aralia racemosa.

Аралія гроздовидная. Растеніе Центральной и Южной Америки семейства Araliaceae.

Употребляется въ названныхъ странахъ какъ народное средство противъ весьма вонючихъ бѣлей съ гнетеніемъ книзу въ половыхъ частяхъ.

Argentum nitricum.

Селитро-(или азотно-)кислое серебро. Химическій препаратъ.

Эпилепсія; нервное дрожаніе; параличъ, преимущественно *одной стороны*. — Чувство, будто всё члены нѣмѣютъ или деревянѣютъ. — Утомленіе послѣ обѣда. — Обильный ночной потъ. — Безпокойство, заставляющее ходить быстро. — Одуреніе головы, какъ передъ приступомъ эпилепсіи. — Одержимые эпилепсіей снова пріобрѣтаютъ память и ясность мыслей. — Уменьшеніе приливовъ крови къ головѣ. — Головокруженіе, съ совершеннымъ помраченіемъ зрѣнія, какъ при слѣпотѣ; помраченіе зрѣнія съ безпокойствомъ; жаръ въ лицѣ и слезливость. — Залеганіе носа; истеченіе гноя и свернувшейся крови. — Уменьшеніе первой боли въ челюстяхъ. — Десны отстаютъ отъ зубовъ и легко источаютъ кровь. — Чувство опуханія въ покровѣ нѣба, когда шевелишь языкомъ или глотаешь. — Недостатокъ аппетита, отвращеніе къ пищѣ и питью, рвота. — Желудочныя боли; давленіе и тяжесть въ желудкѣ, съ тошнотою; жгучій жаръ въ желудкѣ. — Поносъ или запоръ. — Сильное раздраженіе мочевыхъ путей. — Жженіе въ груди и въ желудкѣ. (Патоген. изсл. Ганеманнъ.)

Arnica montana.

Баранникъ горный. Растеніе сем. *Щитконосныхъ* (Corymbiferae, Juss.).

Употребляется преимущественно при слѣдующихъ случаяхъ: напрягающее подергиваніе, колющій зудъ или чувство

разбитости въ страждущихъ частяхъ; боль усиливается при разговорѣ, сморканіи, движеніи, даже отъ всякаго болѣе или менѣе сильнаго звука; *безпокойство отъ боли, заставляющее больного безпрестанно перемѣнять мѣсто, причѣмъ каждое положеніе все-таки кажется ему неловкимъ*; боли подобныя тѣмъ, какія бываютъ послѣ *вывиховъ, ушибовъ, толчковъ и ударовъ*; усиленная болѣзненная чувствительность всего тѣла, преимущественно кожи или суставовъ при движеніи; летучія боли въ суставахъ; *безпокойство съ дрожаніемъ тѣла, волненіемъ крови, біеніемъ въ артеріяхъ*; слабость и утомленіе, принуждающія больного оставаться въ постели; множество мелкихъ кровяныхъ чирьевъ; *красная, глянцевитая, горячія опухоли*; сыпь; ужасныя сновидѣнія, крикъ и вскакиваніе отъ испуга; *холодныя нижнихъ оконечностей и одновременный жаръ въ верхнихъ*; ознобъ, большею частью вечеромъ и послѣ сна; ночной лихорадочный жаръ, съ жаждою; ипохондрія съ тоскою, весьма чувствительное расположеніе духа, сварливость, упрямство; головокруженіе при ходьбѣ и стоячемъ положеніи; *чувство сдавливанія въ передней части головы и ощущеніе, какъ будто мозгъ сжатъ въ комокъ, или подергиваніе съ колотьемъ и зудомъ въ головѣ*; кожа плотно пристаѣтъ къ головѣ и неподвижна; боль въ краяхъ вѣкъ, какъ отъ нарыванія, съ ощущеніемъ сухости и боли при ихъ движеніи; кровотеченіе носомъ, лицо впалое, блѣдно-земляное; твердая, красная, глянцевитая опухоль на одной щекѣ; зудъ въ лицѣ, носѣ, кожѣ головы, губахъ и дѣснахъ; жженіе и тресканіе губъ, язвинки въ углахъ рта; боль и шатаніе зубовъ; гнилой запахъ изо рта; языкъ покрытъ бѣлой слизью; горькій или гнилой вкусъ во рту, отвращеніе къ пищѣ (особенно мясной); аппетитъ на уксусъ; частая, пустая, горькая, гнилая отрыжка; частая тошнота и напрасный позывъ на рвоту; рвота кровяными сгустками; чувство давленія и полноты въ желудкѣ, причѣмъ сердце какъ бы сдавлено; колотье въ селезенкѣ, мѣшающее дыханію при ходьбѣ; колики отъ вѣтровъ; вѣтры съ запахомъ гнилыхъ яицъ; частое, но скудное испражненіе слизью; непроизвольное испражненіе во снѣ; недержаніе мочи ночью; напрасный позывъ на мочу; моча имѣетъ кофейный цвѣтъ и коричневый осадокъ; воспалительная опухоль яичекъ и сѣменнаго канатика; сильная половая похоть съ частыми напряженіями члена

и поллюціями; кашель ночью во время сна, или постѣ плача; мокрота отхаркивается съ трудомъ; кашель съ отдѣленіемъ яркочерной или черной, свернувшейся крови; колотье въ груди, преимущественно во время кашля и движенія; зловонное, короткое, прерывистое дыханіе и одышка; при этомъ чувство стягиванія въ груди: колотье въ груди, боку и сторонѣ сердца, съ обмороками; порывистое сердцебиеніе. (Патоген. изслѣд. Ганеманнъ.)

Arsenicum album.

Мышьякъ. Мышьяковистая кислота. Химическій препаратъ.

Употребляется при слѣдующихъ принадлежкахъ: *чувство разрыванія и растяженія въ членахъ, невозможно лежать на больной сторонѣ, боль облегчается при движеніи пораженной части; боли, заставляющія пациента просыпаться при наступленіи полуночи и до того сильныя, что приводятъ его въ отчаяніе и ярость; жгучія боли; періодическое появленіе типическихъ симптомовъ болѣзни; уменьшеніе болей при ходьбѣ и въ теплотѣ; появленіе побочныхъ симптомовъ во время болей; быстрый упадокъ силъ, приводящій больного къ расслабленію; истощеніе и изнуреніе; дрожаніе членовъ вслѣдствіе слабости; кожа холодна, суха, похожа на пергаментъ, или синяго цвѣта; жгучія сыти и плоскія язвы, отдѣляющія сукровицу; лѣнь, сонливость, отвращеніе къ движенію и постоянная охота лежать; постоянное вздрагиваніе и чувство подергиванія при засыпаніи и во время сна; тяжелыя, ужасныя сновидѣнія; общій наружный холодъ съ холоднымъ и клейкимъ потомъ; ночью жаръ съ жженіемъ въ жилахъ, какъ будто въ нихъ течетъ кипятокъ; перемежающійся пульсъ; потъ въ концѣ михорадки или въ началѣ сна; религіозная скорбь и меланхолія; необыкновенная сердечная тоска и томленіе, преимущественно ночью; больной страшится смерти; наклонность къ пересудамъ и упрекамъ; бьющая головная боль, особенно надъ корнемъ носа; опуханіе головы; гнойныя струнья на волосной ея части; тусклые, мутные, отекающіе глаза; сильный насморкъ съ отдѣленіемъ острой, водянистой влаги; желтизна непрозрачной роговой оболочки глаза; лицо блѣдное, впалое, мертвенное, землянаго цвѣта, глаза впалые, съ синими*

крутами около нихъ; носъ заостренъ; лицо опухло, особенно подъ глазами; желтый цвѣтъ лица; губы опухли, почернѣли, растрѣсались, изъязвлены; судорожный скрежетъ зубовъ; языкъ синеватый, черноватый, дрожащій, растрескавшійся; склонность къ спиртнымъ напиткамъ; *постоянная и сильная жажда, проходящая отъ нѣсколькихъ капель; тошнота*, вынуждающая пациента лечь; *сильная рвота* кровянистыми или черными веществами, *рвота пищею* или рвота тотчасъ послѣ питья; *жжение въ желудкѣ*; *сильная тоска и болзненная чувствительность подъ ложечкой*; давящія судороги въ желудкѣ, какъ будто стремящіяся сдвинуть сердце съ его мѣста; *сильная, судорожная или рѣжущая колика*, съ тоскою, жалобами, безпокойствомъ, уныніемъ; *сильные водянистые поносы съ натурой и рѣзью въ животѣ*; жгучія геморроидальныя шишки въ заднемъ проходѣ; преждевременныя, обильныя менструаціи; острыя бѣли, производящія садненіе и изъязвленіе; кашель послѣ питья или во время ходьбы на открытомъ холодномъ воздухѣ; сильная одышка и стѣсненіе дыханія; ночныя приступы удушья. (Патоген. изслѣд. Ганеманъ.)

Artemisia vulgaris.

Чернобыльникъ. Растеніе семейства *Щитконосныхъ* (Compositae).

Употребляется съ успѣхомъ противъ падучей болѣзни, выпаденія матки, слишкомъ обильныхъ регулъ и маточнаго кровотеченія.

Arum triphyllum.

Аронъ трехлиственный. Растеніе семейства *Аройниковыхъ* (Aroideae).

Одышка, воспаленіе горла, охрипость катаррального характера; при кашлѣ служитъ хорошимъ разрѣшающимъ средствомъ; въ опасныхъ случаяхъ воспаленія рта.

Asa foetida.

Чортовъ калъ. Камедь изъ растенія *Ferula asa foetida* семейства *Зонтичныхъ* (Umbelliferae, Juss.).

Средство еще мало изслѣдовано. Оказывается полезнымъ при *бьющихъ боляхъ, направляющихся изнутри наружу*; также при

колющихъ и разрывающихъ боляхъ, которыя, при прикосновеніи, *измѣняютъ свой характеръ*, съ чувствомъ онѣмѣнія; когда припадки появляются при сидячемъ положеніи и исчезаютъ при движеніи на открытомъ воздухѣ; при темнокрасныхъ, горячихъ опухоляхъ, язвахъ, доходящихъ до костей и отдѣляющихъ похожій на сукровицу зловонный и жидкій гной. (Патоген. изсл. Ганеманнъ.)

Asarum europaeum.

Европейскій копытень. Растеніе сем. *Курказновыхъ* (Aristolochiaceae, Juss.).

Употребляется съ пользою противъ: ломоты въ головѣ, воспаленія глазъ, желчныхъ и *желудочныхъ* недуговъ, глисть, поносъ съ изверженіемъ бѣлыхъ, слизистыхъ веществъ или непереваренной пищи, противъ мигрени, сухотки отъ глисть. (Патоген. изсл. Ганеманнъ.)

Asclepias syriaca.

Ласточникъ сирійскій, ваточникъ. Растеніе семейства *Ласточниковыхъ* (Asclepiadeae).

Употребляется въ скарлатинѣ противъ головной боли, кашля съ катаральной лихорадкой (способствуетъ изверженію мокроты), противъ головной боли съ головокруженіемъ послѣ подавленнаго пота, противъ нервной головной боли съ обильнымъ отдѣленіемъ мочи, противъ воспаленія легкихъ, слабости пищеваренія со рвотою слизью, противъ болѣзненныхъ регулъ, перемѣжающагося типа, съ сильнымъ гнетеніемъ внизу, подобнымъ потугамъ.

Asclepias tuberosa.

Ласточникъ шишконосный. Растеніе семейства *Ласточниковыхъ* (Asclepiadeae).

Рекомендуютъ противъ водянки послѣ скарлатины и воспаленія почекъ.

Atropinum.

Атропинъ. Химическій препаратъ, добываемый изъ *Atropa Belladonna*, растенія сем. *Пасленовыхъ* (Solaneae, Juss.).

Имѣеть вліяніе на головной и спинной мозгъ, повышая ихъ дѣятельность. Частое пробужденіе ото сна; страшныя грезы, вздрагиваніе во снѣ, съ судорожнымъ выпрямленіемъ тѣла; головокруженіе при выпрямленіи, одурѣніе; отвращеніе къ работѣ; потягивающее колотье въ головѣ, которое возникаетъ преимущественно внутри ея, противъ глазъ и висковъ; оптическіе обманы, расширеніе зрачковъ и подвижность радужной оболочки; раздраженное состояніе слизистой оболочки дыхательныхъ органовъ, щекочущій кашель, наступающій періодически, безъ изверженія мокроты; давленіе въ груди; рвота пищею, упадокъ духа; чувство внутренняго холода при наружномъ жгучемъ жарѣ тѣла; неутолимая жажда; запоръ. (Патоген. изсл. Д-ръ Эйдгеръ въ Вѣнѣ.)

Aurum foliatum.

Листовое золото. Простое тѣло.

Полезно при слѣдующихъ явленіяхъ: боль, какъ бы отъ разбитости, преимущественно въ суставахъ, при покойномъ положеніи, когда боль эта усиливается особенно утромъ въ постели, при долгомъ лежаніи; боль съ чувствомъ онѣмѣнія; частое волненіе крови; усиленная раздражительность всѣхъ чувствъ и чрезвычайная чувствительность къ боли; чувство ползанія мурашекъ въ разныхъ частяхъ тѣла; безпокойный сонъ съ тяжелыми, страшными грезами и бредомъ; зябкость и сильная чувствительность къ холодному воздуху; *слезливость, религіозная меланхолія, сильная тоска, желаніе умереть и покушеніе на самоубійство*; сварливость, злоба, причемъ отъ малѣйшаго противорѣчія больной приходятъ въ сильный гнѣвъ и безпокойство; *примигъ крови къ головѣ, стукъ и шумъ въ ней*; болѣзненное чувство разбитости въ головѣ, отъ котораго, при малѣйшей умственной работѣ, больной доходитъ до помраченія ума; способность видѣть предметы на половину, въ

горизонтальномъ положеніи; черныя пятна, искры и пламя передъ глазами; шумъ въ ушахъ; темныя, красно-коричневая пятна на носу, язвы, трещины и струнья на ноздряхъ, опуханіе носа; припуханіе щекъ и губъ съ чувствомъ напряженія и лома въ самыхъ костяхъ; нарывы на деснахъ съ опухолью щекъ; неприятный, гнилой запахъ изо рта; страданіе и колики отъ вѣтровъ; стремленіе уже существующихъ грыжъ къ выходу наружу; мутная моча; чрезвычайное возбужденіе половой похоти съ обильными ночными поллюціями и напряженіемъ члена; яички опухли и въ нихъ боль, какъ бы отъ ушиба; сильная одышка ночью и удушье, какъ бы отъ стягиванія груди; тоскливое сердцебіеніе и приливъ крови къ легкимъ; сердце дрожитъ при ходьбѣ, и больной чувствуетъ, какъ будто оно отдѣлилось отъ окружающихъ органовъ. (Патоген. изсл. Д-ръ Молинъ.)

Baptisia tinctoria.

Баптизія красильная. Растеніе семейства *Бобовыхъ* (Leguminosae).

Удушье, золотушное и гнойное воспаленіе глазъ, дифтеритъ и стѣсненіе дыханія, такъ что больной задыхается, вслѣдствіе прилива крови къ легкимъ; поносъ, какъ у Arsenic.; желчная лихорадка; воспаленіе мозга (?); нарывы на краяхъ маточнаго устья; охриплость катаррального характера; катарральная лихорадка; ревматическая, нервная, желчная головная боль (подобно Bryonia, Gelseminum, Arnica и Muriat. acid при тифѣ); страданія печени; слишкомъ обильныя регулы (?), вонючія бѣли съ нарывами на стѣнкахъ влагалища и матки, всеобщая слабость; нарывъ въ носу (также снаружи); нервная горячка въ болѣе тупой формѣ, какъ при Acid. phosphoric., глухая головная боль, бредъ, буро-красный языкъ, вонючія испражненія, чрезвычайная слабость, ознобъ днемъ, жаръ ночью, лихорадочный ревматизмъ; кровавый поносъ.

Baryta acetica.

Уксусокислый баритъ. Химическій препаратъ.

Парша на головѣ, злокачественная, гнойная, заразительная; воспаленіе околоушной желѣзы, если остается затвердѣніе; воспа-

леніе зѣва отъ простуды и во время оспенной эпидеміи; истощеніе золотушныхъ дѣтей; воспалительная боль лица, и т. д., подобно Baryta carbonica.

Baryta carbonica.

Углекислый баритъ. Химическій препаратъ.

Особенно полезно при слѣдующихъ симптомахъ: чувство напряженія въ членахъ, больному кажется, что мускулы стали короче; сильная впечатлительность къ холоду и расположеніе къ простудѣ; большая слабость и невозможность выносить тяжесть собственнаго тѣла; постоянная склонность сидѣть или лежать; *слабость всего тѣла, нервовъ, чувствъ и умственныхъ способностей*; усиленная воспримчивость всѣхъ чувствъ; кожа нѣжна, болѣзненна и легко изъязвляется; опуханіе и затвердѣніе желѣзъ; сильная сонливость во время дня и спячка; *робость, нерешительность и боязнь людей*; сильная забывчивость и разсѣянность; *головная боль надъ глазами или сзади, ближе къ затылку*; напряженіе головной кожи и выпаденіе волосъ; сыпь на ухахъ и позади ихъ; опухоль или чувство опуханія лица; ощущеніе, какъ будто кожа лица покрыта паутиною; нижняя губа растрескалась и покрыта ссадинами; *верхняя губа и подчелюстная желѣза опухли*; дерганіе въ зубахъ, которое отзывается въ ухахъ и вискахъ; блѣдно-красноватая опухоль десенъ; воспаленіе горла и особенно миндалевидныхъ желѣзъ, переходящее въ нагноеніе; колотье и давленіе въ горлѣ, какъ будто отъ посторонняго тѣла или опухоли; жгучіе пузыри и трещины на языкѣ; постоянная жажда; боль въ желудкѣ и подъ ложечкой и ощущеніе, какъ будто принятая пища проходитъ по изъязвленному мѣсту; жидкія испраженія съ чувствомъ давящей боли въ поясницѣ; слабая половая похоть и слабость половой системы; скудные и кратковременныя регулы; охриплость и утрата голоса; болѣзненное чувство коченія въ поясницѣ и затылкѣ; ощущеніе въ спинѣ стука и бѣшенія. (Патоген. изсл. Ганеманнъ.)

Baryta muriatica.

Водохлорнокислый баритъ (хлористый барій). Химическій препаратъ.

Употребляется при слѣдующихъ явленіяхъ: большая слабость, принуждающая лежать; — слабость и упадокъ силъ, почти доходящій до паралича; замираніе; оковѣлость и нечувствительность тѣла, съ періодическими конвульсіями; повсемѣстная тяжесть; дрожаніе членовъ; судорожное трясеніе; вздрагиваніе мускуловъ лица, или нѣкоторыхъ членовъ, или всего тѣла; періодическіе приступы конвульсій съ чрезвычайно сильнымъ вздрагиваніемъ и метаніемъ. (Патоген. изслѣд. Герингъ.)

Belladonna.

Сонная одурь. Растеніе (*Atropa Belladonna*) семейства *Пасленовыхъ* (Solaneae, Juss.).

Явленія, соотвѣтствующія этому медикаменту суть: колющія и жгучія боли съ опуханіемъ пораженныхъ частей; сильныя судороги съ крикомъ, возобновляющіяся иногда отъ досады или прикосновенія къ пораженной части; *отвращеніе къ свѣжему воздуху*, частые обмороки; усиленная чувствительность всей нервной системы; *приливъ крови къ пораженной части, съ чувствомъ въ ней полноты*; усиленіе страданій при движеніи и прикосновеніи къ больной части; красная, глянцевитая опухоль страждущей части; *глубокій латарическій сонъ* или бессонница съ напраснымъ стремленіемъ уснуть; *жгучій жаръ попеременно съ ознобомъ*; мѣстный холодъ съ головнымъ жаромъ; *сильная тоска и безпокойство* или усиленная впечатлительность всѣхъ чувствъ; упрямство, слезы и рыданія; *яростный бредъ*; потеря сознанія, причемъ пациентъ узнаетъ родныхъ и знакомыхъ только по слуху; *сильная боль во лбу* или жгучее колотье надъ глазами; головная боль съ сильнымъ біеніемъ сонныхъ артерій, головокруженіемъ и шумомъ въ ушахъ; глаза на выкатѣ, красные, блестящіе или впалые, тусклые; сильное *расширеніе* или суженіе зрачковъ; взглядъ при-

стальный, дикій; воспалительная краснота глазъ съ чувствомъ гнетенія въ орбитахъ, жаромъ, свѣтобоязнью, истеченіемъ ѣдкихъ, жгучихъ слезъ; куриная слѣпота; вздутое *красное и горячее лицо*, или впалое и блѣдное; шумъ въ ушахъ; кровотеченіе ртомъ и носомъ; подергиваніе мускуловъ лица; язвы въ углахъ рта; *судороги и стягиваніе гортани съ затрудненіемъ при глотаніи*; *сильная жажда, нередко съ отвращеніемъ ко всякой жидкости*; сухость и краснота рта и зѣва, которые, впрочемъ, бываютъ иногда подернуты бѣлой слизью; вѣтры, при которыхъ ободочная кишка сильно выдается наружу въ видѣ опухоли; боль въ животѣ съ чувствомъ судорожнаго стягиванія, запоръ или поносъ съ изверженіемъ слизи; невольное испражненіе; чувство гнетенія въ женскихъ половыхъ частяхъ, какъ будто все готово вырваться наружу; чувствительность живота къ прикосновенію, какъ будто онъ изъязвленъ; болѣзненная чувствительность глотки съ опасеніемъ задохнуться при ощупываніи; короткий и судорожный кашель, съ колотьемъ въ животѣ и груди; боль въ затылкѣ и шеѣ, ощущаемая при повертываніи головы. (Патоген. изсл. Ганеманнъ.)

Bismuthum.

(*Bismuth. subnitricum, Magisterium Bismuthi.*)

Азотнокислая окись бисмута. Фармацевтический препаратъ.

Полезно при слѣдующихъ симптомахъ: судорожное сокращеніе всѣхъ мускуловъ; давящія боли или давящія и стягивающія за-разъ; чрезвычайная сонливость утромъ, когда встанешь съ постели; пробужденіе ото сна со вздрагиваніемъ и испугомъ; сладострастные грезы; чувство утомленія, когда просыпаешься ночью; сильное жженіе въ кожѣ; наружный холодъ по всему тѣлу; сильный жаръ; малый, перемежающійся пульсъ; неудовольствіе, мрачное расположеніе духа и сѣтованія; непостоянство; отвращеніе къ уединенію; бредъ; *бредъ съ дрожаніемъ у пьяницъ* (*delirium tremens*); потеря сознанія; апатія и равнодушіе. (Патоген. изсл. Ганеманнъ.)

Boletus laricis.

Лиственничная губка. Семейства *Грибовъ* (Fungi).

Рекомендуютъ противъ ночнаго пота у чахоточныхъ.

Borax veneta.

Бура. Бурнокислый натръ. Химическій препаратъ.

Оно употреблялось до сихъ поръ съ успѣхомъ при воспаленіи полости рта и противъ молочницы у дѣтей; полезно также тамъ, гдѣ *Cham.*, *Merc. sol.*, *Ign.*, *Bellad.* и *Puls.* не имѣли успѣха; кромѣ того, приноситъ пользу въ слѣдующихъ случаяхъ: *наклонность къ простудѣ и страданія отъ сыраго холоднаго воздуха*, отъ ѣзды или отъ употребленія плодовъ; болѣзненная чувствительность кожи, причемъ всякое поврежденіе ея съ трудомъ заживаетъ; рожистое воспаленіе, лишай; *тоскливый сонъ со вскрикиваніемъ*, опасеніе заразиться; пугливость и капризы, преимущественно у дѣтей; головная боль съ тошнотою, доходящею до рвоты, съ дрожью въ членахъ; слуханіе волосъ, подобно тому, какъ это бываетъ при колтунахъ; воспаленіе краевъ вѣкъ; слезотеченіе днемъ и слуханіе вѣкъ ночью; опуханіе и воспаленіе ушей съ гноетеченіемъ; болѣзненные, покрытыя струпьями и нарывами ноздри, съ опуханіемъ кончика носа; обильное истеченіе изъ носа зеленой, густой слизи; рожа на лицѣ; опухоль щекъ съ жаромъ и сильнѣйшею болью при смѣхѣ; верхняя губа покрыта шелудьями и лишаями; чувство дерганія въ гнилыхъ зубахъ и хрупкость ихъ; опухлыя, кровоточивыя десны; молочница и нарывы во рту и на языкѣ; обильное накопленіе слизи въ горлѣ; слабое пищевареніе и поносъ послѣ ѣды, рвота слизью, чувство давленія въ сторонѣ селезенки, преимущественно при ѣздѣ и движеніи; *обильное истеченіе изъ задняго прохода слизи во время или послѣ испражненія*, съ болями въ поясницѣ; поносы съ изверженіемъ желтой слизи; зеленыя испражненія у грудныхъ дѣтей; *зловонная, острою запаха моча*; легкое зачатіе; чувство сильнаго напряженія въ подреберныхъ мускулахъ; сильныя боли въ поясницѣ. (Патоген. изсл. Ганеманнъ.)

Bromium.

(Bromum.)

Бромъ. Простое тѣло.

Повидимому дѣйствуетъ на головной мозгъ, слизистую оболочку глазъ, носа, гортани и дыхательнаго горла, на легкія, сердце, слизистую оболочку рта, глотки и всего кишечнаго канала, на слезныя и слюнные желъзы, печень и нервы. — Давящія боли; потягиваніе; ломъ, біеніе; одуряющая боль; — щекотаніе; также съ покальваніемъ; — зудъ, щемленіе, также съ давленіемъ; — жженіе, боль какъ бы отъ изъязвленія; сильное утомленіе; припадки уменьшаются отъ нюханія аммоніакальнаго (нашатырнаго) спирта.

Bryonia alba.

Переступень. Растеніе сем. Тыквенныхъ (Cucurbitaceae, Juss.).

Это средство назначается при слѣдующихъ симптомахъ: чувство напряженія и стрѣльбы въ больной части, причемъ двигать ею бываетъ трудно, во время покоя на больной части появляется потъ, а когда боль уменьшается, начинается дрожаніе; чувство разбитости, причемъ иногда кажется, что мяккія части отдѣляются отъ костей; чрезвычайная первная слабость, принуждающая пациента не покидать постели; желтизна лица; усиленіе страданій отъ движенія и прикосновенія, также по утрамъ при пробужденіи, по вечерамъ и ночью; краснуховидныя сыпи, натянутыя опухоли, горячія, красныя или блѣдныя, твердыя, узловатыя опухоли на кожѣ; рожистое воспаленіе на суставахъ; бессонница или утомительная спячка; ночное волненіе крови, съ жаромъ, мучительными грезами и бредомъ; ознобъ и холодныя тѣла, нерѣдко сопровождаемые жаромъ и краснотою лица; непрерывный, дневной и ночной потъ, иногда жирный, или сухой жаръ съ сильной жаждой; тоска и безпокойство, чрезмѣрныя заботы о своемъ здоровьѣ и утрата надежды на выздоровленіе; сильное расположеніе къ оморченію, вспыльчивости и инъсу; усиленная воспримчивость всѣхъ чувствъ, особенно зрѣнія и слуха; приливъ крови къ го-

ловѣ, съ чувствомъ жара въ ней и сильной болью во лбу; головная боль съ тошнотою и рвотою, и усиленіе боли при малѣйшемъ движеніи, даже глазами; волосы на головѣ очень жирны; красное раздутое или *желтое, землянаго цвѣта* лицо, иногда съ круговидною краснотою на щекахъ, сухія, растрескавшіяся губы; сухость рта и языка; дурной запахъ изо рта; неприятный или гнилой вкусъ во рту, или пища кажется горькою; склонность къ вину, кислымъ веществамъ или кофе; *рвота пищею* или желчью; болѣзненное ощущеніе давленія въ желудкѣ и подъ ложечкой; болѣзненная чувствительность печени; натискъ одежды невыносимъ; *упорный запоръ* или поносъ по утрамъ и ночамъ съ изверженіемъ желтыхъ веществъ; гнилостные поносы; скудная, кофейнаго цвѣта моча; насморкъ съ сухостью и залеганіемъ носа; *сухой кашель* съ судорожнымъ потрясеніемъ тѣла или рвотою; кашель съ отхаркиваніемъ спекшейся крови; головная боль при кашлѣ, усиливающаяся до того, что больному кажется, будто черепъ его долженъ лопнуть; *колотье въ груди, особенно съ боку, усиливающееся при кашлѣ, дыханіи и движеніи; глубокое дыханіе со вздохами* или короткое и тяжелое. (Патоген. изсл. Ганеманнъ.)

Bufo.

(*Rana Bufo, Bufo sahytiensis.*)

Жаба, жабный ядъ, слюна жабы, животного класса *Лягушечныя* (Batrachia), семейства *Anura*.

Лѣкарство это имѣетъ почти специфическое отношеніе къ спинному и головному мозгу, а потому его рекомендуютъ какъ прекрасное средство противъ падучей болѣзни.

Кромѣ того, оно употребляется противъ костоѣды спинныхъ позвонковъ и размягченія мозга, столбняка, мигрени, слабости зрѣнія, воспаленія почекъ, полового истощенія, гипертрофіи сердца и ногтоѣды.

Cactus grandiflorus.

Кактусъ большецвѣтный. Растеніе семейства *Кактусовыя* (Cactaeae).

Дѣйствуетъ сильно на сердце, дыхательные органы и матку. Его съ успѣхомъ употребляли при гипертрофіи (ожиреніи) сердца,

воспаленіи околосердечной сумки съ чувствомъ стягиванія около сердца какъ бы желѣзной рукой, острой болью, колотьемъ около сердца, стѣсненіемъ дыханія, припадками удущья съ обморокомъ, холоднымъ потомъ и сердцебіеніемъ. Противъ мигрени въ правомъ вискѣ, вызываемой утромъ виномъ, посѣщеніемъ театра и т. п., позднимъ ужиномъ, больной не выноситъ свѣта и шума, необходимъ величайшій покой. Ревматическая головная боль; ревматизмъ мускуловъ съ переходомъ на сердце, чувство стягиванія въ немъ. Лихорадка ревматическая, гастрическая и перемежающаяся, припадки послѣдней являются передъ обѣдомъ или ночью, ознобъ, затѣмъ жаръ, съ головной болью, одурѣніемъ, спячкой, нечувствительностью, жаждою, одышкою, невозможностью лежать, обильнымъ потомъ, виѣ пароксизма больной чувствуетъ себя вполне здоровымъ. Личная боль, вызываемая физическимъ напряженіемъ, виномъ, музыкой, свѣтомъ, голодомъ, въ покоѣ — лучше. Разстройство регулъ съ сильной, вызывающей крикъ болью, появляется періодически, большею частью вечеромъ; недостаточныя регулы съ чувствомъ стягиванія около сердца. Воспаленіе вѣтвей дыхательнаго горла, воспаленіе легкихъ и подреберной плевы.

Caladium seguinum.

Ядовитый аронъ или клещинецъ. Растеніе семейства *Аройнико-выхъ* (Aroïdeae).

Употребляется при слѣдующихъ явленіяхъ: отвращеніе ко всякому движенію, съ постояннымъ желаніемъ лежать; легкіе приступы обморока послѣ письма или размышленія, также когда больной лежалъ и потомъ встаетъ; ослабленіе всѣхъ симптомовъ послѣ короткаго сна днемъ и исчезновеніе боли во время испарины; жгучая боль на небольшихъ пространствахъ кожи, съ непреодолимымъ влеченіемъ прикасаться къ нимъ пальцами; болѣзненная чувствительность къ ужаленію комарами; на предплечіи или на груди — крупная просовидная сыпь съ зудомъ и жаръ, попеременно съ стѣсненіемъ дыханія. (Патоген. изслѣд. Герингъ.)

Calcarea acetica.

Уксусовислая известь. Химический препаратъ.

Лѣкарство это соотвѣтствуетъ преимущественно сырому, золотушному, вялому, слабому тѣлосложенію, при плохомъ питаніи, съ расположеніемъ къ слизетеченіямъ, катарру и поносу. Хроническій поносъ у дѣтей съ изверженіемъ кисло-пахучихъ веществъ, во время прорѣзыванія зубовъ. Слизистыя или зеленоватыя испражненія, большею частью безъ боли. Большой блѣдень, опуханіе желѣзь живота, обрюзглое лицо, вѣтры. Размягченіе желудка у взрослыхъ, особенно при преобладающемъ поносѣ. Худоба дѣтей и замедленіе способности ходить, изъязвленіе десенъ. Невареніе желудка, изжога, кислоты, рвота и другія страданія желудка. Изъязвленіе сосковъ у кормящихъ грудью. Хроническій катарръ легкихъ. Бѣли.

Calcarea carbonica.

Углекислая известь, получаемая изъ раковины устрицы (*Ostrea edulis*) сем. *Безиловыхъ* (Acerphalae). По Ганеманну.

Бываетъ однимъ изъ дѣйствительнѣйшихъ средствъ при недугахъ кожи, желѣзь и костей, особенно когда съ этими недугами сопряжено измѣненіе самаго вещества костей. Средство это оказывается полезнымъ также при слѣдующихъ симптомахъ: слабость и атрофія; увеличеніе объема головы у дѣтей и позднее привыканіе къ ходьбѣ; *потягиваніе и сведеніе* въ нѣкоторыхъ частяхъ тѣла, особенно въ пальцахъ рукъ и ногъ; ощущеніе разрыванія и колотье въ членахъ, преимущественно по почамъ, также лѣтомъ и при перемѣнѣ погоды; *онѣмнѣніе и омертвѣніе нѣкоторыхъ членовъ или частей тѣла; припадки повторяются или усиливаются отъ работъ, при которыхъ имѣешь дѣло съ водой*, а также вечеромъ, ночью, утромъ, черезъ день; чрезвычайная нервная слабость и желаніе предаться дѣйствию магнетическаго сна; большая склонность къ простудѣ и чувствительность къ холодному, вольному воздуху; сильная худоба или чрезвычайная полнота; быстрое утомле-

ніе отъ ходьбы или физическаго напряженія; блѣдность и жесткость кожи; крапивная сыпь; множество бородавокъ; мокнущая струповидная сыпь и лишай; тресканіе кожи, опрѣлости и зловонныя язвы; бессонница вслѣдствіе обилія мыслей и фантастическихъ образовъ; летучій жаръ; обильный потъ при ходьбѣ, движеніи или ночью; частый ознобъ; меланхолическая печаль и слезливость; *тоска и страхъ*, преимущественно въ сумерки; опасеніе заразиться, захворать, подвергнуться какому-нибудь горю или несчастію; сильные приливы крови къ головѣ; сыпь, парша и выпаденіе волосъ на головѣ; сильное расширеніе зрачковъ; кровавистый эксудатъ (выпотѣніе) изъ глазъ; безобразіе носа, съ краснотой кончика; *блѣдность, худоба и старческій видъ лица*; мокнущая сыпь на немъ; опуханіе подчелюстныхъ и шейныхъ желѣзъ; постоянная жажда, потеря аппетита, увеличеніе живота, съ опуханіемъ брыжжейчныхъ желѣзъ; частый голодъ; продолжительное отвращеніе къ мясной пищѣ; сильный аппетитъ на вино и сласти; долговременный поносъ или запоръ; сильное изнеможеніе и утомленіе отъ неумѣренныхъ половыхъ наслажденій; преждевременныя, обильныя менструаціи; кашель съ отдѣленіемъ зловонной, гнойной, желтой мокроты, продолжительная охриплость. (Патоген. изсл. Ганеманнъ.)

Calcarea jodata.

Иодистая известь. Химическій препаратъ.

Золотушное хроническое воспаленіе глазъ; воспаленіе горла у золотушныхъ, которое часто повторяется, съ чувствомъ какъ будто обнажено мясо или боль какъ отъ ранъ, колотье, чувство сдавливанія, нарывы, накопленіе мокроты, необходимость постоянно глотать или затрудненное глотаніе; гноетеченіе изъ ушей, въ закоренѣлыхъ случаяхъ.

Calcarea phosphorica.

Фосфорнокислая известь. Химическій препаратъ.

Употребляется противъ хроническаго страданія костей (англійская болѣзнь), боли въ спинѣ съ искривленіемъ позвоночнаго столба. Ревматизмъ. Боль въ суставахъ отъ простуды. Костоѣда.

Calendula officinalis.

Ноготки. Растеніе сем. *Щитконосныхъ* (Corymbiferae, Juss.).

Полезно при слѣдующихъ явленіяхъ: ревматическія боли только при движеніи; когда рана затвердѣла и воспаляется; утромъ въ ней боль, какъ будто содрана кожа, и чувство разбитости; колотье, какъ будто рана начинаетъ гноиться; около раны краснота съ колотьемъ и даже лихорадочнымъ жаромъ. Особенно хорошо дѣйствуетъ это средство, употребляемое наружно и внутрь, на образованіе рубцовъ (заживленіе) на ранахъ. Полезно также, когда почти всѣ припадки сопровождаются лихорадочнымъ ознобомъ; когда при ходьбѣ или при совершенномъ спокойствіи пациентъ чувствуетъ себя всего лучше. Рекомендуютъ особенно противъ открытыхъ ранъ и нарывовъ съ подтеками крови, воспаленіемъ, кровавымъ и водянистымъ изліяніемъ въ клетчатку и лихорадкой. Это средство также весьма хвалятъ какъ останавливающее кровотеченіе; оно также предохраняетъ раны отъ антонова огня (противугниlostное средство). Употребляется, какъ Tinct. Arnicae, внутрь и наружно, въ чистомъ видѣ или на половину съ водой.

Camphora.

Камфора. Летучее смолистое вещество изъ растенія *Laurus Camphora*, сем. *Лавровыхъ* (Laurineae, Juss.).

Употреблялась до сихъ поръ съ успѣхомъ противъ: азіятской холеры, гриппа, припадковъ падучей болѣзни, тифозной горячки, водянки, послѣдствій солнечнаго удара и т. п. Оказывается также полезною при слѣдующихъ явленіяхъ: появленіе приступовъ при движеніи и ночью; когда больные невнимательны къ самимъ себѣ; усиленіе страданій на холоду и открытомъ воздухѣ; чувство сухости тѣла; упадокъ силъ до крайней слабости; *столбнякъ* и *конвульси* со рвотою и потерю сознанія; кожа блѣдная, вялая, въ морщинахъ; сильная спячка, съ храпѣніемъ; *общій холодъ тѣла*, съ *мертвенною блѣдностью лица*, синевою кожи и холоднымъ потомъ; сильная тоска и упадокъ дѣятельности всѣхъ

чувствъ; жженіе во рту, глоткѣ и желудкѣ; *сильный внутренний жаръ* при холодѣ наружныхъ частей; недостатокъ полового возбужденія и вялость дѣтородныхъ органовъ; тяжелое, медленное дыханіе, съ приступами удушья; чрезмѣрное накопленіе слизи въ дыхательныхъ путяхъ, отъ котораго дыханіе затрудняется. Служитъ antidотомъ противъ дѣйствія испанскихъ мухъ. (Патоген. изслѣд. Ганеманнъ.)

Cannabis indica.

Конопля Индійская, Китайскій огонекъ. Растеніе сем. *Крапивныхъ* (Urticeae, Juss.). Гашишъ (Haschisch) есть экстрактъ изъ Индійской конопля.

Средство еще мало испытанное. Употребляютъ противъ страданій нервной системы, разстройства мозга и нѣкоторыхъ видовъ помѣшательства. Рекомендуются также противъ слизетеченія изъ мочевого канала, подобно Cannabis sativa. Въ Турціи и Индіи у лицъ, долгое время употреблявшихъ гашишъ, замѣчается лѣнь, притупленіе чувствъ, ослабленіе памяти, нерѣдко — умопомѣшательство.

Cannabis sativa.

Конопля. Раст. семейст. *Крапивныхъ* (Urticeae, Juss.).

Средство вообще мало изслѣдованное; употребляется съ пользою противъ истерики; противъ недуговъ отъ усталости и тѣлеснаго напряженія; сумасшествія и другихъ душевныхъ недуговъ; золотушнаго воспаления глазъ; *блѣнна, потемнѣнія и пятны на роговой оболочкѣ*; желудочныхъ и желчныхъ недуговъ; судорогъ желудка; затвердѣнія печени; судорожной колики; водянки живота; *домовременныхъ запоровъ*; воспаления почекъ и мочевого пузыря; *кровоистой мочи и другихъ мочевыхъ недуговъ*; мочевыхъ камней; *остраго перелома*; бѣлей, бесплодія; выкидыша; катарральныхъ страданій, воспаления плевры; припадковъ одышки; болѣзней сердца и т. п. (Патоген. изсл. Ганеманнъ.)

Cantharides.

Шпанскія мухи. Насѣкомое (*Lytta vesicatoria*) сем. *Жесткокры-
мыль* (Coleoptera).

Употребляется при слѣдующихъ припадкахъ: чрезмѣрное ко-
лотье и раздирающая боль, направляющаяся снаружи внутрь; *жу-
чая боли, какъ бы отъ изъязвленія въ слизистыхъ оболочкахъ*; преиму-
щественно поражена правая сторона тѣла; худоба и слабость,
принуждающія больнаго лежать; уменьшеніе страданій въ этомъ
положеніи; *конвульсивное метаніе* членовъ съ страшнымъ крикомъ
и ревомъ; столбнякъ; оцѣпенѣніе спинныхъ мускуловъ и сведеніе
челюстей; сухая, горячая кожа; сильный холодъ и ознобъ, или
жукая лихорадка съ жаромъ; сильное безпокойство и тоска, вы-
нуждающія больнаго безпрестанно мѣнять свое мѣсто; припадки
сумасшествія и бѣшенства, съ судорогами; возобновленіе этихъ
припадковъ при видѣ воды или прикосновеніи къ ней; у пациента бо-
лѣзненный, *страдальческій видъ*; мертвенное, впалое, гипократиче-
ское лицо; сильная блѣдность и желтоземляной цвѣтъ лица; ис-
теченіе пѣнистой слюны; пузырьки на языкѣ и деснахъ; *затруд-
неніе при глотаніи*, особенно жидкостей; *жукая жажда съ от-
вращеніемъ ко всему жидкому*; рвота пищеею или кровью, сопро-
вождаемая припадками удушья; запоръ, твердые испражненія, или
поносъ съ отдѣленіемъ обильной кровянистой слизи; *сильная боль
въ шейкѣ мочевого пузыря*; остановка отдѣленія мочи и прекра-
щеніе всякаго позыва на нее; или *сильный позывъ на мочу, но она
отдѣляется каплями*; *сильная половая похоть, доходящая до не-
истовства*; воспаленіе и омертвѣніе половыхъ органовъ; сильный
катарръ, съ отдѣленіемъ изъ носа клейкой слизи; чувство слабос-
ти въ груди и тихая, робкая рѣчь. (Патоген. изсл. Ганеманнъ.)

Capsicum annuum.

Стручковый перецъ. Растеніе сем. *Пасленовыхъ* (Solaneae, *Juss.*).

Полезно при слѣдующихъ симптомахъ: боль какъ бы отъ вы-
виха, негибкость пораженныхъ параличемъ частей, особенно въ

началѣ движенія; *сильная мнѣ, тяжесть и отвращеніе къ движенію*; ознобъ и холодъ тѣла, сильная впечатлительность къ холодному воздуху и сквозному вѣтру; ознобъ и холодъ каждый разъ послѣ питья; раздражительный характеръ, при которомъ пациентъ все принимаетъ въ дурную сторону и имѣетъ наклонность къ клеветѣ; слабость умственныхъ способностей, которыя какъ бы парализованы, причемъ въ головѣ чувство пустоты; блѣдность и краснота щекъ попеременно; слизистыя испраженія съ натугою. (Патоген. изсл. Ганеманнъ.)

Carbo animalis.

Животный уголь. Фармацевтический препаратъ.

Употребляется при слѣдующихъ явленіяхъ: *давящія боли въ суставахъ* и мускулахъ членовъ; *жгучія боли*; *ночныя боли въ суставахъ*; разбитость, недостатокъ силы и трескъ въ суставахъ, которые легкогибаются; *ломотная окованность* и узловатости въ суставахъ, какъ при подагрѣ; напряженіе въ нѣкоторыхъ членахъ, какъ бы отъ сокращенія сухожилій; судорожное стягиваніе нѣсколькихъ частей тѣла; *расположеніе къ надсадѣ*; нечувствительность всѣхъ членовъ, особенно головы; сильная усталость и слабость, преимущественно отъ ходьбы, причемъ легко возбуждается испарина; *сильная чувствительность на открытомъ воздухѣ* и особенно на холоду, зимой; чувство кипѣнія крови и расположеніе къ быстрому разгоряченію. (Ганеманнъ.)

Carbo vegetabilis.

Растительный уголь. Фармацевтический препаратъ.

Боли съ тоскою, жаромъ и совершеннымъ лишеніемъ бодрости, или съ изнеможеніемъ послѣ приступовъ; *острая подрывающія и стягивающія ломотная боли*, съ слабостью и онѣмѣніемъ, преимущественно въ оконечностяхъ, и страданія отъ вѣтровъ, — или съ стѣсненіемъ дыханія, когда поражена грудь; боль въ членахъ какъ бы отъ вывиха или чувство надсады; *жгучія боли* въ членахъ и костяхъ; біеніе жилъ въ различныхъ частяхъ тѣла; страда-

нія вслѣдствіе надады или ѣзды въ повозкѣ; дрожаніе членовъ днемъ; члены легко нѣмьютъ; большая часть симптомовъ появляется при ходьбѣ на вольномъ воздухѣ; худѣніе, особенно въ лицѣ; чувство разбитости во всѣхъ членахъ, особенно утромъ, маишь только пациентъ встанеть; большая слабость сгибабельныхъ мускуловъ; чрезмѣрное изнеможеніе, часто доходящее до обморока, даже утромъ, въ постели, или при началѣ ходьбы; быстрый упадокъ силъ; изнеможеніе всего организма около полудня съ необходимостью опереть голову и отдохнуть; расслабленіе и совершенное отсутствіе пульса; расположеніе къ простудѣ; слабость пищеваженія, запоръ. (Ганеманнъ.)

Carduus marianus.

(*Silybum marianum.*)

Остро-пестро, Марьянъ татарникъ. Растеніе сем. *Артишоковыхъ* (Cynarcephalae.)

Средство это мало извѣстно на практикѣ. Въ недавнее время Д-ръ Вольфъ въ Бѣрлинѣ рекомендовалъ *Carduus marianus* противъ воспаленія печени при совмѣстномъ страданіи легкихъ и кровохарваніи.

Caulophyllum thalictroides.

Стебелеистникъ. Растеніе сем. *Лютиковыхъ* (Ranunculaceae.)

Головная боль съ головокруженіемъ, мутнымъ зрѣніемъ, давленіемъ позади глазъ, опуханіемъ сонныхъ артерій; ревматическая и нервная головная боль, съ пораженіемъ матки и раздраженіемъ спиннаго мозга. Ревматизмъ суставовъ руки и пальцевъ, съ значительнымъ опуханіемъ, или во время походовъ — ревматизмъ спины, затылка, съ одеревянѣніемъ членовъ, давленіемъ въ груди, одышкой и бредомъ. Параличъ, являющійся отраженіемъ разстройства другихъ органовъ и поражающій преимущественно нижнія оконечности. Пляска св. Витта, судороги желудка въ связи съ раздраженіемъ матки, слабость желудка съ судорожными припадками; бессонница отъ нервной слабости; истерика; кровотеченіе изъ

матки при угрожающемъ выкидышѣ, раздраженіи сосудовъ, гнетени книзу, или пассивное кровотеченіе послѣ выкидыша, послѣ родовъ, съ дрожаніемъ отъ слабости; регулы съ болью и раздраженіемъ, приливомъ крови къ матки, скуднымъ отдѣленіемъ крови, истерическими судорогами груди, кадыка, пузыря и прямой кишки; слизистыя бѣли.

Causticum.

Каустикъ. Ганеманово ѣдкое вещество, получаемое черезъ перегонку смѣси изъ воды, гашеной извести и двуѣрнooksлаго кали. Фармацевтичскій препаратъ.

Чувство дерганія, колотья и потягиванія въ суставахъ и костяхъ, ослабѣваетъ въ теплотѣ; искривленіе нѣкоторыхъ частей тѣла или онѣмѣніе, частая нечувствительность оныхъ; стягиваніе гибательныхъ мускуловъ; усиленіе болей послѣ кофе, по вечерамъ и на открытомъ воздухѣ; сильная чувствительность къ холоду, открытому воздуху и сквозному вѣтру; нетвердая походка у дѣтей, при которой они легко падаютъ; сильное волненіе крови и безпокойство въ тѣлѣ; параличная слабость, сопровождаемая дрожаніемъ членовъ и доходящая до обморока; *параличь*, преимущественно голосовыхъ и глотательныхъ органовъ; *сыти, похожія на чесоточныя*; колющій зудъ съ жженіемъ и краснота послѣ чесанья; жженіе во всѣхъ мѣстахъ, до которыхъ ни дотронешься; большое количество *бородавокъ* и варикозныхъ узловъ; сильная сопливость, близкая къ спячкѣ; сильная *зѣбкость и обильный потъ*, особенно ночью или при движеніи на открытомъ воздухѣ; уныніе и мрачныя мысли; сильная тоска и робость; сварливость, впечатлительность, которая все принимаетъ въ дурную сторону, и вспыльчивость; большія бородавки на лицѣ, носу и въ бровяхъ; слипаніе вѣкъ ночью отъ гноя; темная пелена и искры передъ глазами; истеченіе изъ ушей; залеганіе носа и непрерывный насморкъ; *желтое, страдальческое лицо*, желтоватые виски и блѣдносинева-тыя губы; цинготное состояніе десенъ и шатаніе зубовъ; глотаніе затрудняется чувствомъ стягиванія въ горлѣ; отвращеніе къ сладкимъ; давленіе въ желудкѣ даже отъ употребленія въ пищу хлѣ-

ба; расположеніе къ пустой отрыжкѣ и чувство тягости, когда этой отрыжки нѣтъ; раздутый животъ у дѣтей; долговременный запоръ; напрасный позывъ на низъ, съ судорожнымъ стягиваніемъ задняго прохода; при этомъ калъ выходитъ весьма небольшими кусками; *невольное испусканіе мочи*, преимущественно во время кашля, чиханья и ходьбы; недуги во время регулъ; судороги матки; бѣли; долговременная охриплость и слабость голоса, происходящая какъ бы отъ паралича гортанныхъ мускуловъ; чувство садненія въ груди и гортани, особенно во время кашля; судорожное удушье, какъ будто шея и грудь сдавлены одеждой; колотье въ сторонѣ сердца, опухоли шейныхъ желѣзъ, похожія на зобъ. (Ганеманъ.)

Chamomilla vulgaris.

Ромашка. Раст. (*Matricaria chamomilla*) сем. *Щитконосныхъ* (Compositae, *Juss.*) или *Сложноцветныхъ* (Compositae, *Adanson*).

Параличъ и оиѣмѣніе параженныхъ частей съ постояннымъ побужденіемъ двигать ихъ или передвигать съ мѣста на мѣсто, причѣмъ такое состояніе отъ наружной теплоты облегчается; боли, похожія на біеніе, какъ при опухоли; *усиленная впечатлительность всѣхъ чувствъ*, причѣмъ малѣйшая боль кажется нестерпимою, сильная чувствительность къ воздуху, простому и сввозному вѣтру; обморокъ; въ началѣ припадковъ до того большая слабость, что больной не можетъ держаться на ногахъ; судорожное дерганіе въ губахъ, мускулахъ лица, глазахъ и вѣкахъ; вздрагиваніе во время засыпанія; *болѣзненность кожи*; сыпи, похожія на краснуху; болѣзненные нарывы съ жженіемъ и зудомъ ночью; желтизна кожи; ночью сонъ не спокоенъ; больной вскакиваетъ, кричитъ, мечется; бессонница отъ тоски и фантастическихъ призраковъ; дремота съ грезами, похожая на одурѣніе; сильная *дрожь* при внутреннемъ жарѣ; *мыгарадочный жаръ*, сопровождаемый *краснотой щекъ*, *горячимъ потомъ на лбу*, *головѣ и даже на волосной кожѣ*; *тоска до того сильная, что больной выходитъ изъ себя, мечется и стонетъ*; ипохондрическая раздражительность, чувствительность и сварливость; капризный плачъ дѣтей при от-

казѣ исполнить какія-нибудь ихъ желанія; мрачное тупоуміе; приливъ крови къ головѣ съ ощущеніемъ въ ней стука; *краснота и жаръ лица*, особенно *одной какой-нибудь щеки*; морщины надъ носомъ; частая перемѣна въ цвѣтѣ лица; гнилой запахъ изо рта, преимущественно послѣ принятія пищи; невозможность глотать твердую пищу; красный, растрескавшійся языкъ; гнилой вкусъ во рту, рвота желчью или кислыми веществами; *сильное давленіе въ желудкѣ*, причемъ кажется, что сердце сдвигается съ своего мѣста; вздутость подреберной страны, задержаніе дыханія; поносъ съ зелеными испражнениями, похожими на рубленныя яица. (Ганеманнъ.)

Chelidonium majus.

Чистотѣль. Раст. сем. *Маковыхъ* (Papaveraceae, Juss.).

Средство еще мало изслѣдованное. Употребляется при *параличномъ стягиваніи и параличѣ въ различныхъ частяхъ тѣла*; приступахъ коченѣнія; стрѣльбѣ въ разныхъ частяхъ тѣла; судорожныхъ боляхъ; сильномъ утомленіи и лѣности утромъ послѣ пробужденія; отвращеніи къ движенію; нездоровьи безъ опредѣленныхъ страданій; сонливости, причемъ больной однако *не можетъ спать*; вздрагиваніи во время засыпанія; частомъ пробужденіи; *преобладаніи дрожи* и озноба; изнеможеніи; безпокойствѣ за настоящее и будущее; паршѣ на головѣ, лишаяхъ на лицѣ. (Ганеманнъ.)

Chimaphila umbellata.

Химафила зонтичноцвѣтная, крещатый барвинокъ. Растен. семейства *Вересковыхъ* (Ericaceae).

Воспаленіе пузыря, катарръ пузыря, затрудненное испусканіе мочи, кровавая моча при трипперѣ, золотуха (дѣйствуетъ какъ іодъ и желѣзо), водянка почекъ, бѣлковинная моча. Вообще мало изслѣдовано.

China.

Хина. Кора растений *Cinchona cordifolia* и *lancifolia* сем. *Мареновыхъ* (Rubiaceae, Juss.).

Чувство подергиванія и разрыванія, усиливающееся отъ прикосновенія и соединенное съ параличною слабостью пораженныхъ частей; летучія боли, особенно въ началѣ ходьбы, попеременно съ болями во внутреннихъ частяхъ тѣла; безпокойство въ пораженной части, побуждающее пациента безпрестанно двигать ее или мѣнять положеніе; нечувствительность и легкое онѣмѣніе членовъ; болѣзненное чувство разбитости въ суставахъ, особенно отъ лежанія, уменьшающееся при ходьбѣ; усиленіе боли, особенно при прикосновеніи, а также послѣ обѣда и ночью; усиленная раздражительность всѣхъ чувствъ съ болѣзненнымъ ощущеніемъ слабости; болѣзненное утомленіе въ суставахъ, съ чувствомъ давленія, какъ бы тяжестью, сильная тяжесть въ членахъ и отвращеніе къ занятіямъ; параличная слабость, сопряженная съ дрожаніемъ членовъ; чрезвычайное изнуреніе и худоба; желтизна кожи, водяночныя (гидропическія) или твердыя, красныя, воспалительныя опухоли; чрезвычайная сонливость днемъ и тревожный сонъ ночью, вслѣдствіе возбужденія воображенія и обилія мыслей; тревожный, не укрѣпляющій ночной сонъ, съ тяжелыми мучительными презами и безсознательнымъ пробужденіемъ; холодъ, ознобъ, дрожь; при лихорадкѣ жажда, особенно во время пота, до и послѣ озноба; ипохондрическая апатія съ неохотою къ разговору; презрѣніе ко всему: все кажется противнымъ и ничтожнымъ; сварливость и особенная склонность къ клеветѣ; напоръ мыслей и затрудненіе при приведеніи ихъ въ порядокъ; чувство давленія въ головѣ по ночамъ; болѣзненное ощущеніе въ мозгу при умственныхъ работахъ, причемъ мозгъ какъ бы разбитъ; приливъ крови къ головѣ съ болью до того сильною, что пациенту кажется, будто черепъ готовъ лопнуть; болѣзненная чувствительность при прикосновеніи къ волосной кожѣ головы; глаза желты; звонъ въ ушахъ; слабость зрѣнія; больной все видитъ какъ бы въ туманѣ; лицо желтое, блеклое, землянаго цвѣта, чрезвычайно блѣдное; худоба лица съ глубоко впалыми глазами, окруженными синими кольцами, острый носъ;

гнилой запахъ изо рта, особенно утромъ; скопленіе во рту слизи или слюны; пища имѣетъ травяной или горькій вкусъ, слабость желудка и чувство тяжести послѣ ѣды; сильный аппетитъ на сладкое и вино; чувство давленія въ желудкѣ и вздутость живота, преимущественно послѣ ѣды; затвердѣлость и опухоль въ сторонѣ печени; частое выходеніе зловонныхъ вѣтровъ; поносъ съ испражненіемъ водянистой слизи или непереваренной пищи; половое возбужденіе съ сладострастными желаніями; частые приступы удушья, особенно по ночамъ; большое скопленіе слизи въ горлѣ и груди; давленіе между лопатками какъ бы отъ камня. (Ганеманнъ.)

Chininum sulphuricum.

Сѣрноокислый хининъ. Химическій препаратъ.

Болезнь поражаетъ сначала систему питанія, а затѣмъ уже другія; сначала кишечный каналъ, затѣмъ мозгъ, половые и мочевые органы, наконецъ оконечности и кожу; — *давящія боли*; *стрѣльба* или *съкущія боли*; бьющія, напрягающія, жгучія и растягивающія боли; терзающія, стягивающія боли или дрожаніе; *трескъ* въ суставахъ; — *терзанія*, особенно въ ногахъ, — съ дрожаніемъ членовъ, стягивающими болями въ ногахъ, въ рукахъ, во лбу и проч.; — *усиленіе симптомовъ черезъ 2 дня или ежедневно въ тотъ же часъ*; — *черезъ два дня послѣ принятія хинина замѣчается: стягиваніе во лбу съ недостаткомъ аппетита и испражненіями въ видѣ кашицы; боль во лбу вечеромъ или послѣ обѣда, съ жаромъ, жаждою, потомъ, — нервное кризисъ, чрезмерное нервное возбужденіе, съ тоскою, утомленіемъ, и даже истерическіе симптомы; спазма въ членахъ; конвульсія въ лѣвой сторонѣ, причѣмъ рвота желчью, поносъ, приливъ крови къ головѣ и сильная головная боль; — параличъ, сперва одной стороны, затѣмъ всеобщій; — утомленіе съ непрерывною зѣвотою; съ неспособностью къ работѣ и отвращеніемъ къ ней, причѣмъ дрожаніе членовъ, страшная слабость и дрожливость; — худаніе, даже съ изнурительной лихорадкой, потеря аппетита, запоръ, натянутый животъ, давленіе около пупка, тошнота, усиленіе ко рво-*

тѣ и разстройство умственныхъ способностей; худѣніе и водянка; — *дрожаніе членовъ, особенно ногъ, съ онемѣніемъ икръ, дрожаніе съ повсемѣстнымъ ознобомъ.* (Нѣмецкій Гомеоп. Журналъ.)

Cicuta virosa.

Омегъ. Растен. сем. *Зонтичныхъ* (Umbelliferae, Juss.).

Сильное развитіе венозной системы; боль какъ отъ изъязвленія или какъ бы послѣ толчка, удара; припадки столбняка; судороги (конвульсіи) членовъ; дрожаніе при всякомъ движеніи; гнойныя, сливающіяся сыпи съ желтыми струями; зябкость, холодъ и особенная охота грѣться у печки; опасенія за будущность; сильное изнеможеніе при мрачныхъ разказахъ; смѣшныя выходки какъ при помѣшательствѣ; *потеря сознанія и головокруженіе, причемъ больной заводитъ глаза; взглядъ пристально направленный въ одну сторону*; предметы дwoятся въ глазахъ, ощущеніе, какъ будто всѣ предметы чернѣютъ; гнойныя лишаи на лицѣ; сведеніе челюстей и скрежетъ зубовъ; истеченіе изо рта пѣны; затрудненіе при разговорѣ и глотаніи; жгучіе нарывы по краямъ языка; *необыкновенная охота псть древесный уголь*; частая икота; рвота кровью; боль въ животѣ, какъ бы отъ глисть, съ судорогами; невольное испусканіе мочи, какъ бы отъ паралича мочевого пузыря; затрудненное дыханіе, какъ бы отъ сдавливанія груди. (Ганеманнъ.)

Cimicifuga racemosa.

(*Actaea racemosa.*)

Клоповникъ американскій. Растен. Сѣверной Америки, семейства *Лютиковыхъ* (Ranunculaceae).

Слѣпота, оспа, воспаленіе мозга съ сильной головной болью, какъ будто съ каждымъ ударомъ сердца вгоняется въ голову клинъ по направленію отъ затылка къ темени, съ одеревянѣніемъ спины, судорогами, сильной болью въ глазахъ и опухшимъ языкомъ; страданія сердца. Cimicifuga ослабляетъ симптомы, регулируетъ лучше Digitalis при ревматическихъ страданіяхъ и пораженіи матки, при грудной жабѣ (angina pectoris), при воспаленіи околосердечной сумки послѣ ревматизма; нервный кашель съ

щекотаніемъ въ горлѣ; головная боль нервнаго и ревматическаго характера, въ зависимости отъ регулъ, какъ при *Nux. vom.*, *Glo-poin.*, *Spigelia*, *Digitalis*, *Ignatia* и *Belladonna*, хуже отъ движенія; при невралгическомъ ревматизмѣ, съ лихорадкою, мигренью; нервныя боли, особенно какъ рефлексъ страданія матки; раздраженіе спиннаго мозга безъ органической подкладки, у женщинъ, во время регулъ, подъ вліяніемъ погоды (сильныя дозы); изнурительная лихорадка съ поносомъ и потомъ, какъ въ острыхъ, такъ и въ хроническихъ случаяхъ, какъ въ первомъ, такъ и въ позднѣйшихъ періодахъ чахотки; на кашель *Cimicifuga* дѣйствуетъ какъ *Aconit.*, *Bryonia*, *Arnica* и *Veratr. virid.*; душевныя страданія вслѣдствіе разстройства кровообращенія (полнокровіе и кровотеченія), которое влечетъ за собой пораженіе мозга; раздраженіе нервовъ, пораженіе сердца, жаръ попеременно съ ознобомъ, дрожаніе, дерганіе пальцами, болтливость, ипохондрія, страшныя сны. Выпаденіе матки; родильная лихорадка съ маніей; отсутствіе или подавленіе регулъ вслѣдствіе простуды, съ ревматической болью въ членахъ, лихорадкой, головной болью, судорогами матки; бѣлыя всѣхъ видовъ (употреблять внутрь и наружно).

Cina.

Цвѣтварное сѣмя. Получ. отъ раст. *Artemisia contra* сем. *Шитконосныхъ* (*Comyumbiferae*, *Jussieu*).

Доселѣ съ пользою употреблялось противъ: недуговъ отъ потери соковъ, сухотки у дѣтей; золотухи, конвульсій, надучей болѣзни, эклампсїи и другихъ судорожныхъ страданій; перемежающейся лихорадки; воспаленія мозга; острой головной водянки у дѣтей и другихъ мозговыхъ недуговъ; возникающей темной воды и пятенъ на роговой оболочкѣ глазъ; гастрическихъ недуговъ; имистъ; непроизвольнаго мочеиспусканія въ постели; коклюша; послѣдствій онанизма. (Ганеманнъ.)

Cinnabaris.

Киноваръ. Сѣрнистая ртуть. Химическій препаратъ.

Ознобъ въ суставахъ; подираніе по кожѣ и подергиваніе въ рукахъ и ногахъ; боли съ онѣмвнїемъ въ членахъ, причѣмъ дѣ-

ность и клоненіе ко сну; ночью бессонница, которая однакожь не утомляетъ; кошмаръ послѣ полуночи. Опуханіе полового члена, перелой головки съ краснотою крайней плоти; кондиломы. (Ганеманнъ.)

Cinnamomum.

Корица (*Laurus cinnamomum*). Кора растенія Южной Азіи сем. *Лавровыхъ* (Laurineae).

Лѣкарство еще мало изслѣдованное. Употребляется противъ сильныхъ маточныхъ кровотеченій, произошедшихъ отъ подъема тяжестей или повиха у беременныхъ. (Дается крѣпкая тинктура, по нѣскольку капель на приемъ.)

Cistus canadensis.

Ладонникъ Канадскій, каменный розанъ. Растеніе сем. *Cystineae*.

Докторъ Герингъ (въ Филадельфій) первый изслѣдовалъ это средство и рекомендуетъ его противъ: послѣдствій досады, горловой боли отъ простуды, хроническаго воспаленія гортани, затрудненнаго отхаркиванія вязкой мокроты, зловоннаго дыханія, стѣсненія въ груди, отвердѣнія и нагноенія желѣзъ, цинготнаго изъязвленія десенъ, костоѣды нижней челюсти, истеченія гноя изъ ушей. Другіе врачи прописывали это средство противъ поноса, преимущественно кроваваго.

Clematis erecta.

Ломонось. Раст. сем. *Лютиковыхъ* (Ranunculaceae, *Juss.*).

Мало изслѣдовано. Употребляется противъ: недуговъ, произошедшихъ отъ злоупотребленія ртутью; *острого ревматизма суставовъ, развившагося вслѣдствіе перехода перелоя*; губчатыхъ наростовъ; хроническаго воспаленія глазъ; *опуханія и затвердѣнія яичекъ и желѣзъ*; хронической гонорреи; узловатыхъ ломотныхъ отложеній въ суставахъ; рака груди и т. п. (Ганеманнъ.)

Coca.

(Erythroxylon Coca.)

Кока. Листья дерева Южной Америки семейства *Краснодревесных* (Erythroxyleae).

Нервное возбужденіе, измѣнчивое, мрачное расположеніе духа; страсть къ уединенію, апатія; головокруженіе, одурѣніе головы, боль въ затылкѣ и надъ глазами; сильное отвращеніе къ свѣту съ разширеніемъ зрачковъ; шумъ и звонъ въ ушахъ; сухость въ горлѣ, при глотаніи въ горлѣ какъ бы ощущается опухоль; сильный аппетитъ, отрыжка, склонность ко рвотѣ; упорный поносъ со вздутіемъ живота, боль въ животѣ, бурчаніе, отдѣленіе вѣтровъ; темнубурая, скудная моча; щекотаніе какъ бы отъ пуха въ дыхательномъ горлѣ (ларунх). Пациентъ чрезвычайно легко поднимается на высокія горы, не чувствуя никакихъ припадковъ въ дыхательной системѣ; стѣсненіе въ груди, неправильное, тяжелое дыханіе; параличъ оконечностей; сердцебиеніе, пульсъ скорый, малый, нѣсколько слабый; глубокій, крепкій сонъ; эдематическія опухоли (отеки), блѣдность губъ и десенъ, зловонное дыханіе. (Д-ръ Клотаръ Мюллеръ.)

Cocculus.

Кукульванъ. Сѣмена раст. *Menispermum cocculus* сем. *Луноспмянныхъ* (Menispermeae).

Боль и чувство разбитости въ членахъ при движеніи; болѣзненная негибкость суставовъ, съ щелканіемъ въ нихъ; боль и страданія обнаруживаются только въ одной половинѣ тѣла; усиленіе страданій отъ питья, пищи, куренія табаку, питья кофе, сна, прикосновенія, пзды и разговора; сильная чувствительность къ открытому воздуху какъ холодному, такъ и теплomu; судороги и конвульсія при прикосновеніи къ ранамъ; эпилептическія судороги; дрожаніе членовъ; недостатокъ жизненности; чрезвычайная слабость, которая доходитъ до обморока и паралича; на кожѣ пятна, какъ бы отъ краснаго вина; холодныя опухоли желѣзъ съ

колотьемъ въ нихъ; блѣдность кожи; больной часто и сильно зѣваетъ; дремлетъ; вздрагиваніе, холодъ, ознобъ, иногда съ жаромъ кожи; мрачная задумчивость, тоска со слезами и чувствительностью, которая представляетъ больному все въ мрачномъ видѣ; головная боль, причемъ больному кажется, что голову какъ бы сжимаютъ или будто у него вырываютъ глаза; чувство пустоты въ головѣ; краснота и жаръ лица, особенно щекъ, съ жженіемъ. сильная сухость во рту; боль и жженіе въ пищепріемномъ горлѣ; затрудненіе при глотаніи, какъ бы причиняемое параличемъ пищепріемнаго горла; чрезвычайное отвращеніе къ пищѣ и питью, *тошнота доходящая до обморока*, особенно *во время ѣзды въ каретѣ*; спазмы въ желудкѣ тотчасъ же послѣ принятія пищи; вздутость живота и вѣтры; сильное стремленіе грыжъ выйти наружу; прекращеніе менструацій, причиняющее недуги; стѣсненіе дыханія какъ бы отъ суженія и стягиванія груди и горла; болѣзненное онѣмѣніе спины и поясницы. (Ганеманнъ.)

Coccus cacti.

(*Coccionella*.)

Кошениль, червецъ Мексиканскій. Насѣкомое класса *Полужесткокрылыхъ* (Hemiptera, Cuvier), семейства Coccida (*).

Когда болѣзнь сильнѣйшимъ образомъ поражаетъ особъ, у которыхъ преобладаетъ дѣятельность системы слизистыхъ оболочекъ, и расположеніе духа мрачно, то главными сферами дѣйствія этого лѣкарства служатъ дыхательныя, мочевыя и половыя органы, и оно возбуждаетъ ощущенія преимущественно въ слизистыхъ оболочкахъ (глазъ, языка, глотки, дыхательнаго горла, мочевого канала и т. д.), особенно *колющія, жгущія* (также саднящія) и *судорожныя* боли (въ пищепріемномъ горлѣ, желудкѣ, заднепроходной кишкѣ, почкахъ, мочевомъ пузырьѣ и т. д.), къ которымъ легко присоединяются также клоническія судорожныя движенія. — Дѣятельное движеніе и теплота усиливаютъ припадки; спокойствіе и холодъ (холодныя омовенія, открытый воздухъ) осла-

(*) Насѣкомое это живетъ на попалѣ (*Opuntia coccionellifera*, De Cand.); засушенныя самки его извѣстны подъ названіемъ канцелярскаго сѣмени.

бляютъ большую часть ихъ. — Утомленіе и чрезвычайное изнеможеніе, вечеромъ, при ходьбѣ, съ потомъ. (Австрійская гомеоп. газета, Т. IV, стр. 497.)

Coffea arabica (cruda).

Сырой аравійской кофе. Плодъ растенія того же имени, семейства *Мареновыхъ* (Rubiaceae, *Juss.*).

Усиленная раздражительность всѣхъ чувствъ и всей нервной системы, съ усиленною чувствительностью къ малѣйшей боли; сильная дѣятельность пищеваемыхъ и выдѣляющихъ органовъ; чрезвычайная подвижность мускульной системы; сильная чувствительность и отвращеніе къ открытому воздуху; бессонница, происходящая отъ сильнаго возбужденія духа и тѣла; сильная тоска, сопряженная съ дрожаніемъ членовъ; сильный приливъ крови къ головѣ; ощущеніе какъ будто мозгъ разрывается, или боль, происходящая какъ бы отъ вбиванія гвоздя; изощренный слухъ; живость глазъ, съ острымъ зрѣніемъ, неприятное ощущеніе въ сторонѣ подреберья отъ тѣснаго платья; сильное половое влеченіе. (Штапфъ.)

Colchicum autumnale.

Осенникъ, безвременный цвѣтъ. Растеніе сем. *Осенниковыхъ* (Colchicaceae, *Juss.*)

Подеризваніе съ рваньемъ и колотьемъ, проникающее до костей, причемъ отъмѣніе и параличъ пораженныхъ частей; признаки усиливаются при напряженіи умственныхъ способностей, по ночамъ и вечерамъ, и становятся до того нестерпимыми, что больной приходятъ въ бѣшенство и отчаяніе; рвущая боль въ членахъ при теплой и колотье при холодной погодѣ; сильная чувствительность тѣла къ прикосновенію и движенію; параличная слабость всего тѣла и особенно колѣнь, такъ что ноги сгибаются сами собою; зудъ, какой бываетъ въ отмороженныхъ частяхъ, особенно при переѣнѣ погоды; отекъ и водяночныя (гидропическія) опухоли, ночью жаръ съ сильной жаждой; головная боль отъ умственныхъ занятій; волосы сильно лѣзутъ; истеченіе изъ ушей, съ

рвущей болью въ нихъ; болѣзненное усиленіе обонянія; лицо покрыто желтыми пятнами; грустное, страдальческое выраженіе лица; отекъ лица; усиленное отдѣленіе слюны; тошнота, которая возбуждается даже отъ запаха мяснаго супа и свѣжихъ яицъ; безпрестанное жженіе и ощущеніе въ желудкѣ чрезвычайнаго холода; поносъ съ испражненіемъ бѣлой слизи или перепончатыхъ веществъ, причемъ сильная натуга; запоръ съ напраснымъ, болѣзненнымъ позывомъ на нязъ; моча темнаго, коричневаго цвѣта. (Штафъ.)

Collinsonia canadensis.

Коллинсонія канадская. Растеніе сем. *Губоцвѣтныхъ* (Labiatae).

Зудящія сыпи; кашель съ кровью (сгустки крови обернуты въ вязкую слизь); геморрой; ревматизмъ суставовъ; катарръ мочеваго пузыря; затрудненное мочеиспусканіе при хроническомъ воспалительномъ состояніи; привычный запоръ съ геморроемъ; кровавый поносъ; поносъ у дѣтей съ коликами, судорогами и вѣтрами; слишкомъ обильныя регулы съ запоромъ; выпаденіе матки; бѣли съ зудомъ, запоромъ и болями при мѣсячномъ очищеніи.

Colocynthis.

Колоквинтъ, горькая тыква. Плодъ растенія *Cucumis Colocynthis* сем. *Тыквенныхъ* (Cucurbitaceae, Juss.).

Стягивающія боли во внутреннихъ и наружныхъ частяхъ, тоническія судороги съ щемленіемъ и давленіемъ; страданія уменьшаются отъ движенія, куренія табаку и питья кофе; *сокращеніе мускуловъ*, доходящее до того, что всѣ члены сведены; обморокъ съ холодомъ въ членахъ; дупленіе кожи; опухоли желѣзъ, переходящія въ нагноеніе; ночной потъ пахнетъ мочою; печальная молчаливость; головныя боли съ тошнотою; блѣдность, вялость лица, впалые глаза; вкусъ во рту горькій, пища также кажется горькою; *судорожныя стягивающія боли въ животѣ*, какъ будто кишки защемлены между двумя камнями, съ поносомъ; животъ натянуть какъ барабанъ; *тотчасъ же послѣ принятія хотя малаго*

количества пищи или питья начинается поносъ съ желтыми испражнениями; жидкія испраженія слизью и кровью; зловонная моча, которая, оставаясь въ горшкѣ, становится густа и студениста; судорожная одышка, какъ бы отъ сдавливанія груди. (Ганеманнъ.)

Conium maculatum.

Болиголовъ. Растеніе семейства *Зонтичныхъ* (Umbelliferae, Juss.).

Щемленіе и судорожныя боли въ разныхъ частяхъ тѣла; боль возникаетъ въ покоѣ и по ночамъ; вслѣдствіе пребыванія на открытомъ воздухѣ обнаруживается слабость и утомленіе; частое волненіе крови, сопровождаемое безпокойствомъ въ тѣлѣ; нервныя припадки; боль какъ бы послѣ толчка или удара; синія и желто-зеленыя пятна, какія бываютъ при изліянїяхъ крови; опухоль и затвердѣніе желѣзъ; язвы и больныя мѣста зудятъ; зловонныя язвы, отдѣляющія сукровицу; ипохондрическое расположеніе духа, истерическій плачь; отвращеніе къ обществу, съ страхомъ при уединенїи; быстрое опьяненіе даже отъ небольшого количества спиртнаго напитка; лицо блѣдное или синеватое и опухшее; сильная свѣтобоязнь; язвинки на губахъ; лишай на лицѣ; постоянная склонность глотать, преимущественно во время ходьбы на вѣтру; сильный аппетитъ на кофе, кислую и соленую пищу; судороги въ глоткѣ; чрезвычайная слабость желудка, съ развитіемъ въ немъ кислотъ; напрасный позывъ на мочу и затрудненіе при отдѣленїи ея; слабость половыхъ органовъ; сильныя поллюціи; болѣзненные менструаціи; судороги съ болями въ маткѣ; прекращеніе менструацій; бѣли, причемъ истекаетъ острая слизь; судорожный кашель; приступы удушья, какъ будто въ горлѣ засѣло постороннее тѣло. (Ганеманнъ.)

Copaivae balsamum.

Копайскій бальзамъ. Получается изъ дерева Южной Америки *Copaifera multijuga*, семейства *Цесалпиніевыхъ* (Caesalpiniaceae).

Употребляется противъ *перелоя*, крапивныхъ сыпей, *кровохарканія*, поноса съ бѣлыми испраженіями, безпрестаннаго и тщет-

наго позыва на мочу; сильныхъ кровотеченій изъ матки; бѣлей. (Ганеманнъ.)

Cornus circinnata.

Американскій курослѣпъ. Растеніе семейства *Жимолостныхъ* (Carnifoliaceae).

Воспаленіе рта съ молочницей у дѣтей; перемежающаяся лихорадка съ преобладаніемъ пота; ипохондрія съ пораженіемъ печени; холерина у дѣтей; желчный поносъ съ болью въ желудкѣ и натугой; кровавый поносъ. Въ Сѣверной Америкѣ это растеніе издавна извѣстно какъ хорошее средство противъ простаго и кроваваго поноса.

Cornus florida.

Свидина. Растеніе сем. *Жимолостныхъ* (Carnifoliaceae).

Лѣкарство мало изслѣдованное; употребляется, наравнѣ съ *Cornus circinnata*, противъ перемежающейся лихорадки.

Crocus sativus.

Шафранъ. Рыльца (stigmata) и столбики (styli) цвѣтка растенія того же имени, сем. *Касатиковыхъ* (Irideae, Juss.).

Больному кажется, что въ пораженной части движется живое существо; быстрое онѣмѣніе членовъ, особенно тѣхъ, на которыхъ лежишь ночью; волненіе крови; *кровотеченія съ вязкой черной кровью*; облегченіе недуговъ на открытомъ воздухѣ; усиленіе ихъ по утрамъ; изнеможеніе съ расположеніемъ къ обмороку; нѣкоторыя мѣста на кожѣ покрыты scarlatinною краснотою; сильная сонливость и даже спячка днемъ; быстрые переходы отъ смѣха къ плачу, отъ гнѣва къ кротости, причемъ, впрочемъ, послѣдняя беретъ перевѣсъ; *сильная склонность къ шуткамъ и смѣху*; ночныя судороги вѣкъ; неясность зрѣнія и вмѣстѣ съ тѣмъ частое морганіе; земляной, блеклый цвѣтъ лица и ярко-красныя пятна на немъ. (Штапфъ.)

Cuprum aceticum.

Уксусокислая мѣдь. Химическій препаратъ.

Дѣйствіе вообще сходно съ дѣйствиємъ Cuprum metallicum. Употребляется противъ пораженія мозга у дѣтей во время прорѣзыванія зубовъ; противъ помѣшательства у роженицъ; конвульсій общихъ и мѣстныхъ, лица, языка, рукъ; конвульсій съ пѣною у рта; при затрудненномъ глотаніи и одышкѣ; холерѣ, во время судорогъ; противъ коклюша; удушья; судорогъ груди.

Cuprum metallicum.

Мѣдь. Простое тѣло.

Конвульси и судороги, начинающіяся преимущественно съ пальцевъ ногъ и рукъ и сопровождаемая пронизательнымъ крикомъ; припадки падучей болѣзни; болѣзненные припадки — по нѣскольку вдругъ; необычайная тонкость и воспримчивость чувствъ; боли въ костяхъ, какъ бы отъ перелома ихъ; спячка и глубокій сонъ, сопровождаемые подергиваніемъ; сыни, какъ при чесоткѣ и проказѣ; мысль о смерти наводитъ тоску и страхъ; робость; приступы сумасшествія, причѣмъ больной обнаруживаетъ гордость, страхъ или бѣшенство; притомъ у пациента воспаленные, красные глаза, наконецъ припадокъ заключается по́томъ; синева лица и губъ; какектическая (худосочная) блѣдность, рѣзкость чертъ лица, впалые глаза, обведенные синими кругами; кончикъ языка холоденъ; сильная жажда съ сухостью въ горлѣ; позывъ на рвоту и рвота со спазмами и конвульсіями живота; сильное давленіе подъ ложечкой и въ сторонѣ желудка; сильные судороги живота; сильная хрипота; одышка и припадки судорожнаго удушья. (Ганеманнъ.)

Cyclamen europaeum.

Свиной хлѣбъ (дряква). Раст. сем. *Первоцвѣтныя* (Primulaceae, Juss.).

Давящее стягиваніе или терзаніе, преимущественно въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ кости непосредственно прикрыты кожей; во время

движенія всѣ страданія исчезаютъ, исключая изнеможенія, но они возникаютъ вновь при сидячемъ положеніи; сильное утомленіе, особенно вечеромъ, съ чувствомъ разбитости и оковенѣlostію ногъ и стягивающимъ давленіемъ въ ляшкахъ и колѣнахъ; стрѣльба въ вискахъ. (Ганеманнъ.)

Cypripedium pubescens.

Кокушкины сапожки американскіе. Растеніе семейства *Ятрышниковыхъ* (Orchideae).

Бессонница отъ нервнаго раздраженія и чрезвычайной чувствительности; нервныя боли; конвульсіи у дѣтей, какъ предвѣстники опаснаго пораженія мозга; истерика при нервной раздражительности и бессонницѣ (подобно Valeriana).

Daphne indica.

Индійскій волчникъ. Раст. сем. *Ягодковыхъ* (Thymeleae, Juss.).

Средство мало изслѣдованное. Употребляется при: ломотныхъ и ревматическихъ недугахъ, съ колющемъ; боляхъ въ костяхъ, съ наростами на нихъ; слабости зрѣнія, причемъ глаза какъ будто подернуты плевою; предметы двоются; кашель со рвотою; запоръ и т. п. (Герлингъ.)

Digitalinum.

Дигиталинъ. Химическій препаратъ изъ наперсточной травы (*Digitalis purpurea*).

Дѣйствуетъ въ томъ же направленіи, какъ Digitalis, но несравненно сильнѣе. Въ гомеопатіи это средство употребляется противъ сердцебіенія съ расширеніемъ венъ, головной болью вслѣдствіе половыхъ излишествъ; противъ кровохарканія.

Digitalis purpurea.

Наперсточная трава. Раст. сем. *Норичниковыхъ* (Scrophularineae).

Также мало извѣстно; до сихъ поръ съ пользою употреблялось противъ: ломотныхъ припадковъ; опуханія и затвердѣнія же-

лѣзь; желтухи; синей болѣзни (синухи); водянки; желудочной, желчной и слизистой лихорадокъ; медлительной нервной и глистной лихорадокъ; меланхоли, происходящей отъ органическихъ пороковъ сердца; кроваваго (серознаго) удара; ломотнаго, катаральнаго и золотушнаго воспаления глазъ; возникающей темной воды; бѣльма; водянки живота, водяной грыжи яичекъ; кровохарканія; органическихъ пороковъ сердца. (Ганеманнъ.)

Dioscorea villosa.

Диоскорейя. Растеніе Центральной Америки сем. *Диоскорейныхъ* (Dioscoreae).

Судороги желудка съ повторяющимися періодически болями, сильной отрыжкой (подобно *Nux vomica*); желчныя колики; водянистый поносъ во время холеры; геморрой; нервная горячка.

Drosera rotundifolia.

Росникъ. Раст. сем. *Росниковыхъ* (Droseraceae, Juss.).

Лихорадка съ позывомъ на рвоту и желудочными недугами, или съ болью въ горлѣ; робость и страхъ передъ привидѣніями, которыя больной видитъ по ночамъ; сильная чувствительность, при которой пациентъ выходитъ изъ себя отъ самыхъ ничтожныхъ причинъ; дальновзоркость; частое кровотеченіе носомъ; черныя угри на лицѣ и носу; кровотеченіе ртомъ; затрудненное глотаніе: глотка какъ будто сжужена; горькій вкусъ во рту, пища кажется горькою; рвота желчью, слизью и пищею; боли въ подреберья, возникающія при кашлѣ или отъ прикосновенія; боль въ животѣ послѣ ѣды чего-нибудь кислаго; частое испусканіе мочи ночью; прекращеніе или задержаніе менструацій; бѣли, которыя сопровождаются болями, похожими на родильныя потуги; зудъ въ горлѣ, какъ будто въ немъ находится мягкое тѣло; охриплость съ чувствомъ сухости, жесткости и шероховатости въ горлѣ; скопленіе слизи въ дыхательныхъ путяхъ; боль въ гортани во время разговора; *по вечерамъ и ночамъ сухой, судорожный кашель*, съ позывомъ на рвоту, кровотеченіемъ ртомъ и носомъ, синевою лица

и принадками удущья; кашель, при которомъ отдѣляется свѣтло-красная или черная кровь; отдѣленіе гнойной слизи изъ легкихъ. (Ганеманнъ.)

Dulcamara.

Сладкогорькій пасленъ. Раст. (*Solanum Dulcamara*) сем. Пасленовыхъ (*Solaneae*, *Juss.*).

Послѣдствія злоупотребленія меркуріемъ; простудные недуги, особенно отъ сыраго холода; недуги слизистыхъ оболочекъ; золотуха съ опуханіемъ и затвердѣніемъ желѣзъ; холодныя опухоли; разныя водянки; параличи; разнаго рода лишай; пузырьчатая и крапивная сыпь, размягченіе костей; бородавки; скарлатина съ пурпуровою, просовидною сыпью; слизистая лихорадка; простудная головная боль; возникающая темная вода; молочная корка; золотушное воспаленіе глазъ; параличъ языка; катарральная боль въ горлѣ; спорадическая холера (холерина); поносъ отъ простуды; катарръ мочевого пузыря; суженіе мочевого канала; золотушные бубоны; лишай на дѣтородныхъ частяхъ; продолжительные катарры и охрипость; слизистая одышка; водянка груди. (Ганеманнъ.)

Electricitas.

Электричество. Физическій дѣятель.

Электротерапія есть особая отрасль врачебной науки и требуетъ специальныхъ познаній для ея примѣненія. (*)

Въ гомеопатіи электричество употребляется какъ вспомогательное средство отъ дрожанія членовъ, конвульсій, пляски св. Витта, паралича, опуханія желѣзъ, недержанія мочи, боли въ бедрѣ, личной боли, онѣмѣнія послѣ дифтерита.

(*) Специальное сочиненіе по этой части въ русскомъ переводѣ — „Электричество въ примѣненіи къ медицинѣ“, Д-ра Цимсена. Москва, 1865 г. Изданіе А. Форбрихера.

Ergotinum.

Эрготинъ. Спиртовой экстрактъ изъ ржаныхъ рожковъ (*Secale cornutum*). Фармацевтический препаратъ.

Употребляется, какъ *Secale cornutum*, противъ сильныхъ кровотеченій изъ матки (2-ое десятичное растираніе, черезъ 2 часа по 2—3 грана). Противъ кровотеченій изъ легкихъ.

Erigeron canadense.

Шельмовка канадская, котыкъ степной. Растеніе семейства *Щитконосныхъ* (*Corymbiferae*).

Крoвавый поносъ и кровавыя испражненія; рвота кровью съ давленіемъ и жженіемъ въ желудкѣ; кровотеченіе носомъ съ приливомъ крови къ головѣ, краснотой лица и лихорадкой; кровотеченіе изъ матки до и послѣ родовъ или послѣ выкидыша; геморрой съ жесткими, комковатыми испражненіями; кровавая моча; воспаленіе мочевого пузыря; затрудненное мочеиспусканіе; воспаленіе почекъ; сахарное мочеизнуреніе; выпаденіе матки.

Eryngium aquaticum.

Синеголовникъ водяной. Раст. сем. *Зонтичныхъ* (*Umbelliferae*).

Употребляется противъ поносовъ и въ холерѣ.

Eupatorium aromaticum.

Посконникъ ароматичный. Раст. сем. *Щитконосныхъ* (*Corymbiferae*).

Употреблялось только противъ воспаленія рта съ молочницей.

Eupatorium perfoliatum.

Посконникъ прободенный. Раст. сем. *Щитконосныхъ* (*Corymbiferae*).

Рвота; мигрень; изнурительный кашель; одышка; гриппъ; воспаленіе легкихъ; трехдневная перемежающаяся лихорадка или безъ

опредѣленной періодичности повторенія припадковъ, ознобъ начинается съ лины, сильное дрожаніе при небольшомъ ознобѣ, жажда во время озноба и жара, сильная головная боль.

Eupatorium purpureum.

Посконникъ пурпуровый. Раст. сем. *Щитконосныхъ* (Compositae).

Рекомендуютъ противъ парывовъ на мочевомъ пузырьѣ; катарра мочевого пузыря; кровавой мочи; непроизвольнаго истеченія мочи у дѣтей; хроническаго задержанія мочи; каменной болѣзни; воспаления вѣтвей дыхательнаго горла; ломоты; водянки.

Euphorbia corollata.

Молочай вѣничковатый. Растеніе сем. *Молочайныхъ* (Euphorbiaceae, *Juss.*).

Преимущественно при слѣдующихъ припадкахъ: головокруженіе съ слабостью и обморокомъ, помраченіе зрѣнія, шумъ въ ушахъ; больному кажется, что все вертится вокругъ него (морская болѣзнь); рожа; глистная лихорадка; поносъ со рвотою у дѣтей; воспаленіе кишекъ; кровавый поносъ; воспаленіе желудка; катарръ желудка; рвота у беременныхъ.

Euphorbia cyparissias.

Молочай кипарисный. Растеніе сем. *Молочайныхъ* (Euphorbiaceae).

Особенно рекомендуютъ противъ слабости глазъ, причемъ больной постоянно видитъ огонь (пскры, пламя); также противъ воспаления пищеваго канала; водянки. Крапивная лихорадка; перемежающаяся лихорадка; водоболѣзнь.

Euphrasia officinalis.

Очанка. Раст. сем. *Норичниковыхъ* (Scrophularineae).

Мало изслѣдовано. Употребляется въ слѣдующихъ случаяхъ: послѣдствія ушиба, удара, паденія; идиопатическое (самосто-

ительное) или травматическое (отъ механическихъ поврежденій) *воспаленіе глазъ; доловременное слезотеченіе изъ глазъ; воспаленіе, потемнѣніе, пятна, язвы и другіе недуги роговой оболочки глаза; начало темной воды; мокротный кашель послѣ гриппа; смоквообразныя бородавки (конциломы).* (Ганеманнъ.)

Ferrum metallicum.

Желѣзо. Простое тѣло.

*Волненіе и приливы крови, кровотеченіе съ сильнымъ раздраженіемъ сосудистой системы; ощущеніе дерганья и колотья въ пораженныхъ частяхъ, особенно по ночамъ, причѣмъ больному хочется двигать эти части; кровотеченія, съ кровью жидкой, свѣтло-красной или въ видѣ черныхъ сгустковъ!; ночныя страданія, усиливающіяся при сидячемъ положеніи и уменьшающіяся при умѣренномъ движеніи; чрезвычайная слабость съ дрожаніемъ и тяжестью въ членахъ и особенное расположеніе къ лежанію, сильная усталость отъ непродолжительной ходьбы, особенно на открытомъ воздухѣ; чрезвычайная худоба; параличная слабость; судороги и искривленіе членовъ; кожа грязнаго, землянаго цвѣта; водяночныя опухоли, жженіе и боль въ различныхъ мѣстахъ кожи; недостатокъ жизненной теплоты; обильный потъ днемъ во время ходьбы; обильный потъ утромъ послѣ головной боли; зловонный потъ по ночамъ; ощущеніе тоски и біеніе подъ ложечкой; вспыльчивость, сварливость, страсть къ спорамъ; головокруженіе при видѣ текущей воды (рѣки и т. п.), приливъ крови къ головѣ со стукомъ въ ней какъ будто отъ молотка; боль какъ бы отъ изъязвленія въ покрытой волосами части головы, при прикосновеніи; краснота и чувство жженія въ глазахъ; глаза тусклы и мутны и отдѣляютъ водянистую влагу; * постоянное накопленіе въ носу кровяныхъ сгустковъ; *блѣдное, худое лицо* и впалые глаза, съ синими кругами; *землянаго цвѣта лицо, покрытое синими пятнами, или яркая краснота лица* и вздутость на немъ венъ; желтыя пятна на немъ; опуханіе лица, особенно около глазъ; каждый разъ послѣ ѣды чувство давленія въ желудкѣ или рвота; накопленіе кислотъ въ немъ; желудокъ не варитъ пива и кислыхъ*

веществъ; судорожная стягивающая боль въ животѣ и спинѣ; поносъ водянистый и съ испражненіемъ непереваренной пищи; *обильное испражненіе мелкихъ кистъ*; наклонность къ выкидышу; кровотеченіе изъ матки съ потужными болями въ спинѣ и поясницѣ, судорожный кашель и рвота слизью или пищею; харканіе кровью и гнойной матерією; одышка, кабъ бы отъ стягиванія груди. (Ганеманнъ.)

Filix mas.

Папоротникъ. Корень растенія *Aspidium filix mas*, сем. Папоротниковыхъ (*Filices*).

Въ гомеопатіи употребляется противъ болѣзненныхъ припадковъ, причиняемыхъ глистами. Рекомендуютъ особенно противъ солитера. (Въ послѣднемъ случаѣ даютъ до пяти капель крѣпкой эссенціи на одинъ пріемъ; можно повторять нѣсколько разъ въ день.)

Fluoricum acidum.

(*Acidum hydrofluoricum*.)

Водофторная кислота. Химическій препаратъ.

Недуги костей и застарѣлыя кожные болѣзни; давящія боли; напряженіе, сжиманіе, біеніе, потягиваніе, стягиваніе; стрѣльба, колотье, зудъ, жженіе, дерганіе; стрѣляющія боли; сверленіе, покалываніе, щемленіе; садненіе; боли со щемленіемъ, чувство разбитости; *усиленная дѣятельность мускуловъ* безъ истощенія; затрудненіе при ходьбѣ отъ чувства утомленія въ ляшкахъ; чрезвычайное изнеможеніе утромъ, до полудня или цѣлый день, также тошнота и отрыжка; чувство тяжести и ослабленія во всемъ тѣлѣ; послѣ ходьбы вечеромъ большой чувствуетъ менѣе утомленія, чѣмъ обыкновенно; старческіе недуги; многіе симптомы при стоячемъ положеніи усиливаются, но *все-таки въ стоячемъ положеніи легче, нежели въ сидячемъ*; *паціентъ чувствуетъ себя лучше при движеніи, ходьбѣ*; припадки усили-

ваются отъ движенія; быстрое насыщеніе; сильная похоть; хроническая водянка груди.

Fucus vesiculosus.

Морской мохъ пузырьчатый, варекъ, лапуга. Раст. сем. *Водорослей* (Algae).

Средство мало испытанное; нѣкоторые врачи употребляютъ противъ ожирѣнія.

Galvanismus.

(*Electricitas metallica.*)

Гальванизмъ. Физическій дѣятель.

Гальванизмъ сходенъ съ электричествомъ. Получается онъ при соприкосновеніи двухъ разнородныхъ металлическихъ пластинокъ (обыкновенно мѣдной и цинковой).

Дѣйствуетъ такъ же, какъ электричество. Авторъ рекомендуетъ это средство еще противъ болѣзненного измѣненія обонянія, происходящаго отъ нервныхъ причинъ.

Gelseminum sempervirens.

(*Gelseminum nitidum, Bignonia sempervirens.*)

Гельземинъ, желтый жасминъ. Растеніе сем. *Бигноніевыхъ* (Bignoniaceae).

Средство это сильно дѣйствуетъ на кровообращеніе; особенно сильное вліяніе имѣетъ на кровеносные сосуды головного мозга. Чрезвычайно сильно также дѣйствуетъ на органы зрѣнія. Особенно рекомендуютъ противъ пузырьчатой рожи, скарлатины съ слабостью и отравленіемъ мозга скарлатиннымъ ядомъ, слѣпоты, воспаления мозга съ приливомъ крови; мигрени, исходящей изъ затылка, съ мутнымъ зрѣніемъ, слабостью, головокруженіемъ, чувствомъ тяжести въ головѣ, медленнымъ, полнымъ пульсомъ; дифтерита съ ослабленіемъ зрѣнія и возникающимъ параличемъ; при отсутствіи обонянія съ насморкомъ; при гриппѣ;

судорогахъ гортаннаго отверстія, съ звуками какъ при круп-пѣ во время продолжительнаго вдыханія; выдыханіе усиленное и отрывистое; зубная боль ревматическаго характера (подобно Mercur.); сонливость при приливѣ крови къ головѣ, при тифѣ; приливы крови, какъ предвѣстники воспаления легкихъ; катарральная лихорадка; воспаление вѣтвей дыхательнаго горла; воспаление миндалевидныхъ желѣзъ; воспаление нищеприѣмнаго горла; воспаление околосердечной сумки послѣ ревматизма (облегчаетъ органическія болѣзни сердца, исцѣляетъ неорганическія); судороги во время беременности, при малокровіи, трудныхъ родахъ, у дѣтей во время прорѣзыванія зубовъ; параличъ отъ раздраженія спиннаго мозга или хроническаго воспаления его, особенно параличъ мускуловъ крестца и ляшекъ; параличъ запирающихъ мускуловъ мочеваго пузыря; первыя боли съ подергиваніемъ мускуловъ; истерика, падухая болѣзнь, столбнякъ, или при раздражительномъ состояніи, или при нечувствительности; ревматизмъ съ лихорадкой или безъ нея; ударъ съ пассивнымъ приливомъ крови и нервнымъ истощеніемъ; перемежающаяся лихорадка съ безсиліемъ, не разграниченными рѣзко стадіями, чувствительностью къ свѣту, шуму, — безпокойство, бредъ во время жара, припадки по вечерамъ, страхъ, головокруженіе и чувство паденія; судороги мочеваго пузыря; недержаніе мочи; судорожныя боли въ животѣ, колики отъ вѣтровъ; воспаление кишекъ; кровавый поносъ; поносъ отъ испуга и душевныхъ потрясеній; судороги желудка съ напряженіемъ, глухой болью, чувствомъ пустоты и слабости въ верхней части живота, ложнымъ голодомъ, также во время беременности; запоръ вслѣдствіе слабости мускуловъ отъ судорожнаго стягиванія ихъ; посредствомъ Gelsemium изгоняются аскариды, круглыя глисты и солитеры (внутри 2. разж.; тинктура — въ формѣ клистира); грыжи, въ особенности ущемленныя; желчная лихорадка со рвотою черными веществами и поносомъ; желтуха съ глинистыми испраженіями и чрезвычайной слабостью; родильная лихорадка съ конвульсіями; подавленіе регулъ судорожнаго и конгестивнаго характера; регулы съ болью, судорогами матки; бѣли съ болью въ поясищѣ.

Glonoinum.

(Nitro-Glyzerinum).

Глоноинъ, нитроглицеринъ, динамитъ. Химическій препаратъ.

Вліяетъ на кровообращеніе, особенно въ мозгу. Рекомендуютъ противъ приливовъ крови къ головѣ и груди, при задержаніи регулъ, у беременныхъ и въ періодъ прекращенія регулъ въ старости. Послѣдствія нравственныхъ потрясеній, испуга, страха. Морская болѣзнь. Тифозное пораженіе мозга. Тифъ послѣ холеры. Помѣнательство у роженицъ. Кровяной ударъ. Головная боль, воспаленіе мозга. Головная водлянка. Солнечный ударъ. Судороги. Воспаленіе глазъ. Сердцебіеніе и воспаленіе спиннаго мозга.

Gossypium herbaceum.

Хлопчатникъ. Раст. сем. *Мальвовыя* (Malvaceae).

Мало изслѣдовано. Употреблялось противъ болѣзней, находящихся въ связи съ мѣсячнымъ очищеніемъ, а именно противъ задержанія регулъ вслѣдствіе расслабленія матки или при простомъ разстройствѣ регулъ.

Graphites.

(Plumbago.)

Графитъ. Металлоидъ.

Боли со сведеніемъ членовъ, съ красноватою, твердою и болѣзненною опухолью пораженныхъ частей; *чувство напряженія какъ бы отъ сокращенія мускуловъ*; дерганіе преимущественно въ изъязвленныхъ мѣстахъ; быстрое какъ молнія, насквозь пробѣгающее колотье; члены легко нѣмбуютъ; суставы не сгибаются; *сильное расположеніе къ простудѣ* и сильная чувствительность къ вольному воздуху и сквозному вѣтру; волненіе крови и сильное біеніе въ тѣлѣ, когда оно находится въ движеніи; всеобщая слабость, съ дрожаніемъ членовъ и стопами; чрезвычайная худоба; усиленіе страданій при охлажденіи тѣла; чрезвычайная сухость кожи и отсутствіе испарины; рожистое воспаленіе; мѣшет-

чатая опухоль; опуханіе желѣзъ; ломотные узлы; мокнущіе лишай и сыпи; нѣкоторыя мѣста *изъязвлены*; болѣзненность кожи; толстые и безобразные ногти; зловонныя, безпрестанно умножающіяся язвы и *многія друія накожная болѣзни*; почной сонъ не подкрѣпляетъ, полонъ грезъ; бессонница отъ напора неприятныхъ мыслей; потъ при маѣйшемъ движеніи; *сильное расположеніе къ грусти, которая доходитъ до отчаянія*; тоска отъ ожиданія какого-то несчастія; мокнущая сыпь и парша на части головы, покрытой волосами; волосы скоро сѣдѣютъ и лѣзутъ, особенно на боковыхъ частяхъ головы; сильная свѣтобоязнь, глаза не выносятъ дневнаго свѣта; сыпь и опрѣлость за ушами; зловоніе и истеченіе зловонной влаги изъ носу; блѣдность или желтизна лица съ синими кругами около глазъ; полусторонній параличъ и искаженіе лицевыхъ мускуловъ; углы рта покрыты язвинками; *сыпи со струньями вокругъ рта и на подбородкѣ*; сильное слюнотеченіе; гнилой запахъ изо рта, напоминающій мочу; болѣзненное ощущеніе въ горлѣ, какъ будто тамъ опухоль; *чрезвычайная слабость пищеваренія*, съ сильною тяжестью и вздутостью живота или рвотою каждый разъ послѣ ѣды; *скопленіе зловонныхъ вытравъ съ частымъ и мучительнымъ выхожденіемъ ихъ*; *продолжительный запоръ или постоянный поносъ*; при испраженіи отдѣляется большое количество слизи; сильное возбужденіе полового стремленія съ сладострастными мыслями; остановка, *задержаніе*, скудость и блѣдность *менструаций*; боль и судороги живота, особенно во время регулъ; опрѣлость женскихъ половыхъ органовъ и ляшекъ; болѣзненная, воспалительная опухоль яичниковъ; охриплость съ ощущеніемъ пероховатости и зуда въ горлѣ; нечистый голосъ во время нѣжня; грудные соски изъязвлены и покрыты мокнущими пузырьками; зловонный потъ ногъ въ большомъ количествѣ. (Ганеманнъ.)

Guajacum officinale.

Бакауттовая смола изъ растенія того же имени, сем. *Рутовыхъ* (Rutaceae, *Juss.*); по другимъ — сем. *Цинофилловыхъ* (Zygophylleae).

Ломотныя боли въ членахъ, съ стрѣльбою и терзаніемъ; оконечность членовъ; чувство разбитости и слабость въ рукахъ и

ляшкахъ, съ сильнымъ отвращеніемъ къ движенію; частая зѣвота и потягота; большая часть симптомовъ обнаруживается *утромъ*, при вставаньи, или *вечеромъ* при отходѣ ко сну; сухотка; послѣдствія злоупотребленія ртутью; мигрень и проч. (Ганеманнъ.)

Gummi guttae.

Гуммигутъ, желтая камедь, получаемая въ юговосточной Азіи изъ растенія *Garcinia elliptica* сем. Guttiferae.

Дѣйствуетъ преимущественно на органы пищеваренія. Рекомендуютъ противъ остраго колотья въ желудкѣ, давленія въ желудкѣ и подъ грудью, являющагося приступами, захватывающаго дыханіе; противъ сильной рвоты съ поносомъ и обморокомъ, сильнаго жженія, щиплющей боли въ животѣ, исчезающей послѣ испражненія, во время котораго чувствуется жженіе въ заднемъ проходѣ; противъ слизистыхъ испражнений съ натугою, жженіемъ въ заднемъ проходѣ и выпаденіемъ прямой кишки; обильнаго водянистаго поноса съ натугою, хроническаго поноса вслѣдствіе расслабленія слизистой оболочки кишекъ.

Hamamelis virginica.

Гамамелись. Растеніе Сѣверной Америки, сем. *Гамамелиевыхъ* (Hamamelideae).

Холодѣніе всего тѣла; потягивающая боль вдоль спины и въ суставахъ ногъ; чувство полноты въ мозгу и маковѣ; — сухость въ горлѣ съ жаждой, которая не утоляется водою; — кровотеченіе носомъ; бѣлая опухоль колѣна (*phlegmasia alba dolens*); геморрой, кровотеченія изъ матки и легкихъ; кровавый поносъ, изъязвленіе грудныхъ сосковъ и воспаленіе груди. (Д-ръ Борритъ [Burrit] въ Нью-Орлеанѣ.)

Helianthus annuus.

Подсолнечникъ. Раст. сем. *Щитконосныхъ* (Corymbiferae).

Наружно употребляется въ тѣхъ же случаяхъ, какъ *Arnica*, но въ болѣе легкихъ. Употребляется или въ чистомъ видѣ, или

на половину съ водой, если верхняя кожа повреждена или чувствительна. Внутри это средство дается рѣдко. Д-ръ Курцъ излѣчивалъ имъ (3-е дѣленіе) періодически возвращающіяся боли безъ лихорадки (періодическій позывъ на мочу ночью). Истеченіе молока у кормилицъ по отнятїи ребенка отъ груди.

Helleborus niger.

Чемерица черная. Раст. сем. *Лютиковыхъ* (Ranunculaceae, Juss.).

Чувство *раздирающаго* колотья, преимущественно въ суставахъ; *чувство колющаго сверленія* въ надкостной плевѣ и другихъ частяхъ, которое увеличивается отъ ѣды, питья, прохладнаго воздуха и напряженія тѣла; ощущеніе тяжести въ членахъ съ бо- лѣзненной чувствительностью и отвращеніемъ къ движенію; при- падки мгновеннаго расслабленія мускуловъ, причемъ пациентъ вдругъ падаетъ; судороги, конвульси, негибкость членовъ съ со- трясеніемъ головы; уменьшеніе припадковъ на открытомъ возду- хѣ; блѣдность кожи; кожаца лупится; водяночныя опухоли; вы- паденіе волосъ и ногтей; сильная сопливость днемъ; ознобъ и холодъ тѣла при головномъ жарѣ; тихая меланхолія, сопровож- даемая вздохами; тупость чувствъ и мышленія; больной часто впадаетъ въ состояніе безмыслія, причемъ пристально смотреть на одинъ предметъ; ощущеніе разбитости въ головѣ и ея покро- вахъ, съ тупоуміемъ; жгучій жаръ въ головѣ съ блѣдностью ли- ца; лобъ покрытъ морщинами; слюнотеченіе, причемъ углы рта изъязвлены; во рту и на языкѣ молочница и пузырьки; отвраще- ніе къ жирному и зелени; сильный голодь съ отвращеніемъ къ ѣдѣ; каждый разъ послѣ обѣда боль въ желудкѣ какъ отъ изъ- язвленія и боль подъ ложечкой при кашлѣ и малѣйшемъ движе- ніи; жженіе въ желудкѣ, поднимающееся до глотки; ощущеніе тяжести и холода въ животѣ; поносъ съ изверженіемъ бѣлой сту- денистой слизи; вялость дѣтородныхъ частей и отсутствіе поло- ваго стремленія; затрудненное дыханіе какъ бы отъ того, что грудь стянута, съ склонностью къ глубокому вдыханію. (Ганеманнъ.)

Helonias dioica.

Хелонія. Растеніе Сѣверной Америки, семейства *Осенниковыхъ* (Colchicaceae).

Ипохондрія съ страданіемъ желудка и матки, воспаленіемъ грудныхъ желѣзъ (?); отсутствіе аппетита, отрыжка, судороги желудка. Водянка почекъ (сахарное мочеизнуреніе) послѣ скарлатины. Болѣзни половой системы, особенно: кровотеченіе изъ матки при слабости, нарывы на маточномъ устьѣ, выпаденіе матки, подавленіе регулъ при чрезвычайной слабости, регулы съ болью, бѣли съ слабостью и малокровіемъ. Хвалятъ также какъ средство противъ водянки вообще.

Hepar sulphuris calcareum.

(*Calcium sulphuratum, Calcareo sulphurata.*)

Известковая сѣрная печень, сѣрнистый кальцій. Фармацевтический препаратъ.

Дерганіе, рвущая боль и колотье въ членахъ и суставахъ, преимущественно утромъ, при пробужденіи; усиленіе припадковъ по ночамъ, съ лихорадочнымъ ознобомъ; усиленная раздражительность нервовъ съ болью отъ прикосновенія и усиленную чувствительностію къ открытому воздуху; *продолжительное или медленное нагноеніе*; опухоль желѣзъ съ переходомъ въ нагноеніе; *рожистое воспаленіе*; кожа трескается; *кожа болѣзненна и легко покрывается язвами*; гнилостныя зловонныя язвы и вообще *разныя накожные болѣзни*; раковидныя язвы; горячія, красныя опухоли съ болью, подобною бывающей при вывихѣ; *болѣзненное чувство разбитости и боль какъ отъ изъязвленія при прикосновеніи*; частая, иногда судорожная зѣвота; *ночью бессонница или беспокойный сонъ влѣдствіе напора мыслей, пробѣгающихъ въ голову подобно облакамъ*; ночной ознобъ съ сильной болью, или сухой ночной жаръ съ головной болью, жаждою и бредомъ; *сильное расположеніе къ потнью днемъ и ночью*; чрезвычайная скорбь и тоска, побуждающія къ самоубійству; сильная вспыльчивость, доходящая

до буйства; узловатая сыпь на части головы, покрытой волосами, съ болью какъ отъ изъязвленія при прикосновеніи; сильное выпаденіе волосъ и плѣшивость; рожевидное воспаленіе глазъ; судороги вѣкъ ночью; парша на ушахъ и за ушами; гнойное, вонючее истеченіе изъ ушей; чрезвычайная блѣдность лица во время движенія, горячащаго тѣло; желтоватость лица и синіе круги около глазъ; яркая краснота щекъ съ жжениемъ и лихорадкой; углы рта покрыты нарывчиками; сильное слюнотеченіе; болѣзненное ощущеніе въ горлѣ, какъ бы отъ посторонняго тѣла или острыхъ осколковъ; слабость желудка съ чувствомъ давленія каждый разъ послѣ ѣды; сильный позывъ на вино и кислое; чувство застоя крови подъ ребрами и такая чувствительность, что пациентъ не можетъ выносить тѣснаго платья; затрудненное испражненіе, какъ бы вслѣдствіе недѣятельности кишокъ; поносы съ кислыми (по запаху), бѣловатыми или слизистыми, перемѣшанными съ кровью испражненіями; слабость мочевого пузыря съ медленнымъ истеченіемъ мочи; моча покрыта блестящей жирной пленкой; слабое половое возбужденіе съ неполнымъ напряженіемъ члена; женскіе половые органы и ляжки прѣлы; слабость голоса; обильное скопленіе слизи въ груди; сухой кашель, сопровождаемый судорожнымъ удушьемъ и рвотой, или мокротный, съ слизистымъ хрипомъ въ груди; тоскливое дыханіе со свистомъ и боязнь задохнуться въ лежачемъ положеніи. (Ганеманнъ.)

Hydrastis canadensis.

Гидрасть Канадскій. Раст. сем. Лютиковыхъ (Ranunculaceae).

Средство это еще не изслѣдовано достаточно. Въ Америкѣ и Индіи оно слыветъ специфическимъ противъ рака, на практикѣ оно оказалось полезнымъ только противъ опуханія и затвердѣнія желѣзъ, даже скirrosныхъ (раковидныхъ). Кромѣ того, его рекомендуютъ противъ катарральнаго воспаленія слизистой оболочки глазъ съ обильнымъ отдѣленіемъ слизи; противъ рожи и оспы; желтухи съ сердцебіеніемъ, слабостью, катарромъ кишокъ; противъ изъязвленія носа, язвъ на ногахъ и въ моче-

вомъ пузырьѣ; воспаленія мочеваго пузыря; рвоты кровью; воспаления вѣтвей дыхательнаго горла; геммороя; хроническаго и сифилитическаго воспаленія горла; катарра желудка съ образова- ниемъ кислотъ и съ запоромъ; неваренія желудка (наравнѣ съ *Nux vom.*, *Pulsat.*, *Sulphur*); цинги съ слабостью; запора съ головной болью, коликой, геморроидальнымъ состояніемъ, присту- нами обморока, съ продолжительной болью въ заднемъ проходѣ послѣ испражненія; наконецъ, противъ бѣлей съ язвами на мат- точномъ рыльцѣ.

Hydrocyani acidum.

(*Acidum hydrocyanicum*, — *borussicum*.)

Синильная кислота. Химическій препаратъ.

Сильный ознобъ и холодѣніе оконечностей. Мгновенно обуя- щій жаръ. Неровный пульсъ. Упадокъ пульса до того, что его почти незамѣтно. Неодолимая сонливость. По пробужденіе кажется, что вовсе не спалъ. Усиленная воспримчивость чувствъ. Уныніе. Страхъ. Неспособность къ размышленію. Слабость па- мяти. Головокруженіе. Дурнота и жаръ въ головѣ. Приливъ къ головѣ съ помраченіемъ зрѣнія. Внезапное сотрясеніе головы, причемъ больной падаетъ какъ отъ апоплексическаго удара. Рас- ширеніе зрачковъ. Потемнѣніе въ глазахъ. Притупленіе слуха. — Блѣдный, сѣрый цвѣтъ лица. Губы и зубы крѣпко сомкнуты. Обильное слюотеченіе. Жженіе, боль и судороги въ глоткѣ. Отвращеніе къ пищѣ. Тошнота. Жженіе и боль въ желудкѣ. Стѣ- сненіе въ подреберья, въ перемежку съ бьющей болью, усили- вающеюся отъ давленія. Поносъ. Невольное испражненіе. Хо- лера. — Водянистая моча. Жженіе въ мочевоомъ каналѣ. Силь- ный кашель. Обильное отдѣленіе мокроты подъ вечеръ. — Ды- ханіе затрудненное, шумное, съ тоскою и страхомъ. Боль и ко- лотье въ груди при глубокомъ вдыханіи. Гнетущая боль въ серд- цѣ. Чрезвычайно сильное сердцебіеніе.

Hyosciamus niger.

Бѣлена. Растеніе сем. *Пасленовыхъ* (Solaneae, Juss.).

Судороги и конвульсія съ поносомъ, невольнымъ мочениспусканіемъ, холодѣніемъ тѣла, крикомъ, тоскою, стѣсненіемъ дыханія и возвращеніемъ этихъ припадковъ при малѣйшей попыткѣ проглотить что-нибудь жидкое; состояніе, при которомъ больной вдругъ падаетъ съ крикомъ и конвульсіями; полусторонній параличъ; чрезмѣрная слабость, такъ что больной не можетъ вынести тяжести своего собственнаго тѣла и не можетъ стоять на ногахъ; сухость и жесткость кожи; гнойные пузыри, похожіе на оспенные; кровавые нарывы, темныя пятна и пузыри, какіе бываютъ при антоновомъ огнѣ; — чрезвычайная спячка и глубокій сонъ, съ одурѣніемъ и конвульсіями, или бессонница вслѣдствіе тоски или сильнаго раздраженія нервовъ; жаръ, съ ощущеніемъ какъ будто въ жилахъ течетъ огненная кровь; частый, обильный потъ; тоска и чрезвычайная робость, такъ что пациентъ боится даже людей; *сильная ярость, такъ что больной хочетъ кого-нибудь убить* и сильно напрягаетъ тѣло; сварливость; особенное расположеніе къ упрекамъ, брани и ревности; безстыдство и сильная половая похоть; *совершенная потеря сознанія, съ нечувствительностью ко всѣмъ естественнымъ потребностямъ*; неприличный смѣхъ и болтовня; умопомѣшательство; нелѣпныя, шутовскія выходки; сильный приливъ крови къ головѣ: *глаза красные, блестящіе, взглядъ пристальный*; куриная слѣпота, ненормальности зрѣнія, такъ что предметы представляются красными или въ увеличенномъ видѣ; судороги вѣкъ; крѣпость на ухо, какъ бы вслѣдствіе оглушенія; *сильное расширеніе зрачковъ*; *лицо блѣдно-синее, холодное* или кроваво-краснаго, коричневаго цвѣта; зубы подернуты слюзю и кажутся слишкомъ длинными; истеченіе пѣны изо рта; краснота и сухость языка; нѣмота, вслѣдствіе паралича языка; *больной не можетъ глотать вслѣдствіе опухоли или судорожнаго стягиванія гортани*; водобоязнь; рвота пищею и даже кровью; боль въ нижней части живота, со рвотою и головной болью; запоръ отъ вялости кишекъ или невольное испраженіе; поносы съ изверженіемъ во-

дянистой жидкости или слизи; задержаніе или недержаніе мочи; сухой, *судорожный кашель ночью*, съ щекотаньемъ, особенно при лежачемъ положеніи; судороги груди. (Ганеманнъ.)

Jalappa.

Ялаппа. Корень растенія *Ipomoea purga*, сем. *Вьюнковыхъ* (Convolvulaceae).

Слабость. Обморокъ. Безпокойство и метаніе дѣтей во снѣ. Головная боль. Тошнота и рвота. Рѣзь въ животѣ. Вѣтры у дѣтей, съ крикомъ. Воспаленіе кишекъ. Испражненія густыя съ кисловатымъ запахомъ. Кровянистыя испражненія. Боль въ мышцахъ.

Jatropha curcas.

Рвотный орѣшникъ черный. Растеніе сем. *Молочайныхъ* (Euphorbiaceae).

Жаръ въ головѣ. Ревматическая боль въ полныхъ зубахъ. Металлическій и кровавой вкусъ во рту, съ обильнымъ отдѣленіемъ слюны. Тошнота. Сильная рвота и поносъ, съ приливомъ крови къ головѣ. Жженіе въ желудкѣ и рвота жидкостью, подобной бѣлку; въ то же время холоднѣніе тѣла, клейкій потъ и судороги ногъ. Чрезвычайно сильная рвота и изверженіе низомъ, съ слабостью и судорогами. Рекомендуютъ противъ хронической рвоты, глеть, трихинъ, рѣзи въ животѣ, холеры. (Гроссъ, Гартманъ и Руммель.)

Ignatia amara.

(*Faba sancti Ignatii.*)

Игнація, горькій груданикъ. Сѣмена растенія (*Strychnos Ignatii*) сем. *Челобуловыхъ* (Strychnaceae).

Боли, усиливающіяся отъ прикосновенія; *ощущеніе расширенія или стягиванія* въ полостяхъ тѣла; боль въ суставахъ какъ

бы отъ вывиха; *болѣзненное ощущеніе разбитости преимуще- ственно въ надкостной плевѣ трубчатыхъ костей*, усиливающееся *при лежаніи на боку* и пропадающее, когда больной ляжетъ на спину; онѣмѣніе и зудъ въ членахъ; возвращеніе и усиленіе припадковъ отъ куренія табака, питья кофе и водки, отъ шума, а равно послѣ ѣды, также вечеромъ, когда пациентъ ложится спать и утромъ, когда онъ встаетъ съ постели; *отъ перемѣны положенія лече*, особенно когда пациентъ лежалъ на спинѣ или на пораженной части; чувство давленія какъ бы твердымъ тѣломъ или рѣзь съ колотьемъ, какъ бы ножами; сильная чувствительность къ сквозному вѣтру и склонность къ простудѣ; слабость, доходящая до обморока; *приступы судорогъ*, при которыхъ голова закидывается назадъ, а лицо *багровѣетъ*; судороги глотки, припадки удушья, потеря сознанія съ истеченіемъ изо рта пѣны; *кожа изъязвлена въ нѣкоторыхъ мѣстахъ*; частая судорожная *звота*, съ чувствомъ какъ будто нижняя челюсть вывихнута; крапивная сыпь, производящая зудъ; глубокой, какъ бы отъ одурѣнія, но не укрѣпляющій сонъ; *ночной сонъ, сопровождаемый рыданіемъ, стонами, жалобами, бредомъ, поддериваніемъ членовъ* и другими болѣзненными явленіями; сповидѣнія, напрягающія умъ, и грезы, продолжающіяся и послѣ пробужденія; ознобъ, съ сильными болями; жаръ и краснота наружныхъ частей, причемъ пациентъ не выноситъ внѣшней теплоты; больной предается *тихому знанію со слезами и внутренней грусти со вздохами*; измѣнчивое настроеніе духа; мягкость и нѣжность чувства; раздражительность, своенравіе, при которыхъ больной не терпитъ *противоречій*; чувство выпирания въ вискахъ, такъ что, кажется, черепъ готовъ лопнуть; сильное отвращеніе къ свѣту; крѣпость на ухо; *блѣдность и краснота лица попеременно*, или осунувшееся, землянаго цвѣта лицо съ синевою подъ глазами; *одна изъ щекъ красна и въ ней жгучій жаръ*; углы рта усѣяны язвинками; *больной при жеваніи и разговорѣ легко прикусываетъ языкъ*; усиленное слюнотеченіе и постоянное ослизненіе рта; *колотье и ощущеніе въ горлѣ посторонняго тѣла въ то время, когда не глоташь*, при глотаніи же легче; чрезвычайное отвращеніе къ нищѣ, особенно къ мясной и теплой; тягостное чувство послѣ ѣды и куренія табаку; *икота послѣ ѣды и питья*; судоро-

рожная боль въ животѣ съ вѣтрами; недуги отъ мелкихъ глисть; запоръ съ напраснымъ позывомъ на низъ и расположеніемъ задне-проходной кишки къ выпаденію; слизистые поносы, причемъ испражненія иногда смѣшаны съ кровью; возбужденіе полового стремленія и сладострастныя мечты, съ вялостью дѣтородныхъ частей; судороги матки съ рѣзью, колотьемъ и потужными болями; чувство стягиванія въ груди и горлѣ, причемъ сухой кашель. (Ганеманнъ.)

Jodium purum.

(Jodum.)

Юдь. Простое тѣло.

Вообще мало изслѣдованное средство. Употребляется при слѣдующихъ явленіяхъ: послѣдствія злоупотребленія ртуріемъ; опуханіе и затвердѣніе желѣзъ; золотуха, англійская болѣзнь и ревматическіе недуги; лишай; золотушное воспаленіе глазъ; болѣзни ушей; воспаленіе вѣкъ; слюнотеченіе и нарывы во рту вслѣдствіе злоупотребленія ртутью; сухотка нижней части живота (брыжжечная); ломотные и золотушные бубоны; слабость желудка; бѣли; обильное истеченіе молока; чахотка дыхательныхъ путей; хроническіе катарральные недуги; гриппъ, коклюшъ; воспалительная опухоль колѣна (phlegmasia alba dolens); большой застарѣлый зубъ; бѣлыя опухоли суставовъ и членовъ; водянка суставовъ. (Ганеманнъ.)

Ipecacuanha.

Рвотный корень. Корень растенія *Cephaelis Ipecacuanha*, сем. *Ма-реновыхъ* (Rubiaceae, Juss.).

Болѣзненное ощущеніе разбитости или напряженія въ членахъ; трескъ въ суставахъ; сильная впечатлительность къ холоду и теплу; больному лучше на открытомъ воздухѣ; чрезвычайная слабость; лицо блѣдное, съ синевою подъ глазами, какъ бываетъ послѣ тяжкой болѣзни; *внезапные приступы слабости, съ отвращеніемъ къ пдѣ и тишиною*; судороги съ закидываніемъ назадъ головы и искаженіемъ чертъ лица, которое краснѣетъ,

вздувается, причѣмъ начинается подергиваніе мускуловъ лица, губъ и вѣкъ; судорожное выпряменіе тѣла, сильная худоба; *кровотеченіе* свѣтлоокрасной крови; просовидная сыпь; сонъ съ плачемъ и полуоткрытыми глазами; *недостатокъ жизненной теплоты, ознобъ, чувство холода*; внезапные припадки жара и пота; печаль; досада, при которой больной все презираетъ и на все сердится; болѣзненное чувство, какъ будто сломанъ черепъ, и тошнота; воспаленіе глазъ; холодѣніе ушей; желто-земляной цвѣтъ или опухлость и блѣдность лица, съ синевою вокругъ глазъ; кожа вокругъ рта красна; желтая или бѣлая слизь на языкѣ; сладковатый вкусъ во рту, похожій на вкусъ крови; *отращеніе ко всякаго рода пдъ*; легкая тошнота; *рвота слезью, пищею, желчью и кровью*; сильнѣйшая боль въ желудкѣ и подъ ложечкою; ощущеніе пустоты и слабости въ желудкѣ; щиплющая боль и рѣзь въ животѣ; *слизистыя, желтыя или зеленыя испражненія, какъ будто переходящія въ броженіе; испражненія, похожія на варъ*; удушливый, судорожный кашель, причѣмъ лицо синѣетъ, а тѣло теряетъ гибкость; одышка и приступы судорожнаго удушья; дыханіе сопровождается вздохами; слизистый хрипъ въ груди. (Ганеманнъ.)

Iris versicolor.

Касатикъ, сабельникъ разноцвѣтный. Растеніе сем. *Касатиковыхъ* (Irideae).

Жаръ во всемъ тѣлѣ, а потомъ ознобъ съ холодѣніемъ рукъ и ногъ. Пульсъ ускоренный. Тяжесть въ головѣ. Жестокая роющая боль въ правой сторонѣ темени. Воспаленіе соединительной оболочки глаза. Зубная боль. Горькій, гнилой вкусъ во рту. Тошнота. Рвота водянистой и кислой жидкостью. Боль въ желудкѣ натошакъ и отъ холодной воды. Рѣзь въ животѣ, облегчаемая выходненіемъ вѣтровъ. Вонючіе вѣтры. Поносъ съ рѣзью и бурчаніемъ. Густыя вонючія испражненія. Крoвавый поносъ. Рѣжущая и колющая боль въ мочевомъ каналѣ при испусканіи мочи. Пузырьки на пястномъ суставѣ правой руки, обращающіеся въ струпу. Мелкая пузырьчатая сыпь по всему тѣ-

ду. Мелкіе вереды на спиць, лицѣ и рукахъ. — Рекомендуютъ противъ тошноты, рвоты, холерыны и натужнаго поноса, оспы и пустуль, коликъ у дѣтей, воспаления кишекъ, поноса, осиплости, болѣзней печени (наравнѣ съ Меркур.); противъ катарра желудка и слабости его, мигрени, цинги съ нарывами во рту или безъ нихъ, съ жженіемъ во рту и въ зѣвѣ, противъ нервной горячки, невралгій головы, високъ и глазъ, съ слизистой рвотой, противъ слюнотеченія, воспаления пищенріемнаго горла. (Ролендъ, Rowland.)

Kali bichromicum.

Двухромокислоз кали. Химическій препаратъ.

Слабость и изнеможеніе членовъ; слабость и кахектичскій (худосочный) видъ; общее нездоровье; чувство изнеможенія; преходящая, летучая боль во всѣхъ членахъ, не имѣющая опредѣленнаго характера; потягивающая боль въ разныхъ частяхъ тѣла; *хроническій ревматизмъ*; болѣзненность во всемъ тѣлѣ по утрамъ, при вставаніи съ постели; боли быстро переходящія изъ одной части тѣла въ другую; всеобщее истощеніе; паціентъ чувствуетъ себя лучше на открытомъ воздухѣ; когда желудочные припадки достигаютъ извѣстной степени, то ревматическія явленія исчезаютъ; симптомы быстро появляются и скоро исчезаютъ; большая часть симптомовъ появляется утромъ или усиливается въ это время. Вторичная венерическая сыпь и изъязвленіе горла. (Австрійская гомеоп. газета, т. III., тетр. 3., стр. 439.)

Kali carbonicum.

Углекислое кали. Химическій препаратъ.

Сильная чувствительность тѣла; боль въ членахъ и преимущественно въ тѣхъ мѣстахъ ихъ, на которыя паціентъ опирается; каждый разъ послѣ припадка возникаетъ чувство болѣзненнаго напряженія, сопровождаемое блѣдностью и ознобомъ; *колотье, преимущественно въ суставахъ, сухожильяхъ и мускулахъ*; боль какъ отъ изъязвленія при давленіи на какую-нибудь часть; чле-

ны легко нѣмѣютъ; особенная склонность къ надрыву при подъемѣ тяжелыхъ предметовъ; многіе припадки являются утромъ; они усиливаются на открытомъ воздухѣ; отсутствіе испарины и неспособность кожи отдѣлять потъ; сильная склонность къ простудѣ и многіе простудные недуги; *частое волненіе крови и сильное біеніе* (пульсація) *во всемъ тѣлѣ*; сильное расположеніе къ обморокамъ; нервные недуги съ внезапною дурнотой; слабость и дрожаніе членовъ; опуханіе и затвердѣніе желѣзъ; *водяничныя опухоли и отеки*; красновато-синіе ознобины; изъ язвъ, особенно по ночамъ, течетъ кровь; бородавки; *сонливость и спячка днемъ и безпокойный, похожий на дремоту сонъ ночью, съ мучительными, странными сновидѣніями*, подергиваніемъ членовъ и другими припадками; *сильная зябкость и расположеніе къ дрожи*; кожа легко потѣетъ и днемъ, и ночью во время сна; сильная тоска и робость съ меланхолическими думами о будущности; досада и гнѣвъ съ раздражительностью и сильной робостью; *частое головокруженіе* какъ бы отъ разстройства желудка; голова сильно расположена къ простудѣ; волосы сухи и лѣзутъ; мѣшечатыя опухоли между бровями и вѣками; *слезотеченіе и накопленіе въ глазахъ тоя ночью*; холодѣніе вѣкъ, *ушей*; околоушныя желѣзы воспалены и опухли; ноздри покрыты язвами и нарывами; зловонное, гнойное истеченіе изъ носу; желтизна или *блѣдность лица*, притомъ мутные, сильно впалые глаза, блѣдныя губы; на лицѣ бородавки; дурной запахъ (старымъ сыромъ) изо рта; сильный апетитъ на сласти; недѣятельность и ознобъ живота; частое и болѣзненное выхожденіе вѣтровъ; запоръ отъ недѣятельности кишекъ; частый позывъ на мочу и обильное ея отдѣленіе; половая похоть или очень сильна, или ея вовсе нѣтъ; чувство ѣдкости, зудъ, опрѣлость женскихъ дѣтородныхъ частей; *кашель съ обильнымъ отдѣленіемъ слизи или тоя*; отхаркиваніе затруднено; припадки судорожнаго удушья и т. п. (Ганеманнъ.)

Kali chloricum.

Хлорноватокислое кали, Вертолетова соль. Химическій препаратъ.

Лихорадочное состояніе съ сердцебіеніемъ и ускореннымъ пульсомъ. Головокруженіе съ приливомъ крови отъ сильнаго дви-

женія. Постоянная головная боль, вечеромъ. Судороги глазныхъ вѣкъ. Приливъ крови къ глазамъ. Сильное кровоточеніе носомъ. Колотье въ челюстяхъ и зубахъ. Опуханіе губъ. Кровоточивость десенъ. Обильное отдѣленіе слюны. Затрудненное глотаніе. Рѣжущая боль въ желудкѣ. Давленіе въ подреберья и до пупка; легче по выходѣ вѣтровъ. Медленно отдѣляющіяся, твердыя, сухія испражненія, затѣмъ слизь съ кровью. Боль въ прямой кишкѣ. Сильный напоръ мочи. Подергиваніе въ мочевомъ каналѣ. Охрипость. Кашель и насморкъ съ раздраженіемъ гортани. Стѣсненіе дѣханія. Просовидная сыпь. Сыпь подобная сифилитической. (Штапфъ.)

Kali hydrobromicum.

(*Kalium bromatum.*)

Бромистое кали (потассій). Химическій препаратъ.

Головокруженіе съ тяжестью въ головѣ. Раздраженіе слизистой оболочки рта и зѣва. Накопленіе слюны во рту. Ёдко-соленый вкусъ во рту. Давленіе въ желудкѣ послѣ ѣды. Слабость желудка. Ощущеніе жара въ животѣ. Бурчаніе. Вѣтры. Испражненія обильныя, мягкія, съ рѣзью. Обильная, свѣтложелтая, водянистая моча. Боль въ области почекъ. Охрипость съ болью въ горлѣ. Короткій кашель вечеромъ. Стѣсненіе въ груди. Кровохарканіе. Рекомендуютъ преимущественно противъ дифтерита, когда притомъ осиплость и кашель (1-ое или 2-ое десятичное растираніе). Любимое средство аллопатовъ противъ всевозможныхъ нервныхъ болѣзней; въ гомеопатіи же примѣненіе бромистаго кали противъ судорогъ увѣчалось лишь весьма сомнительнымъ успѣхомъ.

Kali hydroiodicum.

(*Kali iodatum.*)

Иодистое кали, іодистый потассій. Химическій препаратъ.

Средство еще весьма мало испытаное. — Стрѣляющія боли въ членахъ; большая часть симптомовъ обнаруживается во время

обѣда и исчезаетъ отъ движенія; весьма частая зѣвота; *бессонница*; безпокойныя ночи, приче́мъ пробужденіе со вздрагиваніемъ и испугомъ; преобладаніе *холода или озноба*, съ жаждою; безпокойство вечеромъ, наклонность къ слезамъ, какъ будто пациентъ ждетъ какого-нибудь несчастія; расположеніе къ испугу; гнѣвъ, вспыльчивость и сварливое расположеніе духа; кровь носомъ. (Гартлаубъ и Тринксъ.)

Kalmia latifolia.

Кальмія широколиственная, ложечное дерево. Растеніе семейства *Вересковыхъ* (Ericaceae).

Ознобъ и жаръ. Холодный потъ. Головная боль съ головокруженіемъ и тошнотою. Мутное зрѣніе. Давленіе, колотье и зудъ въ глазахъ. Блѣдность лица. Личная боль. Воспаленіе подъязычныхъ желѣзъ. Ощущеніе опухоли въ горлѣ, или чувство какъ будто въ горлѣ поднимается шаръ. Затрудненное глотаніе. Тошнота съ головокруженіемъ, головной болью и потемнѣніемъ въ глазахъ. Давленіе подъ ложечкой; усиливается, когда сидишь согнувшись. Боль и давленіе въ области печени. Полужидкія испраженія съ слизью и натугой. Регулы запоздалыя, недостаточныя, съ болью въ спи́нѣ и яшкахъ. Желтоватыя бѣли. Кашель днемъ и ночью, возбуждаемый скребленіемъ въ горлѣ, по вечерамъ съ мокротою. Давленіе въ груди и одышка, особенно во время раوماتическихъ страданій. Сильное сердцебіеніе. Рожистое, зудящее воспаленіе кожи. (Герингъ.)

Kamala.

Камала. Красный порошокъ, получаемый изъ желѣзокъ сѣменныхъ капсулъ *Rottlera tinctoria*, растенія сем. *Молочаиныхъ* (Euphorbiaceae).

Средство это патогенетически не изслѣдовано. Употребляется эмпирически, въ сильныхъ дозахъ, противъ глисть, преимущественно противъ солитера.

Kouso.

(Kusso.)

Куссо. Цвѣты *Brayera anthelminthica*, растенія Восточной Африки, сем. *Розановыхъ* (Rosaceae).

Средство противъ солитера.

Kreosotum.

Креозоть. Химическій препаратъ, получаемый изъ дегтя.

Боли какъ отъ изъязвленія, нарывныя, какъ при ушибахъ и переломахъ; колотье въ суставахъ; боли по ночамъ; тѣло сильно возбуждено, такъ что пациенту и въ покойномъ положеніи кажется, будто оно движется; сыпь похожая на ослу; жирная чесоточная сыпь; сухіе и мокнущіе лишай; сильная сонливость и зѣвота; тяжкіе сны; чрезвычайная зябкость; скорбь, тоска, отсутствіе надежды на выздоровленіе; память очень слаба; приливъ крови къ головѣ со стукомъ и ощущеніемъ, какъ будто мозгъ готовъ вывалиться; чувствительность той части головы, которая покрыта волосами и выпаденіе ихъ; края вѣкъ опухли; глаза гноятся, изъ нихъ обильно текутъ ѣдкія слезы; воспаленіе, сильная краснота и опухоль наружнаго уха, съ болѣзненнымъ чувствомъ жженія; мокнущіе лишай на ухахъ; земляной цвѣтъ лица; угри на немъ; мѣднокрасная сыпь на лицѣ, лишай на вѣкахъ, щекахъ и вокругъ рта; зубная боль, распространяющаяся до висковъ; тошнота и рвота водянистою жидкостью; боль и чувство затвердѣнія въ устьѣ желудка; судорожныя родильныя потуги; боль какъ отъ изъязвленія и чувство холода въ животѣ; неправильное, твердое испражненіе съ натугою; частый позывъ на мочу съ обильнымъ ея отдѣленіемъ, особенно по ночамъ; вонючая моча, кофейнаго цвѣта, съ краснымъ осадкомъ; легкое выпаденіе матки; слишкомъ раннія менструаціи съ обильнымъ истеченіемъ темной крови; послѣ регуль отдѣляется ѣдкая, кровянистая сукровица съ острымъ запахомъ; *болѣзненная менструація;* ѣдкія, гнилаго запаха бѣли, или желтыя безъ боли; зудъ и ощущеніе шероховатости въ горлѣ; *сухой кашель со свистомъ,* иногда съ позывомъ на рвоту; одышка, тяжесть въ груди; колотье въ сторонѣ сердца. (Вале.)

Lachesis.

Лахезисъ. Зубной ядъ змѣи *Trigonocephalus Lachesis* (*Crotalus mutus* — Linné; *Bothrops Surukuku* — Wagler), водящейся въ жаркихъ странахъ Южной Америки.

Флегматическій темпераментъ, тучность тѣла, темные глаза, расположеніе къ лѣни; *чрезвычайная худоба, чувство дерганья съ искривленіемъ членовъ*, причемъ пораженная часть негибка; боли въ костяхъ, возникающія чаще по вечерамъ и прекращающіяся во время сна; параличъ; нетвердая, неловкая походка вслѣдствие негибкости суставовъ; *лень, пациентъ опасается движенія, затрудняется ходить и особенно любитъ лежать*; чрезвычайная, внезапно наступающая слабость и частые обмороки; конвульси, подергиваніе, судороги, припадки падучей болѣзни; *возвращеніе и усиленіе припадковъ во время сырой погоды, при слишкомъ высокой или слишкомъ низкой температурѣ воздуха, постъ сна днемъ или ночью*, также вслѣдствіе испуга, опорченія, употребленія кислаго, пива, вина и особенно при покойномъ положеніи, между тѣмъ какъ *при движеніи больному легче*; бугорчатая сыпь, краснуха, лишай и бородавки; *гангренозная оспа, багряная рожа*; кровавыя пятна, *болѣзненная желтизна кожи*; грязныя, плоскія, отдѣляющія сукровицу язвы; *глубокое нагноеніе*; старые рубцы покрываются язвами; вокругъ язвъ пузыри; расширеніе венъ; сильная сонливость во время дня и спячка; чрезмѣрная зябкость, *ощущеніе холода* или жара съ волненіемъ крови; сильное расположеніе кожи къ потѣнію или полная недѣятельность ея; *сильная склонность къ грусти*, причемъ пациенту представляется все въ мрачномъ видѣ; *печальныя опасенія, утрата надежды на выздоровленіе*; ночные приступы страха; недовѣріе, подозрительность, нерѣшительность; бранливость, склонность клеветать на другихъ и защищать себя; чрезвычайная слабость памяти и забывчивость, преимущественно относительно правилъ орѳографіи; неистовая ревность, сильная склонность къ шуткамъ и остроумамъ, *чрезвычайно усиленная дѣятельность воображенія, съ обиліемъ мыслей, которая большою съ трудомъ можетъ привести въ порядокъ*; сильный приливъ крови къ головѣ, причемъ пациенту кажется,

что черепъ готовъ лопнуть; уши сухи и сѣра въ нихъ бѣлая; *обильное кровотеченіе носомъ* и сморканье кровью; *сильная склонность къ насморку*; лицо блѣдное, свинцоваго цвѣта, около глазъ синева; желто-сѣраго, землянаго цвѣта лицо съ рожевидною на немъ опухолью; горловая боль, распространяющаяся до ушей, съ чувствомъ удушья; *ощущеніе, какъ будто въ горлѣ находится постороннее тѣло, которое причиняетъ весь припадки*; больному очень хочется вина и молока, хотя они ему вредны; чрезвычайная слабость желудка съ сильнымъ чувствомъ обремененія послѣ ѣды; *отсутствіе всякаго аппетита* на пищу, вино и табакъ; частая *пустая отрыжка*, производящая большое облегченіе, между тѣмъ какъ безъ нея страданія усиливаются; сильная чувствительность къ прикосновенію и давленію одежды; *упорный запоръ*; обильное отдѣленіе мочи и частый позывъ на нее; *усиленная половая похоть и обиліе сладострастныхъ мыслей* съ неполными напряженіями члена и неспособностью къ соитію; *скудные, неправильныя, задержанныя менструаціи*, сопровождаемыя сильными страданіями, преимущественно въ эпоху прекращенія регуль въ старости; *усиленная чувствительность гортани къ прикосновенію*, доводящая до опасенія задохнуться; постоянная охриплость, которую какъ бы причиняетъ плотно приставшее къ гортани тѣло; *стѣсненіе дыханія*, особенно послѣ обѣда и ночью во время сна; сильное *сердцебиеніе, вмѣстѣ съ другими страданіями*; тоска въ сторонѣ сердца. (Герингъ.)

Lactuca virosa.

Ядовитый латукъ. Раст. сем. Цикорныхъ (Cichoriaceae).

Повидимому дѣйствуетъ преимущественно на органы дыханія. Употребляется при слѣдующихъ обстоятельствахъ: *терзаніе*, ощущаемое сначала въ суставахъ плеча и праваго локтя, затѣмъ то въ кисти, то въ колѣнахъ, ляшкѣ, суставѣ ступни, затылкѣ, вискахъ и проч.; болѣзненное чувство въ членахъ, послѣ обѣда, когда сидишь спокойно; подергиваніе острое, судорожное, близъ суставовъ (въ затылкѣ, въ подреберьи, въ локтяхъ, въ бедрахъ), всего чаще вечеромъ и въ спокойствіи; иногда также хуже

утромъ, и особенно поражаются разгибающіе мускулы; судорожныя боли, которыя переходятъ съ одной части тѣла на другую и мѣшаютъ ихъ движенію (особенно въ локтяхъ, кистяхъ, пальцахъ, ногахъ); во всѣхъ членахъ чувство разбитости, заставляющее больного проводить весь день въ постели; *повсемѣстное изнеможеніе*, иногда съ неподвижностью; *сильная усталость*, иногда съ необходимостію спать, или утромъ, когда встанешь, съ неспособностью къ работѣ; послѣ малѣйшаго занятія раздраженіе и утомленіе, какъ послѣ утомительной работы; — необходимость держаться прямо при сидячемъ положеніи; на *открытомъ воздухѣ* чувствуешь себя лучше, и въ особенности грудь свободнѣе; облегченіе припадковъ особенно отъ движенія на открытомъ воздухѣ; стремленіе къ открытому воздуху; одышка. (Журналъ Ф. А. М. Л., II., 1.)

Laurocerasus.

Лавровая вишня. Растеніе (*Prunus Laurocerasus*) семейства *Миндалевыхъ* (*Amygdaleae*).

Употребляется противъ синей болѣзни (синюхи), *скоротечной мелочной чахотки и холеры*; также при *судорожномъ дрожаніи*, внезапной слабости съ чрезвычайнымъ нервнымъ изнеможеніемъ. (Гартлаубъ и Тринксъ.)

Ledum palustre.

Дикій розмаринъ. Раст. сем. *Вересковыхъ* (*Ericaceae*, *Juss.*).

Ревматическіе и артритическіе недуги; ломотныя узловатости на суставахъ и водянка; лишай, хроническія сыпи, кровавыя нарывы, всеобщая подкожная водянка; крѣпость на ухо послѣ простуды головы, лишай на лицѣ; судорожный кашель. (Ганеманнъ.)

Leptandra virginica.*(Veronica virginica).*

Вероника Виргинская. Растеніе семейства *Норичниковыхъ* (Scrophularineae).

Боль подъ ложечкой и около пупка, усиливающаяся отъ холоднаго питья. Рѣзь въ кишкахъ. Обильныя испраженія. Головная боль во лбу. Боль въ паховыхъ желѣзахъ и въ яичкахъ. Жаръ и сухость кожи. Общее изнеможеніе и упадокъ силъ. Американскіе врачи рекомендуютъ это средство противъ: боли въ желудкѣ, холеры, воспаленія кишекъ, поноса простаго и кроваваго, желчной лихорадки, желтухи, геморроя, болѣзней сердца вслѣдствіе страданій печени, судорогъ желудка, слабости пищева-ренія, нервной горячки, водянки и перемежающейся лихорадки.

Lobelia inflata.

Лобелія одутлая. Раст. сем. *Лобелиевыхъ* (Lobeliaceae).

Холодъ по всему тѣлу. Обильный потъ. Пульсъ ускоренный. Дурнота и головокруженіе. Сильная рвота. Давленіе въ желудкѣ, отзывающееся въ груди. Боль въ животѣ, усиливающаяся послѣ ѣды, съ головной болью. Поносъ. Усиленное отдѣленіе мочи. Стѣсненное, короткое дыханіе съ ощущеніемъ полноты въ груди. Одышка. Боль въ груди усиливается отъ движенія. (Ноакъ.)

Lycopodium.

Плаунъ, получаемый изъ растений *Lycopodium clavatum*, *Lyc. complanatum* и *Lyc. annotinum*, сем. *Плауновыхъ* (Lycopodiaceae, Juss.).

Болѣзненное чувство разбитости въ членахъ; чувство напряженія и дерганья въ пораженныхъ частяхъ, особенно когда оно является черезъ день или возникаетъ при сырой, вѣтренной пого-

дѣ и облегчается отъ наружной теплоты; страданія усиливаются преимущественно послѣ обѣда и облегчаются подъ вечеръ; *на открытомъ воздухѣ легче*, или же *больной очень чувствителенъ къ нему*, особенно если воздухъ холоденъ; сильная склонность къ простудѣ; параличеобразная окоченѣлость и негибкость членовъ и суставовъ; сильное волненіе крови и безпокойство въ тѣлѣ; частое и до того сильное ощущение холода, что *больному кажется, будто кровь стываетъ или останавливается въ жилахъ*; нѣкоторые члены и мускулы судорожно сжимаются и разжимаются; искривленіе членовъ со щемленіемъ въ нихъ; конвульсіи, какъ при падучей болѣзни; быстрое нѣмѣніе членовъ; *усталость и дрожаніе членовъ*; частые обмороки; *сильная худоба*; кожа суха и растрескалась; свербящія, желчныя пятна; мокнушіе лишай; большіе кровяные нарывы, которые появляются періодически; *ломотная узловатости*; опуханіе желѣзъ; водяночныя опухоли; размягченіе, искривленіе и нагноеніе костей; *боли въ костяхъ ночью*; сонливость и зѣвота днемъ, но притомъ больной не скоро засыпаетъ; сонъ его тревоженъ, полонъ фантастическихъ грезъ и, при пробужденіи, больной не чувствуетъ укрѣпленія силъ; больной сильно зябнетъ, у него недостатокъ жизненной теплоты; жгучій лихорадочный жаръ вечеромъ и *обильное потнѣніе днемъ*, причемъ потъ иногда кисель и съ острымъ запахомъ; *меланхолическая грусть, печаль, слезливость*; *больной придаетъ тоску по вечерамъ*; онъ *недовѣрчивъ, боится людей и вмѣстѣ уединенія*; раздражительная впечатлительность, своенравіе съ досадою; ярое бѣшенство съ гордостью и стремленіемъ повелѣвать; сильная забывчивость, при которой пациентъ ошибается въ словахъ, слогахъ и буквахъ при чтеніи; разные недуги и головная боль вслѣдствіе чрезмѣрныхъ умственныхъ занятій; приливъ крови къ головѣ, съ чувствомъ тяжести и лома головы какъ внутри, такъ и снаружи, съ болью въ костяхъ черепа; сѣдѣніе волосъ и *выпаденіе до плечи*; расстройство зрѣнія, такъ что больной видитъ половины предметовъ въ вертикальномъ направленіи; усиленная воспримчивость слуха и обонянія; *блѣдность, земляной цвѣтъ лица*, рѣзкія черты, синева подъ глазами, синія губы; частый летучій жаръ лица; желтѣніе зубовъ; гнилой запахъ изо рта; аппетитъ на сласти; сильная чув-

ствительность подъ ложечкой къ прикосновенію и давленію платьемъ; чувство стягиванія въ подреберной странѣ, какъ бы обручемъ; *страданіе печени*; накопленіе вѣтровъ, *твердыя* испражненія и запоръ съ напраснымъ позывомъ на низъ; почечные камни; сильное или слабое половое влеченіе; долговременная сухость маточнаго рукава; кашель съ изверженіемъ зеленыхъ и соленыхъ слизи или гноя; на груди желчныя пятна, на затылкѣ кожа желта. (Ганеманнъ.)

Lycopus virginicus.

Красива Виргинская, тютникъ, волоконогъ. Раст. сем. *Губоцвѣтныхъ* (Labiatae).

Средство мало изслѣдованное. Употребляется противъ болѣзней сердца вслѣдствіе пораженія легкихъ, когда преобладаетъ чувство сдавливанія сердца, слышится шумъ дуновенія въ немъ; раздраженіе сердца отъ малѣйшаго движенія.

Magnesia carbonica.

Углекислая магнезія. Химическій препаратъ.

Болѣзненное чувство разбитости и какъ бы вывиха или сильнаго изнеможенія, преимущественно въ ногахъ; параличная слабость, отъ которой больной падаетъ; обмороки и паденіе безъ потери памяти; большая часть припадковъ появляется и усиливается при сидѣніи, а также вечеромъ и ночью; маленькіе, чешуйчатые, красные лишай; маленькіе кровяные нарывы; чрезвычайная сухость кожи; ночной жаръ, тяжкія грезы, крикъ и внезапное вскакиваніе; ознобъ вечеромъ; кислый или жирный зловонный потъ; тоска и робость; досада, дурное настроеніе духа; головокруженіе, отъ котораго больной вдругъ падаетъ на земь; дерганье, сверленіе, стрѣльба въ головѣ; *чувство жженія въ глазахъ съ отверщеніемъ къ свѣту*; роговая оболочка темнѣетъ; глазное яблоко опухаетъ, какъ бы отъ скопленія въ немъ водянистой влаги; шумъ и вѣяніе въ ушахъ; цвѣтъ лица *блѣдный, земляной, измѣнчивый*; чувство напряженія въ лицѣ, какъ бы отъ засохшаго на немъ

яичнаго бѣлка; лицо одутлое, шишковатая опухоль на немъ; ночью личная и зубная рвущія боли, безпокоящія въ постели и усиливающіяся отъ холода; ротъ и языкъ покрыты пузырьчатой сыпью; рѣчь больнаго нерѣдко вдругъ прерывается; *сильный аппетитъ на сырую зелень и отвращеніе къ мясной пищѣ*; кислый вкусъ во рту и отрыжка; твердыя испраженія и запоръ; поносы съ пѣнистыми, кислопахучими или зелеными испраженіями, съ рѣзью въ животѣ; выхожденіе круглыхъ и мелкихъ глисть въ большомъ количествѣ; усиленное отдѣленіе мочи, блѣдной или зеленоватой; *позднія, задержанныя мѣсячныя очищенія*, или же слишкомъ раннія, обильныя, соединенныя съ болями; бѣли съ острой слизью и судорогами нижней части живота; ночной судорожный кашель; часто являющаяся негибкость затылка. (Ганеманнъ.)

Magnesia muriatica.

Водохлорнокислая магнезія. Химическій препаратъ.

Сверлящія или стягивающія судорожныя боли; стягиваніе и ломъ съ онѣмѣніемъ членовъ; *приступы истерическихъ судорогъ и истерической слабости*; расположеніе къ простудѣ; слабость тѣла, зависящая иногда, повидимому, отъ желудка; чувство неловкости и разбитости во всемъ тѣлѣ, съ сильной чувствительностью къ малѣйшему шуму; *большая часть симптомовъ обнаруживается при сидячемъ положеніи или ночью, а облегчается отъ движенія*. (Ганеманнъ.)

Magnetismus.

Магнетизмъ.

Животный магнетизмъ есть совокупность всѣхъ явленій, которыя порождаются вліяніемъ (незамѣтнымъ для чувствъ) одного индивидуума на другой. Вліяніе это особеннымъ образомъ настраиваетъ организмъ и особенно нервную систему, и настроеніе это, по сущности характера его, нельзя считать болѣзненнымъ,

напротивъ того, магнетизмъ возстановляетъ силы и даже излѣчиваетъ болѣзни.

Искусственный магнитъ изготовляется изъ англійской стали хорошаго закала посредствомъ натиранія магнитнымъ камнемъ. Примѣняютъ къ лѣченію сѣверный или южный полюсъ магнита (polus magnetis arcticus или australis), или же оба вмѣстѣ (poli magnetis ambo).

Здѣсь мы рекомендуемъ магнетизмъ особенно противъ паралича и зубной боли.

Manganum.

(Manganum aceticum.)

Уксусокислый марганецъ. Химическій препаратъ.

Нестерпимыя боли въ надкостной плевѣ и суставахъ; *ломота въ суставахъ съ чувствомъ жгучей боли, похожей на напряженіе*, подергиваніе и колотье, большею частью въ одной половинѣ пораженнаго органа или распространяющейся по поясницѣ; воспаленіе костей, съ болью по ночамъ; опрѣлости въ сгибахъ суставовъ; *отъ переменны погоды больной чувствуетъ себя то лучше, то хуже*; воспалительныя опухоли, переходящія въ нагноеніе; частая зѣвота и безъ наклонности ко сну; ослабленіе дѣятельности чувствъ; сильная сухость глазъ, жаръ и слѣпаніе вѣкъ ночью; неясность зрѣнія съ жженіемъ въ глазахъ; *крѣпость на ухо, происходящая какъ бы отъ залеганія ушей*, исчезающая когда больной сморкается и уменьшающаяся или усиливающаяся отъ переменны погоды; шумъ, свистъ въ ушахъ, или трескъ во время сморканья и глотанья; лицо блѣдное, изнуренное, какъ бы вслѣдствіе развратной жизни; хроническія опухоли горла съ рѣжущей болью; слишкомъ частое выхожденіе вѣтровъ и разные недуги отъ нихъ; затрудненное испраженіе сухаго кала въ видѣ шариковъ или похожее на кашицу; *недухи гортани и развѣтвленій дыхательнаго горла, съ шероховатостью и сухостью горла и хрипотою.* (Ганеманшъ.)

Mephitis putorius.

Зловонный сокъ Сѣвероамериканскаго хорька (*Viverra putorius*)
сем. Carnivorae.

Припадки, являющіеся по утрамъ; соединительная оболочка глазъ красна, такъ что больной не въ состояннн читать мелкій шрифтъ; легочный катарръ съ продолжительными отъ него болями; ревматическія боли; чувство разслабленія; лѣдность и потягота; легкое дрожаніе нервовъ. (Герингъ.)

Mercurius bijodatus.

(*Mercurius jodatus ruber*, *Hydrargyrum bijodatum*, *Deutojoduretum Hydrargyri*.)

Двѣюдистая ртуть. Химическій препаратъ.

Дѣйствуетъ сходно съ другими ртутными препаратами. Преимущественно рекомендуютъ противъ болѣзней желѣзъ, воспаленія яичекъ вслѣдствіе скрывшейся заушницы, противъ золотухи и водянки.

Mercurius cyanatus.

(*Cyanuretum Mercurii*.)

Синеродистая ртуть. Химическій препаратъ.

Жестокая головная боль. Язвинки во рту. Десны разрыхлены. Сильное слюотеченіе. Вонючая слюна. Рвота съ кровью. Жестокая рѣзь въ животѣ. Частые позывы на низъ съ натугою; кровавый поносъ. Совершенное задержаніе мочи. Вонючее дыханіе. Кашель. Употребляется въ послѣднее время преимущественно противъ крупознаго воспаленія горла, когда можно опасаться антонова огня (въ скарлатинѣ), противъ дифтерита и молочницы.

Mercurius dulcis.*(Calomel, Hydrargyrum chloratum mite.)*

Каломель, хлористая ртуть. Химическій препаратъ.

Полезно въ слѣдующихъ случаяхъ: шелушеніе кожи, особенно на рукахъ и ногахъ; причиняющія боль ѣдкія болячки съ бѣлымъ основаніемъ и воспаленными краями, во рту, на нѣбѣ, лицѣ, половыхъ и другихъ частяхъ, причѣмъ лихорадка, обильный потъ ночью, терзаніе въ членахъ, упадокъ силъ и дрожаніе; гнилая горячка; — выпаденіе волосъ; глухота отъ опухоли, сжимающей эвстахіеву трубу; сильное кровотеченіе носомъ; трудно открывать ротъ; въ зубахъ сильное жженіе, они шатаются и выпадаютъ; десны пухнутъ и источаютъ кровь отъ прикосновенія; язвы во рту, источающія кровь, особенно ночью; молочница на языкѣ; слюнотеченіе, иногда съ сильнымъ кровотеченіемъ; слюна чрезвычайно зловонна, разъѣдаетъ губы и щеки; поносы; сильное стѣсненіе въ груди и около сердца. (Патоген. изсл. Ганеманнъ.)

Mercurius solubilis Hahnemanni.*(Hydrargyrum oxydulatum nitricum ammoniatum.)*

Ганеманнова растворимая ртуть, основная азотнокислая закись ртути. Фармацевтический препаратъ.

Приливы, волненіе и истеченіе крови; боль въ суставахъ, подобная бывающей при вывихахъ, которая доводитъ больного до такого безпокойства, что онъ не находитъ себѣ мѣста; *бользненное чувство разбитости во всѣхъ членахъ, особенно въ ящикахъ, и боль во всѣхъ костяхъ*; ощущеніе растяженія, дерганья въ членахъ, преимущественно ночью, при чемъ обильный потъ безъ облеменія; быстрое нѣмѣніе и цѣпенѣніе членовъ съ нечувствительностью, подобной омертвѣнію; бользненное ощущеніе, будто мягкія части тѣла отдѣляются отъ костей; большое безпокойство и подергиваніе членовъ, съ постояннымъ стремленіемъ двинуть ими; чрезвычайное истощеніе и слабость съ несписаннымъ чувствомъ тѣлеснаго и душевнаго

страданія; чрезмѣрное утомленіе при малѣйшей ручной работѣ и незначительной ходьбѣ; частые обмороки; чрезвычайная худоба; недуги усилваются по вечерамъ и ночамъ въ теплой постели; воспалительныя боли въ костяхъ по ночамъ; колющая боль въ членахъ и суставахъ, сопровождаемая ощущеніемъ холода въ нихъ; горячія воспалительныя опухоли; желѣзы воспалены, опухли и тмятся; сухія краснуховидныя сыпи, изъ которыхъ, при чесаніи, истекаетъ кровь; воспалительныя опухоли съ медленнымъ нагноеніемъ; больной долго не засыпаетъ отъ тревожнаго состоянія духа и тоски; сонъ его очень чутокъ; холодъ и дрожь, преимущественно вечеромъ и ночью; жаръ и волненіе въ крови по ночамъ, съ бессонницею; чрезвычайная склонность къ испаринѣ, наступающей при появленіи болей; обильный кислый, ночной потъ; сильное безпокойство, преимущественно вечеромъ и ночью, сопровождаемое тоскою и страхомъ; капризы, нетерпѣніе, сварливость, раздражительность, склонность къ противорѣчію; ипохондрическія опасенія и странное чувство какого-то внутренняго озлобленія; больной въ одной половинѣ головы чувствуетъ колюще и дерганье; ощущеніе выниранія и полноты, причемъ больному кажется, что черепъ готовъ лопнуть; волосы лѣзутъ; вѣки изъязвлены, струнья вокругъ глазъ; чрезвычайная боязнь свѣта и огня; ощущеніе колюща и разрывающей боли въ ушахъ: околоушныя желѣзы опухли; красная, лоснящаяся опухоль носа; земляной, блѣдный цвѣтъ лица; лицо покрыто грязными желтыми струньями; зубы растрескались и изъязвлены; въ деснахъ чувство жженія и боль какъ отъ изъязвленія, по ночамъ; зубы шатаются и выпадаютъ; гнилой запахъ изо рта; во рту жгучіе нарывы или молочница; истеченіе вонючей слюны; охриплость и неясность голоса; сильный голодъ; неутолимая жгучая жажда на холодное питье; гнилой вкусъ во рту; чрезвычайная слабость пищеваренія, и притомъ постоянное чувство голода; воспалительная опухоль наховыхъ желѣзъ и нагноеніе ихъ; напрасный позывъ на низъ, преимущественно по ночамъ; частыя, жидкія, слизистыя, ѣдкія, смѣшанныя съ кровью испраженія, изъязвляющія задній проходъ; обильное отдѣленіе мочи; моча темнокраснаго цвѣта, зловонная; болѣзненные напряжения члена (эрекціи) ночью; гнойныя, ѣдкія бѣли, слишкомъ обильныя регулы, съ тоскою и болями въ животѣ; сухой, чрезвычайно силь-

ный кашель, такъ что больному кажется, что голова и грудь у него готовы лопнуть. (Ганеманнъ.)

Mercurius sublimatus corrosivus.

(*Hydrargyrum muriaticum corrosivum*, *Hydrargyrum bichloratum*.)

Сулема, двухлористая ртуть. Химическій препаратъ.

Стягиваніе въ надкостной плевнѣ, какъ передъ приступомъ перемежающейся лихорадки, съ чувствомъ жара въ головѣ; при засыпаніи сильное вздрагиваніе съ потрясеніемъ всего тѣла; сильное расположеніе къ зябкости, особенно головы; ознобъ, происходящій отъ малѣйшаго движенія, а также на открытомъ воздухѣ (даже во время жаровъ), иногда съ рѣзью въ желудкѣ и натугой; жаръ при пагибаніи; при выпрямленіи чувство освѣженія; дурное расположеніе духа, попеременно съ веселостью; слюнотеченіе, слизистыя испраженія съ кровью и натугой; бѣли отвратительнаго запаха. (Ганеманнъ.)

Mercurius vivus.

(*Hydrargyrum*, *Argentum vivum*.)

Ртуть. Живая ртуть. Простое тѣло.

Дѣйствуетъ такъ же, какъ и *Mercurius solubilis* Н.

Mezereum.

Волчье лыко. Кора растенія *Daphne Mezereum*, сем. Ягодковыхъ (*Thymeleae*, *Juss.*).

Волѣзни костей и слизистыхъ оболочекъ; ревматическія боли съ чувствомъ дерганья, растяженія и напряженія въ членахъ; боли съ ознобомъ и дрожью въ одной только половинѣ пораженной части, которыя усиливаются отъ прикосновенія и движенія; чрезвычайная чувствительность къ холодному воздуху; трехдневная перемежающаяся лихорадка, сопровождаемая опухолью селезенки и чрезвычайной чувствительностью къ холодному воздуху;

боли въ костяхъ черепа съ чувствомъ растягиванія и онѣмѣнїя; чешуйчатая, свербящая, мовнущая сыпь на той части головы, которая покрыта волосами; воспаление глазъ; свербящая сыпь за ушами; отдѣленіе носомъ желтой, жидкой, смѣшанной съ кровью слизи, которая производитъ изъязвленіе; щемящая или одуряющая личная боль; колющая, жгучая, похожая на сверленіе боль въ тилъхъ зубасъ; ощущение оскомины на зубахъ, причеиъ они кажутся длиннѣе обыкновеннаго; *слизистая бѣли, производящая изъязвленіе*; кровавая моча. (Ганеманнъ.)

Millefolium.

(*Achillea Millefolium.*)

Тысячелистникъ, кровавикъ. Растеніе семейства *Щитконосныхъ* (Corymbiferae).

Слабость. Нездоровье во всемъ тѣлѣ. Судороги. Коввульсіи. Вдрагиваніе отъ колющей боли. Припадки падучей болѣзни. Приливъ крови. Кровотеченіе изъ разныхъ органовъ. Слизетеченіе. Употребляется противъ приливовъ къ головѣ, груди и сердцу, противъ кровотеченія изъ носа, изъ прямой кишки (геморрой), противъ кровотеченія мочевыми путями, кровотеченія изъ матки, кровохарганія, бѣлей.

Moschus.

Мускусъ. Особое вещество, находимое въ мѣшечкѣ между пупкомъ и дѣтороднымъ членомъ у животнаго *Moschus moschiferus* сем. *Жвачныхъ* (Ruminantia).

Нервные, ипохондрическія и истерическія страданія съ безсознательными жалобами; обмороки, каталептический столбнякъ; *нервные припадки*; бессонница вслѣдствіе сильной раздражительности нервовъ; мужское безсиліе; Миллярова одышка; спазмы въ груди у истерическихъ особъ. (Ганеманнъ.)

Muriatis acidum.*(Acidum muriaticum, Acidum hydrochloratum).*

Соляная кислота. Химическій препаратъ.

Золотуха; кровавые чирья съ колющей болью; тифъ съ гнилостнымъ характеромъ; разстройство зрѣнія, такъ что пациентъ видитъ только половину предметовъ въ вертикальномъ направленіи; нечувствительность органа слуха; крѣпость на ухо и стукъ въ ушахъ; залеганіе носа; угри и веснушки на лицѣ; цинготное состояніе десенъ; воспаленіе горла и чувство садненія въ зѣвѣ; слабость желудка съ отвращеніемъ къ мясной пищѣ и склонность къ отрыжкѣ; чувство переполненія желудка даже послѣ умеренной ѣды; судороги нижней части живота; вѣтры, вздутость живота; синеватая опухоль геморроидальныхъ шишекъ въ заднемъ проходѣ, съ жгучею болью, какъ отъ изъязвленія; кровотеченіе изъ мочевого пузыря. (Галеманнъ.)

Myrica cerifera.Восковое дерево. Раст. сем. *Муриказіевыхъ* (Myricaceae).

Средство это употреблялось пока только противъ кроваваго поноса и желтухи. Еще не изслѣдовано патогенетически.

Naja tripudians.Ядъ Остъ-Индской змѣи *Coluber naja* (очковой змѣи).

Слабость. Ознобъ и холодѣніе рукъ и ногъ. Мрачное, унылое настроеніе духа. Слабая память. Текучій насморкъ. Отрыжка. Тошнота и разстройство пищеваженія. Чувство полноты подъ ложечкой. Сначала твердые испраженія, потомъ поносъ. Густой, слизистый осадокъ мочи. Возбужденіе похоти. Бѣли. Охриплость. По вечерамъ кашель отъ щекотанія въ горлѣ. Сильное сердцебиеніе. Ревматическая боль въ спинѣ и лопаткахъ. Средство это дѣйствуетъ подобно *Lachesis* и употребляется при

гипертрофія сердца, при сердцебіенія отъ нервныхъ и органическихъ причинъ, противъ хронической головной боли и раздраженія спиннаго мозга. (The british journal of Homeopathy.)

Natrum carbonicum.

Углекислый натръ. Химическій препаратъ.

Употребляется рѣже *Natr mur.*, съ которымъ вообще оно очень сходно по своему дѣйствию. Симптомы: ревматическіе недуги съ сокращеніемъ мускуловъ; золотуха; слабость вслѣдствіе растраты соковъ; ипохондрическіе припадкы; *наклонность къ вывисамъ и надрывамъ*; ухудшенія послѣ грозы; приступы боли съ тоскою, дрожью и потомъ; наклонность къ простудѣ; безсиліе и вилость всего тѣла; сильная усталость даже послѣ незначительной ходьбы или работы; *сухость кожи, съ обильнымъ потомъ послѣ малѣйшаго движенія и напряженія*; гнойные лишай; узловатая шишка у страдающихъ проказою; большія бородавки, изъ которыхъ течетъ кровь; сонливость днемъ, причеиъ больной поздно засыпаетъ; фантастическія сновидѣнія; сильное охлажденіе оконечностей; ночной потъ, который смѣняется сухостью кожи; ипохондрическая грусть и отчаяніе; безпокойство; тоска; раздражительность съ наклонностію вредить ближнимъ; неспособность къ размышленію и слабость отъ умственныхъ занятій; головная боль отъ солнечнаго жара; воспаленіе глазъ съ свѣтобоязнью; фистула слезнаго мѣшечка; дальноркость; крѣпость на ухо; залеганіе носа; постоянный насморкъ, сопровождаемый кашлемъ; часто являющийся жаръ въ лицѣ; желтыя пятна на лбу и верхней губѣ; чрезмѣрная жажда; *чрезвычайная слабость органовъ пищеваенія, причеиъ дурное, ипохондрическое расположеніе духа послѣ пды и малѣйшаго проступка противъ діеты*; *припадкы послѣ нитья*; скопленіе и ложное направленіе вѣтровъ, со вздутіемъ живота; ощущение давленія на половые органы у женщинъ, какъ будто все готово выйти наружу; порочное образованіе маточной шейки; гнило-пахучія бѣли, маточное кровотеченіе; истеченіе слизи изъ маточнаго рукава послѣ совокупленія; соленое, гнойное отхаркиваніе при кашлѣ;

кашель днемъ и ночью, съ насморкомъ; ощущение въ рукахъ и ногахъ, похожее на рѣзь; щемленіе въ икрахъ. (Ганеманнъ.)

Natrium muriaticum.

Хлористый натръ, соленокислый натръ. Химическій препаратъ.

Боли, при которыхъ больному, во время движенія больныхъ частей, кажется, что мягкія части отдѣляются отъ костей; ощущение судорожнаго нѣмбія въ членахъ; негибкость суставовъ и трескъ въ нихъ; сокращеніе мускуловъ; истерическія явленія; припадки сильнѣе при лежачемъ положеніи; боли съ стѣсненіемъ дыханія и полустороннимъ параличемъ; дурныя послѣдствія досады; расположеніе къ простудѣ; сильное безпокойство съ волненіемъ крови и биеніемъ (пульзаціею) въ тѣлѣ; подергиваніе мускуловъ всего тѣла; нервныя припадки; *ощущеніе чрезвычайной тяжести въ тѣлѣ, мнѣ, особенно къ движенію*; общая усталость, причемъ больной съ трудомъ выноситъ тяжесть собственнаго тѣла, а также утомленіе послѣ незначительной ходьбы; сильная худоба; болѣзненная чувствительность кожи; большія, красныя, свербящія пятна; *чрезвычайная сонливость днемъ, при позднемъ, трудномъ засыпаніи и безсонницею ночью*; сонъ не подкрѣпляющій и полный сновидѣній; сновидѣнія наводятъ тоску, ночью возникаютъ многія страданія; неправильный, перемежающійся пульсъ; *больной постоянно забываетъ, у него въ тѣлѣ недостаетъ жизненной теплоты*; обильное потѣніе днемъ при малѣйшемъ движеніи; меланхолическая грусть съ плачемъ, причемъ больному досадно, когда его утѣшаютъ; инохондрическая тоска и боязливость; *ощущеніе давленія въ голову, при которомъ кажется, что она готова лопнуть*; жестокая головная боль при прочихъ страданіяхъ; *волосы лезутъ на голову и иногда на бакенбардахъ*; вѣки покрыты язвами, острыя слезы; болѣзненная опухоль одной половины носа; потеря обонанія; лицо имѣетъ желтовато-земляной цвѣтъ и жирный лоскъ; лишайная сыпь вокругъ рта; губы изъязвлены и растрескались; десны гнилы и легко источаютъ кровь; зубныя свищи (фистулы); жгучіе пузыри во рту и на языкѣ; отвращеніе къ жи-

ру и хлѣбу; употребленіе кислыхъ веществъ и хлѣба влечетъ за собой дурныя послѣдствія; *постоянная жажда съ страданіями послѣ питья*; утрата вкуса; *чрезвычайная слабость органовъ пищеваренія*, съ кислотою отрыжкой и другими симптомами послѣ ѣды; водянистая отрыжка отъ глнствъ; рвота пищею; красныя пятна подъ ложечкой; *недури отъ вѣтровъ и ложное направленіе послѣднихъ*; напрасный позывъ на низъ; запоръ и затрудненное испражненіе, сопровождаемое колющемъ въ заднемъ проходѣ; сильный позывъ на мочу, днемъ и ночью, съ обильнымъ отдѣленіемъ ея и невольнымъ испусканіемъ во время кашля, чиханья и ходьбы; *частыя поноженія, напряженія полового члена, усиленная половая похоть*; слишкомъ позднія или *скрывшіяся менструаціи*; острыя бѣли, при желтизнѣ лица; горячее дыханіе; тоскливое біеніе сердца и неправильно перемежающіеся удары его; сильное потѣніе ладоней; ногтоѣда. (Ганеманнъ.)

Nitri acidum.

(*Acidum nitricum.*)

Селитряная (азотная) кислота. Химическій препаратъ.

Употребляется, когда болѣзнь сопровождается слѣдующими явленіями: *воспалительная боль въ надкостной плевѣ*; истерическія явленія; *ощущеніе напряженія и дерганья*; боли какъ отъ вывиха и трескъ въ суставахъ; *колющія боли, какъ отъ острыхъ осколковъ*; частое волненіе крови и быстрое разгоряченіе, даже отъ небольшого движенія; *чрезвычайное расположеніе къ простудѣ* и разныя недуги отъ движенія на открытомъ воздухѣ; *боли отъ перемѣны поюды*; *чрезвычайная слабость вслѣдствіе болей*; принадлежности къ вечеру усиливаются и облегчаются во время ѣды; сильная худоба; *болѣзненное изнеможеніе и слабость, съ дрожью въ членахъ*, такъ что больной по необходимости долженъ лежать въ постели; чувство тяжести во всемъ тѣлѣ и въ особенности въ оконечностяхъ, суставахъ; *принадки надучей болѣзни и нервные*; *опухолн желтъзъ*; *чрезвычайная сухость кожи*; *свербящія лишая, черныя угри, коричнево-красныя пятна на кожѣ* и часто являющіеся *кровяные чирьи*; *язвы*; *бородавки*; *ознобы и нарывы*;

мѣшетчатыя опухоли; тревожный сонъ, больной часто и рано просыпается; ночью являются многія страданія; *боли ночью, которая будятъ больного*; страшныя, фантастическія, сладострастные сновидѣнія; сильный жаръ и безпокойство въ крови; вонючій потъ по ночамъ; *мрачное расположеніе духа, больной какъ бы унетенъ*; своеправіе, раздражительность, досада, боязливость; чрезвычайная слабость памяти и ума; приливъ крови къ головѣ съ жаромъ и стукомъ въ ней; головная боль, больному кажется, что голова крѣпко стянута; изъязвляющая сыпь на головѣ; сильное выпаденіе волосъ; нарывы на вѣкахъ и колотье въ нихъ; *пятна на роговой оболочкѣ*; близорукость; крѣпость на ухо; ощущеніе залеганія уха; шумъ и жужжаніе въ ушахъ; опрѣлость; язвинки въ ноздряхъ и дурной запахъ изъ носу; блѣдность лица, *желтизна, преимущественно около глазъ*; лицо покрыто прыщами и лишаями; боль какъ отъ изъязвленія, жаръ и нарывы въ горлѣ; постоянная и сильная жажда съ болями послѣ питья; отвращеніе къ мясной пищѣ; позывъ на ѣду мѣла, земли, известки; послѣ ѣды больной подвергается многимъ припадкамъ, особенно тошнотѣ, усталости и сонливости; колотье и біеніе подъ ложечкой; рѣзы и колотье въ животѣ; болѣзненное пученіе живота и частое выходненіе вѣтровъ; расположеніе желудка къ простудѣ; расположеніе къ паховымъ грыжамъ; *частое и продолжительное испражненіе мягкаго кала*; зудъ и болѣзненные геморроидальныя шишки въ заднемъ проходѣ; весьма зловонная моча; холодная моча; невольное испусканіе мочи; красныя шелудивыя пятна на головкѣ члена; сильная похоть, усиленное отдѣленіе влаги изъ простатической (предстательной) желѣзы и частыя поллюціи; страданія при регулахъ; бѣли коричневаго цвѣта и гнилаго запаха; охриплость съ колотьемъ въ гортани; *отдѣленіе мноюной слизи изъ легкихъ*; одышка съ сильнымъ и прерывистымъ кашлемъ; боли въ поясницѣ и синѣ. (Ганеманнъ.)

Nitri spiritus dulcis.

(*Spiritus aetheris nitrosi.*)

Сладкій селитрянный спиртъ. Фармацевтический препаратъ.

Головокруженіе. Тяжесть въ головѣ. Тошнота. Слюнотеченіе, потомъ голодь. Давленіе и чувство полноты подъ ложеч-

кой. Слизетеченіе. Тяжесть и слабость въ рукахъ. Ломъ въ суставахъ, особенно въ пальцахъ. Ганеманнъ совѣтовалъ употреблять селитрянный спиртъ въ тифозной горячкѣ. Другіе врачи употребляютъ его для оживленія нервной системы и для возбужденія реакціи въ организмѣ. Лѣкарство это служитъ также антидотомъ противъ многихъ лѣкарствъ и хорошимъ средствомъ противъ гнилости рта вслѣдствіе чрезмѣрнаго употребленія соленой пици. Внутрь принимаютъ 1—2 капли этого средства, въ водѣ. Для антидотическаго дѣйствія достаточно его понюхать.

Nitrum.

(*Kali nitricum*.)

Селитра. Азотнокислые кали. Химическій препаратъ.

Жажда съ утратою аппетита; судороги желудка; вѣтры; поносы безъ боли; кашель на открытомъ воздухѣ и при ходьбѣ по лѣстницѣ; кашель съ кровью; гнойная легочная чахотка; запущенное воспаленіе легкихъ; одышка, отъ которой нельзя низко лежать головою въ постели; колотье въ груди во время глубокаго дыханія. (Ганеманнъ.)

Nuphar luteum.

(*Nymphaea lutea*.)

Бубенчики желтые, кувшинки желтые. Раст. сем. *Кувшинчатыхъ* (Nymphaeaceae).

Рекомендуютъ противъ чешуйчатыхъ сыпей, головной боли, поноса и воспаленія кишекъ.

Nux moschata.

Мускатный орѣхъ. Плодъ растенія *Myristica moschata*, сем. *Мускатныхъ* (Myristiceae).

Рожуція и давяція боли, переходяція съ одного мѣста на другое, занимающія всегда небольшое пространство, непродолжи-

тельные, но часто возобновляющіяся; стягиваніе въ членахъ, особенно въ покой, какъ послѣ простуды; въ *холодную* (сырую) погоду боли въ членахъ и суставахъ и другія разстройства; — симптомы усиливаются при холодномъ воздухѣ и облегчаются отъ наружной теплоты; недуги, сопровождаемые желаніемъ спать и расположеніемъ къ обмороку; приступы обморока; корчи; простудное состояніе, подобное тому, какое бываетъ, когда быстро освѣжаешься послѣ пота, притомъ боль въ затылкѣ и во всѣхъ костяхъ; сильная болѣзненная чувствительность всего тѣла; даже когда больной лежитъ на мягкомъ, въ покоящейся части тѣла вскорѣ являются боли; сильное напряженіе мускульной системы; послѣ малѣйшаго движенія утомленіе и необходимость лечь; — сильное утомленіе, особенно въ поясницѣ и колѣнахъ, какъ бы послѣ долгой ходьбы, притомъ наклонность ко сну; охриплость и катарръ. (Гельбигъ.)

Nux vomica.

Челябуха, рвотный орѣхъ. Плодъ раст. *Strychnos nux vomica*, сем. *Челябуховыхъ* (Strychnaceae).

Періодическіе, перемежающіеся недуги; *ревматическая боль*, преимущественно въ мускулахъ спины, поясницѣ, груди и крестца; дергающее колотье во всемъ тѣлѣ, колотье и чувство лома въ суставахъ, усиливающееся при переменахъ погоды, чувство растягиванія и лома, особенно по почамъ, съ чувствомъ онемѣнія въ пораженныхъ частяхъ; сильныя боли, которыя заставляютъ пациента желать смерти; *болѣзненное чувство разбитости въ членахъ и суставахъ*, преимущественно при движеніи, или утромъ въ постели, которое вынуждаетъ больного постоянно мѣнять положеніе, потому что отъ долгаго лежанія боли усиливаются; чувство судорожнаго напряженія въ мускулахъ по разнымъ направленіямъ, какъ будто въ мускулахъ что-нибудь движется; параличъ; дрожь въ членахъ, съ подергиваніемъ въ сердцѣ и дрожаніемъ; конвульсія, судороги простыя и эпилептическія; приступы обморока послѣ незначительнаго даже напряженія или послѣ ходьбы на открытомъ воздухѣ; утомленіе *всѣхъ членовъ*, сильная наклонность къ ле-

жапію, лѣньность и особенное отвращеніе къ движенію; чрезвычайная слабость нервовъ, съ усиленною раздражительностью въслѣ органовъ чувствъ, особенно ушей и глазъ; сильная чувствительность къ открытому воздуху; большое расположеніе къ простудѣ, даже отъ слабаго сквознаго вѣтра; многіе припадки усливаются отъ питья кофе или вина, куренія табаку, бодрствованія ночью, умственнаго напряженія, вѣтренной погоды, по утрамъ или послѣ обѣда; припадки, происходящіе отъ сидячей жизни, облегчаются при ходьбѣ, и наоборотъ; чрезвычайная худоба; краснуха; синія пятна на тѣлѣ, похожія на подкожныя кровоизліянія; кровяные чирья; ознобы; желтуха; сонливость днемъ, вскорѣ послѣ обѣда или въ началѣ вечера; больной домо не засыпаетъ вслѣдствіе наплыва мыслей; ощущеніе холода, причѣмъ кожа и ногти сини; больной до того тоскуетъ, что готовъ покусится на свою жизнь; сильная ипохондрическая забота о своемъ здоровьи; особенное желаніе рассказывать о своей болѣзни и подробное изслѣдованіе ея, сопряженное съ тоскою; усиленная чувствительность ко всѣмъ внѣшнимъ впечатлѣніямъ, при которой шумъ, разговоръ, рѣзкій запахъ, яркій свѣтъ и даже пѣніе и музыка, бывають нестерпимы; боли съ стонами, рыданіемъ, упреками, ссорой; чрезвычайная склонность къ клеветѣ и упрекамъ; вспыльчивость и досада, внезапный гнѣвъ; лѣнь и особенная неохота къ работѣ; голова устааетъ отъ умственныхъ занятій; частое головокруженіе; болѣзненное чувство разбитости въ мозгу; сильный приливъ крови къ головѣ, съ жаромъ и краснотою въ лицѣ; желтовато-земляной цвѣтъ лица и желтизна около носа и рта; больной имѣетъ блѣдный, страдальческій видъ, у него подъ глазами синева, и носъ заостренъ; черты лица мрачны и искажены; языкъ бѣлый, покрытый слизью; кислый вкусъ во рту послѣ ѣды и питья, особенно молока, отъ котораго развиваются въ желудкѣ кислоты; травяной или гнилой вкусъ; полное отвращеніе къ черному хлѣбу; сильный голодъ и въ то же время отвращеніе къ пищѣ; страданія послѣ принятія пищи; безпрестанная тошнота, позывъ на рвоту и даже рвота пищею послѣ ѣды или питья; ощущеніе застоя крови и тяжести въ животѣ; пученіе живота, особенно послѣ ѣды и питья; болѣзненное ощущеніе разбитости въ брюшныхъ мускулахъ при прикосновеніи и движеніи; легкое выпаденіе паховыхъ грыжъ;

запоръ, причиняемый какъ бы суженіемъ и стягиваніемъ задняго прохода, и напрасный позывъ на низъ; твердый калъ, выходящій большими кусками, и затрудненное испражненіе, или же частыя и скудныя испражненія, состоящія изъ слизи и сопряженныя съ натугою и жженіемъ; выпаденіе прямой кишки; геморроидальныя шишки въ заднемъ проходѣ; тягостный позывъ на мочу съ истеченіемъ ея каплями; сильная похоть и легкое половое возбужденіе съ частыми напряженіями дѣтороднаго члена (особенно утромъ въ постели) и частыми поллюціями; выпаденіе матки; слишкомъ рано возникающія и слишкомъ продолжительныя, болѣзненные менструаціи; продолжительный, сильный сухой кашель съ позывомъ на рвоту, рвота слизью или одышка, какъ бы причиняемая стягиваніемъ груди въ косвенномъ направленіи; припадки удушья; сердцебиеніе слабыми, частыми приступами, съ волненіемъ крови. (Ганеманнъ.)

Oleander.

Олеандръ. Растеніе (*Nerium oleander*) сем. *Кутровыхъ* (*Apocynaceae*, *Juss.*).

Чувство напряженія во всемъ организмѣ; параличное коленчатое членовъ; параличи безъ боли; члены нѣмѣютъ и становятся нечувствительными; слабость всего тѣла; приступы обморока, какъ бы обусловливаемые слабостью, съ безпамятствомъ, прекращающіеся лишь послѣ появленія пота; сыпь, похожая на чесоточную; лишаи; тревожныя грезы съ частымъ пробужденіемъ; тупость ума и разспяность; сыпи на той части головы, которая покрыта волосами, — шелудивыя, чешуйчатыя; мокнуція, зловоонныя пятна за ушами и красныя, лишаевидныя пятна передъ ушами; лицо то блѣдное, то темнокрасное; біеніе подъ ложечкою, каждый ударъ сердца отдается во всей груди; частое и обильное отдѣленіе мочи, преимущественно послѣ питья кофе; моча жгучая, коричневая, съ бѣловатымъ осадкомъ; удушье въ лежащемъ положеніи, съ чувствомъ стѣсненія въ груди, сопровождаемымъ продолжительными, глубокими вздохами; колотье въ груди, усиливающееся отъ глубокаго вдыханія; чувство дрожанія и колеба-

нія въ ступняхъ; постоянный холодъ нижнихъ оконечностей; параличъ ногъ. (Ганеманнъ.)

Opium.

Опій. Сгущенный сокъ головокъ растенія *Papaver somniferum*, сем. *Маковыхъ* (Papaveraceae, Juss.).

Дурныя послѣдствія и недуги отъ употребленія виноградныхъ винъ; дурныя послѣдствія испуга или неожиданной радости; мнимая смерть; уменьшеніе чувствительности; *всеобщая нечувствительность нервной системы и отсутствіе реакціи противъ принимаемыхъ лекарствъ; отсутствіе боли при припадкахъ; возобновленіе и усиленіе припадковъ, когда тѣло разгорячено; конвульсіи и судорожныя движенія; столбнякъ; конвульсіи какъ при падучей болѣзни; параличъ; чрезмѣрная сонливость съ безчувствіемъ и крѣпкій, происшедшій какъ бы отъ одурненія сокъ (спячка), съ храпильніемъ и открытымъ ртомъ; бессонница съ одурѣніемъ, безпокойствомъ и бредомъ; обильный потъ, съ зудомъ и сыпью на кожѣ; робость, боязливость; отуманеніе чувствъ или совершенное безпамятство; бредъ, ужасныя фантастическія видѣнія скорпіоновъ, мышей и т. п.; безуміе; пьянство; приступы головокруженія; біеніе головныхъ артерій; сильный приливъ крови къ головѣ; глаза красны, воспалены и сильно блестятъ; зорь пристальный; распиреніе и неподвижность зрачковъ; шумъ въ ушахъ; синева лица; судорожное сокращеніе мускуловъ лица; искривленіе рта; судорожное сведеніе челюстей; нижняя челюсть отвисла; рвота каломъ; сильное пученіе живота, который расширяется отъ давленія газовъ (tympanitis); запоръ, твердыя испраженія; сильная натуга, какъ въ видѣ маленькихъ, твердыхъ комковъ; задержаніе мочи; остановка родильныхъ потугъ; дыханіе съ хрипомъ. (Ганеманнъ.)*

Pareira brava.

(*Cissampelos Pareira.*)

Парейра, пескогонный корень Южно-Американскаго растенія семейства *Луноотмянныхъ* (Menispermaceae).

Затрудненное испусканіе мочи. Сильная боль въ мочевомъ пузырьѣ. Жестокіе припадки мочерѣза. Моча сильно пахнетъ

амміакомъ и содержитъ много слизи. Лѣвое ядро съ болѣю притягиваетъ кверху, съ болѣю въ лянкахъ.

Pareira brava, по дѣйствию своему на мочевыя пути, сходно съ *Berberis vulgaris* и отчасти съ *Cantharides*. Средство это съ успѣхомъ употреблялось противъ мочерѣза, воспаления почекъ и мочевого пузыря. (Линне.)

Paris quadrifolia.

Вороній глазъ, одногодникъ. Раст. семейства *Carpanarелевыхъ* (Smilacae).

Холодѣніе одной стороны тѣла при жарѣ въ другой. Жаръ съ испариною въ верхнихъ частяхъ тѣла. Пульсъ полный и медленный. Головокруженіе при чтеніи вслухъ. Гнетущая головная боль, усиливающаяся отъ умственного напряженія. Головная боль отъ куренія табаку. Напряженіе въ мозгу и лбу. Мигрень. Неопредѣленный, блуждающій взглядъ. Лишай около рта. Сухость во рту утромъ. Языкъ сухой, красный. Тяжесть въ желудкѣ; легче отъ отрыжки. Слабое, медленное пищевареніе. Мягкія испраженія. Острая, разѣдающая моча. Жженіе и колотье въ мочевомъ каналѣ. Періодичная оснчлость. Кашель какъ бы отъ сѣрныхъ паровъ. Колотье въ груди. Сердцебіеніе, особенно при движеніи. Одышка. (Штафъ.)

Petroleum.

(*Oleum petrae.*)

Горное масло, нефть.

Дурныя послѣдствія гнѣва; страданія, происшедшія отъ ѣзды; трескъ, шелканье въ суставахъ, причѣмъ они иногда негибки; оконечности быстро нѣмѣютъ; волненіе въ крови; сильная склонность къ простудѣ; чрезвычайная слабость послѣ каждаго напряженія, причѣмъ мутное зрѣніе, дрожаніе тѣла, шумъ въ ушахъ и тошнота; обморочные припадки съ волненіемъ въ крови, жаромъ, давленіемъ въ сторонѣ сердца и сердцебіеніемъ; *коричневая и желтая пятна на кожѣ*; свербящіе, жгучіе пузыри; зудящіе лишай; нѣкоторыя мѣста на кожѣ изъязвлены, мокнутъ и зудятъ;

кожа дает трещины; ознобы; мозоли; опуханіе желѣзъ; на гнойныхъ язвахъ растетъ дикое мясо; ночной сонъ полонъ фантастическихъ грезъ и болѣе похожъ на дремоту; по тѣлу часто пробѣгаетъ дрожь; ночная испарина; грусть, уныніе и слезливость; тоска и чрезвычайная пугливость, *нервительность*; возбужденное состояніе и сильная склонность къ брани; слабость умственныхъ способностей, забывчивость и неохота къ размышленію; чувство тяжести въ головѣ; сынь на головѣ и затылкѣ; волосная кожа покрыта шелудями; дальнорукость или близорукость; крѣпость на ухо и глухота, вслѣдствіе паралича слуховыхъ нервовъ; сухость и залеганіе носа; желтый цвѣтъ лица; подчелюстныя желѣзы опухли; дурной запахъ изо рта; приторный, слизистый вкусъ во рту, какъ бы отъ разстройства желудка, или гнилостный; *чрезвычайный голодъ, который утоляется небольшимъ количествомъ пищи*; тошнота и рвота вслѣдствіе язвы; опухлость и болѣзненность стороны подъ ложечкою, при прикосновеніи; чувство холода въ животѣ, испражненія твердыя, въ видѣ комковъ; водянистыя, желтоватыя испражненія, по нѣскольку разъ въ день; слизистые поносы; выхожденіе солитера; безпрерывное истеченіе мочи по кашлямъ; невольное мочениспусканіе въ постели, зудъ и потъ на мошонкѣ; лишай между мошонкою и бедрами; отдѣленіе влаги изъ предстательной желѣзы и частыя поллюціи; истеченіе слизи изъ маточнаго рукава, сопряженное съ похотливыми грезами; охриплость и сухой кашель; лишай на затылкѣ; на рукахъ кожа растрескавшаяся; ознобы на пальцахъ рукъ; холодѣніе нижнихъ конечностей. (Ганеманшъ.)

Petroselinum.

Петрушка. Растеніе (*Apium Petroselinum*) сем. *Зонтичныхъ* (*Umbelliferae*, *Juss.*).

Медленно наступающій сонъ, съ напоромъ безпокойныхъ грезъ; въ ушахъ слышится громкое цѣніе; бѣловатыя, похожія на глину, испражненія; частый и почти тщетный позывъ на мочу каждые полчаса; зудъ, стрѣльба, давленіе и стягиваніе въ мочевоомъ каналъ; слизетеченіе изъ него; поллюціи; тренетаніе спинныхъ и ручныхъ мускуловъ. (Нѣмецк. всеобщая гомеопатическая газета.)

Phosphori acidum.*(Acidum phosphoricum.)*

Фосфорная кислота. Химическій препаратъ.

Недуги костей, особенно опуханіе, воспаленіе, костоѣда; ощущеніе напряженія и терзанія въ членахъ; слабость съ блѣдностью лица, также нервная слабость съ склонностью къ обильному поту во время дня; рожистое, яркокрасное воспаленіе; лишай; кровавые чирьи; свербящія, плоскія язвы съ грязнымъ гноемъ и шероховатымъ основаніемъ; трещины, язвы на костяхъ; неразговорчивость, упрямое молчаніе; полное равнодушіе; тупоуміе и неспособность къ умственнымъ занятіямъ; слезотеченіе; на бѣлкѣ глаза желтое пятно; свѣтобоязнь, ослѣпленіе при взглядѣ на яркіе предметы; близорукость; состояніе, при которомъ для большаго невыносимы ни шумъ, ни разговоръ, ни музыка; струнья на носу; жженіе въ кожѣ, въ щекахъ; струповидные лишай на щекахъ, губахъ и углахъ рта, источающіе влагу; оскомна и желтизна зубовъ; десны отдѣляются отъ зубовъ; десны трескаются и на нихъ появляются болѣзненные узловатости; вязкая, клейкая слюнь во рту; большой гнусить; сильная жажда, аппетитъ на сочныя, освѣжающія вещества; отрыжка, чувство колебанія (вверхъ и внизъ) въ желудкѣ; сильная тошнота; бурчаніе и переливаніе въ нижней части живота, съ обильными вѣтрами, особенно послѣ употребленія чего-нибудь кислаго; матка вздута, какъ бы отъ накопленія въ ней воздуха; испражненіе непереваренной пищи; поносъ съ зеленовато-бѣлыми испражненіями; обильная, свѣтлая или молоковидная моча съ студенистыми хлопьями; кондиомы; сильная охрицость; кашель съ отдѣленіемъ гнойной, зловонной мокроты; невольное мочеиспусканіе во время кашля; застарѣлыя свербящія язвы на бедрахъ. (Ганеманнъ.)

Phosphorus.

Фосфоръ. Простое тѣло.

Недуги вслѣдствіе простуды и гриѣва; ощущеніе возвышенной температуры въ пораженныхъ параличемъ частяхъ; жгучія боли; чувство

лома и ревматическаго колотья послѣ малѣйшей простуды; *припад-ки* появляются по утрамъ и вечерамъ въ постели или послѣ обѣда, между тѣмъ какъ во время обѣда возникаютъ новые припад-ки; чувствительность къ прохладной погодѣ; боли при пере-*мѣнахъ* погоды и во время грозы; склонность къ простудѣ на от-крытомъ воздухѣ; *частое волненіе крови*; кровотеченія изъ раз-ныхъ органовъ тѣла; *отяжеленіе членовъ, духовная и физическая* лѣнь; изнеможеніе съ слабостью нервовъ и усталость, чувству-емая преимущественно въ ногахъ и колѣнахъ, причемъ отъ ма-лѣйшей ходьбы страданія усиливаются; *силы внезапно упада-ютъ*; дрожаніе, *худоба*, особенно рукъ; ползаніе мурашекъ по па-рализованнымъ частямъ; отрубевидные, сухіе лишай; прозрачныя ко-ричневныя, синеватыя и желтыя пятна; кровавыя пятна; кровавыя чирья; *сильное кровотеченіе изъ небольшихъ язвъ*; кровавыя губча-тыя наросты; лимфатическіе нарывы, съ фистулами; недуги костей; *больной съ трудомъ засыпаетъ и рано пробуждается* отъ сна; тревожный ночной сонъ съ грезами, какъ будто боль-ной очень занятъ хлопотами и дѣлами; зябкость вечеромъ; *испа-рина ночью и утромъ*; сильное уныніе и дурное расположеніе ду-ха; больной, оставаясь наединѣ, впадаетъ въ тоску и раздражи-тельность; *усиленная впечатлительность всѣхъ чувствъ и чрезвы-чайная нрливость*, раздражительность и досада; больной сердить и гнѣвнъ; *головокруженіе, приливъ крови къ голове*, съ жужжані-емъ, шумомъ и сильнымъ жаромъ въ ней; выпаденіе волосъ; кор-ни ихъ какъ бы засохли; приливъ крови къ глазамъ; слезотече-ніе, особенно на открытомъ воздухѣ; свѣтобоязнь; близорукость; дневная слѣпота, причемъ глаза какъ будто подернуты пленкою; крѣпость на ухо; отсутствіе обонянія; дурной запахъ изъ носу и истеченіе изъ него желтой или желто-зеленой слизи; *лицо имѣетъ* бользненный видъ, нечисто, блѣдно, съ синевою подъ глазами, глубоко впадинами; одутловатость лица, преимущественно около глазъ; лишай на верхней губѣ и надъ нею; десны источаютъ кровь и отстаютъ отъ зубовъ; отъ кислой пищи и молока явля-ются страданія; чрезвычайный голодь; *необыкновенная слабость* желудка и пищеваренія; отрыжка, съ ощущеніемъ, какъ будто вся область подреберья полна воздуха; кислая отрыжка, явля-ющаяся каждый разъ послѣ ѣды; *бользненность желудка при*

прикосновении и ходьбѣ; жжение въ немъ и подъ ложечкой; животъ вздутъ, съ отдѣленіемъ твердыхъ испражнений и скопленіемъ вѣтровъ; большія желтыя пятна и кровяныя чырѣя на животѣ; по нѣскольку разъ въ день повторяющееся испражненіе весьма мягкаго кала; колющія геморроидальныя шишки, съ истеченіемъ крови заднимъ проходомъ; слизетеченіе изъ него; непроизвольное испусканіе мочи; моча водяниста, безцвѣтна, обильна; сильная половая похоть и чрезвычайное, неудержимое стремленіе къ совокупленію, съ напряженіями члена и поллюціями; слишкомъ раннія или слишкомъ обильныя менструаціи, сопряженныя съ страданіями; хроническая потеря голоса и охриплость; хроническій кашель, происходящій какъ бы отъ бугорковъ въ легкихъ или отъ хроническаго воспаления послѣднихъ; обильное отхаркиваніе (при кашлѣ) слизистой или соленой, гнойной матеріи; стѣсненіе дыханія; тоска и чувство тяжести въ груди; частое сердцебиеніе; желтыя пятна на груди; дрожаніе рукъ и потеря чувства осязанія въ пальцахъ; подошвы болятъ при ходьбѣ, какъ будто онѣ изъязвлены. (Ганеманъ.)

Phytolacca decandra.

Шпинатъ Американскій, Индійскій плющъ, жирная трава. Растеніе семейства *Фитолакиевыхъ* (Phytolaccaeae).

Головокруженіе съ потемнѣніемъ въ глазахъ. Односторонняя головная боль съ тошнотой. Жжение и боль въ глазахъ и вѣкахъ, съ обильнымъ слезотеченіемъ; на воздухѣ хуже. Блѣдность лица. Сыпь на губахъ. Языкъ шероховатый, съ пузырьками по краямъ и ярко-краснымъ кончикомъ. Зубы кажутся удлинненными и болятъ. Краснота и садненіе въ зѣвѣ. Тошнота и сильная рвота слизью, желчью, пищей, кровью и глистами. Запоръ. Испражненіе съ слизью и натугой. Поносъ. — Сильный напоръ мочи. Сильная примѣсь бѣлковины въ мочѣ. Моча съ подобнымъ извести осадкомъ. Регулы слишкомъ обильны и часты. Воспаленіе, опуханіе и нагноеніе грудной желѣзы. Бѣли. (Линне.)

Plantago major.

Подорожникъ крупный, попутный. Раст. сем. *Подорожниковыхъ* (Plantagineae).

Средство это рекомендуютъ противъ моченія дѣтей въ постели.

Platina.

Платина. Простое тѣло.

Дурныя слѣдствія досады, огорченія и гнѣва; *невралги съ ощущеніемъ бьющей, роющей, тупой боли, похожей на щемленіе, и зудъ въ пораженныхъ частяхъ*; припадки судорогъ, преимущественно у женщинъ, страдающихъ истерикой; приступы судорожнаго коченія членовъ, безъ потери сознанія; *чрезвычайная печаль, особенно вечеромъ, съ слезливостью и угрюмымъ настроеніемъ духа*; *чрезвычайная тоска, при которой больной какъ бы теряетъ разумъ*; *чрезвычайная тоска и страхъ вслѣдствіе ложнаго ожиданія скорой смерти*; страхъ и странное мнѣніе, будто всѣ люди, подходящіе къ больному, суть злые духи; истерическое настроеніе духа съ чрезвычайною слабостью нервовъ и раздражительностью сосудистой системы; *надменность, гордость*; *высокое мнѣніе больного о самомъ себѣ и низкое обо всѣхъ окружающихъ*; бредъ; боль, похожая на щемленіе и стягиваніе въ вискахъ или во лбу, съ жаромъ и краснотою лица; шумъ и трескъ въ головѣ; залеганіе одной ноздри; блѣдность, поблеклость, земляной цвѣтъ лица или яркая краснота его; сведеніе челюстей; утрата аппетита; отрыжка и чувство давленія въ желудкѣ; чувство стягиванія живота; *запоръ*; *чрезвычайно сильная половая похоть* и сладострастное щекотаніе въ половыхъ органахъ; чувство надавливанія на женскіе дѣтородные органы и приливъ крови къ маткѣ; *слишкомъ раннія менструаціи, съ обильнымъ истеченіемъ крови, или слишкомъ продолжительныя регулы съ истеченіемъ густой, темной крови*; потеря голоса; короткий и сухой кашель; короткое, стѣсненное, тоскливое дыханіе. (Ганеманъ.)

Plumbum metallicum.

Свинець. Простое тѣло.

Стягиваніе и терзаніе въ членахъ, сильнѣе ночью; жгучее ощущеніе въ различныхъ частяхъ тѣла; приступы сильнаго лома въ костяхъ съ чувствомъ какъ бы зуда; судороги и стягивающія боли во внутреннихъ органахъ; параличи; судорожное дрожаніе и трепетаніе членовъ, корчи и судороги, а иногда за ними и параличъ; приступы падучей болѣзни; обмороки, особенно въ многочисленныхъ собраніяхъ; чрезвычайная слабость, съ трясеніемъ членовъ; мускулы вялы и слабы; всеобщее худѣніе; водянистое опуханіе, иногда всего тѣла; чувствительность на открытомъ воздухѣ; симптомы развиваются медленно и иногда исчезаютъ на нѣкоторое время, чтобы потомъ снова появиться; запоръ. (Гартлаубъ и Тринксъ.)

Podophyllum peltatum.

Ноголистникъ щитовидный. Растеніе семейства *Барбарисовыхъ* (Berberideae).

Волненіе во всемъ тѣлѣ. Болѣзненные толчки и вздрагиваніе. Вялость мышцъ. Негибкость суставовъ въ началѣ движенія. Параличная слабость лѣвой стороны тѣла. Ознобъ, потомъ жаръ и потъ. Въ жару бредъ. Перемежающаяся лихорадка, однодневная и трехдневная. Во время жара сильная головная боль и жажда. Пульсъ полный, мягкій, перемежающійся. Тревожный сонъ. Не подтверждающій сонъ. Глухая головная боль. Чувство полноты и жаръ въ головѣ, потомъ головокруженіе. Боль въ маковкѣ съ тяжестью въ глазахъ. Воспаленіе глазъ и вѣкъ. Глухота. Слюнотеченіе. Дурной запахъ изо рта. Отсутствие аппетита. Кислоты въ желудкѣ. Боль въ желудкѣ. Тошнота. Боль въ кишкахъ, облегчаемая согрѣваніемъ. Бурчаніе и спираше въ-тровоу. Поносъ тотчасъ послѣ приема пищи и питья. Натужный поносъ. Выпаденіе прямой кишки при поносѣ. Частые позывы на мочу. Стрѣляющая боль въ сѣменныхъ канатикахъ. Гоноррейная течь. Задержаніе регулъ. Бѣли. Онущеніе матки. —

Сухой кашель, одышка. Колющая боль около сердца. Сердцебиение. Зобъ. Постоянная боль въ спинѣ; хуже во время и послѣ испражненія. Боль въ крестцѣ. Ревматическая боль въ рукахъ и пальцахъ. Боль и слабость въ лѣвомъ бедрѣ; при подниманіи на лѣстницу хуже. Слабость въ колѣнахъ. Потливость.

Средство это рекомендуютъ противъ слѣдующихъ болѣзней: хроническихъ болѣзней глазъ съ образованіемъ язвенокъ; противъ холеры; поноса; желчной лихорадки; выпаденія матки; желтухи; геморроя; недержанія мочи; кашля; родильной лихорадки; страданій печени; выпаденія прямой кишки; болѣзней селезенки; тифа; кроваваго поноса; перемежающейся лихорадки; бѣлей съ густою, прозрачною слизью. (Уильямсонъ [Williamson], Ротъ.)

Polygonum hydropiper.

Водяной перецъ, горчакъ бабій, лѣсная горчица. Растеніе сем. *Гречишныхъ* (Polygonaceae).

Нѣкоторые врачи рекомендуютъ противъ геморроя.

Polygonum punctatum.

Горецъ крапчатый. Раст. семейства *Гречишныхъ* (Polygonaceae).

Хвалятъ преимущественно какъ средство противъ задержанія регуль.

Prunus spinosa.

Тернъ, терновникъ. Раст. сем. *Миндалевыхъ* (Amygdaleae).

Послѣдовательное покалываніе въ отдѣльныхъ частяхъ мускульной системы. Дрожаніе во всемъ тѣлѣ. Безнокойство съ стѣсненіемъ въ груди. Нетвердая походка. Ознобъ съ потяготою, особенно къ вечеру. Плохой сонъ ночью. Душевное безнокойство. Головокруженіе. Колотье и стрѣльба въ разныхъ частяхъ головы. Зудъ въ краяхъ вѣкъ. Колющая боль въ зубахъ, особенно въ переднихъ нижнихъ. Горькій вкусъ во рту утромъ. Тошнота и отвращеніе къ пищѣ. Жестокая рѣзь въ животѣ, не

позволяющей лежать ни на спинѣ, ни на бокахъ. Спираніе вѣтровъ. Поносъ съ рвѣзью въ животѣ. Жгучая боль въ шейкѣ мочевого пузыря. Позывъ на мочеиспусканіе каждыя 15 минутъ. Мочерѣзъ. Зудъ въ мошонкѣ. Бѣдкія бѣли, окрашивающія бѣлье въ желтый цвѣтъ. Свистящій кашель. Боль и стѣсненіе въ груди. Одышка во время ходьбы. Гнетущая боль въ поясницѣ. Судорожно стягивающая боль въ рукѣ и пальцахъ. Жженіе и беспокойство въ ногахъ. Колотье какъ бы горячими иглами въ ляшкахъ и сѣдалищныхъ мышцахъ.

Рекомендуютъ это средство противъ подкожной и брюшной водянокъ, бессонницы, головной и зубной боли, воспаления мочевого пузыря и канала, маточнаго кровотеченія, одышки, сердцебиенія, боли въ бедрѣ и ревматической боли въ рукахъ и ногахъ. (Тринксъ.)

Pulsatilla.

Вѣтреница. Растеніе (*Anemone pratensis*) сем. Лютиковыхъ (Ranunculaceae, Juss.).

Терзающія, рвущія боли въ членахъ, или подергивающія боли въ мускулахъ, съ онѣмѣніемъ, параличною слабостью и опуханіемъ пораженныхъ частей; колотье и ощущеніе холода въ нихъ при переměнѣ погоды; блуждающія боли, быстро переходящія съ одного мѣста на другое, причѣмъ суставы красны и опухли; болезненное ощущеніе лома и боли при прикосновеніи, какъ будто тѣло изъязвлено; припадки и боли въ одной только половинѣ тѣла; притомъ ознобъ, стѣсненіе дыханія, блѣдное лицо; страданія увеличиваются въ сидячемъ положеніи, при вставаніи, въ покоѣ и особенно при лежаніи на боку; больному легче при переměнѣ положенія, движеніи, ходьбѣ, давленіи на пораженную часть, вліяніи наружной теплоты и открытаго воздуха; припадки крайне усиливаются по вечерамъ, ночамъ и передъ полночью; впрочемъ, нѣкоторые припадки являются и усиливаются также по утрамъ или послѣ обѣда, а преимущественно являются черезъ вечеръ; тяжесть въ цѣломъ организмѣ съ ознобомъ, особенно въ рукахъ и ногахъ; сыть, похожая на ложную опухь; рожевидная опухоль; тресканіе кожи подъ вліяніемъ влаги; язвы источаютъ кровь;

наклонность къ разнаго рода слизетеченіямъ; ознобины съ сине-красными опухольями; сонливость днемъ и тревожный сонъ ночью, вълѣдствіе наплыва мыслей; ощущеніе холода, дрожи, озноба и безпрестанная внутренняя зябкость; жаръ, съ чувствомъ озноба при обнаженіи тѣла; отчаяніе, слезы, печаль и страхъ при мысли о смерти; больной боится привидѣній и не хочетъ по вечерамъ оставаться одинъ въ темнотѣ; застѣчивость, слезивость; корыстолюбіе, зависть и такая алчность, что больной желалъ бы завладѣть всѣмъ міромъ; утомленіе отъ умственныхъ занятій; пустота и боль въ головѣ, какъ бы послѣ пирушки или бодрствованія; дерганіе и колютье въ головѣ, ушахъ и зубахъ; краснота и опуханіе вѣкъ съ ячменями; слезотеченіе на открытомъ, сыромъ воздухѣ; зрѣніе мутно, съ чувствомъ, какъ будто передъ роговою оболочкою находится что-то, что легко удалить; истеченіе гноя изъ ушей; насморкъ съ обильнымъ слизетеченіемъ и наклонность къ насморку; лицо то блѣдно, то красно; страдальческій видъ лица, зубная боль съ колютьемъ въ ушахъ; дурной запахъ изо рта; непріятный слизистый, гнилой (какъ отъ употребленія испорченнаго мяса) вкусъ во рту; вкусъ горькій при подѣ, питьѣ и жеваніи, преимущественно чернаго хлѣба; страсть къ спиртнымъ напиткамъ или острой пищѣ; отрыжка употребленною пищею; рвота пищею послѣ стола; біеніе подѣ ложечкой; чисто слизистыя испраженія; мочерѣзъ; затрудненное испусканіе мочи, каплями, или отдѣленіе безцвѣтной мочи; сильное половое возбужденіе, доходящее до пріатизма (болѣзненнаго напряженія полового члена), съ сильнымъ желаніемъ совокупленія; остановка регулъ; недуги во время менструацій, особенно ознобъ и блѣдность лица; отдѣляемая кровь густа и черна; бѣли; кашель съ отдѣленіемъ густой слизи; при горизонтальномъ положеніи больной ощущаетъ тоску въ груди, причемъ гортань какъ будто стянута; сильные, повторяющіеся приступы сердцебіенія съ тоскою. (Ганеманнъ.)

Punica granatum.

Корень гранатаго дерева, сем. *Миртовыхъ* (Myrtaceae).

Утомленіе. Дрожаніе рукъ и ногъ. Разслабленіе мышцъ. Сухой жаръ по всему тѣлу. Сонливость съ головной болью. Тре-

вожрый сонъ съ метаніемъ. Мрачное расположеніе духа. Головокруженіе отъ умственныхъ занятій, иногда съ тошнотою и болью въ желудкѣ. Желтоватый цвѣтъ глазаго бѣлка. Катарральное воспаленіе глазъ. Шумъ и звонъ въ ухахъ. Цвѣтъ лица болѣзненный, земляной. Стрѣляющая боль въ зубахъ. Зубы кажутся удлиненными. Судороги желудка, утромъ, натошакъ. Боль въ животѣ, съ тошнотою и накопленіемъ воды во рту. Болѣзненное пученіе живота. Слизистый поносъ. Опуханіе и воспаленіе мочеваго канала. Желтоватыя бѣли. Біеніе сердца отъ малѣйшаго движенія.

Рекомендуютъ преимущественно противъ солитера, хотя употребленіе тинктуры изъ этого корня въ большинствѣ случаевъ не было успѣшно.

Ranunculus bulbosus.

Жабинець. Растеніе семейства *Лютиковыхъ* (Ranunculaceae, Juss.).

Эпилептическія конвульсіи; золотуха; желтуха; пузырьчатая сыпь, какъ бы послѣ ожоги; плоскія разъѣдающія язвы; роговые наросты, лишай по всему тѣлу; острия бѣли; икота. (Штапфъ.)

Rheum.

(*Rhabarbarum.*)

Ревень. Корень растенія *Rheum palmatum etc.*, сем. *Гречишныхъ* (Polygonaceae, Juss.).

Недостаточно еще изслѣдовано. Употребляется въ болѣзняхъ дѣтей, особенно грудныхъ; при прорѣзываніи зубовъ; золотушныхъ недугахъ; если дѣти мечутся, кричатъ, блѣднѣютъ, неугомонны, если у нихъ является конвульсивное сведеніе пальцевъ, мускуловъ лица и вѣкъ; если ребенокъ безпокоенъ, споритъ, капризничаетъ; при конвульсивномъ подергиваніи пальцевъ, мускуловъ лица, угловъ рта и вѣкъ; при кислотѣ, гниломъ или слизистомъ вкусѣ во рту; при чрезвычайной тоскѣ; при поносахъ у родильницъ и дѣтей, или при поносахъ съ мягкими, кисло-пахучими испражненіями, съ тщетною натугою передъ тѣмъ;

при трудномъ прорѣзываніи зубовъ; коликѣ и безсонницѣ у дѣтей. (Ганеманнъ.)

Rhododendron.

Рододендръ, Сибирская роза. Растеніе (*Rhododendron chrysanthum*) сем. *Вересковыхъ* (Ericaceae, Juss.).

Ревматическія и ломотныя боли въ членахъ; отъ дурной, бурной погоды, перемѣны ея и покоя хуже; ощущеніе сильнаго напряженія, происходящаго отъ злоупотребленія ртутью и сопряженнаго съ опуханіемъ и краснотой пораженной части; боли усиливаются особенно по утрамъ и ночамъ, причеиъ усиливается напряженіе и негибкость суставовъ; чувство дерганья, щипанія и колотья въ членахъ, съ параличнымъ состояніемъ ихъ, легкимъ нѣмѣніемъ членовъ и чувствомъ ползанія по нимъ мурашекъ; возобновленіе всѣхъ принадковъ при суровой погодѣ и грозѣ; боли въ костяхъ или надкостной плевѣ, возникающія на опредѣленныхъ мѣстахъ при перемѣнѣ погоды; водянка; краснота и опуханіе частей, пораженныхъ ломотою; опуханіе яичекъ съ чувствомъ напряженія и давленія, также послѣ подавленнаго перелоа и простуды; водяная грыжа. (Штапфъ.)

Rhus toxicodendron.

Сумахъ, древоядъ. Раст. сем. *Терпентиновыхъ* (Terebinthaceae).

Недуги связокъ, сухожилій и синовиальныхъ оболочекъ; отсутствіе пластичности въ крови, съ склонностію къ ослабленію органической дѣятельности всего организма и даже параличу; дурныя слѣдствія холоднаго купанья; чувство напряженія и терзанія въ членахъ, которое увеличивается въ покой и въ холодное время или по ночамъ отъ постельной теплоты, и которое сопровождается нечувствительностію пораженныхъ частей и онѣмѣніемъ ихъ послѣ движенія; колотье въ суставахъ при покой; щекочущія боли; сильнѣйшія боли, заставляющія стонать; болѣз-

ненное чувство разбитости, или *чувство будто мягкія части отстаютъ отъ костей*; чувство разрыва во внутреннихъ органахъ; боли какъ отъ вывиха и расположеніе къ вывихамъ; онѣмѣніе тѣхъ членовъ, на которыхъ пациентъ лежитъ; онѣмѣніе другихъ частей, съ щекотаньемъ въ нихъ и нечувствительностью; при переходѣ отъ покоя къ движенію члены негибки; онѣмѣніе и полный или половинный параличъ; судороги, бывающіе при столбнякѣ (tetanus); чрезвычайная усталость, такъ что больной долженъ постоянно сидѣть или лежать; приступы обморока; чрезвычайная чувствительность къ открытому, хотя бы даже и теплomu воздуху; *рожистая, особенно пузырчатая воспаленія*; гноящіяся пузырьки, которые, лопаясь, источаютъ влагу; лишайная сыпь, струнья; тресканье кожи, бородавки, *нотопда*; красныя, лоснящіяся опухоли; *судорожная зѣвота, до такой степени сильная, что отъ нея болитъ челюстной суставъ, а иногда даже происходитъ вывихъ послѣдняго*; ознобъ, съ приступами боли и другими второстепенными принадками, которые большею частью являются вечеромъ; вечерняя лихорадка, сопровождаемая поносомъ; при приступахъ боли потъ, иногда съ сильной дрожью; чрезвычайная тоска съ боязнью смерти, во время сумерокъ; настроеніе духа, при которомъ пациентъ боится, что его отравятъ; призраки и бредъ; боли съ ощущеніемъ, какъ будто мозгъ разрывается на части; зудящая боль въ головѣ; опухоль, парша на головѣ; небольшія мягкія шишечки на той части головы, которая покрыта волосами; свѣтобоязнь; опуханіе и воспаленіе околоушныхъ желѣзъ; лицо блѣдно, пациентъ имѣетъ страдальческій видъ; синева подъ глазами и острый носъ; искривленіе и искаженіе лица, сыпи на немъ; мѣднокрасная сыпь около рта и на подбородкѣ; дурной запахъ изо рта, происходящій отъ гнилыхъ зубовъ; истечение ночью желтой, иногда смѣшанной съ кровью слюны; больному трудно глотать твердую пищу, какъ бы вслѣдствіе суженія глотки и нищенріемнаго горла; полное отвращеніе ко всякой пищѣ и преимущественно къ хлѣбу; сильный позывъ на холодное молоко; боль какъ бы отъ изъязвленія въ предсердіи, какъ будто тамъ что-то порвалось, пациентъ чувствуетъ это преимущественно, когда нагнется или поскользнется; иученіе живота тотчасъ послѣ обѣда; слизисто-кровавыя испраженія; невольное

испражненіе во время сна; во время покоя пациентъ не держитъ мочи и невольно ее испускаетъ; чувство разбитости въ крестцѣ, особенно при лежаніи на немъ; боль въ спинѣ и доплаткахъ, какъ бы отъ надрыва. (Ганеманнъ.)

Rumex crispus.

Щавель кудрявый, огневка. Раст. сем. *Гречишныхъ* (Polygonaceae).

Усталость, слабость. Усиленіе припадковъ къ вечеру. Ознобъ въ спячѣ. Пульсъ ускоренный. Сонливость. Пробужденіе съ тошнотою, чувствомъ полноты въ животѣ, головной болью и потомъ. Дурное расположеніе духа, угрюмость. Головная боль во лбу. Гнетущая боль въ мозгу. Боль въ глазахъ, какъ будто края вѣкъ сухи и воспалены. Давящая боль въ правомъ ухѣ. Насморкъ съ чиханіемъ, вечеромъ сильнѣе. Кровотеченіе носомъ. Усиленное отдѣленіе слюны. Сухость языка и грязная, желтая слизь на немъ. Стрѣляющая зубная боль. Дурной вкусъ во рту. Боль подъ ложечкой, съ тошнотою. Боль въ правомъ подреберьѣ съ отрыжкой. Спираніе вѣтровъ. Колотье въ прямой кишкѣ. Геморроидальныя шишки. Жаръ и зудъ въ заднемъ проходѣ. Мало мочи. Моча мутная, красная, осадокъ красный, песчаный, хлопья. Краснота, садненіе и зудъ крайней плоти. Охрилость. Кашель съ щекотаніемъ въ горлѣ и груди, особенно при лежанчѣ положеніи. Ночной кашель. Давленіе и жгучее колотье подъ грудной костью. Жгучая боль около сердца, вечеромъ и ночью. Боль въ поясницѣ. Судорожная боль въ плечахъ. Боль въ мышцахъ ляшекъ и голеней.

Рекомендуютъ противъ воспаленія вѣтвей дыхательнаго горла, поноса, охрилости, воспаленія околосердечной сумки; противъ кашля, воспаленія желудка, катарра желудка, слабости пищеваренія и зубной боли. (Герингъ.)

Ruta graveolens.

Рута. Раст. сем. *Рутовыхъ* (Rutaceae).

Разъѣдающія и жгучія боли въ костяхъ и надкостной плевѣ; боли въ костяхъ, членахъ и суставахъ, какія бываютъ послѣ

толчка, ушиба, паденія; дурныя слѣдствія механическихъ поврежденій; боль въ членахъ усиливается при покоѣ, особенно при лежаніи, также въ сырую и холодную погоду; легкое образованіе ссадинъ, преимущественно отъ верховой ѣзды и ходьбы; воспалительныя язвы; бородавки; подкожная водянка; *ушибы, поврежденіе костей и надкостной плевы*; жаръ во всемъ тѣлѣ; меланхолія, уныніе; на волосной кожѣ черепа струшья, источающія влагу; отдѣленіе изъ глазъ слезъ и водянистой влаги; слезотеченіе только на вольномъ воздухѣ; пятна на роговой оболочкѣ; *слабость глазъ вслѣдствіе напряженія ихъ при продолжительномъ чтеніи*; неправильности зрѣнія, причеиъ больной видитъ красныя круги около пламени свѣчей; начало темной воды съ туманнымъ зрѣніемъ и невозможностью различать отдаленныя предметы; кровотеченіе носомъ; желудочная боль каждый разъ послѣ употребленія чернаго хлѣба или сырой, неудобоваримой пищи; отрыжка у особъ, подверженныхъ истерикѣ, или гнилая отрыжка послѣ употребленія мяса; тошнота во время ѣды и рвота пищею; глистная боль въ животѣ; ощущеніе грызенія въ желудкѣ; частая натуга съ скудными, мягкими испражнениями; слизистый поносъ; выпаденіе прямой кишки во время испраженія; частый позывъ на мочу, съ скуднымъ ея отдѣленіемъ и со вторичнымъ, напраснымъ позывомъ послѣ испусканія ея; недержаніе мочи; почечныя камни; слишкомъ раннія, обильныя или скудныя менструаціи, съ незначительными бѣлями послѣ ихъ прекращенія; выкидышъ; безплодіе; острыя бѣли послѣ скрывшихся регулъ. (Ганеманнъ.)

Sabadilla.

Китайская чемерица. Сѣмена раст. *Veratrum Sabadilla* [*V. officinale*] сем. *Осенниковыхъ* (Colchicaceae, Juss.).

Мало изслѣдовано. — Сильная чувствительность къ холоду; больной во всемъ тѣлѣ ощущаетъ параличное напряженіе; чрезвычайная сонливость; тревожный, не освѣжающій сонъ; перемежающаяся лихорадка, съ жаждой между ознобомъ и жаромъ; чрезвычайная тоска и безпокойство; чувство давленія во лбу; — въ глазахъ, преимущественно, когда смотришь вверхъ; острый насморкъ

съ одурѣніемъ головы и искаженіемъ лица; боль во рту, какъ будто онъ обваренъ кипяткомъ; языкъ покрытъ толстымъ слоемъ желтоватой слизи; чрезвычайный голодь, позывъ на сласти, медъ, мучнистое, попеременно съ отвращеніемъ къ мясной пищѣ вину и кислымъ веществамъ; тошнота и непрерывное выплевываніе безвкусной влаги; рвота круглыми глистами; красныя пятна на животѣ, груди и рукахъ; недуги отъ солитера; кашель, начинающійся, какъ только пациентъ ляжетъ, кашель глухой, съ кровохарканіемъ; кашель со рвотою, колотьемъ въ черепѣ, болями въ животѣ; гриппъ и одышка. (Штапфъ.)

Sabina.

Казачій можжевельникъ. Раст. (*Juniperus Sabina*) сем. Хвойныхъ (Coniferae, Juss.).

Женскія болѣзни; острая и хроническая ломота; ломотные желваки; ревматическія боли; ощущеніе щемленія и сдавливанія въ зубахъ, такъ что больному кажется, будто они ломаются; слишкомъ раннія менструаціи; слишкомъ обильныя менструаціи, съ отдѣленіемъ кусковъ свернувшейся крови; маточныя кровотечения, во время регулъ, послѣ родовъ и выкидыша; выкидышъ съ обильнымъ маточнымъ кровотеченіемъ, особенно на третьемъ мѣсяцѣ; бѣли при остановкѣ менструацій, бѣли съ отдѣленіемъ похожей на крахмалъ, желтоватой сукровицы, или съ истеченіемъ зловонной крови, похожей на воду, въ которой мыто мясо. (Штапфъ.)

Sambucus.

Бузина. Цвѣты и кора растенія *Sambucus nigra* сем. Жимолостныхъ (Caprifoliaceae, Juss.).

Чрезвычайная худоба; водяночное опуханіе всего тѣла; тревожный сонъ съ тоскою и вскакиваніемъ, дрожью въ членахъ и одышкою, доходящею до удушья; нестерпимый жаръ во всемъ тѣлѣ, причемъ однако больной опасается сбросить одѣяло; перемежающаяся лихорадка съ обильнымъ потомъ; синева, одутловатость лица, рѣзко ограниченный румянецъ на щекахъ; красныя пятна

на лицѣ; опуханіе мошонки; слишкомъ обильныя регулы, похожія на маточное кровотеченіе; воспаленіе дыхательнаго горла; перепончатая жаба; кашель съ обильнымъ отхаркиваніемъ солоноватой или сладкой мокроты; быстрое дыханіе съ хрипомъ и свистомъ; сильная одышка; одышка, похожая на Милларову; грудная жаба; давленіе въ груди. (Ганеманиъ.)

Sanguinaria canadensis.

Горець птичій, брылена. Раст. сем. *Маковыя* (Papaveraceae, Juss.).

Ревматическія боли въ членахъ, особенно въ плечахъ, рукахъ и лянкахъ, и усиленіе болей ночью; жгучее чувство въ подошвахъ и ладоняхъ, усиливающееся ночью; въ кончикахъ пальцевъ боль какъ отъ изъязвленія; бессонница; пробужденіе въ испугѣ, со вздрагиваніемъ; грезятся путешествія на морѣ, притомъ чувство, будто качаешься; чувство тяжести въ головѣ; головныя боли, быстро переходящія съ одного мѣста на другое, подобныя электрическимъ сотрясеніямъ; чувство подвижности волосной кожи; жилы на головѣ вздуты; вздутое лицо, съ краснотою, жгучимъ жаромъ, чувствомъ околѣлости и полноты; мутное зрѣніе, какъ будто въ глазахъ волоса; при жеваніи боли въ гнилыхъ зубахъ; шаткость зубовъ; чувство опухлости въ горлѣ, особенно при глотаніи; воспаленіе горла; крупъ; судороги и бѣшеніе въ животѣ; тщетный позывъ на низъ, съ чувствомъ присутствія густой массы въ заднепроходной кишкѣ; частыя испраженія; частое мочеиспусканіе даже ночью; стрѣльба въ грудяхъ и саднящая боль въ сосочкахъ. (Герингъ.)

Sarracenia purpurea.

Сарраценія алая, индійскій махъ. Растеніе сем. *Непентевыхъ* (Nepenthae).

Средство это не изслѣдовано достаточно, но употребляется какъ превосходное гѣбарство противъ оспы и ея послѣдствій.

Sarsaparilla.

Сарсапарель. Корень растенія *Smilax medica* сем. *Carpanarilevyx* (Smilacaceae).

Ломотные и ревматическіе недуги съ уменьшеннымъ отдѣленіемъ мочи, а также произошедшіе послѣ скрывшагося перелоя (гоноррей), отъ простуды (въ водѣ); чувство утомленія, преимущественно въ оконечностяхъ; язвы вслѣдствіе злоупотребленія ртутью; потъ на лбу; тошнота, вслѣдствіе неприятной отрыжки; запоръ съ сильнымъ позывомъ на мочу; отдѣленіе крови при испражненіи; почечные камни; каменная болѣзнь; бѣли слизистыя, обильныя. (Ганеманнъ.)

Secale cornutum.

Спорынья (ржаные рожки). Продуктъ болѣзни ржи (*Secale cereale*).

Судороги рукъ и ногъ съ подергиваніемъ; кожа жесткая, суха, вяла; жаръ, причемъ ускоренный пульсъ, безпокойство, бессонница; малый, сжатый пульсъ; родильная лихорадка; потъ, покрывающій тѣло отъ головы до предсердія; потъ холодный и липкій; чрезвычайная печаль, меланхолія и тоска, боязнь смерти; бредъ, головокруженіе съ чувствомъ отуманенія; *впалые глаза*; кровотеченіе носомъ; *лицо впалое, гипократическое, блѣдное*; лицо желто и черты его сильно искажены; на лицѣ пятна; языкъ покрытъ густой слизью грязнаго, коричневаго, даже чернаго цвѣта; сильная жажда; отвращеніе ко многимъ яствамъ, тошнота; рвота пищею и чрезвычайная слабость; азіятская и спорадическая холера; холерина; болѣзненная колика съ болями въ поясницѣ и бедрахъ, съ частой отрыжкой, рвота и рѣзь съ ощущеніемъ терзанія въ животѣ; жженіе въ немъ, особенно въ странѣ селезенки; постоянная жгучая боль въ бедрахъ; бурчанье въ животѣ; поносы съ чрезмѣрнымъ упадкомъ силъ, или водянисто-слизистые, коричневаго цвѣта; поносъ послѣ холеры; задержаніе мочи; моча горяча, скудна; слишкомъ обильныя или слишкомъ продолжительныя менструаціи; приливъ крови къ маткѣ; *маточныя кровотеченія*, по-

слѣ выкидыша, родовъ, съ истеченіемъ жидкой черной крови, преимущественно при сильномъ движеніи; опухоли и бородавки въ полукрѣпой маточной шейкѣ; воспаленіе матки въ родильномъ періодѣ послѣ удара по животу во время беременности; хроническое воспаленіе послѣ прерваннаго родильнаго очищенія и скрывшихся мѣсячныхъ очищеній; омертвѣніе и антоновъ огонь матки; недуги во время беременности; угрожающая опасность выкидыша; неправильныя, слабыя или отсутствующія потуги; *послѣдъ плотно прикрѣпленъ*; слишкомъ продолжительное родильное очищеніе, или кровавистое, очень скудное и зловонное; сильная краснуха на затылкѣ и груди; ночью сильнѣйшія судороги въ икрахъ и подошвахъ. (Гартлаубъ и Тринксъ.)

Selenium.

Селеній. Простое тѣло.

Боли во всѣхъ членахъ, какъ отъ простуды; чрезвычайное *худьніе*, особенно лица, рукъ и ногъ; хина производитъ чрезвычайныя страданія, а существующія уже усиливаетъ до невыносимой степени; *сильное желаніе лежать* и спать, особенно во время дневнаго жара; *усиленіе симптомовъ послѣ сна*; *больной не выноситъ сквознаго вѣтра*. (Герингъ.)

Senecio aureus.

Крестовникъ золотистый. Раст. Сѣверной Америки сем. *Щитконосныхъ* (Corymbiferae).

Средство это употреблялось эмпирически противъ кровотеченія изъ мочеваго канала (во время гонорреи).

Senecio gracilis.

Крестовникъ стройный. Раст. сем. *Щитконосныхъ* (Corymbiferae).

Употреблялось эмпирически противъ кашля, кашля съ кровью, бессонницы; противъ маточнаго кровотеченія, остановки регуль, кровавой мочи, труднаго мочеиспусканія, сахарнаго мочеизнуренія, бѣлей, ипохондріи, истерики и брюшной водянки.

Senega.

Многомлечникъ, истодъ. Растеніе (*Polygala Senega*) сем. *Истодовыхъ* (*Polygaleae*).

Недуги слизистыхъ оболочекъ; слизетеченіе; подкожная водянка; особенно полезно флегматичнымъ, вялымъ, полносочнымъ людямъ; язвы вслѣдствіе укушенія ядовитыми животными; гриппъ. (Штаффъ.)

Senna.

(*Cassia lenitiva*, — *lanceolata*.)

Александрійскій листъ, ланцетолистная кассія. Раст. сем. *Бобовыхъ* (*Leguminosae*).

Волненіе крови, особенно ночью, нарушающее сонъ. Бессонница у дѣтей, съ крикомъ и метаніемъ. Клизму гнетущая головная боль при наклоненіи. Потеря аппетита. Тошнота. Рвѣзъ въ животѣ. Бурчаніе и броженіе въ животѣ съ отдѣленіемъ вонючихъ вѣтровъ. Поносъ съ натугою и жженіемъ въ проходѣ послѣ испраженія. Стягивающая боль въ кишкахъ и желтыя испраженія съ вѣтрами.

Sepia.

Сокъ каракатицы, животного (*Sepia officinalis*) класса *Головоногихъ* (*Cephalopoda*, *Cw.*).

Недуги волосныхъ (капиллярныхъ) *сосудовъ*; нервныя недуги; дурныя слѣдствія гнѣва; боли какъ отъ вывиха, появляющіяся преимущественно при напряженіи пораженныхъ частей и ночью, отъ постельной теплоты; колющія и жгучія боли; напряжение, какъ бы отъ сокращенія мускуловъ, ощущеніе терзанія снизу вверхъ; подергиваніе и рвущая боль въ членахъ днемъ и ночью; быстрое и легкое нѣмѣніе членовъ; околѣлость и негибкость ихъ; *волненіе крови* съ чувствительнымъ біеніемъ жилъ во всемъ тѣлѣ; боль

ной быстро разгорячается даже при незначительной прогулкѣ; больному легче отъ сильнаго движенія, ходьбы на открытомъ воздухѣ, фехтованья и т. д., хуже при спокойномъ сидѣннн; припадкн сильнѣе вечеромъ и ночью; сильная чувствительность къ холодному воздуху и особенно сѣверному вѣтру; чрезвычайная наклонность къ простудѣ, преимущественно отъ вѣтра; ощущение духовной и физической тягости, съ стѣсненіемъ дыханія; внезапное онѣмѣніе вслѣдствіе гнѣва; истерическіе приступы слабости; обмороки; свербящая сыпь на суставахъ; чесоточная сыпь; коричневая, красная, лишайная пятна на кожѣ, кольцевидные лишай; лимфатическія опухоли; сильная сонливость днемъ при позднемъ засыпанн ночью, вслѣдствіе живости мыслей; недостатокъ жизненной теплоты и дрожь по вечерамъ и на вольномъ воздухѣ; обильный потъ при ходьбѣ и даже незначительномъ движенн; *грусть со слезами, печалью о своей болѣзни, уныніе, меланхолія*; душевная бездѣятельность и сильное равнодушіе ко всему, даже къ близкимъ людямъ; неохота къ занятіямъ; мигрень со рвотою; приливъ крови къ головѣ, съ жаромъ въ шей; *непроизвольное трясаніе головы*; волосы сильно лѣзуть; пустулы на роговой оболочкѣ глаза; параличъ вѣкъ; начало темной воды съ суженіемъ зрачковъ; чувствительность къ шуму и музыкѣ; ощущение, какъ будто носъ чѣмъ-либо заткнутъ, и болѣзненная сыпь на кончикѣ носа; потеря чувства обонянн; *блѣдность лица и синева около глазъ; болѣзненный видъ и мутные, красные глаза; желтая пятна на лицѣ и дугообразная желтая полоса, проходящая черезъ носъ и щеки пациента*; черные угри на лицѣ; желтизна или лишай на губахъ и вокругъ рта; отвращеніе къ пищѣ, особенно мясной; сильный аппетитъ на уксусъ и вино; *необыкновенный аппетитъ; обжорство и болѣзненное ощущение голода въ желудкѣ; чрезвычайная слабость пищеваренн и многіе припадкн послѣ пды*; скопленіе кислотъ въ желудкѣ; отрыжка водою отъ глицъ; біеніе подъ дожечкой; тяжесть и твердость нижней части живота; у рожавшихъ женщинъ объемъ живота увеличенъ; *напрасный позывъ на низъ, испражненн тверды, медленно, не вполне выходятъ, имѣютъ форму катышковъ*; поносъ отъ молока; обильное отдѣленіе крови при испражненн; изъ задняго прохода течетъ влага и слизь; открытый гемморой; частое мочеис-

пущаніе, также ночью; невольное испусканіе мочи въ постели; мутная моча съ краснымъ, песковиднымъ осадкомъ; *сильная по- ловая похоть*; *сладолюбивыя мысли и постоянныя поллюціи и напряженія члена*; чрезвычайная слабость послѣ совокупленія; выпаденіе матки и влагалища; мокнуція ссадины и краснота женскихъ дѣтородныхъ частей; остановка мѣсячныхъ кровей; страданія во время ихъ; бѣды съ зудомъ и изъязвленіемъ маточнаго рукава; склонность къ выкидышу; мокротный кашель; одышка, причемъ накопившаяся въ груди слизь не выходитъ вонъ; приливъ крови къ груди; ощущеніе кипѣнія въ ней, сердцебіеніе, удары сердца перемежаются; темныя пятна на груди; красныя пятна на шеѣ и на подбородкѣ; кожа на ладоняхъ дунится; не причиняющія боли язвы на кончикахъ пальцевъ; острый, изъязвляющій потъ на ногахъ, скрывшійся пожной потъ. (Ганеманнъ).

Silicea.

(*Silicea terra.*)

Кремнеземъ. Окись металлоида силиціи. Фармацевтическій препаратъ.

Слабость мускуловъ у дѣтей, отъ которой они долго не начинаютъ ходить; объемъ головы увеличенъ; позднее срастаніе черепна у дѣтей; ощущеніе напряженія въ членахъ, съ терзаніемъ и колотьемъ; ночное колотье въ суставахъ; болѣзненное чувство разбитости, какъ бы вслѣдствіе неловкаго положенія въ постели ночью; боль какъ отъ изъязвленія въ томъ боку, на которомъ больной спитъ; склонность къ надсадамъ; подергиваніе членовъ днемъ и ночью; припадки падучей болѣзни; тяжелая, неловкая походка; чрезвычайная слабость при умственныхъ занятіяхъ и лѣнь; безпокойство въ тѣлѣ съ волненіемъ крови и жаждою; сильная худоба; *припадки болшею частью возникаютъ при ново- или поллюціи*; чувствительность членовъ и черепа къ переменѣ погоды; больной сильно боится грозы; необыкновенная склонность къ простудѣ; чрезвычайная нервная слабость и склонность къ обмороку; лимфатическія опухоли и гнойныя пузырьки; *опухоли желтъ* съ нагноеніемъ или отвердѣніемъ; ракообразныя за-

твердѣлости; *доброкачественная и злокачественная* нагноенія, преимущественно въ слизистыхъ оболочкахъ; *бользненность* кожи, при которой каждое поврежденіе ея съ трудомъ заглѣчивается; кровавые чирья; злокачественные, гангренозные чирья; ногтоѣда; болѣзни костей; чрезвычайная сонливость днемъ, но ночью большой засыпаетъ поздно; тревожный ночной сонъ съ грезами; многочисленные припадки ночью: разговоры, вскрикиванье, кошмаръ; волненіе крови съ сильнымъ жаромъ; потъ при умѣренной ходьбѣ; потъ по ночамъ; тоска и дурное расположеніе духа съ необычайною слабостью нервовъ; *снисходительное настроеніе духа*; мышленіе затруднено, и больной утомляется отъ умственныхъ занятій; головокруженіе, чувство напряженія и давленія въ головѣ, какъ будто все изъ нея готово вывалиться, а черепъ лопнуть; стукъ въ головѣ отъ прилива крови; потѣніе волосной кожи по ночамъ; свербящая, мокнущая парша и шишковатые опухоли на головѣ; *выпаденіе волосъ*; кровавистые губчатые наросты (fungus haematodes), пятна, язвинки, рубцы на роговой оболочкѣ; свѣтобоязнь, больной не выноситъ дневнаго свѣта; потемнѣніе зрѣнія, такъ что все видно какъ бы сквозь сѣрый завѣсъ; *приступы висцеральной слѣпоты*; залеганіе ушей, исчезающее съ трескомъ; струнья, волдыри, язвы въ носу; постоянный насморкъ; кожа на лицѣ опухла и растрескалась; отвращеніе къ вареной и мясной пищѣ; сильнѣйшій голодь; многочисленные страданія послѣ ѣды; водянистая отрыжка отъ глисть и дрожь; рвота каждый разъ послѣ питья; вздутость, напряженіе и жаръ живота; увеличеніе въ объемѣ нижней части живота; *запоръ съ безпрестаннымъ, напраснымъ позывомъ на низъ и недостаточнымъ, весьма твердая испраженія, похожая на бараній калъ*; сильное половое возбужденіе съ частымъ напряженіемъ члена и сладострастными мыслями; *кашель съ отхаркиваніемъ тоя*; стѣсненіе дыханія при лежаніи на спинѣ, нагибаніи, бѣганіи и кашлѣ; зловонный потъ на ногахъ; скрывшійся ножной потъ съ коченѣніемъ ногъ вслѣдствіе этого. (Ганеманнъ.)

Silphium laciniatum.

Киринейская трава. Раст. сем. *Щитконосныхъ* (Corymbiferae).

Лѣкарство мало извѣстное. Употреблялось противъ кашля и одышки.

Solanum nigrum.

Черный пасленъ. Раст. сем. *Пасленовыхъ* (Solaneae, Juss.).

Оказывается дѣйствительнымъ противъ *отравленія спорыннею*, или *рожками рожками* (Secale cornutum); кромѣ того, при слѣдующихъ симптомахъ: *стрекотаніе въ членахъ*; *трепетаніе*; *стягиваніе сгибающихъ мускуловъ*, какъ будто большой хочетъ прыгнуть; *судорожное искривленіе членовъ*; тоническіе спазмы; эпилептическія судороги; *ярость*; слабоуміе; какъ бы сардоническій смѣхъ отъ искаженія лицевыхъ мускуловъ; *сведеніе членовъ*; *стягиваніе пальцевъ*; *судороги въ икрахъ*; ступни заворачиваются внутрь.

Solanum tuberosum.

(*Solanum aegrotans.*)

Картофель. (Наружныя части картофеля, подвергавшагося гніенію.)

Употреблялось до сихъ поръ только противъ выпаденія прямой кишки, если послѣднее было не продолжительно, а являлось лишь періодически.

Spigelia.

Спигелія. Растеніе (*Spigelia anthelmia*) семейства *Горечавковыхъ* (Gentianeae, Juss.).

Ощущеніе терзанія въ членахъ ломотнаго и ревматическаго характера; приступы обморока, появляющіеся при испражненіи съ натугой или въ слишкомъ теплой комнатѣ; склонность къ простудѣ; катарральная, слизистая и глистная лихорадки; періодическія, типичныя головныя боли; *нервныя боли въ глазахъ или надъ ними*; такая же боль въ орбитахъ, — въ глазномъ яблокѣ при движеніи, причемъ кажется, что яблоко слишкомъ велико; нестерпимая боль и колюще въ глазахъ, распространяющееся внутрь головы; глаза и края вѣкъ воспалены, причемъ послѣднія изъязвлены; глаза тусклы, мутны; побужденіе къ морганію глаза-

ми; верхнее веко опустилось, какъ бы въ слѣдствіе паралича; чрезвычайная чувствительность къ свѣту; слабость глазъ, которые останавливаются неподвижно на томъ предметѣ, на который большой взглянетъ; блескъ передъ глазами, какъ бы отъ молніи; темная вода; сѣрое бѣльмо; періодически возвращающаяся глухота; *блѣдность, искаженіе лица и желтизна около глазъ*; щеки и губы то блѣдны, то темнокрасны; личныя боли, не выносящія ни прикосновенія, ни движенія, съ глянцевою опухолью большой стороны; зубныя боли одновременно съ личными; чрезвычайный голодъ съ жаждою; тошнота и ощущение, какъ будто что-то поднимается изъ желудка въ горло; глистные недуги; круглые глисты; аскариды въ прямой кишкѣ; гриппъ, одышка; сильное стѣсненіе дыханія при поворачиваніи въ постели, больной можетъ лежать только на правомъ боку и на высокой подушкѣ; удушье при самомъ незначительномъ движеніи, особенно при подыманіи рукъ; внезапные приступы удушья съ тоскою и сердцебіеніемъ; ощущение судорогъ въ груди, которое возникаетъ сначала подъ ложечкой, съ стѣсненіемъ дыханія; водянка груди, при органическихъ порокахъ послѣдней; сердцебіеніе, доступное зрѣнію, замѣтное даже съвозъ платье; волнообразное движеніе сердца; удары сердца не совпадаютъ съ ударами пульса; колотье около сердца; бурчаніе въ груди (преимущественно около сердца), похожее на мурлыканье кошекъ; воспаленіе сердца; органическіе пороки его; аневризъмъ сердца или большихъ сосудовъ; жестокой, сухой кашель. (Ганеманнъ.)

Spongia tosta.

(*Spongia marina usta.*)

Жженая морская губка.

Недуги лимфатическихъ сосудовъ и желѣзъ, съ опухолью и затвердѣніемъ; жаръ, сухая, жгучая кожа, съ постоянною жаждою, головою болью и бредомъ; ощущение давленія и стука въ головѣ; приливъ крови къ головѣ съ замѣтнымъ біеніемъ шейныхъ артерій; глаза красны, притомъ чувство жженія и слезоте-

чение; горькій вкусъ въ гортлѣ; частая отрыжка, сопровождаемая рвѣзью и терзаніемъ въ желудкѣ; твердыя, задержанныя испражнения; частый позывъ на мочу съ скуднымъ отдѣленіемъ ея; воспаление и опуханіе яичекъ; отвердѣніе послѣднихъ; боль въ гортани при прикосновеніи къ ней; при поворачиваніи головы чувствуется стѣсненіе дыханія; жженіе въ гортани и развѣтвленіяхъ дыхательнаго горла; сухость горла, неясность голоса, охриплость; воспаленіе гортани, дыхательныхъ путей и перепончатая жаба; горловая чахотка; кашель, выходящій изъ глубины груди, съ болью какъ отъ изъязвленія и жженіемъ, или долговременный кашель съ отхаркиваніемъ желтой слизи; охриплость, свистъ при вдыханіи; удушье, съ остановкою мѣсячныхъ очищеній; зобъ. (Ганеманнъ.)

Squilla maritima.

Морской лукъ. Раст. сем. *Asfodelевыхъ* (Asphodeleae).

Усталость, ощущеніе тяжести въ тѣлѣ; водянка; затвердѣніе желѣзъ; бессонница и тревожный сонъ, жаръ во всемъ тѣлѣ, — съ дрожью, когда пациентъ хотя немного раскроется; блѣдность лица послѣ того какъ жаръ пройдетъ; темнокрасное лицо; обильная водянистая моча. (Ганеманнъ.)

Stannum.

(*Stannum metallicum.*)

Олово. Простое тѣло.

Нравственное и физическое изнеможеніе; нестерпимое безпокойство во всемъ тѣлѣ; судороги; истерическія или эпилептичскія корчи у младенцевъ въ періодъ прорѣзыванія зубовъ; припадки падучей болѣзни съ искривленіемъ большихъ пальцевъ; чрезвычайная худоба; дрожь по вечерамъ; жгучій жаръ въ членахъ, особенно рукахъ, горячій потъ, который отъ малѣйшаго движенія является по всему тѣлу, при полномъ изне-

моженія; обильный потъ каждое утро; медлительная лихорадка; уныніе и слезливость; больной на вопросы отвѣчаетъ нехотя и отрывисто; тяжесть въ головѣ и одуряющее давленіе въ мозгу; *лицо блѣдно, осунулось, глаза сильно впали*; лицо болѣзненное, вытянутое; личныя боли; зубы рыхлы и кажутся слишкомъ длинными; языкъ красенъ; тошнота послѣ ѣды; послѣ сильнаго позыва — рвота непереваренною пищею; желудочныя слазмы съ горькою отрыжкою и тошнотою, болѣзненная блѣдность лица; истерическія и ипохондрическія судороги нижней части живота; напрасный позывъ на нязъ; сильный поносъ; частый позывъ на мочу, съ обильнымъ ея испусканіемъ; бѣли, сопровождаемыя чрезвычайною потерею силъ; ощущеніе шероховатости въ гортани и охриплость; скопленіе слизи въ дыхательномъ горлѣ; глухой кашель съ сотрясеніемъ и чувствомъ разбитости подъ ложечкою, или позывъ на рвоту и рвота принятою пищею; *кашель съ обильнымъ отхаркиваніемъ слизи*; отдѣляемая мокрота желта, солоновата, или имѣетъ гнилой вкусъ; дыханіе захватывается ночью при лежаніи или днемъ во время всякаго движенія; сильная тяжесть въ груди съ чувствомъ стѣсненія и пустоты подъ ложечкою; боль какъ отъ изъязвленія и чувство слабости въ груди, какъ будто она пуста, преимущественно если эти симптомы возникаютъ послѣ разговора или отхаркиванія слизи; водянка груди; опухлость ступней. (Ганеманнъ.)

Staphisagria.

Гнидникъ. Растеніе (*Delphinium staphisagria*) сем. Лютиковыхъ (*Ranunculaceae*, Juss.).

Цинготныя припадки; *дурная сладостія огорченія, грусти, заботъ, горести*; истерическія и ипохондрическія недуги; боли въ костяхъ и воспалительныя страданія ихъ; чувство напряженія въ суставахъ, особенно при неловкомъ положеніи членовъ; боли похожія на терзаніе, съ напряженіемъ мускуловъ; оковѣлость суставовъ, по утрамъ, при вставаніи; болѣзненное чувство разбитости во всемъ тѣлѣ, какъ бы вслѣдствіе долгой ходьбы пѣшкомъ; общая болѣзненность какъ въ мускулахъ при прикоснове-

ни, такъ и въ суставахъ при движеніи; постоянная склонность къ лежанію; краснуха, съ подергиваніемъ ночью; лишаевидныя и чесоточныя сыпи; болѣзненная кожа, которая трудно поддается лѣченію при поврежденіи; частое появленіе кровяныхъ чирьевъ; опуханіе желѣзъ и затвердѣніе ихъ; опуханіе костей; сильная сонливость днемъ, такъ что глаза сами собою смыкаются; бессонница; вечерняя лихорадка, которая состоитъ изъ одного озноба; сильная склонность къ поту или неспособность къ потѣнію даже при сильномъ напряженіи тѣла, притомъ блѣдность лица и головная боль; холодный потъ на лбу и на ногахъ; грусть и чрезвычайная слезливость; *печальное настроеніе духа и слезы*; чрезвычайное равнодушіе, какъ при ипохондріи, съ желаніемъ умереть; *больной съ досадою бросаетъ все, что ему подвернется подъ руки*; тупость ума, мѣшающая заниматься; чешуйчатая сыпь и парша на покрытой волосами части головной кожи, съ сильнымъ зудомъ, и зловонная, мокнущая сыпь; *волосы лезутъ*; на краяхъ вѣкъ находятся узловатости; крѣпость на ухо отъ увеличенія объема миндалевидныхъ желѣзъ; насморкъ съ изъясвленіемъ поздрей; *лице изнуренное, глаза сильно воспалены, какъ бы отъ продолжительнаго ночнаго бдѣнія или душевныхъ потрясеній*; глаза впали и вокругъ нихъ синева, какъ бы послѣ продолжительнаго распутства; досада, съ багровымъ и синимъ цвѣтомъ лица; воспалительныя боли въ лицевыхъ костяхъ; язвы на губахъ съ болью, похожею на грызеніе и напряженіе; опуханіе десенъ съ узловатостями на нихъ; пища кажется горькою; сильный голодь даже когда желудокъ наполненъ, съ накопленіемъ въ немъ слизи; аппетитъ на жидкую пищу; ощущеніе слабости въ желудкѣ, причемъ пациенту кажется, что желудокъ понижается; увеличеніе въ объемѣ живота у дѣтей; опуханіе паховыхъ желѣзъ; *запоръ и медленное испражненіе, по причинѣ недостаточнаго перистальтическаго движенія кишекъ*; кровавый поносъ; частый позывъ на мочу и отдѣленіе ея каплями; *сильное половое возбужденіе*; ночныя напряженія члена и поллюціи съ сладострастными сновидѣніями; охрилость съ труднымъ отхаркиваніемъ слизи; кашель съ отдѣленіемъ желтой, похожей на гной слизи; судороги грудобрюшной преграды, вслѣдствіе огорченія. (Ганеманнъ.)

Sticta pulmonaria.

Плющичъкъ, легочный мохъ. Раст. сем. *Лишайныя* (Lichenes).

Средство это еще не достаточно изслѣдовано. Рекомендуютъ противъ: крупа, гриппа, кашля, кашля у чахоточныхъ (успокаиваетъ), коклюша, бессонницы и ревматизма сочлененій.

Stramonium.

Дурманъ. Растеніе (*Datura Stramonium*) сем. *Пасленовыя* (Solanaceae, Juss.).

Болѣзненное ощущеніе будто члены раздвинуты въ суставахъ; зудъ и нѣмѣніе членовъ; судороги, конвульсіи при взглядѣ на блестящіе предметы; подергиваніе толчками; подергиванія, свойственныя падучей болѣзни, но больной остается въ памяти; параличъ членовъ; пляска св. Витта, дрожь; сильное желаніе лежать; слабость тѣла съ шаткостью членовъ при ходьбѣ и стоячемъ положеніи; обморокъ съ храпѣніемъ, чрезвычайной блѣдностью лица, послѣ обморока пропадаетъ аппетитъ; сонливость днемъ, *но пробужденіи у пациента бываетъ важное, торжественное выраженіе лица*; крѣпкій сонъ съ храпомъ, хрипѣніемъ, кровавистою пѣною у рта и темнокоричневымъ цвѣтомъ лица; *меланхолія, при которой больной ищетъ общества, свѣта и солнечнаго сіянія, потому что въ уединеніи и темнотѣ ему бываетъ хуже*; грусть съ размысленіемъ о смерти и плачемъ; страхъ и чувство одиночества; приступы бѣшенства, съ сильнымъ напряженіемъ; тупоуміе; чувства тупы и не впечатлительны; больному мерещатся страшныя видѣнія (напр. безобразныя звѣри); помѣшательство съ гордостью и набожностью; безпрестанные переходы отъ смѣшныхъ движеній къ печальнымъ жестамъ; сильная головная боль съ помраченіемъ зрѣнія и крѣпостью на ухо; глаза блестятъ, пристально устремлены на одинъ предметъ, зрачки расширены; оптическіе обманы; блѣдность лица; *черты лица искажены какъ бы сильной болью или какъ бы выражаютъ смущеніе отъ страха причѣмъ на*

лицъ глубокия морщины; лицо красно, глаза неподвижны; лицо опухло, имѣетъ доброе выраженіе, притомъ приливъ крови къ нему; губы сини и распухли; языкъ какъ бы парализованъ, и вслѣдствіе этого больной бормочетъ и заикается; судорожное стягиваніе глотки и невозможность глотать; *отращеніе къ водѣ и вообще ко всякой влагѣ*; сильная икота; тухло-пахучія испражненія; задержаніе мочи; сладострастіе и безстыдство; судороги груди. (Ганеманнь.)

Strontiana carbonica.

Углекислый стронцій. Химическій препаратъ.

Усталость, тяжесть и разбитость тѣла утромъ. Разслабленіе съ дерганіемъ во всѣхъ членахъ. Дрожаніе отъ слабости. Исхуданіе тѣла. Боли чувствуются преимущественно въ длинныхъ костяхъ. Постепенное передвиженіе боли съ одного мѣста на другое. На воздухъ легче. Дрожь и ознобъ передъ обѣдомъ и вечеромъ. Жаръ въ рукахъ при внутреннемъ ознобѣ. Тревожный сонъ. Вздрагиваніе во время засыпанія. Угрюмость и раздражительность. Забывчивость. Утромъ головокруженіе съ тошнотою. Выпирающая боль во лбу. Стрѣльба въ разныхъ частяхъ головы. Буравящая боль въ одной точкѣ головы, ночью. Зудъ и кусающая боль во внутреннихъ углахъ глазъ. Кровотеченіе носомъ. Покальваніе въ зубахъ. Опуханіе щеки. Жестокая зубная боль. Колющая боль въ зубахъ. Боль какъ отъ язвинъ въ кончикѣ языка. Дурной запахъ изо рта. Воспаленіе зѣва и боль при глотаніи. Отращеніе къ мясной пищѣ. Отсутствіе аппетита. Позывъ на рвоту. Давленіе подъ ложечкой. Боль въ желудкѣ послѣ обѣда. Вздутость живота съ отдѣленіемъ вѣтровъ. Рѣзь и бурчаніе около пупка. Весьма воюющіе вѣтры. Запоръ. Поносъ съ рѣзью въ животѣ. Напоръ мочи. Бѣля. Опаздывающее мѣсячное. Постоянный кашель ночью съ колотьемъ въ груди. Стѣсненіе въ груди, особенно на ходу. Зудъ въ разныхъ мѣстахъ кожи. Мелкіе, но причиняющіе боль прыщи на лицѣ. Гнойные прыщи на груди. (Гартлаубъ и Тринксъ.)

Strychninum nitricum.

Азотнокислый стрихнинъ. Химическій препаратъ.

Чрезвычайное расслабленіе. Дерганіе во всѣхъ членахъ. Корча челюстей и столбнякъ. Сильныя эпилептическія судороги. Конвульсіи. Столбнякъ съ удушiемъ и потерю сознанія. Откинутая назадъ голова и неподвижное тѣло. Совершенный застой крови въ венахъ. Сохраненіе полного сознанія до самой смерти (вслѣдствіе того, что стрихнинъ сначала поражаетъ позвоночный столбъ, а потомъ уже дѣйствіе этого яда распространяется на головной мозгъ). Воспаленіе спинного мозга. Боли въ спинѣ.

Sulphur.

(*Sulphur sublimatum.*)

Сѣра. Простое тѣло.

Боли въ членахъ, сопровождаемая слабостью и коченѣніемъ, колотьемъ въ суставахъ и одеревенѣніемъ; чувство сильнѣйшаго напряженія и терзанія, которое въ мягкой постели становится нестерпимымъ; отъ вѣшней теплоты лучше, отъ холода хуже; боли появляются только въ покоѣ и проходятъ при движеніи пораженной части или при ходьбѣ; *утомленіе всего тѣла и увеличеніе страданій отъ разговора*; члены быстро нѣмѣютъ; сильная склонность къ простудѣ, *чрезвычайная чувствительность къ вѣтру и открытому воздуху*; больной не хочетъ умываться; боли при перемѣнахъ погоды; сильное волненіе крови и безпокойство, со вздутостью венъ на рукахъ; дрожаніе тѣла; приступы падучей болѣзни вслѣдствіе испуга или быстрого бѣга; дрожаніе членовъ, особенно рукъ; походка петверда, причемъ туловище согнуто; слабость мускуловъ у дѣтей, отчего они поздно начинаютъ ходить; *чрезвычайное исхуданіе; чесоточныя сыпи* или сыпи похожія на бывающую послѣ коровьей оспы; *печеночныя пятна*; — родимыя; трещины кожи; *кожа болѣзненна и поврежденія ея поэтому трудно замѣчиваются*; опрѣлость кожи; ознобы; кровоточивыя язвы; болѣзни желѣзъ и костей; блѣдная немочь; водяночное со-

стояніе; горячія, красныя или блѣднаго цвѣта напряженныя опухоли; *чрезвычайная сонливость днемъ, причеъ вечеромъ больной лолю не можетъ заснуть и, заснувъ, часто пробуждается*; бодрость при ночномъ бдѣніи; трепетаніе и подергиваніе членовъ во снѣ, кошмаръ; лунатизмъ и говоръ во снѣ; *ощущеніе холода, ознобъ*; потъ легко выступаетъ при сидѣніи, чтеніи, разговорѣ, писемѣ и малѣйшемъ движеніи; обильный потъ ночью; *меланхолия и слезливость, раздраженіе, вспыльчивость, сосредоточенность; страсть къ философствованію и религіознымъ мечтаніямъ*; стугъ въ головѣ по утрамъ, вечерамъ или ночамъ; приливъ крови къ головѣ, частый летучій жаръ въ лицѣ; парша на головѣ; *боль въ волоснахъ корняхъ, особенно при прикосновеніи*; выпаденіе волосъ; наклоненіе головы при ходьбѣ; язвы на краяхъ вѣкъ; больной не выносить солнечнаго свѣта; *блѣдность и одутловатость лица; лицо желтовато, блѣдно, имѣетъ страдальческое выраженіе, какъ бы вслѣдствіе продолжительной болѣзни; синева подъ глазами, которые впали*; рѣзко ограниченный румянецъ на щекахъ; *жаръ въ лицѣ и красныя на немъ пятна*; надъ носомъ и вѣками лишая; *кожа на лицѣ шероховата и красна; поры на носу, губахъ и подбородкѣ черны*; зубы кажутся шаткими и слишкомъ длинными; опуханіе десенъ; *молочница*; сладкій вкусъ во рту; *сильный голодъ*; *недухи отъ скопленія кислотъ въ желудкѣ*; отрыжка пищею и изжога; ослизеніе желудка; чувство давленія какъ бы отъ находящагося въ немъ какого-то комка; *судорожныя колики живота вслѣдствіе геморроя или вѣтровъ*; застой крови въ животѣ; *домовременный запоръ*; недостаточное испражненіе, съ чувствомъ какъ будто часть каала осталась въ проходѣ; бѣловато-слизистыя испражненія; испражненіе непереваренной пищи; геморроидальныя шишки въ заднемъ проходѣ; болѣзненное испусканіе мочи каплями; *невольное испусканіе ея во снѣ*; складки кожи прѣютъ, преимущественно между ногами, при ходьбѣ; мужское безсиліе или же увеличеніе половой силы; частыя поллюціи; давняя остановка регулъ; слишкомъ блѣдная менструальная кровь; бѣли, изъязвляющія половыя части, съ жгучею болью; ослизеніе горла и груди; слабость груди при разговорѣ; удушье ночью, во снѣ; чувство тяжести въ груди, какъ будто на ней лежитъ камень; сильный приливъ къ груди и волненіе крови; боли въ по-

ясниць; ногтоѣда; сильное коченѣніе оконечностей, такъ что онѣ не согрѣваются даже въ постели. (Ганеманнъ.)

Sulphuris acidum.

(*Acidum sulphuricum.*)

Сѣрная кислота. Химическій препаратъ.

Зудъ во всемъ тѣлѣ; красныя или синеватыя (какъ отъ подкожныхъ изліяній крови) пятна на кожѣ; изъязвленіе и гангренозное нагноеніе кожи; слѣдствія толчка, ушиба и т. п. механическихъ поврежденій; слизистая лихорадка; тоскливое, печальное расположеніе духа и малодушіе, попеременно съ возбужденнымъ состояніемъ духа; волосы лѣзутъ и сѣдѣютъ; хроническое воспаленіе глазъ; слухъ притупленъ, съ чувствомъ будто уши чѣмъ-то заткнуты; молочница во рту; кислоты поднимаются въ горло, изжога; слишкомъ продолжительныя и слишкомъ раннія менструаціи; охриплость; насморкъ и побужденіе каплять, или сухость и шероховатость горла и надгортаннаго хряща; кровохарканіе и застарѣлый кашель съ кровью. (Ганеманнъ.)

Symphitum officinale.

Живокость, сальный корень, лошаково ухо, красъ. Раст. сем. *Бурачниковыхъ* (Borragineae).

Средство это еще мало изслѣдовано. Въ гомеопатіи тинктура (пополамъ съ водою) употребляется только при переломахъ костей и механическихъ поврежденіяхъ надкостной плевы.

Tabacum.

(*Nicotiana Tabacum.*)

Табакъ. Растеніе сем. *Пасленовыхъ* (Solaneae).

Усталость и изнеможеніе передъ обѣдомъ. Дрожаніе рукъ и ногъ. Разслабленіе мышцъ. Судороги. Нечувствительность. Конвульсія съ храпѣніемъ и обильнымъ потомъ, при боли подъ ложеч-

кой. Корчи съ жестокой болью. Эпилептическіе припадки. Обморокъ. Потеря сознанія. Желтуха. Ломотныя боли. Сильное исхуданіе.

Врачи рекомендуютъ преимущественно противъ холеры и холерины, головокруженія, судорогъ въѣкъ, страданій печени и селезенки

Tarantula.

(*Lycosa Tarantula.*)

Тарантула. Насѣкомое сем. Пауковихъ (*Arachnoides*).

Безпокойство въ тѣлѣ. Нервное раздраженіе. Судорожное дрожаніе одной половины тѣла. Конвульси. Истерическіе припадки. Обморокъ. Припадки усиливаются отъ шума, разговора и атмосферическихъ вліяній; припадки возобновляются періодически.

Испанскіе врачи рекомендуютъ это средство противъ пляски св. Витта, истерики, дѣвической немочи, ипохондрии, каменной болѣзни, сахарнаго мочеизнуренія; противъ страданій матки, нимфоманіи, одышки, опухолей и карбункула.

Tartarus emeticus.

(*Tartarus stibiatus, Antimonium tartaricum.*)

Винный рвотный камень. Химическій препаратъ.

Пустулезная сыпь; ложная оспа; сильная сонливость и спячка; перемежающаяся лихорадка съ отсутствіемъ жажды и сонливостью; ударъ; блѣдность и страдальческое выраженіе лица; позывъ на рвоту; рвота съ поносомъ и чрезвычайною слабостью; кислая рвота пищею; давленіе въ желудкѣ и подъ ложечкой; стукъ и биеніе въ сторонѣ желудка; воспаленіе его; боль въ животѣ съ сильнымъ душевнымъ и тѣлеснымъ безпокойствомъ; поносъ съ предшествующею рвзью въ животѣ и съ слизистыми или темножелтыми испражненіями; чувствительность гортани къ прикосновенію; перепончатая жаба; охриплость; катарръ съ слизистымъ хрипомъ въ развѣтвленіяхъ дыхательныхъ путей; кашель

съ чиханьемъ и рвотою или стѣсненіемъ дыханія, какъ бываетъ при удушливомъ кашлѣ; параличъ легкихъ; катарръ съ удушьемъ; боль въ поясницѣ. (Штапфъ.)

Tellurium.

Теллурий. Простое тѣло (металлъ).

Ознобъ во время болей. Усиленная испарина. Потъ пахнетъ чеснокомъ. Головокруженіе утромъ, съ тошнотою и рвотою. Насморкъ съ охрипlostью. Сильная кровоточивость десенъ. Опухоль языка. Давленіе подъ ложечкой. Вонючіе вѣтры. Черныя испраженія. Моча красная, кисло-пахучая. Сердцебиеніе съ затрудненнымъ дыханіемъ. Боль въ спинныхъ позвонкахъ и крестцѣ. Кольцевидные лишай по всему тѣлу. Лишайныя сыпи, со временемъ слушающіяся бѣлыми чешуйками.

Terebinthina.

(*Oleum Terebinthinae.*)

Скипидаръ. Получается изъ дерева *Pinus pinaster* сем. *Хвойныхъ* (Coniferae).

Слабость. Изнеможеніе. Тугость мышцъ. Обморокъ. Подкожная водянка. Тревожный сонъ. Головокруженіе. Кровотеченіе носомъ и кровохарканіе. Кровоточивость десенъ. Слизистый поносъ. Воспаленіе желудка. Запоръ. Глисты. Воспаленіе почекъ. Почечные камни. Воспаленіе мочевого пузыря и канала. Кровавая моча. Задержаніе мочи. Мочеръзь. Катарръ мочевого пузыря. Боль въ поясницѣ. Боль въ бедрѣхъ.

Teucrium marum verum.

(*Marum verum.*)

Кошачья мята, кошачья трава, дубровка. Раст. сем. *Губоцвѣтныхъ* (Labiatae).

Подергиваніе мышцъ въ разныхъ частяхъ тѣла. Нѣмніе оконечностей и стрекотаніе въ нихъ. Нетвердая походка. Дро-

жаніе во всемъ тѣлѣ. Изнеможеніе. Ознобъ съ холодѣніемъ рукъ и зѣвотой. Сопливость днемъ. Раздражительность. Давящая боль въ одной точкѣ лба. Воспаленіе соединительной оболочки глаза, съ саднящею болью во внутреннихъ углахъ его и съ насморкомъ. Боль въ ушахъ. При сморканіи пискливый звукъ въ ухѣ. Боль въ деснахъ при жеваніи. Сильный аппетитъ по утрамъ. Давленіе подъ ложечкой. Бурчаніе и рѣзь въ животѣ. Обильное отдѣленіе вонючихъ вѣтровъ. Боль и зудъ въ прямой кишкѣ послѣ испраженія. Отдѣленіе мелкихъ глисть. Жженіе въ концѣ мочевого канала. Обильная водянистая моча. Боль въ сѣменныхъ канатикахъ. Отсутствие зречій. Стѣсненіе въ груди. Давящая боль въ поясницѣ.

Гомеопаты употребляютъ преимущественно противъ первнаго раздраженія и бессонницы, падучей болѣзни, аскариды (мелкихъ глисть), воспаленія слизистой оболочки носа и полипа въ носу. (Въ послѣднемъ случаѣ нюхаютъ также порошокъ изъ листьевъ этого растенія.)

Thuja occidentalis.

Негніючка. Раст. сем. Хвойныхъ (Coniferae, Juss.).

Фикообразные наросты (кондиломы) на дѣтородныхъ частяхъ; *терзаніе и біеніе въ пораженныхъ частяхъ, какъ будто оны изъязвлены*; колотье въ членахъ и суставахъ, члены нѣмѣютъ, особенно по ночамъ, въ постели; чувство, какъ будто тѣло стало очень худо или готово развалиться на части; *припадки усмиваются въ покой и теплоту, особенно постельной*, при движеніи, холодѣ и потѣнии легче; послѣ обѣда и ночью, около 3 часовъ по полуночи, или по вечерамъ — хуже, и больной не можетъ заснуть; многіе припадки, какъ кажется, начинаются съ лѣвой стороны; дурныя слѣдствія разгоряченія, чая, жирной пици, лука; сильное волненіе крови и біеніе всѣхъ артерій; подкожныя вены вздуты; сыпь, похожая на вѣтреноую оспу и окаймленная широкиими красными кругами; *темныя или мраморныя пятна на кожѣ*; кровавые чирья; ознобы; *фикообразные наросты*; жаръ съ жаждою и сильное душевное возбужденіе; безпокойство, наводящее отвращеніе къ жизни; *медленность мышленія и разговора*; го-

головная боль съ чувствомъ какъ будто въ маковку вбитъ гвоздь; даже волосы чувствительны къ прикосновенію; бѣлки глазъ кроваваго цвѣта; слезотеченіе изъ глазъ на вольномъ воздухѣ; ощущеніе напряженія въ носовыхъ костяхъ; язвы и болѣзненные струпыя внутри носа; сморканье кровью; жаръ и краснота въ лицѣ; молочница; опуханіе слюнныхъ желѣзъ; опухоль подъ языкомъ; ощущеніе сытости даже послѣ немногой пищи; охота къ холодной пищѣ и питью; отрыжка промозглымъ послѣ жирной пищи; чувство, какъ будто кишки перешлепываются; *ощущеніе какъ будто брюшныя мускулы выталкиваются изнутри наружу рукою; ощущеніе какъ будто въ нижней части живота движется что то живое*; завалы въ нижней части живота; *запоръ вслѣдствіе недѣятельности кишокъ*; частое, обильное мочеиспусканіе, съ предшествующимъ сильнымъ позывомъ; свѣтлая, водянистая моча; ощущеніе истеченія жидкости въ мочевомъ каналѣ; круглыя, плоскія, грязныя язвы на головкѣ полового члена; фигообразныя, роговидныя, источающія влагу, гнойныя, зудящія бородавки; постоянныя напряженія члена и поллюціи, съ ощущеніемъ суженія мочевого канала; истеченіе влаги изъ предстательной желѣзы; наросты на маточной шейкѣ, похожія видомъ на бородавки; колюче въ груди послѣ холоднаго питья; сильное біеніе сердца, особенно при подниманіи на лѣстницу; чувствительность страны сердца; около ключиць кожа синяго цвѣта; на рукахъ бородавки. (Ганеманнъ.)

Trillium pendulum.

Колкунія висячая. Раст. сем. *Осенниковыхъ* (Colchicaceae).

Средство еще мало изслѣдовано. Нѣкоторые врачи рекомендуютъ противъ кровохарканія, кровотеченія изъ мочевого канала, маточнаго кровотеченія, кровотеченія носомъ, противъ кроваваго поноса, бѣлей и сахарнаго мочеизнуренія.

Uranum muriaticum.

Соленокислый ураній. Химическій препаратъ.

Докторъ Вэръ хвалитъ дѣйствіе этого средства (въ низкихъ растираніяхъ) противъ сахарнаго мочеизнуренія.

Urtica urens.

Крапива-жгучка. Раст. сем. *Крапивныхъ* (Urticaceae).

Легкая испарина кожи. Обильная моча. Опуханіе губъ, носа и ушей. Отечная опухоль вѣкъ. Зудящія красныя волдыри на кожѣ.

Употребляется въ гомеопатіи почти исключительно отъ ожоговъ, въ видѣ примочки изъ 1 части тинктуры и 10 частей воды или прованскаго масла.

Uva ursi.

Толокнянка. Раст. (*Arctostaphylos uva ursi*) сем. *Вересковыхъ* (Ericaceae).

Каменная болѣзнь; *болѣзненное испусканіе мочи*, съ чувствомъ жженія; *мошная*, слизистая моча; кровавая моча. Медикаментъ мало еще изслѣдованный.

Valeriana.

Буддырьянъ, маунъ. Корень растенія (*Valeriana officinalis*) сем. *Валерьяновыхъ* (Valerianeae, Juss.).

Дергающія и потрясающія боли съ напряженіемъ въ членахъ и востяхъ; внезапныя, летучія боли; *страданія увеличиваются вечеромъ, послѣ стола и съ покоемъ, преимущественно послѣ движенія, облегчаются отъ движенія и тренія*; сыпь, состоящая изъ бѣлыхъ, твердыхъ шишечекъ; *болѣзненная раздражительность нервовъ и усиленная впечатлительность всего чувства*, притомъ дрожаніе; сильное безпокойство и робость; сильное душевное возбужденіе и обманы чувствъ; чрезвычайная пугливость, ипохондрическая тоскливость и отчаяніе; частая пустая отрыжка, со вкусомъ во рту, похожимъ на вкусъ промозглаго жира; боль какъ отъ изъязвленія и судорожное ощущеніе растяженія живота. (Штапфъ.)

Veratrum album.

Бѣлая чемерица. Корень растенія сем. *Осенниковыхъ* (Colchicaceae).

Дурныя слѣдствія испуга и страха или огорченія и гнѣва; *приступы боли, производящія кратковременные бредъ и неистовство*; болѣзненное чувство разбитости въ членахъ и особенно въ костяхъ, или давящая боль въ членахъ; *боль въ частяхъ, на которыхъ лежитъ больной, такъ что постель кажется жесткою*; боль съ онѣмѣнiемъ, какъ бы вслѣдствiе сильной усталости и истощенiя; *боли въ членахъ, не выносящія постельной теплоты, уменьшающіяся, когда встанешь, и совершенно прекращающіяся при ходьбѣ, возникаютъ болѣею частью утромъ*; больному хуже осенью, весной, въ дурную, холодную погоду; — при разговорѣ постороннихъ; дрожанiе членовъ, съ тоской и расположенiемъ къ обморокамъ; потрясенiя, подобныя электрическимъ, и подергиванiе съ сильнымъ потѣнiемъ; судороги, конвульси, причемъ ладони и подошвы искривляются; каталепсиа съ сведенiемъ челюстей; общая худоба; *параличная слабость* и расположенiе къ обморокамъ, при незначительномъ движенiи; *вялость и неупругость кожи*; полудремота или продолжительный, крѣпкiй сонъ; *ощущенiе холода во всемъ тѣлѣ, съ микимъ, холоднымъ потомъ*; жаръ въ лицѣ, сопровождаемый краснотой и дрожью; медленный, едва замѣтный пульсъ; дневной потъ отъ малѣйшаго движенiя; *сильная тоска какъ бы вслѣдствiе упрямiя совѣсти или предчувствiя несчастiя*; робость съ крикомъ, безпокойствомъ, безцѣльной бѣготнею; расположенiе духа, при которомъ больной склоненъ обнаруживать чужiе пороки; неистовство, глумливость и сварливость; *больной помѣшанъ на религи или любви*, поступаетъ странно и нелѣпно; болѣзненное чувство разбитости въ мозгу; волосная кожа чувствительна; *ощущенiе холода въ темени, какъ бы отъ лежащаго на немъ льда*; холодный потъ на лбу; параличъ и какъ бы отяжелѣнiе вѣкъ; почная слѣнота, возникающая въ сумерки; красныя пятна на носу; *лицо холодно, мертвенно, искажено, носъ заостренъ, и щеки впалы*; подъ глазами синiе круги; лицо желтовато или синеовато; на немъ красная сыпь, а также около рта и на подбородкѣ; губы сухи, черноваты, растреска-

лись; сведеніе челюстей; истеченіе пѣны и слизи изо рта; языкъ красенъ, распухъ, черновать, въ трещинахъ; сильная охота къ плодамъ и кислой пищѣ; *чрезвычайная прожорливость и голодъ; неупокоимая жажда на холодное;* скопленіе слизи въ желудкѣ; рвота чернымъ веществомъ; рвота съ поносомъ и чувствомъ давленія подъ ложечкой; *чрезмѣрная болѣзненная чувствительность области предсердія и желудка и чувство сильной тоски подъ ложечкой;* рѣзъ въ животѣ, какъ бы ножами, или жжение, какъ бы раскаленными углями; *долговременный запоръ вслѣдствіе недѣятельности кишекъ;* зеленныя, водянистыя, съ хлопьями, или коричневыя, или черноватыя испраженія; припадки удушья вслѣдствіе судорожнаго стягиванія гортани; сильное бѣненіе сердца и сильная тоска; зудъ въ рукахъ и пальцахъ; ледяной холодъ ногъ. (Ганеманнъ.)

Veratrum viride.

Чемерица зеленая, американская. Растеніе семейства *Осенниковыхъ* (Colchicaceae).

Дѣйствуетъ сходно съ *Veratrum album* и до сего времени употреблялось эмпирически противъ слѣдующихъ болѣзней: скарлатины и оспы; слѣпоты; воспаления грудныхъ желѣзъ и легкихъ; воспаления мозга, сердца и околосердечной сумки; воспаления шлѣзъ и почекъ; поноса простаго и кроваваго; холеры; спазмовъ (челюстей); истерики; нервной горячки; родильной лихорадки; перемежающейся лихорадки; геморроя; ревматизма; водянки; сахарнаго мочеизнуренія; раздраженія мозга вслѣдствіе прорѣзыванія зубовъ у дѣтей.

Verbasum thapsus.

Царскій скипетръ. Растеніе сем. *Норичниковыхъ* (Scrophularineae).

Всеобщая лѣнность и позывъ ко сну, утромъ, послѣ пробужденія; частая *потягота* и зѣвота; *терзаніе*, иногда стрѣляющее, въ различныхъ частяхъ тѣла; нетвердая походка; пациенту *сильно хочется спать послѣ обѣда*; тревожный сонъ ночью, съ ме-

таніемъ; непродолжительный сонъ ночью, только до 4 часовъ утра, съ безпокойными, страшными грезами о битвахъ и мертвецахъ; *холодъ по всему тѣлу*, чувствительный даже снаружн, особенно въ рукахъ и ногахъ; подираетъ по кожѣ, особенно одной стороны тѣла, какъ будто ее обливаютъ холодною водою; апатія (нечувствительность); мрачное, дурное расположеніе духа и гнѣвъ; веселость со смѣхомъ; чрезмѣрное душевное возбужденіе съ сладострастными представленіями; слабость памяти; разсѣянность; приливъ мыслей и возбужденное воображеніе; катарральный кашель у дѣтей. (Ганеманнъ.)

Viola tricolor.

Анютины глазки. Раст. сем. *Фіалковыхъ* (Violarineae, Juss.).

Изнеможеніе, иногда подобное тому, какое бываетъ послѣ недостаточнаго сна; стрѣляющія боли въ членахъ; просовидная сыпь по всему тѣлу, съ стрѣляющимъ, ѣдкимъ ощущеніемъ; больному *хочется спать послѣ обѣда*; тревожный сонъ съ частымъ пробужденіемъ; медленно наступающій сонъ, отъ прилива мыслей, причемъ больной трудно просыпается утромъ; *живилья и сладострастныя грезы*, дрожаніе кистей и сведеніе большихъ пальцевъ во снѣ, съ краснотою лица и всеобщимъ сухимъ жаромъ; зябкость и холодъ на вольномъ воздухѣ; ночной потъ; печаль о домашнихъ дѣлахъ; торопливость, какъ отъ внутренней тоски, съ чувствомъ большой слабости; желаніе плакать, *дурное расположеніе духа, мрачное настроеніе его*, притомъ отвращеніе къ разговору; сильная воспримчивость и сварливое расположеніе духа; непослушаніе; удаленіе отъ работы; молочная корка. (Штапфъ.)

Xanthoxylum fraxineum.

Американское желтое дерево, сем. *Ксантоксилowychъ* (Xanthoxyleae).

Дѣйствіе этого медикамента еще мало изслѣдовано. Эмпирически употреблялось противъ воспаления глазъ (внутри и наружно), колики отъ вѣтровъ, поноса, холеры; противъ ипохондрій, задержанія мѣсячныхъ, бѣлей и, наконецъ, противъ паралича языка и ослѣпости.

Zincum metallicum.

Цинкъ. (Шпиаутеръ.) Простое тѣло.

Нечувствительность тѣла; ощущение холода въ костяхъ; острья и хроническія сыпи; лишай и лишайныя язвы; тресканіе кожи; сонливость и лѣнь утромъ или тотчасъ послѣ обѣда; громкій крикъ и разговоры во снѣ; грёзы и ужасныя сновидѣнія; легко возникающее потѣніе днемъ; ночной потъ; нерасположеніе къ работѣ и ходбѣ; сильная забывчивость и слабость памяти; боль какъ отъ изъязвленія и жужжаніе въ головѣ; боль въ части головы, покрытой волосной кожей, какъ бы вслѣдствіе подкожнаго изъязвленія; сухость глазъ; отвислость и параличъ верхнихъ вѣкъ; чувствительность и боль, какъ отъ изъязвленія, въ зубахъ; болѣзненность десенъ, какъ отъ изъязвленія; кровоточивость ихъ; синеватые лишай въ зѣвѣ, возникающіе послѣ плохо залѣченной гонорреи; боковыя части живота напряжены; скопленіе вѣтровъ и выдавливаніе ими наружу геморроидальныхъ шишекъ; запоръ; жидкія испраженія, поносъ; задержаніе мочи; невольное мочеиспусканіе при ходбѣ, кашлѣ и чиханіи; мочевые и почечныя камни; слишкомъ быстрое изверженіе сѣмени, сильныя напряженія члена; бѣли, съ предшествующею рѣзью въ животѣ; судорожное удушье; напряженіе въ грудной кости; біеніе и толчки сердца, причѣмъ удары его перемежаются, и дыханіе стѣснено; боли въ поясницѣ ревматическаго свойства; судороги оконечностей. (Танеманъ.)

Zizia aurea.

Циція золотистая. Раст. сем. *Зонтичныя* (Umbelliferae).

Нервные, эпилептическія припадки. Конвульсія. Судорожное движеніе мышцъ лица и оконечностей. Боли усиливаются отъ движенія, прикосновенія, шума и свѣта. Хроническое воспаленіе глазъ съ изъязвленіемъ роговой оболочки. Нервная головная боль. Ипохондрія. Истерика. Нервная бессонница. Воспаленіе подреберной плевры. Задержаніе регуль. Бѣли.

ОБОЗРѢНІЕ

сферы дѣйствія отдѣльных лѣкарствъ по болѣзнямъ.

Предлагаемое обозрѣніе, матеріаломъ для котораго послужилъ текстъ книги, имѣетъ ближайшею цѣлью облегчить выборъ лѣкарства въ извѣстномъ, частномъ случаѣ, — и этимъ оно отличается отъ предъидущаго отдѣла книги. Тамъ мы знакомимся съ возможно полнымъ сводомъ симптомовъ, излѣчиваемыхъ извѣстными лѣкарствами, здѣсь, напротивъ того, сгруппированы подъ извѣстнымъ лѣкарствомъ не всѣ частные симптомы, а только болѣзни вообще, имѣющія отношеніе къ средству. Характеристика лѣкарствъ должна служить руководствомъ для желающаго подробно изучить дѣйствіе гомеопатическихъ лѣкарствъ, обозрѣніе же это, хотя служитъ отчасти и этой общей цѣли, но главнымъ образомъ должно облегчать выборъ лѣкарства въ отдѣльныхъ случаяхъ, т. е. когда предстоитъ сравнительно быстро выбрать средство для заболѣвшаго, и когда едва ли достаточно времени для справокъ въ „характеристикѣ.“

Если напр. возникнетъ сомнѣніе на счетъ того, выбрать ли *Aconitum* или *Ignatia*, то на основаніи этого обозрѣнія легко будетъ рѣшить, что *Aconitum* преимущественно дѣйствуетъ противъ болѣзней кровеносной системы, а *Ignatia* — противъ нервныхъ болѣзней, и, сообразуясь съ этимъ, остановиться на одномъ изъ этихъ средствъ. Тѣ общія и частныя указанія, которыя можно извлечь изъ „обозрѣнія,“ и должны помогать при столь трудномъ дѣлѣ выбора лѣкарства.

Этимъ обозрѣніемъ можно также пользоваться для составленія домашней аптечки по желанію.

При каждой болѣзни обозначена страница, подъ которой можно справиться въ текстѣ.

Aconitum Napellus. Воспаленіе горла 236; горла пище-
 реннаго 242; гортани, дыхательнаго горла и бронхіи 198; грудно-
 брюшной преграды 351; желудка 261; живота нижней части (ки-
 шокъ, брюшины) 265; легкихъ 207; матки 327; мозга спиннаго
 149; мочеваго канала, мочеваго пузыря, почекъ 309; мошонки
 325; мышцы поясничной 352; печени 305; подреберной плевы
 211; сердца и околосердечной сумки 111; языка 223. — Гемор-
 рой 61. — Глазныя болѣзни 138, 139, 140. — Глистныя болѣзни
 292. — Глухота 142. — Головная боль 126. — Головокруженіе
 123. — Гоноррея 344. — Гриппъ 188. — Желтуха 299. — Же-
 лудка катарръ 244, 245. — Желчныхъ путей болѣзни 300. — Жи-
 вота боли (колики) 269. — Зубная боль 231. — Зубныя болѣзни
 (дѣтей) 233, 234. — Кашель (катарральный) 183, 187. — Крово-
 теченія 66. — Крупъ 201. — Лихорадки: гастрическая 244, 245;
 желчная 299, 300; молочная 55; родильная 54. — Личная боль
 170. — Ломота 81. — Мочевыхъ органовъ болѣзни 320, 321; мо-
 чи задержаніе (у дѣтей) 317. — Насморкъ 177. — Обморокъ 175. —
 Одышка 216. — Охриплость 204. — Полнокровіе 58. — Ревма-
 тизмъ 85. — Сердца болѣзни 105, 107. — Сифилиса вторичныя
 формы 350. — Сонъ ненормальный 134, 135. — Спинная боль
 152. — Сыпи, острыя (лихорадочныя): корь 362; крапивная сыпь
 364; краснуха 363; оспа, настоящая 366; вариолонды 367;
 вѣтрена 367; скарлатина 358; — хроническія (нелихорадочныя)
 368. — Хирургическія болѣзни: грыжи 389; раны 384, 385. —
 Холерина 282. — Шумъ въ ушахъ 143.

Actaea spicata. Личная боль 173.

Aesculus glabra. Головная боль 131. — Головокруженіе 125.
 — Морская болѣзнь 125. — Параличъ 168.

Aesculus hippocastanum. Бѣли 340. — Геморрой 64. —
 Запоръ 289. — Параличъ 168.

Aethusa Cynapium. Рвота (у новорожденныхъ) 253.

Agaricus muscarius. Глазныя болѣзни 140. — Мозга спи-
 наго истощенія 322. — Обоняніи разстройство 147. — Отморо-
 женіе 382. — Падучая болѣзнь 160. — Спинная боль 151.

Agave americana. Гнилость рта. 222.

Agnus castus. Молочная лихорадка 56. — Мужское безсиліе 325. — Обонянiя разстройство 147.

Aletris farinosa. Бѣли 340. — Менструальныя болѣзни 335. — Матки выпаденіе 328. — Мозга воспаленіе 118.

Allium sativum. Болѣзни отъ глiсть 293.

Alumen. Кровотеченія 70. — Нарывы въ носу 179. — Обонянiя разстройство 147. — Слюнотеченіе 224.

Alumina. Бѣли 338.

Aluminium. Параличъ спиннаго мозга 168. — Пораженіе спиннаго мозга 103.

Ambra. Кашель (судорожный) 194.

Ammonium carbonicum. Глазныя болѣзни 140. — Одышка 218. — Скарлатина 359. — Шумъ въ ушахъ 143.

Ammonium muriaticum. Глазныя болѣзни 140. — Кашель (катарральный) 187.

Anacardium orientale. Глазныя болѣзни 139. — Душевные недуги (слабость памяти) 137. — Сонъ ненормальный 135. — Языка параличъ 224.

Antimonium (crudum). Гастрическая лихорадка 245, 246. — Головная боль 126, 127. — Головокруженіе 123. — Желудка катарръ 245, 246. — Желчныхъ путей болѣзни 303. — Золотуха (накожныя болѣзни) 78. — Ломота 83. — Ожирѣніе 98. — Сыпи, хроническія (нелихорадочныя) 368: парша 378; пузырьчатыя 374; угри 373; узловатыя сыпи 371.

Antimonium tartaricum (см. Tartarus emeticus).

Apis. Воспаленіе горла 238; мозга 117, 118; мозга спинно-головнаго 118. — Водянка 96. — Сыпи, острыя (лихорадочныя): рожа 356; скарлатина 358.

Arocyum androsemifolium. Бѣли 340. — Водянки 96. — Головная боль 131. — Желчная лихорадка 304. — Запоръ 290. — Кашель 203. — Ломота 83. — Менструальныя болѣзни 335. — Мигрень 132. — Поносъ простой и кровавый 280. — Ревматизмъ 89, 90. — Сыпи 372.

Arocyum cannabinum. Водянки 96. — Глазныя болѣзни 141. — Кашель 203. — Маточное кровотеченіе 72. — Менструальныя болѣзни 335. — Мочерѣзь 314. — Сыпи 371.

- Aralia racemosa.** Бѣли 340.
- Argentum foliatum.** Сахарное мочеизнуреніе 97.
- Argentum (nitricum).** Воспаленіе желудка 262; мозга спиннаго 150. — Глистныхъ болѣзни 293. — Головная боль 126. — Желудка боль (судороги) 256, 260; размягченіе 264. — Ипохондрія и истерика 153. — Кровотеченія 70. — Личная боль 173. — Мозга спиннаго сухотка 103. — Мочи недержаніе ночью 318. — Нервовъ слабость 156. — Обонянія разстройство 147. — Одышка 218. — Падучая болѣзнь 160. — Параличь 168; — послѣ дифтерита 241. — Сердца болѣзни 107, 109. — Спинальная боль 151. — Судороги 164. — Холера 285.
- Arnica montana.** Вѣнь расширеніе 113. — Воспаленіе горла пищепріемнаго 242; желѣзь грудныхъ 212; мозга 116, 117; мозга спиннаго 150; мошонки 325; языка 223. — Глазныя болѣзни 139. — Глухота 142. — Головная боль 125, 127. — Головокруженіе 124. — Гриппъ 188. — Зубная боль 232. — Кашель 183. — Кровотеченія 67, 70. — Личная боль 173. — Ломота 81. — Молочная лихорадка 55. — Мочевыхъ органовъ болѣзни 320; мочи недержаніе 318. — Нарывъ въ носу 179. — Отмороженіе 382. — Параличь 167; — языка 224. — Поносъ 279. — Рвота 252. — Ревматизмъ (поясницы) 85. — Спинальная боль 151. — Судороги 158, 161. — Сыпи, хроническія (нелихорадочныя): кровяныя пятна 370; кровяныя чирья 373; ссадина 370. — Ударъ 121. — Хирургическія болѣзни: вывихъ 388; кровоизліяніе подкожное 385; надрывъ 388; повихъ 389; раны 384, 385. — Шумъ въ ушахъ 143. — Языка опухоль 223.
- Arsenicum album.** Антоновъ огонь 100. — Брюшная чахотка 102. — Бѣли 338. — Водянка 92, 93. — Воспаленіе горла 238; горла пищепріемнаго 242; грудобрюшной преграды 352; желудка 261; живота нижней части (кишекъ и т. д.) 265; легкихъ 209; мозга 117; мозга спиннаго 149; печени 305; поясничной мышцы 352; селезенки 297; сердца и околосердечной сумки 111. — Гангренозная жаба 241. — Геморрой 63. — Глазныя болѣзни 139. — Головная боль 126, 127. — Головокруженіе 124. — Гриппъ 188. — Душевные недуги 136, 137, 138. — Дѣвичья немочь и малокровіе 76. — Желудка боль 256; катарръ 249; размягченіе 263. — Желчныхъ путей болѣзни 300; желтуха 299; желчныя камни 300.

— Женское безплодіе 350. — Живота боль (колики) 269. — Золотуха (накожн. бол.) 76. — Зубная боль у дѣтей 234. — Исхуданіе 99. — Кашель (катарральный) 183, (органической) 192. — Кишки прямой выпаденіе 297. — Коклюшъ 197. — Кровеносныхъ сосудовъ болѣзни 113. — Кровотеченія 67, 70. — Лихорадки: желчная 299; изнурительная 99; нервная 49; перемежающаяся 39, 45; родильная 54. — Личная боль 173. — Лядвей опухоль (бѣлая) 113. — Мочеваго пузыря катарръ 313. — Мочевыхъ органовъ болѣзни 319, 320, 321; задержаніе мочи 317, — недержаніе 318. — Мочезнуреніе сахарное 97. — Мускуловъ атрофія, прогрессирующая 353. — Нарывы 100. — Одышка 216. — Ожирѣніе 98. — Падучая болѣзнь 164. — Поносъ изнурительный 99; простой и кровавый 273, 275. — Рвота 253. — Ревматизмъ 85, 89. — Рта гнилость 220. — Сердца болѣзни 107, 109. — Сифилиса вторичныя формы 349. — Сонъ ненормальный 100, 134. — Спинальная боль 151. — Сыпи, острия (лихорадочныя): крапивная 365; просовидная 364; рожа 356; скарлатина 358, 359; — хроническія (нелихорадочныя) 368: гнойная корка 376; зудящая сыпь 372; кровавыя пузырьки 376; кровавыя пятна 370; лихорадочная сыпь 374; лишай 372; лишайные пузырьки 375; молочная корка 377; мѣдная сыпь 373; отрубевидный лишай 369; парша 379; пузырчатая сыпь 374; узловатая 371; чешуйчатая сыпь 371; чирья кровавыя 373. — Трихины 296. — Хирургическія болѣзни: антоновъ огонь 388; кровоизліаніе подкожное 385; нагноеніе 386; нарывы 387; раны 384, 385. — Холера 285. — Холерина 283. — Языка нарывъ 223, опухоль 223, параличъ 224.

Artemisia vulgaris. Падучая болѣзнь 160.

Arum triphyllum. Воспаленіе горла 239; рта 219. — Кашель 204. — Одышка 219. — Охрипость 206.

Asa foetida. Вѣтры 254. — Живота боли (колики) 271. — Ипохондрія и истерика 153. — Костоѣда 387. — Костные наросты на головѣ 381. — Нервовъ слабость 156. — Сердца болѣзни (нервн.) 107. — Сифилиса втор. формы 349. — Спинальная боль 152.

Asarum europaeum. Глистныя болѣзни 293. — Холера 285.

Asclepias syriaca. Головная боль 131. — Желудка слабость 250. — Кашель 203. — Легкихъ воспаление 209. — Менструальныя болѣзни 335. — Сыпи 360.

Asclepias tuberosa. Водянки 96.

Atropinum. Воспаленіе мозга 117; мозга спинно-головнаго 118. — Желудка боль (судороги) 256, 260. — Желчная колика 300. — Спинная боль 152.

Aurum. Бѣли 338. — Водянка 96. — Воспаленіе желѣзь околоушныхъ 147; мошонки 326; языка 223. — Глазныя болѣзни 140. — Головная боль 126. — Душевные недуги 137. — Желчныхъ путей болѣзни (желтуха) 304. — Запахъ изо рта 222. — Ипохондрія и истерика 153. — Истеченіе изъ уха 145. — Мошонки болѣзни 326. — Костные наросты на головѣ 381. — Нарывы въ носу 179. — Насморкъ 178. — Обонянія разстройство 147. — Одышка 219. — Полипы 381. — Сердца болѣзни 107, 109. — Сифилиса вторичн. формы 349. — Спинная боль 151. — Сыпи, хроническія (нелихорадочныя) 368; мѣдная 373; чешуйчатая 371. — Хирургическія болѣзни: нагноеніе 386; нарывы 387.

Baptisia tinctoria. Бѣли 340. — Глазныя болѣзни 141. — Головная боль 131. — Дифтеритъ 242. — Желчная лихорадка 304. — Кашель 203. — Менструальныя болѣзни 335. — Мозга спинно-головнаго воспаленіе 119. — Нарывы 387; — въ носу 180. — Одышка 219. — Охриплость 206. — Печени болѣзни 307. — Поносъ простой и кровавый 280. — Ревматизмъ 89. — Тифъ 53.

Baryta acetica. Желѣзь околоушн. воспал. 147. — Парша 378.

Baryta carbonica. Бѣли 338. — Воспаленіе горла 236, 238; желѣзь околоушныхъ 147. — Глазныя болѣзни 139. — Желудка боль (судороги) 256, 260. — Желѣзь страданія 77. — Золотуха 79. — Костей пораженіе (золотушн.) 79. — Личная боль 173. — Ломота 83. — Мошонки болѣзни 326. — Новообразованія: бородавки 382; опухоль мѣшеччатая и сальная 380. — Обонянія разстройство 147. — Охриплость 205. — Параличъ 167. — Слюнотеченіе 224. — Сыпи, острыя (лихорадочныя): скарлатина 358; — хроническія (нелихорадочныя) 78, 368; парша 378. — Ударъ 121. — Хирургическія болѣзни: затвердѣлости 388. — Чахотка брюшная 102, горловая 100.

Baryta muriatica. Желѣзь страданія 77. — Золотуха 77.

Belladonna, Atropa. Воспаленіе горла 236, 238; горла дыхательнаго, его развѣтвленій и гортани 198; пищепріемнаго 242;

желудка 261; желѣзь грудныхъ 212; желѣзь околоушныхъ 146; живота нижней части (кишекъ и т. д.) 266; легкихъ 208; матки 327; мозга 116, 117; мозга спиннаго 149; мочеваго канала, пузыря и почекъ 309; мошонки 325; печени 306; селезенки 298; сердца и околосердечной сумки 111; ушей 143; языка 223. — Геморрой 61, 63. — Глазные болѣзни 138, 139, 140. — Глистныя болѣзни 292. — Глухота 142. — Головная боль 125, 127. — Головокруженіе 123, 125. — Гриппъ 188. — Душевные недуги 137. — Желудка боль (судороги) 257. — Желчные камни 300. — Желѣзь страданія 77. — Живота боль (колики) 269, 271. — Золотуха 77. — Зубная боль 225, 226, 227. — Зубныя болѣзни у дѣтей 233. — Ипохондрія и истерика 153. — Кашель, катарральный 183, 187; судорожный 194. — Коклюшъ 196. — Крови волненіе 58, 334. — Кровотеченія 67, 70. — Личная боль 170. — Лихорадки: гастрическая 244; молочная 55; перемежающаяся 40; родильная 54. — Ломота 81. — Менструальныя болѣзни 331, 334. — Мочеваго пузыря судороги 316. — Мочевые камни 319. — Мочевыхъ органовъ болѣзни 320, 321; мочи задержаніе 316, испусканіе съ болью 314, недержаніе ночью 318. — Насморкъ 177. — Одышка 216. — Падучая болѣзнь 160, 161. — Параличъ 168. — Почекъ боль 315. — Ревматизмъ 85. — Сердца болѣзни 105, 107. — Сифилиса вторич. формы 350. — Слюнотеченіе 224. — Сонъ ненормальный 134, 135, 136. — Спиннаго мозга истощеніе 322. — Судороги 158, 160, 161. — Сыпи, острыя (лихорадочныя): корь 362; крапивная сыпь 365; краснуха 363; оспа 366; рожа 356; скарлатина 358, 360; — хроническія 368: чирья кровавыя 373. — Тифъ 48. — Ударъ 121. — Уши, истеченіе изъ нихъ 145; ломъ въ нихъ 144; шумъ 143. — Хирургическія болѣзни: нагноеніе 386; раны 384, 385.

Bismuthum (metallicum, nitricum). Желудка боль (судороги) 257. — Спинная боль 151.

Boletus laricis. Потъ, изнурительный 99.

Borax. Молочница 221. — Рта гнилость 220.

Bromum. Воспаленіе гортани 199; горла дыхательнаго 199; желудка 262; легкихъ 209; желѣзь околоушныхъ 146; мошонки 326; печени 306; селезенки 298. — Гриппъ 188. — Дифтеритъ 241. — Желѣзь болѣзни 78. — Золотуха 78, 79. — Кашель, катарральный 183, 187, 199; — органический 192. — Крупъ 202. —

Мошонки болѣзни 326. — Новообразованія: бѣлая опухоль кольна 380; зобъ 379. — Охриплость 205. — Слюнотеченіе 224. — Чохотка, брюшная 102; горловая 100.

Bryonia alba. Безсонница 134. — Водянка 92, 93. — Волненіе крови 58, 334. — Воспаленіе горла 238; гортани, дыхательнаго горла и бронхій 199; грудобрюшной преграды 351; желудка 262; желѣзь грудныхъ 212; живота нижней части (кишекъ и т. д.) 266; легкихъ 208; матки 328; мозга 116; спиннаго 149; мышцы поясничной 352; печени 306; плевры подреберной 211; селезенки 298; сердца и околосердечной сумки 111; ушей 143. — Вѣтры 254. — Глухота 142. — Головная боль 126, 127. — Гриппъ 188. — Желтуха 299. — Желудка катарръ 244, 246, 249; — судороги 257. — Желчныхъ путей болѣзни 300; желчное состояніе 299. — Живота боль (колики) 268, 269. — Запоръ 287, 289. — Зубная боль 225, 226, 227, 232. — Зубныя болѣзни у дѣтей 234. — Кашель катарральный 184, 187; органическій 192. — Кислотъ развитіе въ желудкѣ 250. — Колотье въ селезенкѣ 298. — Кровотеченія 66, 67. — Лихорадка гастрическая 245; желчная 299; молочная 55; перемежающаяся 40; родильная 54. — Личная боль 173. — Ломота 81. — Менструальныя болѣзни 331, 334. — Мочевыхъ органовъ болѣзни 319, 321. — Насморкъ 177. — Одышка 216. — Охриплость 204. — Полнокровіе 58. — Поносъ 279. — Ревматизмъ 85. — Сонъ ненормальный 135. — Спинальная боль 151. — Сыни, острия (лихорадочныя): корь 362; оспа настоящая 366; вариолоиды 367; рожа 356; скарлатина 359; — хроническія 368. — Тифъ 48, 49. — Трихины 296. — Хирургическія болѣзни: вывихъ 388; повихъ 389; раны 385.

Bufo. Падучая болѣзнь 160.

Cactus grandiflorus. Менструальныя болѣзни 335. — Мигрень 132. — Нервные боли 173. — Околосердечной сумки воспаленіе 109, 112. — Перемежающаяся лихорадка 45. — Ревматизмъ 89.

Caladium seguinum. Мужское безсиліе 325.

Calcareæ aceticæ. Желудка размягченіе 263. — Зубныя болѣзни у дѣтей 234. — Поносъ 273, 275.

Calcareæ carbonicæ. Бѣли 338. — Водянка 96. — Воспаленіе горла 238; желѣзь околушнныхъ 146; спиннаго мозга 150. —

Вѣтры 254. — Геморрой 63. — Глазныя болѣзни 138, 139. — Глистныя болѣзни 292. — Глухота 142. — Головная боль 126, 128. — Головокруженіе 123, 124. — Дѣвичья немочь и малокровіе 74. — Желудка катарръ 245, 249; судороги 256. — Желчныхъ путей болѣзни 303. — Женское безплодіе 350. — Золотуха 77, 78, 79. — Зубная боль 232. — Зубныя болѣзни у дѣтей 233. — Ипохондрія и истерика 153. — Истеченіе изъ уха 146. — Исхуданіе 99. — Кашель (органической) 190. — Кислоты 249. — Книжки прямой выпаденіе 297. — Костей пораженія 79, 381. — Кровотеченія 70. — Личная боль 173. — Ломота 81, 83. — Менструальныя болѣзни 330, 332. — Молочная лихорадка 56. — Мочевого пузыря катарръ 312. — Мочевыхъ органовъ болѣзни 321. — Мочевыя камни 319. — Нарывы въ носу 179. — Насморкъ 178. — Новообразованія: бородавки 382; зобъ 380; колѣна опухоль (бѣлая) 380; мѣшеччатая опухоль 380; полипы 381; родимыя пятна 382. — Обоимъ разстройство 147. — Ожирѣніе 98. — Охриплость 205. — Падучая болѣзнь 164. — Полипы въ носу 181. — Полнокровіе 58. — Поносъ 275. — Рвота (кислая) 253. — Сердца болѣзни 105, 109. — Сонъ ненормальный 135. — Спинальная боль 152. — Судороги 159, 164. — Сыпи, острыя (лихорадочныя): крапивная сыпь 365; скарлатина 359; — хроническія (нелихорадочныя) 78, 368; гнойная сыпь 377; лишай отрубевидный 369; молочная корка 377; узловатая сыпь 371; чешуйчатая сыпь 371. Хирургическія болѣзни: затвердѣлости 388; нагноеніе 386; нарывы 387. — Чохотка брюшная 102; — горловая 100; — легочная, слизистая 101. — Шумъ въ ушахъ 143. — Ячмень 141.

Calcarea jodata. Глазныя болѣзни 139. — Горла воспаленіе 238. — Истеченіе изъ уха 146.

Calcarea phosphorica. Костей пораженіе 79. — Спинальная боль 152.

Calendulaofficinalis. Раны 384.

Camphora. Воспаленіе желудка 262, легкихъ 209. — Мочи задержаніе 316. — Падучая болѣзнь 160. — Параличь 168. — Судороги 159, 160. — Сыпи, острыя (лихорадочныя): оспа 366; рожа 356; скарлатина 359. — Тифъ 52. — Холера 284.

Cannabis sativa. Бѣли 340. — Воспаленіе мочевого пузыря, канала, почекъ 309. — Глазныя болѣзни 140. — Гоноррея 343. —

Душевные недуги 137. — Женское безплодіе 350. Мочевого пузыря и канала катарръ 311. — Мочевого пузыря судороги 315. — Мочевыхъ органовъ болѣзни 320, 321; мочевые камни 319. — Мужское безплодіе 325. — Недостаточное отдѣленіе мочи 320. — Сифилиса вторичныя формы 350.

Cantharis. Бѣли 340. — Воспаленіе горла пищепріемнаго 242; живота нижней части 267; мозга 118; мочевого пузыря, канала, почекъ 310; языка 223. — Геморрой 63. — Гоноррея 344. — Душевные недуги 137. — Кровотеченія 66, 70. — Мочевыхъ органовъ болѣзни 320, 321. — Мочевого пузыря и канала катарръ 311. — Мочевого пузыря судороги 315. — Параличъ 168. — Почекъ боль 315.

Capsicum annuum. Головная боль 126. — Перемежающаяся лихорадка 40. — Спинальная боль 151.

Carbo animalis. Бубоны 347. — Бѣли 338. — Желѣзь болѣзни 77. — Желѣзь грудныхъ воспаленіе 213. — Золотуха 77. — Мѣдная сыпь 373. — Нарывы 387. — Спинальная боль 151.

Carbo vegetabilis. Бессонница дѣтей 136. — Бѣли 338. — Вѣтры 254. — Геморрой 61. — Горловая чахотка 100. — Гриппъ 188. — Желтуха 304. — Желудка катарръ 245, 249; — судороги 256, 257. — Запахъ изо рта 222. — Изжога 251. — Кашель (органический) 191, 192. — Коклюшъ 197. — Кровеносныхъ сосудовъ болѣзни 113. — Крови волненіе 58. — Легкихъ воспаленіе 209. — Лихорадки: изнурительная 99; перемежающаяся 41. — Новообразованія: родимыя пятна 382. — Охриплость 205. — Полнокровіе 58. — Ревматизмъ 89. — Рвота 253. — Сыпи, хроническія (нелихорадочныя): зудящая 372; узловатая 371. — Тифъ 50. — Хирургическія болѣзни: антоновъ огонь 388; кровоизліяніе подкожное 385; нарывы 387. — Холера 284.

Carduus marianus. Воспаленіе печени 306.

Caulophyllum thalictroides. Бѣли 340. — Головная боль 131. — Желудка судороги 260; — слабость 250. — Истерика 154. — Кровотеченіе изъ матки 72. — Менструальныя болѣзни 336. — Параличъ 168. — Ревматизмъ 89, 90. — Сонъ ненормальный 135. — Судороги 165.

Causticum. Глазныя болѣзни 139, 140. — Глухота 142. — Гриппъ 188. — Ломота 81. — Мочи недержаніе 318. — Мышцеловъ

атрофія, прогрессивная 353. — Обонянiя разстройство 147. — Охриплость 205. — Параличъ 168; — отъ удара 122; — языка 224. — Ревматизмъ 89. — Спинная боль 151. — Судороги 164. — Узловатыя сыпи 371.

Chamomilla vulgaris. Воспаленіе грудобрюшной преграды 351; — ушей 143, 144. — Вѣтры 255. — Геморрой 61. — Головная боль 126, 128. — Головокруженіе 124. — Желтуха 299. — Желудка катарръ 249; — судороги 256. — Желчная колика 300; — лихорадка 299. — Желчное состояніе 299. — Желчныхъ путей болѣзни 301. — Живота боль (колики) 269, 271. — Зубная боль 225, 226, 228, 232; — у дѣтей 233, 234. — Ипохондрія и истерика 153. — Кашель (судорожный) 193. — Кровотеченія 67, 70. — Менструальныя болѣзни 334. — Мочеваго пузыря судороги 316. — Мочи задержаніе 317. — Насморкъ 177. — Поносъ 273, 276. — Ревматизмъ 85, 86. — Рвота 252, 253. — Сопъ ненормальный 134, 135, 136. — Спинная боль 151. — Судороги 157, 158, 161, 295. — Ушная боль 144. — Холерина 282.

Chimaphila umbellata. Водянки 96. — Золотуха 80. — Моча кровавая 72. — Мочеваго пузыря воспаленіе 311; — катарръ 314. — Мочи затрудненное испусканіе 314.

China. Бѣли 338. — Водянка 93. — Воспаленіе легкихъ 209; матки 328; печени 306; поясничной мышцы 252; селезенки 298. — Вѣтры 254. — Глазныя болѣзни 139, 140. — Глистныя болѣзни 292. — Головная боль 126, 128. — Головокруженіе 123. — Дифтеритъ 241. — Дѣвичья немочь и малокровіе 75. — Желтуха 299. — Желудка катарръ 244, 245, 246, 249; — слабость 245; — судороги 256, 258. — Желчныхъ путей болѣзни 301. — Живота боли (колики) 271. — Запахъ изо рта 222. — Зубная боль 225, 226, 228, 232. — Ипохондрія и истерика 153. — Истощеніе спиннаго мозга 323. — Исхуданіе 99. — Кашель, органическій 191; — судорожный 194. — Крови волненіе 58. — Кровотеченія 68, 71, 333. — Лихорадки: изнурительная 99; перемежающаяся 41; тифъ 51. — Личная боль 170. — Ломота 81, 83. — Менструальныя болѣзни 330, 332, 333. — Нервовъ слабость 156. — Обморокъ 175. — Обонянiя разстройство 147. — Параличъ 167, 168. — Поносъ изнурительный 99; — простой и кровавый 273, 274, 276. — Пораженіе спиннаго мозга 103. — Потъ изнури-

тельный 99. — Рвота 253. — Ревматизмъ 86. — Селезенки воспаление 298. — Сердца болѣзни 105. — Сифилиса вторичн. формы 349. — Спинальная боль 151. — Сыщи, острия (лихорадочныя): оспа 366; — хроническія (нелихорадочныя) 368. — Сѣмени непроизвольное изліяніе 324. — Трихины 296. — Хирургическія болѣзни: антоновъ огонь 388; кровоизліяніе подкожное 385; нагноеніе 385; раны 384. — Чахотка брюшная 102; — легочная 101. — Шумъ въ ушахъ 143.

Cicuta virosa. Глазныя болѣзни 140. — Повихъ 389. — Спинальная боль 152. — Судороги 158, 164; — отъ глисть 295. — Холе́ра 285.

Cimicifuga racemosa. Вѣли 340. — Глазныя болѣзни 141. — Головная боль 132. — Душевные болѣзни 138. — Кашель 203. — Легочная чахотка 103. — Лихорадка изнурительная 103; — родильная 55. — Матки вынадеііе 328. — Менструальныя болѣзни 336. — Мигрень 132. — Мозга спинного раздраженіе 152. — Мозга спинно-головного воспаление 119. — Нервныя боли 173. — Ревматизмъ 90. — Сердца болѣзни 109. — Судороги 165. — Сыщи 366. — Сѣдалищная боль 90.

Cina. Бессонница дѣтей 136. — Глистные болѣзни 292. — Головокруженіе 125. — Коклюшь 197. — Мочи недержаніе въ постели 318. — Судороги 164.

Cinnabaris. Гоноррея 345. — Шанкеръ 346.

Cinnamomum. Кровотеченія 70.

Cistus canadensis. Поносъ простой и кровавый 280.

Clematis erecta. Воспаленіе желѣзь грудныхъ 213; — мошонки 325. — Сифилиса вторичн. формы 349. — Сыщи, хроническія 368: лишайные пузырьки 375; пузырьчатыя сыщи 374.

Coca. Одышка 219.

Cocculus Menispermum. Головокруженіе 124. — Желудка боль (судороги) 256, 258; — катарръ 249. — Желчная колика 300. — Женское безплодіе 350. — Икота 352. — Ипохондрія и истерика 153. — Падучая болѣзнь 161. — Параличь 167; — отъ удара 122. — Рвота 253. — Спинальная боль 151. — Судороги 160, 161. — Тифъ 52.

Coccus cacti. Водянка 96.

Coffea (и Coffein). Бессонница 134, 136. — Вѣтры 255. — Головная боль 126, 133. — Головокруженіе 124. — Душевные недуги 137. — Желудка катарръ 249. — Зубныя болѣзни (дѣтей) 233. — Нервовъ слабость 156. — Обморокъ 175. — Сыпи, острыя (лихорадочныя): корь 362; — оспа 366; — скарлатина 359.

Colchicum autumnale. Глазныя болѣзни (ломотныя) 139. — Грудобрюшной преграды воспаленіе 352. — Волянка 93. — Зубная боль 231. — Ломота 82. — Мочевыхъ органовъ болѣзни 321. — Поносъ кровавый 275, 280. — Ревматизмъ 85, 86. — Скарлатина 359. — Слюнотеченіе 224.

Collinsonia canadensis. Бѣли 340. — Геморрой 64. — Запоръ 290. — Затрудненное мочеиспусканіе 314. — Кровотеченіе 71. — Матки выпаденіе 328. — Менструальныя болѣзни 335, 336. — Мочевого пузыря катарръ 314. — Поносъ простой и кровавый 280. — Ревматизмъ 90. — Сыпи 372.

Colocynthis. Геморрой 63. — Головная боль 126, 128. — Желудка катарръ 249. — Желчныхъ путей болѣзни 301; желтуха 299; желчная колика 300. — Живота боль (колика) 268, 269. — Личная боль 171. — Мочевыхъ органовъ болѣзни 321. — Мышцы поясничной воспаленіе 352. — Поносъ простой и кровавый 273, 275, 276. — Почекъ колика 315. — Ревматизмъ 85. — Холерина 282.

Conium maculatum. Бессонница 134. — Бѣли 338. — Воспаленіе желѣзъ грудныхъ 213; — мшонки 325. — Глазныя болѣзни 138, 140. — Глухота 142. — Гришъ 188. — Желудка боль (судороги) 256; катарръ 249. — Желѣзъ болѣзни 78. — Золотуха 78, 79. — Кашель, органическій 192; — судорожный 193. — Личная боль 173. — Мочи испусканіе съ болью 314. — Мочевыхъ органовъ болѣзни 320, 221. — Мшонки болѣзни 325. — Мужское безсиліе 325. — Обновія разстройство 147. — Полипы 381. — Спинальная боль 151. — Сыпи, хроническія 368: гнойная корка 377; лишая 372; узловатыя сыпи 371. — Хирургическія болѣзни: затвердѣлости 388; повихъ 389; раны 385. — Шумъ въ ушахъ 143. — Языка опухоль 223; нарывъ на языкѣ 223.

Copaiva. Сыпь крапивная 365.

Cornus circinnata. Ипохондрія 154. — Молочница 222. — Перемежающаяся лихорадка 45. — Поносъ простой и кровавый 280. — Рта гнилость 222. — Холера 285.

Cornus florida. Перемежающаяся лихорадка 45.
 — **Crocus sativus.** Глазные болѣзни 140. — Кровотеченія 66, 68, 333.

Cuprum (acet., metaleicum etc.). Глистные болѣзни 293. — Душевные недуги 137. — Коклюшъ 197. — Личная боль 173. — Менструальныя болѣзни 331, 334. — Мускуловъ атрофія прогрессивная 353. — Одышка 216. — Сонъ ненормальный 135. — Спивно-головнаго мозга воспаленіе 118. — Судороги 150, 158, 159, 161, 331, 334. — Холера 284.

Cyclamen europaeum. Глазныя болѣзни 140. — Насморкъ 178.

Cypripedium pubescens. Истерика 154. — Нервная боль 173. — Сонъ ненормальный 135. — Судороги 165.

Digitalinum. Одышка при болѣзняхъ сердца 219.

Digitalis purpurea. Водянка 92, 93. — Воспаленіе мозга 117; сердца 112. — Глазныя болѣзни 140. — Желудка катарръ 249. — Желчныхъ путей болѣзни 299; желтуха 299. — Кровеносныхъ сосудовъ болѣзни 113. — Кровотеченія 370. — Мочевыхъ органовъ болѣзни 320, 321; мочи задержаніе 316. — Ревматизмъ 89. — Сердца болѣзни 107.

Dioscorea villosa. Геморрой 64. — Желудка судороги 260. — Живота боль 271. — Тифъ 53. — Холера 285.

Drosera rotundifolia. Гриппъ 188. — Кашель 193; органической 192. — Коклюшъ 197.

Dulcamara. Водянка 96. — Головная боль 126. — Истеченіе изъ уха 146. — Мочевого пузыря катарръ 312. — Мочевыхъ органовъ болѣзни 320, 321. — Поносъ простой и кровавый 273, 276. — Сыпи, хроническія 368: молочная корка 377; парша 378; узловатая 371. — Шумъ въ ушахъ 143.

Electricitas. Личная боль 173. — Параличъ 167; послѣ дифтерита 241.

Ergotinam. Кровотеченія 70.

Erigeron canadense. Воспаленіе мочевого пузыря, почекъ 311. — Геморрой 64. — Кровотеченія 71; — изъ матки 72; — носомъ 71. — Менструальныя болѣзни 335. — Моча кровавая 72. — Мочевизуреніе сахарное 98. — Мочееиспусканіе затрудненное 314. — Поносъ простой и кровавый 280. — Рвота кровавая 71.

Eupatorium aromaticum. Рта воспаление (молочница) 222.

Eupatorium perforatum. Гриппъ 204. — Кашель 204. — Легкихъ воспаление 209. — Мигрень 132. — Одышка 219. — Перемежающаяся лихорадка 45. — Ревматизмъ 89. — Рвота 250.

Eupatorium purpureum. Бронхитъ 204. — Водянка 96. — Каменная болѣзнь 321. — Кашель 204. — Ломота 83. — Моча кровавая 72. — Мочевого пузыря катарръ 314. — Мочерѣзь 314. — Мочи недержание 319. — Нарывы 387.

Euphorbia corollata. Глистныя болѣзни 295. — Головокруженіе 125. — Желудка воспаление 262; катарръ 250. — Кишекъ воспаление 267. — Поносъ простой и кровавый 280. — Рвота у беременныхъ 250. — Сыпь (рожа) 356. — Холера 285.

Euphorbium Cypris. Водянка 96. — Глазныя болѣзни 140. — Горла пищеприѣмнаго воспаление 242.

Euphrasia officinalis. Глазныя болѣзни 138, 140. — Головная боль 126. — Насморкъ 177. — Сыпи, острыя (лихорадочныя): корь 362; — хроническія (нелихорадочныя) 368.

Ferrum. Бѣли 338. — Водянка 92, 94. — Глистныя болѣзни 293. — Головная боль 126. — Дѣвичья немочь и малокровіе 75. — Желтуха 304. — Желудка боль (судороги) 256; катарръ 249; слабость 245. — Ипохондрія и истерика 153, 154. — Исхуданіе 99. — Кашель (органической) 191. — Крови волненіе 58. — Кровотеченія 66, 68, 71. — Лихорадка, перемежающаяся 42, 45. — Личная боль 173. — Ломота 81. — Менструальныя болѣзни 330, 332, 333. — Нервовъ слабость 157. — Обморокъ 175. — Ожирѣніе 98. — Параличъ 167, 168. — Поносъ 273, 276; изнурительный 99. — Ревматизмъ 85, 86. — Селезенки опухоль 298. — Сердца болѣзни 105, 108. — Хирургическія болѣзни: кровоизліяніе подкожное 385; нагноенія 386. — Чохотка, брюшная 102; легочная 101.

Filix mas. Глистныя болѣзни 294.

Fluoricum acidum. Водянка 96. — Личная боль 173.

Fucus vesiculosus. Ожирѣніе 98.

Galvanismus. Обонянія разстройство 147.

Gelsemium sempervirens. Бронхитъ 204. — Бѣли 340. — Воспаленіе горла пищепріемнаго 242; кишекъ 267; желѣзъ миндалевидныхъ 239; легкихъ 209; мозга 118; мозга спинно-головнаго 119. — Глазныя болѣзни 141. — Глистныя болѣзни 295. — Гриппъ 204. — Грыжи 389. — Дифтеритъ 241. — Желтуха 304. — Живота боль 260. — Запоръ 290. — Зубная боль 232. — Истерика 154. — Кашель 203, 204. — Кровотеченія 71. — Лихорадка желчная 304; родильная 55. — Менструальныя болѣзни 335, 336. — Мигрень 132, 133. — Мочи недержание 319. — Нервныя боли 173. — Обонянія разстройство 147. — Параличъ 168. — Поносъ простой и кровавый 280. — Ревматизмъ 89. — Сердца болѣзни 109. — Сонъ ненормальный 135. — Сыпи (рожа, скарлатина) 356, 360. — Судороги 165; гортанной щели 219; желудка 260; мочеваго пузыря 316. — Ударъ 122.

Glonoinum. Воспаленіе мозга 118; мозга спинно-головнаго 118. — Головная боль 126.

Gossipium herbaceum. Менструальныя болѣзни 335.

Graphites. Бѣли 339. — Водянка 96. — Геморрой 63. — Глазныя болѣзни 139, 140. — Глухота 142. — Желѣзъ грудныхъ воспаленіе 213. — Менструальныя болѣзни 331. — Мошонки болѣзни 326. — Нарывы 387; въ носу 179. — Новообразованія: мѣшеччатая опухоль 380; полипы 381; родимыя пятна 382. — Обонянія разстройство 147. — Сыпи, острия (лихорадочныя): рожа 356; рожа поясная 363; — хроническія (нелихорадочныя) 368; веснушки 369; гнойная корка 376; зудящая сыпь 372; лышай 372; молочная корка 377; парша 378; пузырьчатая сыпь 374; ссадина 370; узловатая сыпь 371. — Шумъ въ ушахъ 143.

Guajacum officinale. Ломота 83.

Gummi guttae. Поносъ 279.

Hamamelis virginica. Бѣли 340. — Вѣнь расширеніе 113. — Геморрой 63, 64. — Желѣзъ грудныхъ воспаленіе 213. — Запоръ 290. — Кровотеченія 70, 71; носомъ 71; — изъ матки 72. — Кровохарканіе 71. — Кровяныя пятна 370. — Менструальныя болѣзни 335, 336. — Моча кровавая 72. — Мошонки болѣзни 326. — Нарывы 387. — Поносъ простой и кровавый 280. — Ревматизмъ 89.

Helleborus niger. Водянка 92, 94. — Душевные недуги 137. — Мозга воспаление 117. — Мочевыхъ органовъ болѣзни 319; мочи задержаніе 316. — Рта гнилость 220. — Скарлатина 359.

Helonias dioica. Бѣли 340. — Водянки 96. — Желудка слабость 250. — Желѣзь грудныхъ воспаление 213. — Ипохондія 154. — Матки выпаденіе 328; кровотеченія 72; нарывы 387. — Менструальныя болѣзни 336. — Мочевызуреніе сахарное 98.

Hepar sulphuris. Бубоны 347. — Бѣли 340. — Воспаленіе горла 235, 236; гортани и дыхательнаго горла 199; желѣзь грудныхъ 212, околоушныхъ 146; мышцы поясничной 352; подреберной плевы 211. — Геморрой 63. — Глазныя болѣзни 138, 139, 140, 141. — Глухота 142. — Головная боль 126. — Головокруженіе 124. — Головы кровяная опухоль 133. — Гриппъ 188. — Желѣзь болѣзни 77. — Запахъ изо рта 222. — Золотуха 77. — Зубныя болѣзни (дѣтей) 234. — Истеченіе изъ уха 145. — Кашель катаральный 184, 187; органическій 192. — Коклюшь 197. — Крупъ 201. — Личная боль 173. — Ломота 83. — Мочевого пузыря катарръ 313. — Нарывы въ носу 179, полины 181. — Обонянія расстройство 147. — Охрилость 204, 205. — Ревматизмъ 88, 89. — Сифилиса вторичныя формы 349. — Сось ненормальный 135. — Сыпи, острия (лихорадочныя): скарлатина 358; — хроническія (нелихорадочныя) 78, 368: лишай кольцевидный 375; лишайные пузырьки 375; молочная корка 377; парша 378; пузырчатая сыпь 374; пузырчатая воспалительная сыпь 376; ссадина 370; узловатая сыпь 371; чирья кровяные 373. — Хирургическія болѣзни: нагноенія 385, 386; нарывы 387. — Шанкеръ 346. — Языка опухоль 223.

Hydrastis canadensis. Бронхитъ 204. — Бѣли 340. — Воспаленіе горла 239; мочевого пузыря 311. — Геморрой 64. — Глазныя болѣзни 141. — Дифтеритъ 242. — Желтуха 304. — Желудка катарръ 249; слабость 250. — Запоръ 290. — Нарывы 387; — въ носу 180. — Сыпи: оспа 366; рожа 356. — Цынга (воспаленіе рта) 222.

Hydrocyanicum acidum. Холера 284.

Hyoscyamus niger. Глазныя болѣзни 139, 140. — Гриппъ 188. — Душевные недуги 137. — Кашель (органическій) 192; судорожный 194. — Корь 362. — Мозга воспаление 117. — Моче-

выхъ органовъ болѣзни 320, 321; мочи задержаніе 316; — затрудненное испусканіе 314. — Обонянiя разстройство 147. — Надучая болѣзнь 160, 161. — Сонъ ненормальный 135, 136. — Судороги 158, 159, 160; — мочевого пузыря 316. — Тифъ 52.

Ignatia amara. Геморрой 63. — Глистные болѣзни 292, 293. — Головная боль 126, 128. — Горла воспаленіе 236. — Душевные недуги 136, 138. — Дѣвичья немочь и малокровіе 75. — Желудка боль (судороги) 256; слабость 245. — Женское безплодіе 350. — Зубная боль 226, 227, 231. — Зубныя болѣзни (дѣтей) 233. — Зудящая сыпь 372. — Икота 352. — Ипохондрія и истерика 153. — Кашель (судорожный) 195. — Кишки прямой выпаденіе 297. — Нервовъ слабость 156. — Обморокъ 175. — Одышка 218. — Надучая болѣзнь 160, 162. — Перемежающаяся лихорадка 42. — Рвота 252. — Сердца болѣзни 105, 106. — Сонъ ненормальный 134, 135. — Судороги 158, 162, 331; — послѣ болѣзней спинного мозга 150.

Iodum. (Kali. iod.) Бѣли 338. — Водянка 92, 94. — Воспаленіе горла 238; гортани и дыхательнаго горла 199; желудка 262; желѣзъ околоушныхъ 146; легкихъ 209; мозга 118; мошонки 326; околосердечной сумки 112; печени 306; подреберной плевы 211; языка 223. — Глазныя болѣзни 138, 139. — Глухота 142. — Головная боль 126. — Гриппъ 188. — Желчныхъ путей болѣзни 302; желтуха 299. — Желѣзъ болѣзни 77. — Золотуха 77, 78, 79. — Кашель, катарральный 184, 187, 358, 362; органическій 192. — Колѣна опухоль (бѣлая) 380. — Костей пораженіе 78, 381. — Крупъ 201, 202. — Ломота 81, 83. — Мошонки болѣзни 326. — Нарывъ въ носу 180. — Ожирѣніе 98. — Охриплость 204, 205. — Ревматизмъ 88, 89. — Рта гнилость 220; запахъ изо рта 222. — Селезенки опухоль 298. — Сердца болѣзни 108. — Сифилиса вторичныя формы 349. — Слюнотеченіе 224. — Сыпи, острыя (лихорадочныя): корь 362; скарлатина 358; — хроническія (нелихорадочныя) 78, 368; гнойная корка 376. — Хирургическія болѣзни: затвердѣлости 388; нагноенія 386; нарывы 387; раны 385. — Чохотка брюшная 102; горловая 100; легочная 101.

Иресасуанна. Головная боль 126, 129. — Гриппъ 188. — Желудка катарръ 244, 246, 249. — Желчныхъ путей болѣзни

303. — Зубныя болѣзни дѣтей 234. — Кашель, катарральный 184, 187; органическій 192; судорожный 194. — Кислоты 250. — Коклюшъ 196. — Кровотеченія 66, 68, 70. — Лихорадки: гастрическая 244, 245; перемежающаяся 42. — Менструальныя болѣзни 334. — Обморокъ 175. — Одышка 217. — Поносъ простой и кровавый 273, 274, 277. — Рвота 251, 252, 253. — Сонъ ненормальный 135. — Сыпи, острия (лихорадочныя): корь 362; просовидная сыпь 364. — Трихины 296. — Холерина 282.

Iris versicolor. Воспаленіе горла пѣщеприѣмнаго 242; кишекъ 267; рта 222. — Желудка воспаленіе 262; катарръ 250; слабость 250. — Золотуха 80. — Желѣзы поджелудочной страданія 224. — Живота боль 271. — Мигрень 132. — Охрилость 206. — Печени болѣзни 307. — Поносъ простой и кровавый 280. — Рвота 250. — Слабость нервовъ 173. — Слюнотеченіе 224. — Сыпи 366. — Тифъ 53. — Холера 285.

Jalappa. Безсонница (дѣтей) 136. — Вѣтры 255.

Jatropha curcas. Холера 285.

Kali bichromicum. Дифтеритъ 241. — Кашель органическій 192; судорожный 195. — Личная боль 173. — Нарывы въ носу 179; — полипы 181. — Рта гнилость 220.

Kali bromatum. Дифтеритъ 241. — Судороги 164.

Kali carbonicum. Водянка 92, 94. — Запахъ изо рта 222. — Кашель (органическій) 191. — Легочная чахотка 101. — Сердца болѣзни 108. — Сонъ ненормальный 135. — Сыпи, хроническія 368; кровавыя чирья 373.

Kali chloricum. Слюнотеченіе 224.

Kalmia latifolia. Сердца болѣзни 109.

Kamala. Солитеръ 294.

Koussou. Солитеръ 294.

Kreosotum. Брюшная чахотка 102. — Бѣли 338. — Геморрой 63. — Дифтеритъ 241. — Желудка боль (судороги) 256, 260; катарръ 249; размягченіе 263. — Кашель (органическій) 192. — Кровотеченія 66, 68, 70. — Легкихъ воспаленіе 209. — Менструальныя болѣзни 333. — Мочевыхъ органовъ болѣзни 321; недержаніе мочи въ постели 318. — Поносъ 279; — изнурительный 99. — Рвота 253. — Сыпи, острия (лихорадочныя): оспа 366; свар-

латина 359; — хроническія: кровавыя пятна 370. — Тифъ 51. — Хирургическія болѣзни: нагноенія 386; нарывы 387.

Lachesis. Водянка 96. — Воспаленіе горла 237; мозга 118; сердца и околосердечной сумки 112. — Душевные недуги 136. — Желудка размягченіе 264. — Кровеносныхъ сосудовъ болѣзни 113. — Личная боль 173. — Мускуловъ атрофія прогрессивная 353. — Сонъ ненормальный 135. — Судороги 164.

Lactuca virosa. Водянка 96. — Кашель (судорожный) 195.

Laurocerasus. Глазныя болѣзни 140. — Кашель (судорожный) 195.

Ledum palustre. Глазныя болѣзни (ломотныя) 139. — Ломота 81. — Ревматизмъ 85. — Спинальная боль 151, 152. — Сыпи, хроническія: молочная корка 377; чешуйчатая сыпь 371.

Leptandria virginica. Водянка 96. — Геморрой 64. — Желтуха 304. — Желудка слабость 250; судороги 260. — Живота боль 271. — Кишечкѣ воспаленіе 267. — Лихорадка желчная 304; перемежающаяся 45. — Печени болѣзни 307. — Поносъ простой и кровавый 280. — Сердца болѣзни 109. — Тифъ 53. — Холера 285.

Lobelia inflata. Желудка слабость 250. — Одышка 218.

Lycopodium. Бѣли 339. — Вѣнь расширеніе 113. — Водянка 92, 95. — Воспаленіе желѣзъ грудныхъ 213; печени 306; селезенки 298; ушей 144. — Геморрой 61, 63. — Глухота 142. — Гоноррея 344. — Желудка боль (судороги) 256, 258; катарръ 245, 249. — Желчныхъ путей болѣзни 303. — Живота боль (коликъ) 271. — Запоръ 289. — Золотуха 77. — Кашель органический 192. — Кровотеченія 70. — Мочевого пузыря и канала катарръ 312. — Мочевыхъ органовъ болѣзни 321. — Мужское безсиліе 325. — Нарывы 387. — Новообразованія: бородавки 382; полипы 381. — Обонянія расстройство 147. — Одышка 218. — Полнокровіе 58. — Почекъ боль 315. — Ревматизмъ 89. — Сердца болѣзни 107. — Сыпи, острия (лихорадочныя): скарлатинна 359; — хроническія (нелихорадочныя) 368: веснушки 369; зудящая сыпь 372; лишай отрубевидный 369, узловатый 372; парша 379; печеночныя пятна 369; ссадина 370; чесотка 376; чирья кровавыя 374. — Трихины 296. — Чохотка брюшная 102. — Шумъ въ ушахъ 143.

Lycopus virginicus. Болѣзни сердца вслѣдствіе пораженія легкихъ 109.

Magnesia carbonica. Бородавки 382. — Вѣтры 254. — Желчныхъ путей болѣзни 303. — Золотуха 77. — Зубная боль 226, 228. — Кислоты 251. — Рвота (кислая) 253. — Сыпи, хроническія 368.

Magnesia muriatica. Печени воспаленіе 306. — Спинальная боль 151.

Magnetismus. Зубная боль 232. — Параличъ 168.

Manganum. Запахъ изо рта 222. — Ломота 81. — Охриплость 205. — Сифилиса вторичныя формы 349. — Шумъ въ ушахъ 143.

Mercurius (praec., solubilis, sublimatus, vivus). Безсонница 100, 134; — дѣтей 136. — Бѣли 338, 339. — Водянка 92, 95. — Воспаленіе горла 235, 237, — пищепріемнаго 242: гортани, дыхательнаго горла и бронхій 198; грудобрюшной преграды 352; желѣзь грудныхъ 212, околоушныхъ 146; живота, нижней части, (кишечъ и т. д.) 266; легкихъ 209; матки 328; мозга 117; мозга спиннаго 149; мочеваго пузыря, канала и почекъ 310; мошонки 326; мышцы поясничной 352; печени 306; ушей 143; языка 223. — Геморрой 63. — Глазныя болѣзни 138, 139, 140, 141. — Глистныя болѣзни 292, 293. — Глухота 142. — Головная боль 126, 129. — Головы кровяная опухоль 133. — Гоноррея 344, 345. — Горловая чахотка 100. — Гриппъ 188. — Дифтеритъ 241. — Желчныхъ путей болѣзни 302; желтуха 299; желчная колика 300; желчное состояніе 299. — Желѣзь болѣзни 77. — Женское безплодіе 350. — Живота боль (колика) 268, 270. — Запахъ изо рта 222. — Запоръ 287, 289. — Золотуха 77, 79. — Зубная боль 225, 226, 227, 228, 232. — Зубныя болѣзни дѣтей 233, 234. — Истеченіе изъ уха 145. — Кашель, катарральный 185, 187; органическій 192. — Кишки прямой выпаденіе 296. — Костей пораженіе 79. — Лихорадки: гастрическая 244; желчная 299; молочная 55; родильная 54. — Личная боль 170, 171. — Ломота 81, 82. — Молочница 221. — Мочеваго пузыря и канала катарръ 311. — Мочевыхъ органовъ болѣзни 320, 321. — Нарывъ въ носу 179. — Насморкъ 177, 178. — Новообразованія: отмороженіе

382; полины 381. — Охрипость 204, 205. — Поносъ простой и кровавый 273, 274, 275, 277; изнурительный 99. — Потъ изнурительный 99. — Ревматизмъ 85, 87. — Рта гнилость 220. — Сифилиса вторичныя формы 349, 350. — Слюнотеченіе 224. — Спинная боль 152. — Сыпи, острия (лихорадочныя): корь 362; оспа 366; рожа 356, поясная 363; скарлатина 358; — хроническія (нелихорадочныя) 368: гнойная корка 376; зудящая сыпь 372; лихорадочная сыпь 374; лишай 372, кольцевидный 375; лишайные пузырьки 375; молочная корка 377; пузырчатая сыпь 374; садненіе 370; узловатая сыпь 371; чесотка 376; чешуйчатая сыпь 371; чирья кровавыя 373. — Тифъ 53. — Хирургическія болѣзни: нагноенія 385, 386; нарывы 387; раны 385. — Шанкеръ 346. — Шумъ въ ушахъ 143; ломъ (стрѣльба) 144. — Языка опухоль и нарывы на языкѣ 223. — Ячмени 141.

Mercurius bijodatus. Желѣзь болѣзни 77. — Золотуха 77. — Мошонки воспаленіе 326.

Mercurius jodatus. Водянка 92. — Шанкеръ 346.

Mercurius cyanatus (Cyanuret. Mercurii). Дифтеритъ 241, 358.

Mercurius dulcis (Calomel). Воспаленіе живота, нижней части (кишекъ и т. д.) 267; печени 306.

Mezereum, Daphne. Бѣли 340. — Головная боль 126. — Горла пищепріемнаго воспаленіе 242. — Зубная боль 226, 232. — Кашель (органический) 192. — Костные наросты на головѣ 381. — Кровотеченія 70. — Личная боль 170, 171. — Обонянія разстройство 147. — Охрипость 205. — Нагноенія 386. — Сифилиса вторичныя формы 348, 349. — Сыпи, хроническія 368: гнойная корка 377; пузырчатая сыпь 374, лишайные пузырьки 375; садненіе 370; узловатая сыпь 371. — Языка опухоль 223.

Millefolium, Achillea. Геморрой 63. — Кровотеченія 70.

Moschus. Кровотеченія 71. — Обморокъ 175. — Одышка 218. — Зубныя болѣзни (дѣтей) 233. — Судороги 158, 159, 162.

Muriaticum acidum. Дифтеритъ 241. — Молочница 221. — Нарывы на языкѣ 223. — Рта гнилость 220. — Сыпи, острия (лихорадочныя): оспа 366; просовидная сыпь 364; скарлатина 358, 359. — Тифъ 49, 50. — Трихины 296. — Хирургическія болѣзни: антоновъ огонь 388; нарывы 387.

Myrica cerifera. Желтуха 304. — Кровавый поносъ 280.

Naja tripudians. Сердца болѣзни 109.

Natrum carbonicum. Кашель (органическій) 192.

Natrum muriaticum. Бѣли 339. — Вѣтры 254. — Глазныя болѣзни 140. — Головная боль 126. — Головокруженіе 124. — Гоноррея 345. — Дѣвичья немочь и малокровіе 75. — Желудка боль (судороги) 256, 260; катарръ 245, 247, 249. — Женское безплодіе 350. — Запоръ 289. — Золотуха 77. — Кислотъ разв. въ жел. 250. — Мочевыхъ органовъ болѣзни 319, 321; мочевые камни 321. — Охриплость 206. — Перемежающаяся лихорадка 43. — Сердца болѣзни 105. — Слюнотеченіе 224. — Сонъ ненормальный 135. — Спинальная боль 151. — Сыпи хроническія 368; кровяные чирья 374. — Угри 373. — Шумъ въ ухахъ 143.

Nitri acidum. Антоновъ огонь 100. — Безсонница 134. — Бѣли 339. — Воспаленіе горла 238; нижней части живота 267. — Геморрой 62. — Глазныя болѣзни 139. — Глухота 142. — Головная боль 126. — Головокруженіе 124. — Дифтеритъ 241. — Желудка боль (судороги) 256, 260. — Желчныхъ путей болѣзни 304. — Запахъ изо рта 222. — Зубная боль 231. — Изнурительная лихорадка 99. — Кашель (органическій) 192. — Крови приливы 58. — Кровотеченія 70. — Мозга спиннаго пораженіе 103. — Мочевыхъ органовъ болѣзни 321. — Мошонки болѣзни 326. — Нарывы 100, 387; — на языкѣ 223. — Нервовъ слабость 157. — Новообразованія: мозоли 382; отмороженіе 382. — Поносъ простой и кровавый 273, 277. — Потъ изнурительный 99. — Рта гнилость 220. — Сердца болѣзни 105, 106, 107. — Сифилиса вторичныя формы 349. — Слюнотеченіе 224. — Спинальная боль 151, 152. — Сыпи, хроническія 368; веснушки 369; гнойная корка 376; зудящая сыпь 372; лишай 372, кольцевидный 375; печеночныя пятна 369; угри 373; узловатыя сыпи 371; чешуйчатая 371; чирья кровяные 374. — Тифъ 52. — Фягообразныя шишки 348. — Шанкеръ 346. — Шумъ въ ухахъ 143.

Nitri dulcis spiritus. Гнилость рта 220.

Nitrum. Воспаленіе желудка 262; нижней части живота 267; сердца и околосердечной сумки 112. — Спинальная боль 151.

Nuphar lutea. Головная боль 132. — Кишечъ воспаленіе 267. — Поносъ 280. — Сыпи 371.

Nux moschata. Душевные недуги 137. — Желудка слабость 249.

Nux vomica. Воспаление горла 237; грудобрюшной преграды 352; желудка 262; живота, нижней части (кишекъ и т. д.) 267; мозга спинного 149; печени 306; селезенки 298, ушей 144. — Вѣтры 254, 255. — Геморрой 60, 62. — Глазныя болѣзни 139, 140. — Головная боль 125, 126, 129. — Головокружение 123, 125. — Гриппъ 188. — Грыжи 389. — Душевные недуги 137, 138. — Желудка боль (судороги) 256, 259; — катарръ 244, 245, 247, 249. — Желчныхъ путей болѣзни 302; желтуха 299; желчное состояние 299. — Женское безплодіе 350. — Живота боль (колика) 268, 270. — Запахъ изо рта 222. — Запоръ 287, 289. — Зубная боль 225, 226, 227, 229, 232. — Ипохондрія и истерика 153. — Кашель, катарральный 185; судорожный 194. — Кишки прямой выпаденіе 296, 297. — Кровотеченія 66, 69. — Лихорадки: гастрическая 245; перемежающаяся 43. — Личная боль 170, 171. — Ломъ (стрѣльба) въ ушахъ 144. — Менструальныя болѣзни 331, 332. — Мозга спинного истощеніе вслѣдствіе полов. излиш. 323; пораженіе 103. — Мочевого пузыря катарръ 312; судороги 316. — Мочевыхъ органовъ болѣзни 320, 321. — Мочи задержаніе 316; недержаніе 318, — у дѣтей (въ постели) 318. — Мошонки болѣзни 326. — Мужское безсіе 325. — Насморкъ 177, 178. — Нервовъ слабость 157. — Обонянія разстройство 147. — Одышка 217. — Охрипость 204. — Падучая болѣзнь 160, 162. — Параличъ 167, 168; послѣ дифтерита 241. — Полнокровіе 58. — Поносъ простой и кровавый 273, 275, 277. — Рвота 251, 252, 253. — Ревматизмъ (сѣдалищная боль, боль въ ляшкахъ) 85, 87. — Сердца болѣзни 105, 106. — Сонъ ненормальный 134, 135. — Спинная боль 151, 152. — Судороги 158, 159, 160, 162. — Сыпи, острыя (лихорадочныя): крапивная 365; — хроническія: зудящая 372. — Сѣмени непроизвольное изліяніе 324. — Трихины 296. — Ударъ 121.

Oleander. Душевные недуги 137. — Параличъ 168. — Сыпи, хроническія 368: лихорадочная сыпь 374; парша 378; пузырьчатыя сыпи 374; узловатыя 371.

Opium. Головокружение 124. — Гриппъ 188. — Грыжи 389. — Душевные недуги 137, 138. — Желудка катарръ (у пьаницъ) 249. —

Живота боль (колика) 271. — Запоръ 288, 289. — Зубная боль 231. — Зубныя болѣзни дѣтей 233. — Кашель (судорожный) 195. — Личная боль 173. — Мозга воспаленіе 117. — Мочевого пузыря судороги 316. — Мочевыхъ органовъ болѣзни 320; мочи задержаніе 316. — Обморокъ 175. — Параличъ 167. — Почекъ боль 315. — Рвота 252. — Сонъ ненормальный 134, 135. — Судороги 158, 159, 162. — Сыпи, острия (лихорадочныя): корь 362; скарлатина 358. — Ударъ 121.

Paris quadrifolia. Мигрень 133.

Petroleum. Геморрой 63. — Глухота 142. — Горла пище-
приемнаго воспаленіе 242. — Запахъ изо рта 222. — Кашель (ор-
ганическій) 192. — Мочевого канала суженіе 320. — Мочевыхъ
органовъ болѣзни 321; мочевые камни 319; мочи недержаніе 318.
— Мошонки болѣзни 326. — Новообразованія: ознобленіе 382;
мозоли 382. — Поносъ 273, 279; изнурительный 100. — Сыпи,
хроническія: зудящая 372; лишай кольцевидный 375; чешуйча-
тая сыпи 371. — Шумъ въ ушахъ 143.

Petroselinum. Гоноррея 343. — Катарръ мочевого кана-
ла 313.

Phosphoricum acidum. Брюшная чахотка 102. — Глухота
142. — Душевные вѣдуги 137, 138. — Дѣвчья немочь и мало-
кровіе 75. — Желудка катарръ 244, 247, 249; размягченіе 263;
слабость 245. — Зубныя болѣзни дѣтей 234. — Ипохондрія и
истерика 153, 154. — Кашель (органическій) 191. — Костей по-
раженіе 79, 387. — Лихорадка: гастрическая 244; изнурительная
99; родильная 54. — Ломота 83. — Мозга спиннаго пораженіе
103. — Мочевого пузыря катарръ 313. — Нервовъ слабость 157.
— Обонянія разстройство 147. — Поносъ 273, 278; изнуритель-
ный 100. — Потъ изнурительный 99. — Сердца болѣзни 106. —
Сифилиса вторичныя формы 349. — Сыпи, острия (лихорадоч-
ныя): скарлатина 359; — хроническія 368: молочная корка 377;
мѣдная сыпь 373; узловатая сыпи 371; чешуйчатая 371. — Съ-
мени произвольное изліянiе 324. — Тифъ 49, 50. — Трихины
296.

Phosphorus. Бѣли 340. — Водянка 92. — Воспаленіе горла
237; гортани, дыхательнаго горла и бронхій 199; желудка 262;

желѣзь грудныхъ 212; живота, нижней части (кишекъ и т. д.) 266; легкихъ 208, 209; мозга 117, 118; печени 306; плевы под-реберной 211; сердца и околосердечной сумки 112. — Вѣтры 254. — Геморрой 63. — Глазныя болѣзни 139, 140. — Головная боль 126, 129. — Головокруженіе 123, 124. — Гриппъ 188. — Душевные недуги 137. — Дѣвичья немочь и малокровіе 75. — Желудка боль (судороги) 256, 259. — Женское безплодіе 350. — Запоръ 289. — Зубная боль 231. — Изжога 251. — Ипохондрія и истерика 153. — Кашель, судорожный 194; органической 192. — Костные наросты на головѣ 381. — Кровотеченія 70, 71. — Крупъ 201. — Легочная чахотка 101. — Личная боль 170, 171. — Мозга спиннаго пораженіе 103. — Мочеизнуреніе сахарное 97. — Мочевого пузыря судороги 316. — Мочевыхъ органовъ болѣзни 320, 321; мочи недержаніе 318; — въ постели 318. — Нагноенія 386. — Нарывы въ носу 180, полипы 181. — Нервовъ слабость 157. — Обморокъ 175. — Обонянія разстройства 147. — Одышка 217. — Отмороженіе 382. — Охрипость 204, 205. — Падающая болѣзнь 164. — Параличъ 167, 168; послѣ дифтерита 241. — Поносъ простой и кровавый 273, 274, 275, 277; изнурительный 100. — Ревматизмъ 89. — Родильная лихорадка 54. — Сердца болѣзни 105, 106, 107. — Сонъ ненормальный 135. — Спинная боль 151, 152. — Судороги 158, 164. — Сыни, острыя (лихорадочныя): корь 362; скарлатина 359; — хроническія (нелихорадочныя) 368; веснушки 369; гнойная корка 377; зудящая сыпь 372; кровавыя пятна 370; лишайные пузырьки 375; пузырьчатая сыпь 374; лишай отрубевидный 369; чешуйчатая сыпь 371. — Тифъ 49, 52. — Ударъ 122. — Холера 285. — Холерина 282. — Шумъ въ ухахъ 143.

Phytolacca decandra. Бѣли 340. — Воспаленіе горла 239; желѣзь грудныхъ 213, мидальевидныхъ 239, околожушныхъ 147; кишекъ 267. — Геморрой 64. — Глазныя болѣзни 141. — Головная боль 132. — Дифтеритъ 242. — Желудка слабость 250. — Живота боль 272. — Запоръ 290. — Зубная боль 232. — Кровотеченіе изъ матки 72. — Менструальныя болѣзни 335. — Мозга спиннаго раздраженіе 152. — Мошонки болѣзни 326. — Нарывы 387; — въ носу 180. — Нервовъ страданія 173. — Печени страданія 307. — Поносъ простой и кровавый 280. — Ревматизмъ 90.

— Судороги 165. — Сыни: парша 379; чесотка 376; чешуйчатая сыни 371. — Сѣдалищная боль 90.

Plantago major. Недержаніе мочи въ постели 318.

Platina. Беременныхъ прихоти 253. — Головная боль 126, 130. — Глухота 142. — Душевные недуги 137, 138. — Дѣвчья немочь и малокровіе 75. — Женское безплодіе 350. — Запоръ 288, 289. — Зубная боль 231. — Ипохондрія и истерика 153. — Кровотеченія 69, 71. — Личная боль 170, 172. — Менструальныя болѣзни 331, 332, 333, 334. — Сердца болѣзни 105, 106. — Спинная боль 151. — Судороги 158, 162, 331. — Сыни, острые (лихорадочныя): просовидная сынь 364; — хроническія (нелихорадочныя): зудящая сынь 372. — Тифъ 53. — Шумъ въ ушахъ 143.

Plumbum (metallicum, aceticum). Воспаленіе желудка 262; мозга спиннаго 150; живота нижней части (кишекъ и т. д.) 164; селезенки 298. — Глазныя болѣзни 140. — Желудка боль (судороги) 256. — Живота боль (колика) 271. — Запоръ 288. — Кровотеченія 70. — Мускуловъ атрофія прогрессивная 353. — Обонянія разстройство 147. — Падающая болѣзнь 164. — Параличъ 168; — отъ удара 122. — Поносъ кровавый 275. — Рвота 253. — Сердца болѣзни 109. — Хирургическія болѣзни: нагноенія 385; раны 385.

Podophyllum peltatum. Бѣли 340. — Выпаденіе кишки прямой 297; матки 328. — Геморрой 64. — Глазныя болѣзни 141. — Желтуха 304. — Желудка воспаленіе 262; катарръ 250; слабость 250. — Желчные камни 304. — Желѣзь миндалевидныхъ воспаленіе 239. — Желѣзы поджелудочной страданія 224. — Живота боль 272. — Запоръ 290. — Ипохондрія 154. — Кашель 203. — Лихорадка: желчная 304; перемежающаяся 45; родильная 53. — Мочи недержаніе 319. — Печени страданія 64. — Поносъ простой и кровавый 280. — Рта воспаленіе 222. — Селезенки болѣзни 298. — Слюнотеченіе 224. — Сухотка дѣтей 104. — Тифъ 53. — Холе-ра 285.

Polygonum hydropiper. Геморрой 64.

Polygonum punctatum. Менструальныя болѣзни 335.

Prunus spinosa. Водянка 96.

Pulsatilla nigricans. Бѣли 339. — Воспаленіе горла 238; ушей 143. — Вѣтры 254. — Геморрой 62, 63. — Глазныя болѣзни

139, 140. — Глухота 142. — Головная боль 126, 130. — Головокружение 123, 124. — Гоноррея 344. — Гриппъ 188. — Душевные недуги 137, 138. — Дѣвичья немочь и малокровіе 75. — Желудка боль (судороги) 256, 259; катарръ 244, 245, 248, 249; слабость 245. — Желчное состояніе 299. — Желчныхъ путей болѣзни 303. — Живота боль (колика) 268, 270. — Запахъ изо рта 222. — Запоръ 288. — Золотуха 77. — Зубная боль 225, 226, 227, 229, 232. — Зубныя болѣзни (дѣтей) 234. — Ипохондрія и истерика 153. — Истеченіе изъ уха 145; ломъ въ ушахъ (стрѣльба) 144; шумъ 143. — Кашель, катарральный 185, 187; органической 192. — Кислотъ развитіе въ желудкѣ 250. — Коклюшъ 197. — Кровотеченія 69. — Лихорадки: гастрическая 245; желчная 299; молочная 56; перемежающаяся 44. — Личная боль 170, 172. — Менструальныя болѣзни 330, 332, 333, 334. — Мочеваго пузыря и канала катарръ 313. — Мочеваго пузыря судороги 315. — Мочевыхъ органовъ болѣзни 320, 321; мочи задержаніе 317. — Насморкъ 178. — Недержаніе мочи въ постели 318. — Обморокъ 175. — Обоняннй разстройство 147. — Одышка 217. — Отмороженіе 382. — Охриплость 204. — Параличъ 168. — Повихъ 389. — Полнокровіе 58. — Поносъ простой и кровавый 273, 278. — Почекъ боль 315. — Ревматизмъ 85, 87. — Сердца болѣзни 105, 106. — Сонъ ненормальный 135, 136. — Сыни, острия (лихорадочныя): корь 362; крапивная сынь 364; скарлатина 358. — Трихины 296.

Punica granatum. Солитеръ 294.

Ranunculus bulbosus. Глазныя болѣзни 140. — Сыни, хроническія: лихорадочная 374; лишайныя пузырьки 375.

Rheum. Вѣтры у дѣтей 255. — Зубныя болѣзни (дѣтей) 234. — Поносъ 273, 279.

Rhododendron chrysanthemum. Глухота 142. — Зубная боль 231. — Личная боль 170. — Ревматизмъ 87.

Rhus toxicodendron. Водянка 96. — Воспаленіе горла пищепріемнаго 242; желъзь околушныхъ 146; легкихъ 209; матки 328; мозга 118; мозга спиннаго 149; мышцы поясничной 352; ушей 144. — Глазныя болѣзни 138, 139, 140. — Головная боль 126, 130. — Головокруженіе 123, 124. — Гриппъ 188. — Душевные недуги 137. — Запоръ 289. — Золотуха (накожн. бол.) 78.

— Зубная боль 225, 226, 227, 230. — Лихорадки: гастрическая 244; перемежающаяся 44; родильная 54. — Личная боль 170, 173. — Ломота 81, 82. — Мозга спинного поражение 103. — Мочевого пузыря судороги 316. — Мочевых органов болѣзни 320, 321; мочи недержание 318. — Нарывъ въ носу 180. — Нервовъ слабость 157. — Обонянiя разстройство 147. — Параличь 167, 168; отъ удара 122. — Поносъ простой и кровавый 273, 275, 278; изнурительный 100. — Ревматизмъ 85, 88. — Сонъ ненормальный 135. — Спинная боль 151, 152. — Сыпи, острия (лихорадочныя): крапивная сыпь 365; осна 366; просовидная сыпь 364; рожа 356, поясная 363; скарлатина 359; — хроническія (нелихорадочныя) 368: гнойная корка 377; лихорадочная сыпь 374; молочная корка 377; парша 378, 379; пузырчатая сыпь 374, лишайные пузырьки 375; пузырчатая воспалительная сыпь 376. — Тифъ 51. — Трихины 296. — Хирургическія болѣзни: антоновъ огонь 388; вывихъ 388; нагноенiя 386; надрывы отъ подъема тяжести 388; нарывы 387.

Rumex crispus. Бронхитъ 204. — Желудка воспаление 262; катарръ 250; слабость 250. — Зубная боль 232. — Кашель 203, 204. — Околосердечной сумки воспаление 112. — Охриплость 206. Поносъ 280. — Сердца болѣзни 109.

Ruta graveolens. Глазныя болѣзни 140. — Кишки прямой выпаденiе 297. — Ревматизмъ 89. — Спинная боль 151. — Хирургическія болѣзни: вывихъ 388; повихъ 389; раны 384, 385.

Sabadilla. Глистныя болѣзни 292, 293.

Sabina, Juniperus. Бѣли 339. — Зубная боль 231. — Колѣна опухоль (бѣлая) 380. — Кровотеченiя 66, 69, 333. — Ломота 81, 82. — Менструальныя болѣзни 331, 333. — Спинная боль 152. — Фигообразныя шишки 348.

Sambucus. Водянка 96. — Зубныя болѣзни (дѣтей) 234. — Кашель (судорожный) 195. — Коклюшъ 197. — Одышка 218. —

Sanguinaria canadensis. Бородавки 382. — Бронхитъ 204. — Бѣли 340. — Водянка 96. — Воспаленiе горла 239; желѣзь миндалевидныхъ 239; легкихъ 209; мозга 118. — Желудка воспаление 262; катарръ 250; слабость 250. — Изнурительная лихорадка 103. — Кашель 204. — Кровохарканiе 71. — Менструаль-

ныя болѣзни 335, 336. — Мигрень 132. — Нарывы 387; — въ носу 180. — Полипы 381. — Поносъ 280. — Ревматизмъ 90. — Рвота 250. — Сердца болѣзни 110. — Ударъ 122.

Sarracenia purpurea. Оспа 366.

Sassaparilla. Мочевые камни 316, 319. — Нарывы 387. — Сифилиса вторичныя формы 349. — Сыпи, хроническія 368: молочная корка 377; садненіе 370; узловатыя сыпи 371.

Secale cornutum. Антоновъ огонь 100, 388. — Глазныя болѣзни 140. — Запоръ 289. — Кровотеченія 66, 69, 333. — Мозга спиннаго пораженіе 103. — Мужское безсиліе 325. — Нарывы 100. — Параличъ 167, 168. — Поносъ 273, 279; — изнурительный 100. — Родильная лихорадка 54. — Судороги 159, 164; при воспаленіи спиннаго мозга 150. — Сыпи, хроническія: кровавые пузырьки 376; кровавыя пятна 370. — Сѣмени непроизвольное изліяніе 324. — Холера 285.

Selenium. Душевные недуги 137. — Охрипость 206. — Мужское безсиліе 325. — Сѣмени непроизвольное изліяніе 324.

Senecio aureus. Кровотеченія 71.

Senecio gracilis. Бѣли 340. — Водянки 96. — Ипохондрія и истерика 154. — Кашель 203, 204. — Кровотеченія изъ матки 72. — Кровохарканіе 71. — Менструальныя болѣзни 335, 336. — Моча кровавая 72. — Мочезнуреніе сахарное 98. — Мочеспусканіе затрудненное 314. — Сонъ ненормальный 135.

Senega, Polygala. Гриппъ 188. — Кашель катарральный, 186, 187; органической 192. — Мочеваго пузыря катарръ 313. — Мочевыхъ органовъ болѣзни 320, 321.

Senna. Безсонница (дѣтей) 136.

Sepia. Бѣли 339. — Геморрой 62. — Глазныя болѣзни 140. — Головная боль 126, 130. — Головокруженіе 124. — Гриппъ 188. — Дѣвичья немочь и малокровіе 76. — Желудка боль (судороги) 256; катарръ 244, 245, 248, 249. — Желчныхъ путей болѣзни 303. — Женское безплодіе 350. — Запахъ изо рта 222. — Зубная боль 232. — Ипохондрія и истерика 153. — Кашель, катарральный 186, 187; органической 192. — Кислотъ развитіе въ желудкѣ 250. — Кровотеченія 71. — Личная боль 173. — Менструальныя болѣзни 331, 332, 333, 334. — Мочеваго пузыря катарръ 313. — Обонянія разстройство 147. — Охрипость 205. — Печени

воспаленіе 306. — Полнокровіе 58. — Сонъ ненормальный 135. — Спинальная боль 151. — Сыпи, хроническія 368: гнойная корка 377; лихорадочная сыпь 374; лишай кольцевидный 375; печеночныя пятна 369; пузырчатая сыпь 374; угри 373; узловатая сыпь 371.

Silicea. Бѣли 340. — Глазныя болѣзни 140. — Головная боль 126, 130. — Головокруженіе 124. — Головы опухоль кровяная 133. — Веиъ расширеніе 113. — Водянка 96. — Воспаленіе желѣзъ грудныхъ 212; желѣзъ околушныхъ 146; ушей 144. — Душевные недуги 137. — Желѣзъ болѣзни 77. — Золотуха 77, 79. — Зубная боль 231, 232. — Истеченіе изъ уха 146. — Кашель (органическій) 192. — Костныя болѣзни (золотушныя) 79. — Личная боль 173. — Ломота 83. — Мозга спиннаго пораженіе 103. — Мочевыхъ органовъ болѣзни 321; мочевые камни 319. — Нарывы на языкѣ 223. — Насморкъ 178. — Новообразованія: бородавки 382; колѣна опухоль, бѣлая 380; мозоли 382; мѣшеччатая опухоль 380; наросты на сухожильяхъ 381. — Обонянія расстройство 147. — Падучая болѣзнь 164. — Полипъ въ носу 181. — Ревматизмъ 89. — Сифилиса вторичныя формы 349. — Сонъ ненормальный 135. — Спинальная боль 151, 152. — Сыпи, острыя (лихорадочныя): скарлатина 358; — хроническія (нелихорадочныя): садненіе 370; чирья кровяные 374. — Хирургическія болѣзни: затвердѣлости 388; нагноенія 386; надрывъ отъ подъема тяжестей 389; нарывы 387; раны 385; фистулы 388. — Чахотки: брюшная 102; легочная 101. — Шумъ въ ушахъ 143.

Silphium laciniatum. Кашель 203. — Одышка 219.

Solanum nigrum. Водянка 96.

Solanum tuberosum. Выпаденіе прямой кишки 297.

Spigelia anthelmintica. Бессонница 134. — Водянка 92, 95. — Глазныя болѣзни 140. — Глистныя болѣзни 292, 293. — Головная боль 126. — Головокруженіе 125. — Зубная боль 226, 227, 230. — Кровеносныхъ сосудовъ болѣзни 113. — Кровотеченія 70. — Личная боль 170, 172. — Мочи недержаніе (въ постели) 318. — Параличъ 168. — Рвота 253. — Ревматизмъ 89. — Сердца болѣзни 105, 109. — Сердца и околосердечной сумки воспаленіе 111. — Спинальная боль 151, 152. — Шумъ въ ушахъ 143.

Spongia tosta. Гортани и дыхательнаго горла воспаленіе 199. — Гриппъ 188. — Зобъ 380. — Зубныя болѣзни (дѣтей)

234. — Кашель, катаральный 186, 187, 362; — органический 192. — Крупъ 201. — Охрилость 204.

Squilla maritima. Водянка 92, 95. — Плевры подреберной воспаление 211.

Stannum. Бѣли 339. — Глистныя болѣзни 292, 293. — Кашель органический 191. — Легочная чахотка 101. — Личная боль 170, 172. — Падучая болѣзнь 164.

Staphysagria, Delphinium. Глазныя болѣзни 138, 140. — Душевные недуги 138. — Желудка слабость 249. — Зубная боль 226, 227, 230. — Кашель (органический) 192. — Личная боль 172. — Полипы 381. — Рта гнилость 220. — Сифилиса вторичныя формы 348. — Спинальная боль 152. — Сыпи, хроническія 368: гнойная корка 377; лишай узловатый 372; молочная корка 377; парша 379; угри 373; чирья кровяные 374.

Sticta pulmonaria. Гриппъ 204. — Кашель 203, 204; — чахоточныхъ 103. — Коклюшъ 204. — Крупъ 204. — Ревматизмъ 90. — Сонъ ненормальный 135.

Stramonium, Datura. Глазныя болѣзни 140. — Душевные недуги 137. — Личная боль 173. — Мозга воспаление 117. — Мозга спиннаго истощеніе 323. — Одышка 218. — Падучая болѣзнь 159, 160. — Сонъ ненормальный 135. — Судороги 158, 159, 163. — Тифъ 52. — Языка параличъ 224.

Strontiana. Лишай узловатый 372. — Спинальная боль 151.

Strychninum nitricum. Мозга спиннаго воспаление 150. — Падучая болѣзнь 160. — Спинальная боль 152. — Судороги 118, 159, 164.

Sulphur. Бѣли 340. — Вѣнь расширеніе 113. — Водянка 92, 95. — Воспаленіе горла 235, 237; желудка 262; желѣзъ грудныхъ 213; живота, нижней части (кишекъ и т. д.) 267; легкихъ 208; мозга 117, 118; мочевого пузыря, канала и почекъ 310; мышцы поясничной 352; печени 306; плевры подреберной 211; селезенки 298; сердца и околосердечной сумки 112; ушей 144; языка 223. — Вѣтры 254, 255. — Геморрой 60, 62, 63. — Глазныя болѣзни 138, 139, 140. — Глистныя болѣзни 292. — Глухота 142. — Головная боль 126, 131. — Головокруженіе 123, 124. — Гоноррея 344. — Гриппъ 188. — Душевные недуги 137. — Дѣвичья немочь и малокровіе 76. — Желудка боль (судороги) 256, 259; катарръ 244, 245, 248, 249; слабость 245. — Желч-

ныхъ путей болѣзни 303; желтуха 299; желчная колика 300; желчное состояніе 299. — Женское безплодіе 350. — Живота боль (колика) 268, 271. — Запахъ изо рта 222. — Запоръ 289. — Золотуха 77, 78, 79. — Зубная боль 226, 231. — Ипохондрія и истерика 153, 154. — Кашель, катарральный 186, 187; органическій 192. — Кислотъ развитіе въ желудкѣ 250, 251. — Кишки прямой выпаденіе 297. — Костей пораженіе 79. — Личная боль 173. — Ломота 81, 83. — Менструальныя болѣзни 331, 332, 333. — Мозга спиннаго пораженіе 103. — Мочевого пузыря и канала катарръ 311. — Мочевыхъ органовъ болѣзни 320, 321; мочевые камни 319; мочи недержаніе (въ постели) 318. — Мошонки болѣзни 326. — Мышцовъ атрофія прогрессивная 353. — Нарывы въ носу 179; Полипы — 181. — Насморкъ 178. — Новообразованія: колѣна опухоль (бѣлая) 380; мозоли 382; мѣшеччатая опухоль 380; ознобленіе 382; полипы 381. — Обонянія разстройство 147. — Одышка 218. — Ожиреніе 98. — Охрипость 205. — Падучая болѣзнь 164. — Параличъ 168. — Полнокровіе 58. — Понось простой и кровавый 273, 279; изнурительный 100. — Ревматизмъ 85, 88. — Сердца болѣзни 105, 107. — Слюнотеченіе 224. — Сонъ ненормальный 134, 135. — Спинная боль 151, 152. — Сыпи, острия (лихорадочныя): крапивная сыпь 365; рожа 356; скарлатина 359; — хроническія (нелихорадочныя) 78, 368: веснушки 369; гнойная корка 377; зудящая сыпь 372; кровавые пузырьки 376; лишай кольцевидный 375, узловатый 372; мѣдная сыпь 373; парша 378; печеночныя пятна 369; пузырьчатая сыпь 374; садненіе 370; угри (простыя и съ точечками) 373; узловатая сыпь 371; чесотка 375; чешуйчатая сыпь 371; чирья кровавые 373. — Ударъ 122. — Хирургическія болѣзни: вывихъ 388; затвердѣлости 388; нагноеніе 386; надрывъ отъ подъема тяжести 389; нарывы 387; фистулы 388. — Холера 285. — Чахотки: брюшная 102; горловая 100; легочная 101. — Шумъ въ ухахъ 143; ломъ (стрѣльба) 145. — Языка опухоль 223.

Sulphuricum acidum. Геморрой 63. — Кислотъ развитіе въ желудкѣ 251. — Кровотеченія 70, 333. — Кровавыя пятна 370. — Молочница 221. — Рвота (кислая) 253. — Родимыя пятна 382. — Слюнотеченіе 224. — Хирургическія болѣзни: крововзпаніе подкожное 385; раны 385.

Symphytum off. Раны 385.

Tabacum. Мозга спинно-головного воспаление 118. — Холе-
ра 285. — Холерина 283.

Tartarus emeticus или **stibiatus.** Водянка 92. — Воспале-
ние гортани, горла дыхательного и бронхий 199; легких 209;
мозга 118; сердца и околосердечной сумки 112. — Гриппъ 188.
— Желудка размягчение 263. — Зубныя болѣзни (дѣтей) 234. —
Кашель, катарральный 187; органической 192. — Крупъ 201.
— Лихорадки: гастрическая 245; перемежающаяся 45. — Одыш-
ка 218. — Оспа 366. — Рвота 251, 252, 253. — Ревматизмъ 88.
— Спячка 135. — Тифъ 52. — Ударъ 122.

Tellurium. Чешуйчатая сыпь 371.

Terebinthina. Водянка 96. — Кровотеченія 66, 70. — Мо-
чеваго пузыря и канала катарръ 311. — Мочеваго пузыря, кана-
ла и почек воспаление 311. — Мочеваго пузыря судороги 315.

Teucrium marum verum. Глистныя болѣзни 292. — Поли-
пы 181, 381.

Thuja occidentalis. Бѣли 340. — Венъ расширение 113. —
Геморрой 63. — Гоноррея 344, 345. — Кровеносныхъ сосудовъ
болѣзни 113. — Личная боль 173. — Нарывы 387. — Новообра-
зованія: бородавки 381; мозоли 382; полипы 381. — Ревматизмъ
89. — Сифилиса вторичныя формы 348, 349. — Сыпи, хрониче-
скія 368: мѣдная сыпь 373; пузырьчатая сыпь 374; узловатая
371; чирья кровяные 374. — Фигообразныя шишки 347. — Язы-
ка опухоль 223.

Trillium pendulum. Бѣли 340. — Кровотеченія 71, 72; по-
сомъ 71; изъ матки 72. — Кровохарканіе 71. — Менструальныя
болѣзни 335. — Моча кровавая 72. — Мочезвуреніе сахарное
98. — Поносъ простой и кровавый 280.

Tussilago petasites. Гоноррея 344.

Uranium muriaticum. Сахарное мочезвуреніе 98.

Urtica urens. Крапивная сыпь 365.

Uva ursi. Кровотеченія 70. — Мочеваго пузыря катарръ
313.

Valeriana offic. Ипохондрія и истерика 153. — Просовидная сыпь 364. — Судороги 164; — отъ глисть 295. — Тифъ 53.

Veratrum album. Бородавки 381, — Веснушки 369. — Вѣтры 254. — Глазныя болѣзни 140. — Глухота 142. — Головная боль 126, 131. — Грыжи 389. — Душевные недуги 137. — Желудка катарръ 249; размягченіе 264. — Желчныхъ путей болѣзни 303; желчная колика 300. — Живота боль (колика) 268, 271. — Запоръ 289. — Зубныя болѣзни (у дѣтей) 234. — Кашель, органической 192; судорожный 194. — Коклюшъ 197. — Кровотеченія 71. — Личная боль 173. — Менструальныя болѣзни 335. — Нервовъ слабость 157. — Обморокъ 175. — Обонянія разстройство 147. — Одышка 218. — Параличъ 168. — Перемежающаяся лихорадка 44. — Поносъ простой и кровавый 273, 274, 278. — Рвота 252, 253. — Сердца болѣзни 107. — Сонъ ненормальный 135. — Судороги 159, 163, 331. — Тифъ 52. — Холера 285. — Холерина 282.

Veratrum viride. Водянка 96. — Воспаленіе легкихъ 209; мозга 118; спинно-головного 119; мочевого пузыря 311; почекъ 311; сердца и околосердечной сумки 112. — Геморрой 64. — Глазныя болѣзни 141. — Желѣзь грудныхъ болѣзни 213. — Истерика 154. — Лихорадки: перемежающаяся 45; родильная 55. — Мочезнуреніе сахарное 98. — Мошонки болѣзни 326. — Поносъ простой и кровавый 280. — Ревматизмъ 90. — Сердца болѣзни 110. — Судороги 165. — Сыни: оспа 366; скарлатина 360. — Тифъ 53. — Холера 285.

Verbascum Thapsus. Личная боль 172.

Viola tricolor. Сыни, хроническія 368: гнойная корка 377; молочная корка 377.

Xanthoxylum fraxineum. Бѣли 340. — Глазныя болѣзни 141. — Ипохондрія 154. — Колика отъ вѣтровъ 272. — Менструальныя болѣзни 335, 336. — Параличъ 168. — Поносъ 280. — Холера, 285.

Zincum (metallicum, oxydatum). Воспаленіе мозга 118; мозга спинного 150. — Геморрой 63. — Глазныя болѣзни 140. —

Запоръ 289. — Зубныя болѣзни (дѣтей) 233. — Личная боль 173. — Мошонки болѣзни 326. — Недержаніе мочи 318. — Параличъ 167; — отъ удара 122. — Ревматизмъ 88. — Сонъ ненормальный 135. — Спинальная боль 151. — Судороги 158, 159, 163; отъ глисть 295; при скарлатинѣ 359. — Тифъ 52.

Zizia aurea. Судороги 165.



Алфавитный указатель. *)

А.	
Абсцессы	385.
Аддисонова болѣзнь	155. 320.
Англійская болѣзнь	76.
Антоновъ огонь	388.
Аорты расширение	112.
Аппарата дыхательнаго болѣзни	176.
— пищеварительнаго бо-	
лѣзни	219.
Аппетита отсутствие	244. 250.
Аскариды	290.
Атрофія мускуловъ, прогрессив-	
ная	353.

Б.

Базедова болѣзнь	113. 155.
Безплодіе женское	350.
Безспіе мужское	324.
Безсонница	134.
Безсонница дѣтей	135.
Беременныхъ и родильницъ су-	
дороги	157. 165.
Беременныхъ прихоти	253.
Блескъ передъ глазами	140.
Близорукость	141.
Боли въ животѣ	268. 271.
— въ почкахъ	315.
— желудочныя	255. 260.
— нервныя	169. 173.
Боль въ мускулахъ	84.

Боль въ поясницѣ	59.	Стр. 84.
— въ спинѣ	150.	
— въ суставахъ	84.	89.
— въ ушахъ	144.	
— головная	125.	131.
— зубная	224.	232.
— личная	169.	173.
— при испусканіи мочи	314.	
— при отдѣленіи регуль	329.	
— прямой кишки	59.	
— сѣдалищная	84.	89.
Болѣзненное состояніе крови от-		
носительно качества	76.	
Болѣзненное состояніе крови от-		
носительно количества	56.	
Болѣзни большихъ кровеносныхъ		
сосудовъ	112.	
— бронхій	181.	
— глазныя	138.	141.
— глистные	290.	
— гортани	181.	
— грудобрюшной преграды	351.	
— душевныя	136.	
— дыхательнаго аппарата .	176.	
— дыхательнаго горла	181.	
— желудка	242.	
— желчныхъ путей	298. 304.	
— зубныя дѣтей	232.	
— зѣва	235.	
— изнурительныя	99. 103.	
— кишечнаго канала	242.	

*) Если при болѣзни приведены двѣ страницы, то вторая въ большинствѣ случаевъ указываетъ на новыя лѣкарства, употребляемыя противъ упомянутой болѣзни.

	Стр.		Стр.
Болезни кожи	354.	Болезнь трихинная	295.
— кровеносной системы	37. 104.	Бородавки	381. 382.
— легких	181.	Брайтова болезнь почек	91. 96.
— менструальная	329. 335.	Бронзовая болезнь	155.
— мозга и его оболочек	114.	Бронхий болезни	181.
— мочевого пузыря	308. 311.	— воспаление	198. 204.
— мочевых путей	307. 311.	— чахотка	101.
— мочеточников	308. 311.	Брюшины воспаление	264. 267.
— мускульной системы	351.	Брюшная водянка	91. 96.
— кожные у золотушли- вых	78.	— чахотка	102.
— первой системы	114.	Брюшной тиф	46. 53.
— первых движений	155.	Бубоны	347.
— первых чувств	155.	Бугорки	101.
— органов глотания	219.	Будущность гомеопатии	12.
— органов жевания	219.	Белая опухоль колена	380.
— органов чувств	138.	— — лядвей	113.
— пищеварительного аппа- рата	219.	Белая просовидная сыпь	363.
— подреберной плевры	181.	Бели	336. 340.
— половья вследствие за- ражения	341.	Белковидная моча	91. 96.
— половья не заразитель- ная	322.	Бешенство	137.
— почек	308.		
— психическая	136.	В.	
— селезенки	297.	Вариолонды	367.
— сердца	104. 109.	Венз воспаление	113.
— сердца неорганическая	105.	— расширение	113.
— сердца органическая	107.	Верлгофа болезнь	369. 370.
— слизистых оболочек	176.	Веснушки	368.
— спинного мозга	148.	Видения	137.
— уха	142.	Виттова пляска	159. 165.
— хирургическая	383.	Вкуса разстройство	147.
— черепа	133.	Внѣшнее устройство домашней гомеопатической аптечки	19.
— яичек	325. 326.	Водяная грыжа яичка	326.
Болезнь Аддисонова	155. 320.	Водянка грудная	91. 96.
— английская	76.	— желчного пузыря	91.
— Базедова	113. 155.	— живота	91. 96.
— бронзовая	155.	— клетчатой ткани	91.
— Верлгофа	369. 370.	— легких	91.
— каменная	819. 321.	— матки	91.
— падучая	157. 165.	— мозговая	91. 96.
— почек, Брайтова	91. 96.	— мошонки	91. 96.
		— околосердечной сумки	91.
		— острая мозга	114.
		— подкожная	91. 96.

	Стр.		Стр.
Водянка почек	91. 96.	Воспаленіе сердца	110. 112.
— суставовъ	91.	— спинного мозга	148.
— фаллопиевыхъ трубъ	91.	— спинно-головного моз-	
— яичниковъ	91.	га	114. 118.
Водянки	91. 96.	— уха	148.
Водяной ракъ	219.	— языка	222.
Возбужденная половая похоть	137.	— язычка	235.
Волненіе крови	56.	— яичекъ	325. 326.
Вонючее истеченіе изъ носу	179.	Воспалительная лихорадка, см.	
Воспаленіе бронхій	198. 204.	воспаленія.	
— брюшины	264. 267.	Воспалительная опухоль крайней	
— венъ	118.	плоти	348.
— геморроидальныхъ ши-		Воспалительная пузырьчатая сыпь	363.
шекъ	63.	Воспалительныя сыпи	354.
— глазныхъ вѣкъ	138.	Вторичныя формы сифилиса	348.
— глазъ	139. 141.	Вывихъ	388.
— горла	235. 239.	Выкидышъ	64. 72.
— гортани	198. 235.	Выпаденіе прямой кишки	296. 297.
— грудныхъ желѣзъ	212. 213.	Выпотѣніе мозговое	114.
— грудобрюш. преграды	351.	Вѣкъ глазныхъ воспаленіе	138.
— дыхательнаго горла	200.	Вѣтреная оспа	367.
— желудка	261. 262.	Вѣтры	253.
— зѣва	235.		
— кишекъ	264. 267.	Г.	
— легкихъ	206. 209.	Гангренозная жаба	239. 241.
— матки	327.	Ганеманна жизнь и дѣятель-	
— миндалевидныхъ же-		ность	2.
лѣзъ	235.	Гастрическая лихорадка	244.
— мозга	114. 118.	Гастрическіе недуги	242. 249.
— мочеваго канала	309.	Гастрическое состояніе	243. 249.
— мочеваго пузыря	309. 311.	Геморроидальная колика	63. 64.
— нѣба	235.	— сыпь	63.
— нижней части живо-		Геморроидальный зудъ	63.
та	264. 267.	Геморроидальныхъ шишекъ вос-	
— околосердечной		паленіе	63.
сумки	110. 112.	Геморроидальныя кровотеченія	63.
— околоушныхъ слю-		— шишки	66.
ныхъ желѣзъ	146. 147.	Геморрой	59. 64.
— печени	305. 307.	— мочеваго пузыря	59.
— пищепріемнаго горла	242.	Глазныхъ вѣкъ воспаленіе	138.
— подреберной плевры	210.	Глазныя болѣзни	138. 141.
— почекъ	309. 311.	Глазь воспаленіе	139. 141.
— поясничной мышцы	352.	Глазь гноеточивость	140.
— селезенки	297. 298.		

	Стр.		Стр.
Глазь слабость	139.	Грудобрюшной преграды воспа-	Стр.
Глистная кельма	268.	леніе	351.
— лихорадка	292.	— — параличь	351.
Глистные болѣзни	290.	Грыжи	389.
Глисты мелкія	291.		
Глотательныхъ органовъ болѣзни	219.	Д.	
Гаухота	142.	Дальнозоркость	141.
Гнилая лихорадка	46.	Дифтеритъ	239. 241.
Гнилость рта	219. 222.	Диѣтетическія наставленія	31.
Гноеточивость глазъ	140.	Дурачество	137.
Гнойная корка	376.	Дурной запахъ изо рта	222.
Головного мозга страданія	102.	Душевные недуги	136. 138.
Головная боль	125. 131.	Дыханія стѣсненіе	213. 219.
Головокруженіе	122. 125.	Дыхательнаго аппарата болѣзни	176.
Головы кровяная опухоль у дѣ-		— горла болѣзни	181.
тей	133.	— — чахотка	100.
Голоса утрата	204.	Дѣвчья немочь	72.
Гомеопатія будущность	12.	Дѣтей холера	281. 285.
— основаніе	2.	Дѣтскій самостоятельный пара-	
Гомеопатическаго способа лѣче-		личья	166.
нія основныя черты	15.	Дюшена параличь мускуловъ	166.
Гомеопатической домашней ап-			
течки виѣшнее устройство	19.	Ж.	
Гомеопатической домашней ап-		Жаба гангренозная	239. 241.
течки составъ	24.	— грудная	213.
Гоноррея	343.	Желтуха	299. 304.
Горла воспаленіе	235. 239.	Желудка болѣзни	242.
Горла дыхательнаго болѣзни	181.	— воспаленіе	261. 262.
— — чахотка	100.	— катарръ	243. 249.
— вищепріемаго воспаленіе	242.	— кровотеченіе	65. 71.
Горловая чахотка	100.	— ослизненіе	243.
Гортани болѣзни	181.	— размягченіе	263.
— воспаленіе	198. 235.	— слабость	245. 250.
Гортанная чахотка	100.	— судороги	255. 260.
Гортанной щели судороги	213. 219.	Желудокъ испорченный	243.
Горячка нервная	45. 53.	Желудочные недуги	242. 249.
— — изнурительная	102.	Желудочныя боли	255. 260.
Гриппъ	188. 204.	Желчнаго пузыря водянка	91.
Груди стѣсненіе	213.	Желчная колика	298. 304.
— судороги	213.	— лихорадка	299. 304.
Грудная водянка	91. 96.	Желчное состояніе	298.
— жаба	213.	Желчные камни	300. 304.
Грудныхъ желѣзь воспаленіе	212.	Желчныхъ путей болѣзни	298. 304.
Грудобрюшной преграды болѣзни	351.		

	Стр.
Желѣзь грудныхъ воспа-	
леніе	212. 213.
— мидалевидныхъ воспа-	
леніе	235.
— паховыхъ припуханіе .	343.
— припуханіе при золотухѣ	77.
Жемское безплодіе	350.
Живота боли	268. 271.
— водянка	91. 96.
— нижней части вос-	
паленіе	264. 267.
Животные паразиты	290.
Жизнь и дѣятельность Ганемал-	
на	2.
Жужжаніе въ ушахъ	143.

З.

Задержаніе мочи	316.
Запахъ дурной изо рта	222.
Запоръ	286. 289.
Зараженіе сифилитическое	341.
Затвердѣлости	388.
Затрудненное испусканіе мочи .	314.
Злоупотребленіе хиной	45.
Зобъ	379.
Золотуха	76. 80.
Зрѣнія помраченіе	140. 141.
— слабость	139.
Зубная боль	224. 232.
— лихорадка	233.
Зубныя болѣзни дѣтей	232.
Зубовъ трудное прорѣзываніе .	232.
Зудъ въ заднемъ проходѣ	63. 291. 372.
— геморроидальный	63.
Зудящая сыпь	372.
Зѣва болѣзни	235.
— воспаленіе	235.

И.

Изжога	250.
Изліяніе сѣмени непроизвольное	323.
Изнурительная лихорадка . 99.	103.
— нервная горячка	102.

	Стр.
Изнурительныя болѣзни	99. 103.
Изолированные пузырьки	374.
Икота	351.
Ипохондрія	152. 154.
Искривленіе костей	78.
— позвоночнаго столба	79.
Испорченный желудокъ	243.
Испраженія кровавыя	64.
Испусканіе мочи затрудненное .	314.
— — ночью, неволь-	
ное	317.
— — съ болью	314.
Истерика	152. 154.
Истеченіе вонючее изъ носу . .	179.
— изъ уха	145.
Истощеніе спиннаго мозга всл.	
пол. изл.	322.
Истощеніе старческое	99.
Исхуданіе	99. 103.

К.

Каменная болѣзнь	319. 321.
Камни желчныя	300. 304.
— мочевые	319. 321.
— почечныя	319.
Канала кишечнаго болѣзней . . .	242.
Канала мочеваго воспаленіе . .	309.
— — катарръ	311.
Катарральная лихорадка	182.
Катарральныи кашель	182.
Катарръ желудка	243. 249.
— мочеваго канала	311.
— — пузыря	311. 314.
— носа	176.
Кашель	181. 203.
— катарральныи	182.
— органическій	188.
— судорожныи	192.
Кислоты въ желудкѣ	250.
Кишечкѣ воспаленіе	264. 267.
Кишечнаго канала болѣзни . . .	242.
Кишки прямой боль	59.
— — выпаденіе	296. 297.

Клоническія судороги	Стр. 158.
Клѣтчатой ткани водянка	91.
Кожи болѣзни	354.
— и костей сифилитическое пораженіе	348.
Коклюшъ	195.
Колика въ почкахъ	315.
— геморроидальная	63. 64.
— глистная	268.
— желчная	298. 304.
— отъ вѣтровъ	268. 271.
— свинцовая	268. 272.
Колики	268. 271.
Колотье въ селезенкѣ	297.
Кольцевидный лишай	375.
Колѣна бѣлая опухоль	380.
Конвульси	157. 165.
Кондиломы	347.
Корка гнойная	376.
— молочная	377.
Корь	361.
Косоглазіе	140. 141.
Костей искривленія	78.
— опуханіе	78.
— переломъ	384.
— пораженіе при золотухѣ	78.
— раны	384.
Костные наросты на головѣ	381.
Костоѣда	387.
Крайней плоти опухоль воспа- лительная	343.
Крапивная сыпь	364.
Красная просовидная сыпь	363.
Краснуха	362.
Кровавая моча	64. 72.
Кровавыя испраженія	64.
Кровавый поносъ	274. 280.
Кровеносной системы бо- лѣзни	37. 104.
Кровеносныхъ сосудовъ большихъ болѣзни	112.
Крови болѣзненное состояніе от- носительно ея качества	76.
Крови болѣзненное состояніе от-	

носительно количества	Стр. 56.
Крови волненіе	56.
— приливъ	56.
Кровоизліаніе подкожное	385.
Кровотеченіе изъ желудка	65. 71.
— — легкихъ	64.
— — матки	64. 72.
— — мочевого пузыря	64.
— — почекъ	64.
— носомъ	64. 71.
— подкожное	64.
Кровотеченія	64. 71.
— геморроидальныя	63.
Кровохарканіе	64. 71.
Кровью рвота	64. 71.
Кровяная опухоль головы у но- ворожденныхъ	133.
Кровяные пузырьки	376.
— чирья	373.
Кровяныя пятна	369. 370.
Крупъ	199.

Л.

Лазаретная лихорадка	46.
Легкихъ болѣзни	181.
— водянка	91.
— воспаленіе	206. 209.
— расширеніе	181. 214.
Легочная чахотка	101. 103.
Легочный тифъ	46.
Летающія мушки	140.
Лихорадка	37.
— гастрическая	244.
— гнилая	46.
— желчная	299. 304.
— зубная	233.
— изнурительная	99. 103.
— катарральная	182.
— лазаретная	46.
— молочная	55.
— нервно-гастрическая	46.
— отъ глисть	292.
— перемежающаяся	38. 45.

	Стр.
Лихорадка ревматическая	84. 89.
— родильная	53. 55.
— скарлатинная	356.
— слизистая	46.
— сопровождающая по- ранение	385.
Лихорадочныя сыпи	354.
Личная боль	169. 173.
Лишай	371.
— кольцевидный	375.
— отрубевидный	369.
— узловатый	371.
Лишайные пузырьки	374.
Ломота	80. 83.
Ломъ въ ухахъ	144.
Лядвеи бѣлая опухоль	113.

М.

Малокровіе	72.
Матки водянка	91.
— воспаление	327.
Меланхолія	136.
Мелкія глисты	291.
Менструальныя болѣзни	329. 335.
Механическія поврежденія	383.
Милларова одышка	213.
Миндалевидныхъ желѣзъ воспа- леніе	235.
Мозга воспаленіе	114. 118.
— головного страданія	102.
— и его оболочекъ болѣзни.	114.
— острая водянка	114.
— спиннаго болѣзни	148.
— — воспаленіе	148.
— — истощеніе всл. пол. изл.	322.
— — параличь	166. 168.
— — пораженіе	103.
— — раздраженіе	150. 152.
— спинно-головнаго воспа- леніе	114. 118.
Мозговая водянка	91. 96.
Мозговое выпотѣніе	114.

	Стр.
Мозговой тифъ	46.
Мозоли	382.
Молочная корка	377.
— лихорадка	55.
Молочница	221. 222.
Моча бѣлковинная	91. 96.
— кровавая	64. 71.
Мочевого канала воспаленіе	309.
— — катарръ	311.
— — пузыря болѣзни	308. 311.
— — воспаленіе	309. 311.
— — геморрой	59.
— — катарръ	311. 314.
— — параличь	317. 319.
— — судороги	315. 316.
Мочевые камни	319. 321.
Мочевыхъ путей болѣзни	307. 311.
Мочезнуреніе сахарное	97. 98.
Мочерѣзь	314.
Мочеточниковъ болѣзни	308. 311.
Мочи задержаніе	316.
— затрудненное испусканіе	314.
— испусканіе невольное по- чью	317.
— недержаніе	317. 319.
Мотонки водянка	91.
Мужское безсиліе	324.
Мускуловъ параличь Дюшена	166.
— — прогрессивная атро- фія	353.
— — растяженіе чрезмѣр- ное	388.
Мускульной системы болѣзни	351.
Мушки летающія	140.
Мышцы поясничной воспаленіе	352.
Мѣдная сыпь	373.
Мѣшеччатая опухоль	380.

Н.

Нагноеніе	385.
Надрывъ отъ подъема тяжестей	388.
Нажошныя болѣзни у золотуш- ливыхъ	78.

	Стр.		Стр.
Наросты	379. 381.	Оболочекъ слизистыхъ болѣзни	176.
— костные на головѣ	381.	Обонянiя разстройство	147.
— на сухожилияхъ	381.	Огонь Антоновъ	388.
— просовидные	141.	Одышка	213. 219.
Нарывы	386. 387.	— Милларова	213. 219.
— въ носу	179. 180.	— судорожная	213.
— на языкѣ	223.	Ожирѣнiе	98.
Насморкъ	176.	Ожоги	384.
Наставленiя дiететическiя	31.	Ознобленiе	382.
Настоящая оспа	365.	Околосердечной сумки водянка	91
Неба воспаленiе	235.	— — — — —	воспале-
Невольное испусканiе мочи ночью	317.	нiе	110. 112.
Невралгiи	169. 173.	Околоушныхъ слюннхъ же-	
Недержанiе мочи	317. 319.	лъзъ воспаленiе	146. 147.
Недуги гастрическiе	242. 249.	Опрѣлость	370.
— душевные	136. 138.	Опуханiе костей	78.
— желудочные	242. 249.	Опухоль бѣлая ядвен.	113.
— печени	307.	— воспалительная крайней	
— психическiе	136. 138.	плоти	343.
Неистовство	137.	— кровяная головы у но-	
Нелихорадочныя сны	367. 379.	ворожденнхъ	133.
Немочь дѣвичья	72.	Опухоль мѣшеччатая	380.
Ненормальный сонъ	133. 135.	— носа	179.
Неорганическiя болѣзни сердца	105.	— сальная	380.
Неповоротливость языка	224.	— селезенки	298.
Непроизвольное излiянiе сѣмени	323.	— языка	223.
Нервная горячка	45. 53.	Органическiй кашель	188.
— изнурительная горячка	102.	Органическiя болѣзни сердца	107.
Нервно-гастрическая лихорадка	46.	Органовъ глотанiя болѣзни	219.
Нервное оцѣненiе	157.	— движенiя параличь	165. 168.
Нервной системы болѣзни	114.	— жеванiя болѣзни	219.
Нервные боли	169. 173.	— чувствъ —	188.
— чахотки	102.	— — параличь	174.
Нервовъ движенiя болѣзни	155.	Ослизненiе желудка	243.
— слабость	156.	Основанiе гомеопатiи	2.
— чувствъ болѣзни	155.	Основныя черты гомеопатическа-	
Нечувствительность	174.	го способа лѣченiя	15.
Новообразованiя	379. 382.	Осла вѣтрная	367.
Погтофда	385.	— настоящая	365.
Носа катарръ	176.	Оспенныя сны	365. 366.
— опухоль	179.	Оспы настоящей легкая форма	367.
О.		Острая водянка мозга	114.
Обморокъ	174.	Отдѣленiе мочи, содержащей мно-	
		го бѣлковины	91. 96.

	Стр.		Стр.
Отекъ	91.	Поврежденія механическія	383.
Отмороженіе	382.	Повтореніе приемовъ	23.
Отнятіе ребенка отъ груди, со- пряженныя съ этимъ явленія 55.	212.	Подагра	81.
Отрубевидный лишай	369.	Подкожная водянка	91. 96.
Отсутствіе аппетита	244. 250.	Подкожное кровоизліяніе	385.
— регуль	329. 335.	— кровотеченіе	64.
Охриплость	204. 206.	Подреберной плевры болѣзни	181.
Оцѣпенѣніе нервное	157.	— — воспаленіе	210.
II.			
Падучая болѣзнь	157. 165.	Позвоночнаго столба искривле- нія	79.
Памяти слабость	137.	Полипы	380. 381.
Паразиты животные	290.	— въ носу	180.
Параличъ	166. 168.	Поллюціи	323.
Параличъ грудобрюшной прегра- ды	351.	Полнокровіе	57.
— душевно-больнаго	137.	Половая похоть возбужденная	137.
— дѣтскій самостоятельный	166.	Половыя болѣзни	322.
— мочевого пузыря	317. 319.	— — не заразитель- ныя	322.
— мускуловъ, Дюшена	166.	— — отъ зараженія	341.
— органовъ движе- нія	165. 168.	Помраченіе зрѣнія	140. 141.
— — чувствъ	174.	Помѣшательство	137.
— языка	224.	— религиозное	137.
Парша	378. 379.	Поносъ кровавый	274. 280.
Паховыхъ желѣзъ припуханіе	343.	Поносъ простой	272. 280.
Перелой	343.	Пораженіе костей при золотухѣ	78.
Переломъ костей	384.	— спиннаго мозга	103.
Перемежающаяся лихорадка	38. 45.	Поть	99.
Печени воспаленіе	305. 307.	Похоть половая возбужденная	137.
— недуги	307.	Почекъ болѣзни	308.
Печеночныя пятна	369.	— болѣзнь, Брайтова	91. 96.
Пищеваренія разстройство при золотухѣ	77.	— водянка	91. 96.
Пищеварительнаго аппарата бо- лѣзни	219.	— воспаленіе	309. 311.
Пищеприѣмнаго горла воспаленіе	242.	Почечные камни	319.
Плевры подреберной болѣзни	181.	Поясная рожа	363.
— — воспаленіе	210.	Поясничной мышцы воспаленіе	352.
Плоскія сыпи	355.	Преграды грудобрюшной болѣзни	351.
Пляска св. Витта	159. 165.	— — воспаленіе	351.
Повихъ	389.	— — параличъ	351.
		Приготовленіе разжиженій	20.
		Приливъ крови	56.
		— къ нижней части жи- вота	58.
		Принятіе лѣкарствъ	20.
		Припуханіе желѣзъ при золотухѣ	77.

	Стр.
Припуханіе паховыхъ желѣзъ	343.
Прихоти беременныхъ	253.
Пріемовъ повтореніе	23.
Прогрессивная атрофія мускуловъ	353.
Пролежни	384.
Прорѣзываніе трудное зубовъ	232.
Просовидная сыпь бѣлая	363.
— — красная	363.
Просовидные наросты	141.
Просовидныя сыпи	363.
Прохода задняго зудъ	63. 291. 372.
Прямой кишки выпаденіе	296. 297.
Психическіе недуги	136. 138.
Пузырки изолированныя	374.
— кровяные	376.
— лишайныя	374.
Пузырчатая сыпь	376.
Пузырчатая воспалительная сыпь	363.
— хроническія сыпи	374.
Пузыря желчнаго водянка	91.
— мочевого болѣзни	308. 311.
— — воспаленіе	309. 311.
— — геморрой	59.
— — катарръ	311. 314.
— — параличь	317. 319.
— — судороги	315. 316.
Пустулезныя сыпи	376.
Путей желчныхъ болѣзни	298. 304.
Пѣніе въ ушахъ	143.
Пятна кровяныя	369. 370.
— печеночныя	369.
— родимыя	382.
Пятнистыя сыпи	355.

Р.

Раздраженіе спиннаго мозга	150. 152.
Разжиженій приготовленіе	20.
Размягченіе желудка	263.
Разстройство вкуса	147.
— обонянія	147.
— пищеваренія при золотухѣ	77.
— регуль	329.

Разстройство чувствъ	147.
Ракъ водяной	219.
Раны	383.
— костей	384.
— на желѣзахъ	385.
— на суставахъ	384.
— огнестрѣльныя	384.
— отъ отмороженія	384.
— отъ паденія	383.
— отъ толчка	383.
— отъ укуса	384.
— отъ ущемленія	383.
Растяженіе мускуловъ, чрезмѣрное	388.
— сочлененій	389.
Расширеніе аорты	112.
— венъ	113.
— жилъ у женщинъ	63.
— легкихъ	181. 214.
Рвота	250. 251.
— кровью	64. 71.
Ревматизмъ	84. 89.
— суставовъ	84. 89.
— уха	144.
Ревматическая лихорадка	84. 89.
Регуль отсутствіе	329. 335.
Регуль разстройство	329.
Регуль слишкомъ обильныя	329.
Религіозное помѣшательство	137.
Родильная лихорадка	53. 55.
Родимыя пятна	382.
Рожа	355. 356.
— поясная	363.
Рта гнилость	219. 222.

С.

Сальная опухоль	380.
Самостоятельный дѣтскій параличь	166.
Сахарное мочеизнуреніе	97. 98.
Сведеніе челюстей	157. 165.
Свинка	146.
Свинцовая колика	268. 272.
Свистъ въ ушахъ	143.

	Стр.		Стр.
Селезенки болѣзни	297.	Спинно-головного мозга во-	
— воспаление	297. 298.	спаленіе	114. 118.
— опухоль	298.	Спячка	134.
Сердца болѣзни	104. 109.	Ссадина	370.
— — неорганическія	105.	Старческое истощеніе	99.
— — органическія	107.	Столба позвоночнаго искривле-	
— воспаление	110. 112.	нія	79.
Сердцебиеніе	104.	Столбнякъ	158.
Системы кровеносной болѣзни	104.	Страданія головного мозга	102.
— мускульной —	351.	Стрѣльба въ ушахъ	144.
— нервной —	114.	Стѣсненіе въ груди	213.
— половой —	307.	— дыханія	213. 219.
Сифилиса вторичныя формы	348.	Судороги	157. 165.
Сифилитическое зараженіе	341.	— беременных и родиль-	
— пораженіе кожи	348.	ницъ	157. 165.
и костей	348.	— гортанной щели	213. 219.
Скарлатина	356. 360.	— груди	213.
Скарлатинная лихорадка	356.	— желудка	255. 260.
Слабость глазъ	139.	— икръ	158.
— желудка	245. 250.	— клоническія	158.
— зрѣнія	139.	— мочевого пузыря	315. 316.
— нервовъ	156.	— отъ ранъ	157.
— памяти	137.	— тоническія	158.
Слабоуміе	137.	Судорожная одышка	213.
Слизетеченія при золотухѣ	78.	Судорожное сведеніе челюстей	158.
Слизистая лихорадка	46.	Судорожный кашель	192.
— чахотка	101.	Сумки околосердечной воспали-	
Слизистыхъ оболочекъ болѣзни	176.	ніе	110. 112.
Слѣбота	140. 141.	Сустановъ водянка	91.
Слюнотеченіе	224.	Сухотка дѣтей	102.
Сокращеніе членовъ у дѣтей	159. 165.	Сыпи лихорадочныя	354.
Солитеръ	291.	— нелихорадочныя	367. 379.
Сонъ ненормальный	133. 135.	— оспенныя	365. 366.
Составъ домашней гомеопатиче-		— плоскія	355.
ской аптечки	24.	— просовидныя	363.
Состояніе гастрическое	243. 249.	— пузырьчатыя воспалительныя	363.
— желчное	298.	— — хроническія	374.
Спинаго мозга болѣзни	148.	— пустулезныя	376.
— — воспаление	148.	— пятнистыя	355.
— — истощеніе всл.		— узловатыя	371.
пол. изл.	322.	— чешуйчатыя	370. 371.
Спинаго мозга параличь	166. 168.	Сыпь геморроидальная	63.
— — пораженіе	103.	— зудящая	372.
— — раздраженіе	150. 152.	— крапивная	364.

	Стр.
Сыпь мѣдная	373.
— просовидная бѣлая	363.
— — красная	363.
— пузырчатая	376.
— сопровождающая прорѣзываніе зубовъ	371.
Сѣдалищная боль	84. 89.
Сѣмени изліяніе, произвольное	323.

Т.

Тифъ	45. 53.
— брюшной	46. 53.
— легочный	46.
— мозговой	46.
Ткани клетчатой водянка	91.
Тоническія судороги	158.
Тошнота	244. 250.
Трипперъ	343.
Трихинная болѣзнь	295.
Трубъ фаллопиевыхъ водянка	91.
Трудное прорѣзываніе зубовъ	232.
Тупоуміе	137.

У.

Угри	372.
— съ точечками	373.
Ударъ	119. 122.
Узловатый лишай	371.
Узловатая сыпь	371.
Устройство виѣшеное домашней гомеопатической аптечки	19.
Утрата голоса	204.
Уха болѣзни	142.
— воспаленіе	143.
— ревматизмъ	144.

Ф.

Фаллопиевыхъ трубъ водянка	91.
Фягообразныя шишки	347.
Фистулы	385. 387.

Х.

	Стр.
Хиной злоупотребленіе	45.
Хирагра	81.
Хирургическія болѣзни	383.
Холера дѣтей	281. 285.
— эндемическая	283. 285.
Холерина	281.
Хроническая пузырчатая сыпь	374.

Ц.

Чахотка бронхіальная	101.
— брюшная	102.
— горловая	100.
— гортанная	100.
— легочная	101. 103.
— нервная	102.
— отъ разрушенія мускуловъ, костей, суставовъ	103.
Чахотка слизистая	101.
Чахотки	99. 102.
Челюстей сведеніе	157. 165.
— судорожное сведеніе	158.
Черепя болѣзни	133.
Черты основныя гомеопатическаго способа лѣченія	15.
Чесотка	375. 376.
Чешуйчатая сыпь	370. 371.
Чирья кровяные	373.
Членовъ сокращеніе у дѣтей	159. 165.
Чрезмѣрное растяженіе мускуловъ	388.
Чувство жара	56.
Чувствъ разстройство	147.

Ш.

Шанкеръ	345.
Шишекъ геморроидальныхъ воспаленіе	63.
Шипки геморроидальныя	66.
— фягообразныя	347.
Шумъ въ ушахъ	142.

	Стр.		Стр.
Щ.		Языка воспаление	222.
Щели гортанной судороги	213. 219.	— неворотливость	224.
		— опухоль	223.
Э.		— паралич	224.
Эпидемическая холера.	283. 285.	Языка воспаление	235.
		Яичекъ болѣзни	325. 326.
Я.		— воспаление	325. 326.
Язвы	386. 387.	Яичка водяная грыжа	326.
		Яичниковъ водянка	91.
		Ячмени	141.

0

89

н.об. СМ. СЕМУ

с. 367.

Л. М. Школенко



2011142081